This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

+ *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.

+ *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.

+ *Beibehaltung von Google-Markenelementen* Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.

+ *Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität* Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter `http://books.google.com` durchsuchen.


FROM THE LIBRARY OF
J. V. Uspensky
PROFESSOR OF MATHEMATICS
AT STANFORD, 1929–1947
*
Therefore the mind which is free from passions is a citadel,
for man has nothing more secure to which he can fly for refuge
and for the future be inexpugnable.
—Marcus Aurelius
*
STANFORD UNIVERSITY
LIBRARIES

Aſtronomie

von

J. G. F. Bohnenberger,
Profeſſor zu Tübingen.

Mit acht Kupfertafeln.

Tübingen,
in der J. G. Cotta'ſchen Buchhandlung.
1811.

Astronomie

von

J. G. F. Bohnenberger,
Professor zu Tübingen.

Mit acht Kupfertafeln.

Tübingen,
in der J. G. Cotta'schen Buchhandlung.
1811.

QB 43
B7

Vorrede.

Ich habe gesucht, die Lehren der Astronomie in derjenigen Ordnung vorzutragen, in welcher sie erfunden worden sind, ohne dabey mehr als die Kenntniß der Elementargeometrie und einiger der bekanntesten Sätze von den Kegelschnitten vorauszusetzen. Was mit kleinerer Schrift gedruckt ist, und bey dem ersten Durchlesen überschlagen werden kann, setzt die Trigonometrie voraus, und enthält theils Berechnungen der in dem Text angezeigten geometrischen Construktionen, theils die Beweise der in dem Text entweder historisch angeführten, oder nur für besondere Fälle bewiesenen Sätze.

Die mit römischen und arabischen Zahlen angeführten Sätze beziehen sich auf Euklids Elemente, oder wenn ein K. vorangesetzt ist, auf H. Prof. Camerers Uebersetzung der drey ersten Bücher Simsons von den Kegelschnitten (Tübingen in der J. G. Cotta'schen Buchhandlung, 1809.)

Tübingen den 1. October 1810.

J. G. F. Bohnenberger.

Inhaltsanzeige.

Erſtes Buch.
Von den ſcheinbaren Bewegungen der Himmelskörper. (Sphäriſche Aſtronomie.)

		Seite
I.	Cap. Von der täglichen Bewegung des Himmels.	1.
II.	Cap. Von der aſtronomiſchen Stralenbrechung und Parallaxe.	19.
III.	Cap. Von den ſcheinbaren Bewegungen der Sonne und der Zeitmeſſung.	43.
IV.	Cap. Von den Bewegungen des Monds, ſeinen Lichtgeſtalten, und den Finſterniſſen.	90.
V.	Cap. Von den Bewegungen der Planeten.	126.

Zweytes Buch.
Von den wahren Bewegungen der Himmelskörper. (Theoriſche Aſtronomie.)

I.	Cap. Von der Geſtalt und Größe der Erde.	187.
II.	Cap. Von den Bewegungen der Erde, und den davon abhängenden Erſcheinungen.	219.
III.	Cap. Von den Geſetzen der Bewegung der Planeten um die Sonne, und der Geſtalt ihrer Bahnen.	246.
IV.	Cap. Von den Bahnen der Cometen.	320.
V.	Cap. Von der Bahn des Monds um die Erde, und den Bahnen der übrigen *Nebenplaneten um ihre Hauptplaneten.*	358.

Drittes Buch.

Von den Geſetzen der Bewegung, und ihrer Anwendung auf die Bewegung der Himmelskörper. (Phyſiſche Aſtronomie.)

	Seite
I. Cap. Von den Geſetzen der Bewegung.	376.
II. Cap. Von den Wirkungen der Schwere.	417.
III. Cap. Von der Theorie der Bewegung der Himmelskörper und der allgemeinen Schwere.	457.
IV. Cap. Von den Störungen der elliptiſchen Bewegungen durch die gegenſeitige Gravitation der Himmelskörper.	541.
V. Cap. Von der Geſtalt der Erde und der Planeten, von dem Geſetz der Schwere auf ihren Oberflächen, und von der Veränderung der Lage ihrer Umdrehungsaxen.	626.

Erſtes Buch.

Von den ſcheinbaren Bewegungen der Himmelskörper.

Erſtes Capitel.

Von der täglichen Bewegung des Himmels.

§. 1. Die Himmelskörper ſcheinen ſich an der holen Oberfläche eines großen Gewölbes zu befinden, welches die Oberfläche der Erde zur Gränze hat. In einer ebenen Gegend oder auf der See erſcheint uns dieſelbe als ein Kreis, in deſſen Mittelpunkt wir uns befinden, und heißt der Horizont oder Geſichtskreis, in unebenen Gegenden aber als eine irreguläre krumme Linie. Um an jedem Ort der Erde eine von den Irregularitäten ihrer Oberfläche unabhängige Gränze des Himmelsgewölbes zu erhalten, auf welche man die Lage der Himmelskörper beziehen kann, denkt man ſich die Oberfläche des ſtillſtehenden Waſſers bis an die ſcheinbare Oberfläche des Himmels hinaus erweitert, wo ſie denſelben Kreis als Horizont bezeichnen wird, den man auf der See oder auf einer großen Ebene hat. Da die Richtung der Schwere, welche durch einen mit einem Gewicht beſchwerten freyhängenden Faden im Zuſtand der Ruhe oder durch das ſogenannte Loth bezeichnet wird, auf der Oberfläche des ſtillſtehenden Waſſers ſenkrecht iſt; ſo wird man auch mittelſt des Loths an jedem Ort der Erde ſo viele Punkte des Horizonts *als man will*, beſtimmen können. Wird

nemlich an einer senkrecht aufgestellten Axe ein Lineal unter einem rechten Winkel befestigt; so wird die Ziellinie an der Schärfe des Linials hin, Punkte des Horizonts bezeichnen, und bey der Umdrehung um die senkrecht stehende Axe nach und nach den ganzen Horizont beschreiben, welcher demnach überall 90 Grade von dem Punkt abstehen wird, wo die aufwarts verlängerte Richtung der Schwere das Himmelsgewölbe trift, und welcher der Scheitelpunkt oder das Zenith heißt. Man wird also den Horizont als einen grösten Kreis einer Kugel betrachten können, in deren Mittelpunkt sich der Beobachter befindet, und dessen einer Pol das Zenith ist. Der andere Pol desselben, welcher in die für uns unsichtbare Hälfte dieser Kugel fällt, heißt der Fußpunkt oder das Nadir.

§. 2. Man wird die Sterne nur kurze Zeit beobachten dürfen, um zu bemerken, daß sie ihre Lage gegen den Horizont alle Augenblicke verändern. Indem einige an dem Horizont sichtbar werden und sich immer mehr über denselben erheben, werden andere sich demselben nähern und wieder verschwinden. Einige werden den Horizont bey ihrem niedrigsten Stand kaum berühren, und wiederum anfangen sich über denselben zu erheben, andere werden selbst bey ihrem niedrigsten Stand noch beträchtlich über den Horizont erhaben seyn, und kleine Kreise um einen unbeweglichen Punkt zu beschreiben scheinen, in dessen Nähe man kaum noch einige Bewegung an den Sternen bemerkt. Endlich wird man finden, daß die Punkte, in welchen die Sterne ihre gröste und kleinste Höhe über den Horizont erreichen, in einem grösten Kreis der Sphäre liegen, welcher durch den Scheitelpunkt und denjenigen Punkt des Himmels durchgeht, in dessen Nähe die Bewegung der Sterne unmerklich wird. Weil die Sonne um die Mittagszeit sich in diesem Kreis befindet; so heißt er der Mittagskreis oder Meridian, und die Durchschnittslinie seiner Ebene mit der Ebene des Horizonts die Mittagslinie. Wird die Mittagslinie beyderseits bis an den Horizont verlängert; so bezeichnet sie auf derjenigen Seite des Himmels, wo sich die Son-

ne um die Mittagszeit befindet, den Mittags- oder Südpunkt, und auf der entgegengesetzten den Mitternachts- oder Nordpunkt. Zieht man in der Ebene des Horizonts eine gerade Linie auf die Mittagslinie senkrecht; so schneidet sie den Horizont in zwey Punkten, von welchen der auf der Seite des Aufgangs der Sonne liegende der Morgen- oder Ostpunkt, der entgegengesetzte der Abend oder Westpunkt heißt.

§. 3. Man wird bey dieser allen Sternen gemeinschaftlichen Bewegung, welche nach Verfluß eines Tags in derselben Ordnung wiederkehrt, und daher die tägliche Bewegung heißt, keine merkliche Veränderung in der gegenseitigen Lage der Sterne bemerken. Diese Erscheinungen sind also so beschaffen, als ob sich eine Kugel, an deren innerer Oberfläche die Sterne fest sind, und in deren Mittelpunkt sich das Auge des Beobachters befindet, um eine unbewegliche Axe drehte, welche die Weltaxe heißt, und in unseren Gegenden eine gegen den Horizont schiefe Lage hat. Die zwey Punkte, in welchen die Weltaxe der Himmelskugel begegnet, heißen ihre Pole, und zwar der über unserm Horizont erhabene der Nordpol, der entgegengesetzte der Südpol. Der Winkel, welchen die Weltaxe mit der Ebene des Horizonts macht, oder um welchen der Pol über den Horizont erhaben ist, heißt die Polhöhe.

Um nun zu zeigen, daß die Erscheinungen der täglichen Bewegung mit der Voraussetzung der Umdrehung einer Kugel um eine unbewegliche Axe übereinstimmen, sey *MAZPp Fig. 1.* ein gröster Kreis der Sphäre, welcher durch das Zenith *Z*, das Nadir *z* und die Weltpole *P*, *p* durchgehe. Der scheinbare Weg *GSF*, *gsf* eines Sterns *S*, *s* wird unter dieser Voraussetzung ein Kreis seyn, dessen Ebene auf der Weltaxe *Pp* senkrecht steht. Der Stern *S* komme während seiner täglichen Bewegung in dem Punkt *F* in den gröstен Kreis *MAZPp* auf der Südseite des Scheitels *Z*. Man fälle aus *Z* das Perpendickel *ZR* auf die Ebene des Kreises *FSG*; so wird dieses in die gemeinschaftliche *Durchschnittslinie FG* der Ebene dieses Kreises

und des gröſten Kreiſes *MAZPp* fallen (*XI*, 38 E.) Man lege durch den Scheitelpunkt *Z* und den Stern *S* einen Bogen *ZS* eines gröſten Kreiſes, welcher den Abſtand des Sterns vom Scheitel meſſen wird, ziehe *RS* und die Chorden *ZS*, *ZF*. Da der Punkt *C*, in welchem die Weltaxe *Pp* die Ebene des Kreiſes *FSG* ſchneidet, der Mittelpunkt des leztern iſt; ſo iſt von allen geraden Linien, die von dem Punkt *R* an des Kreiſes *FSG* Umfang gehen, die *RF* die kleinſte, *RG* die gröſte (*III*, 7. E.) In den bey *R* rechtwinklichten Dreyecken *ZRF*, *ZRS*, welche die Seite *ZR* gemeinſchaftlich haben, iſt alſo $ZS > ZF$, mithin auch der Bogen $ZS >$ Bogen *ZF*. Der Stern iſt alſo in *F* dem Scheitel *Z* am nächſten, und hat daſelbſt ſeine gröſte Höhe. Es komme nun der Stern *s* in den Punkten *f* und *g* in den gröſten Kreis *MAZPp* auf der Nordſeite des Scheitels *Z*. Fällt man jezt aus dem Scheitelpunkt *Z* das Perpendickel *Zr* auf die erweiterte Ebene des von dem Stern beſchriebenen Kreiſes *fsg*, und macht die fernere Conſtruktion wie vorhin; ſo iſt (*III*, 8. E.) *rf* die kleinſte, *rg* die gröſte der von *r* an dieſen Kreis gehenden geraden Linien, mithin $Zs > Zf$, und Bogen $Zs >$ Bogen *Zf*, aber $< Zg$. Der Stern *s* hat alſo in *f* ſeine gröſte, und in *g* ſeine kleinſte Höhe über dem Horizont. Der gröſte Kreis, welcher durch die Pole *P*, *p* der Himmelskugel und den Scheitelpunkt *Z* durchgeht, geht folglich durch alle diejenige Punkte, in welchen die Sterne ihre gröſte und kleinſte Höhe erreichen, und iſt der Meridian. Diejenigen Sterne, deren Abſtand vom Pol *Pg* kleiner als die Polhöhe *PN* iſt, werden bey ihrem niedrigſten Stand in *g* den Horizont *MN* nicht erreichen, und die halbe Summe ihrer gröſten Höhe *Nf* und der kleinſten *Ng* wird der Polhöhe *NP*, die halbe Differenz derſelben aber dem Abſtand *Pf* oder *Pg* des Sterns vom Pol *P* gleich ſeyn.

Iſt der Abſtand eines Sterns von dem über den Horizont erhabenen Pol *P* der Polhöhe gleich; ſo wird er bey ſeinem niedrigſten Stand den Horizont in dem Nordpunkt *N* berühren, und wenn jener Abſtand gröſſer als die Polhöhe iſt; ſo wird ein Theil ſeines ſcheinbaren Wegs unter

den Horizont fallen. Steht ein Stern 90° von den Polen ab; so beſchreibt er einen gröſten Kreis *AQ*, welcher durch den Horizont halbirt wird, weil alle gröſten Kreiſe einer Kugel ſich halbiren, und da dieſer Kreis ſo wie der Horizont auf der Ebene des Meridians ſenkrecht iſt; ſo iſt die gemeinſchaftliche Durchſchnittslinie der erſtern auf dem Meridian ſenkrecht (*XI*, 19. E.) und der Stern geht in dem Oſtpunkt auf, in dem Weſtpunkt unter. Die Sonne beſchreibt zur Zeit der Tag- und Nachtgleichen dieſen Kreis, und daher heißt derjenige gröſte Kreis, deſſen Pole die zwey Pole der Himmelskugel ſind, der Aequator. Alle übrigen von den Sternen während der täglichen Bewegung beſchriebenen kleineren Kreiſe heißen Parallelkreiſe des Aequators. So wie der Abſtand der Sterne von dem über den Horizont erhabenen Pol wächst und gröſſer als 90° wird, fällt immer ein gröſſerer und gröſſerer Theil ihrer Parallelkreiſe unter den Horizont, bis endlich diejenige, deren Abſtand vom Pol *P* dem Bogen *PM*, welcher durch den *pM* oder die ihm gleiche Polhöhe *PN* (*I*, 15. E.) zu 180° ergänzt wird, den Horizont in dem Südpunkt *M* nur noch berühren, und nicht mehr über denſelben ſich erheben.

§. 4. Um die Lage des Meridians genauer als durch die Beobachtung der gröſten oder kleinſten Höhe eines Sterns zu beſtimmen, kann man ſich einer der folgenden Methoden bedienen.

1.) Man wähle einen der nie untergehenden Sterne, und warte die Zeit ab, da er ſich bey ſeiner täglichen Bewegung am weiteſten auf der Oſt- und Weſtſeite von dem Meridian entfernt. In dieſem Augenblik wird ein durch den Stern *R* oder *R'* Fig. 2. und den Scheitelpunkt *Z* gelegter gröſter Kreis *ZRH*, *ZR'H'* den Parallelkreis *GRFR'*, welchen der Stern um den Pol beſchreibt, berühren, und der zwiſchen den zwey berührenden Vertikalkreiſen *ZRH*, *ZR'H'* in der Mitte liegende Vertikalkreis *ZPN* wird der Meridian ſeyn. Die zwey Vertikalebenen können durch Bleylothe beſtimmt werden, hinter welchen man das Aug an einer beſtimmten Stelle, z. B.

einer kleinen Oefnung in einem befeſtigten Stük Blech, hält, indem man die Bleylothe ſo lange verſchiebt, bis ſie den Stern bey ſeiner gröſten Digreſſion bedecken.

2. Unter der Vorausſetzung einer gleichförmigen Umdrehung der Himmelskugel wird die Zeit, welche von dem Durchgang eines Sterns durch den Meridian über dem Pol bis zu ſeinem nächſtfolgenden Durchgang durch denſelben unter dem Pol verfließt der Hälfte der vollen Umlaufszeit deſſelben um den Pol gleich ſeyn, weil die Ebene des Meridians durch die Weltaxe, mithin durch die Mittelpunkte aller Parallelkreiſe des Aequators geht, und daher dieſelbige halbirt. Man hänge alſo ein Loth auf, halte das Aug an einer kleinen Oefnung, welche in einem horizontal hin und her beweglichen Blech angebracht iſt, und beobachte, ohne das Blech zu verrücken die Zeiten des obern, untern und hierauf wieder des obern Durchgangs an dem Faden. Sind die Zwiſchenzeiten gleich; ſo iſt die durch den Ort des Augs und das Bleyloth gelegte Ebene, die Ebene des Meridians. Sind ſie aber ungleich; ſo muß die Vertikalebene gegen derjenigen Seite hingerükt werden, wo die Zwiſchenzeit größer war als auf der andern, d. i. man muß das Blech nach der entgegengeſetzten Seite hin bewegen, und dieſes Verfahren ſo oft wiederholen, bis die Zwiſchenzeiten gleich werden.

3. Nimmt man auf dem Parallelkreis eines Sterns *S* Fig. 1. auf der andern Seite des Meridians von letzterem an einen Bogen dem *SF* gleich; ſo werden die von *R* aus an die Endpunkte dieſer Bogen gezogenen geraden Linien einander gleich (*III*, 7. 8. E.) Daher ſind auch die Abſtände vom Scheitel auf beyden Seiten des Meridians einander gleich, und der Zeitpunkt des Durchgangs eines Sterns durch den Meridian fällt in die Mitte zwiſchen die zwey Zeitpunkte, da er gleiche Höhen vor und nach ſeinem Durchgang durch den Meridian hatte. Man kann alſo durch Beobachtung der Zeiten, da ein Stern auf beyden Seiten des Meridians gleiche Höhe hatte, die Zeit ſeines Durchgangs durch denſelben finden, und dieſe mit *derjenigen vergleichen*, welche man auf ähnliche Art wie

in n. 2. bey dem Durchgang durch eine Vertikalebene beobachtet hat, und dadurch finden, ob diese Vertikalebene in oder ausserhalb des Meridians fällt. Diese Methode, die Zeit des Durchgangs eines Sterns durch den Meridian zu finden, nennt man die Methode der correspondirenden Höhen.

4.) Auf einer horizontalen Ebene befestigt man einen Stift senkrecht, und bemerkt Vormittags von Zeit zu Zeit die Länge seines Schattens. Nachmittags wartet man die Zeiten ab, da der Schatten wieder dieselben Längen erhält. Nun verbindet man die Endpunkte gleicher Schattenlängen durch gerade Linien, halbirt sie und zieht durch den Fußpunkt des Stifts und die Halbirungspunkte gerade Linien. Diese werden, wenn man genau beobachtet hat auf einander fallen und die Mittagslinie bezeichnen. Weil, wie in der Folge wird gezeigt werden, die Sonne nicht genau einen Parallelkreis des Aequators beschreibt; so erfordert diese Methode, so wie die ihr ähnliche der correspondirenden Höhen bey Sonnenbeobachtungen eine Correktion.

§. 5. Mittelst der sphärischen Trigonometrie läßt sich das im vorhergehenden §. in n. 1. und 2. gezeigte Verfahren, die Lage des Meridians zu bestimmen, abkürzen.

Bey der Methode n. 1. berührt der Vertikalkreis ZRH Fig. 2. den Parallel des Sterns bey seiner gröſten Digression in R. Man ziehe aus dem Pol P den gröſten Kreis PR an den Berührungspunkt R; so ist der sphärische Triangel PZR bey R rechtwinklicht; und es verhält sich:

1.) Sin. PZ : Sin. PR = Sin. tot. : Sin. PZR;
2.) Cos. PZ : Cos. PR = Cos. ZR : Sin. tot.:
3.) Tang. PZ : Tang. PR = Sin. tot. : Cos. ZPR;

Kennt man die Polhöhe PN; folglich auch ihr Complement PZ, und die Polardistanz PR des Sterns: so findet man aus n. 1. den Winkel PZR, welcher durch den zwischen dem Vertikalkreis, in welchem man die gröſte Digression des Sterns von dem Meridian beobachtete, und dem Meridian ZN begriffenen Bogen HN des Horizonts gemessen wird. Man kennt also die Abweichung dieses Vertikalkreises von dem Meridian. Aus eben diesen Stücken erhält man die Zenithdistanz ZR des Sterns bey seiner gröſten Digression durch n. 2., und mittelst n. 3. den Winkel ZPR, oder die Anzahl Grade, welche auf den Bo-

gen HE des Parallels gehen, und hieraus mittelst der Umlaufszeit des Sterns, die Zwischenzeit zwischen seinem obern Durchgang durch den Meridian und der Zeit seiner grösten Digression.

Bey der Methode n. 2. kennt man die Zeiten des Durchgangs des Sterns durch einerley Vertikalkreis Zh Fig. 2. in s und s', und seine Umlaufszeit, und hieraus den Winkel sPs', wenn man schließt: Umlaufszeit: Zeit von s bis $s' = 360° : sPs'$. Man ziehe aus dem Pol P den grösten Kreis Pr auf Zh senkrecht; so halbirt dieser den Winkel sPs' und man kennt sPr. In dem bey r rechtwinklichten Dreyeck Psr verhält sich Cosin. Ps : Cotang. $rPs = $ Sin. tot : Tang. Psr, woraus man mittelst der Polardistanz Ps den Winkel Psr findet. Sodenn hat man in dem Dreyeck PsZ die Proportion Sin. PZ : Sin. $Ps =$ Sin. Psr : Sin. PZs, woraus sich der Winkel PZr oder der Bogen Nh des Horizonts zwischen dem Vertikalkreis Zh und dem Meridian ZN ergiebt. Sind die zwey Zwischenzeiten nur wenig verschieden; so hat man sehr nahe, wenn man statt der Tangenten und Sinus der kleinen Winkel $90° - rPs$, Psr und PZs die Winkel oder Bogen selbst setzt

Cos. Ps : Sin. tot. $= 90° - rPs$: Psr
Sin. PZ : Sin. $Ps = Psr$: PZs

$$\text{Sin. } PZ \text{ Cos. } Ps : \text{Sin. } Ps \text{ Sin. tot.}$$
$$\text{Sin. } PZ : \frac{\text{Sin. } Ps \text{ Sin. tot.}}{\text{Cos. } Ps} \Big\} = 90° - rPs : PZs$$
$$\text{d. i. Sin. } PZ : \text{Tang. } Ps$$

und der Winkel $90° - rPs$ ergiebt sich unmittelbar, wenn man den Unterschied des vierten Theils der Umlaufszeit des Sterns und der halben Zwischenzeit zwischen einem obern und untern Durchgang durch den Vertikalkreis in Grade oder deren Unterabtheilungen verwandelt, indem man schließt:

$\frac{1}{4}$ Umlaufszeit : Unterschied $= 90° : 90° - rPs$.

§. 6. Die nähere Bestimmung der Lage eines Sterns gegen den Horizont und seiner täglichen Bewegung ergiebt sich nun auf folgende Art. Es sey $MZ\,Pzp$ Fig. 3. der Meridian, MHN der Horizont, und ein Stern in S. Man lege durch den Scheitel Z und den Stern S einen grösten Kreis ZS, welcher dem Horizont in H begegne: so ist ZH ein Vertikalkreis, SZ des Sterns Abstand vom Scheitel, und HS seine Höhe über dem Horizont, gegen welche seine Lage bestimmt ist, wenn man seine Höhe HS, und den Bogen NH des Horizonts kennt, welcher von dem Nordpunkt N an durch den Vertikalkreis abgeschnitten wird, und das Azimuth *des Sterns heißt*. Ein Parallelkreis KSL des Horizonts

heißt ein Höhenkreis (Almucantharat), und alle in demſelben befindlichen Sterne haben einerley Höhe, welche durch die Bogen *SH* oder *MK*, *NL* gemeſſen wird. Man lege durch den Stern *S* auch noch einen Parallelkreis *FSG* des Aequators. Der Bogen *FS* dieſes Parallelkreiſes mißt den Winkel *FPS* am Pol *P*, von welchem die Zeit zwiſchen ſeinem Durchgang durch den Meridian und dem Augenblick, da er in *S* war, abhängt, und welcher daher der Stundenwinkel heißt. Der Höhenkreis *KSL* iſt als ein Parallelkreis des Horizonts auf der Ebene des Meridians ſenkrecht, und der Parallelkreis *FSG* des Aequators iſt auf der Weltaxe *Pp*, und daher ebenfalls auf der Ebene des Meridians ſenkrecht. Folglich iſt (XI, 19. E.) Die gemeinſchaftliche Durchſchnittslinie *SR* der Ebenen *KSL* und *FSG* auf der Ebene des Meridians ſenkrecht, und der Punkt *R* fällt in den Durchſchnittspunkt der Durchmeſſer *KL*, *FG* der Kreiſe *KSL*, *FSG*.

Iſt nun 1.) die Polhöhe *PN*, Polardiſtanz *PS* und Höhe *SH* des Sterns gegeben, ſo findet man den Stundenwinkel *FPS*, wenn man auf dem Meridian von dem Horizont an *MK* der Höhe des Sterns gleich nimmt, durch *K* die *KL* mit *MN* parallel zieht, *PF* und *PG* durch eine gerade Linie *FG* miteinander verbindet. Dadurch erhält man den Punkt *R*, in welchem das von dem Stern auf die Ebene des Meridians gefällte Perpendikel *SR* dem Durchmeſſer *FG* ſeines Parallelkreiſes begegnet, und daher den Bogen *FS*, wenn man ſich, wie in der 4ten Figur den Halbzirkel *FSG* auf die Ebene des Papiers, in welcher der Meridian *MZPzp* mit der Axe *Pp*, dem Durchmeſſer *MN* des Horizonts, der Vertikallinie *Zz*, und den Durchmeſſern *FG*, *KL* der Parallelkreiſe des Aequators und des Horizonts, verzeichnet angenommen wird, niedergelegt denkt, und in dem Punkt *R* auf der *FG* ein Perpendikel errichtet, welches dem über *FG* als Durchmeſſer beſchriebenen Halbzirkel *FSG* in *S* begegnet, und den geſuchten Bogen *FS* abſchneidet.

2.) Sucht man umgekehrt aus der Polhöhe, Polardiſtanz und dem Stundenwinkel die Höhe des Sterns; ſo beſtimmt man *FG wie vorhin*, nimmt in dem über FG be-

schriebene Halbzirkel von *F* an den Bogen *FS* dem Stundenwinkel gleich, fällt von *S* das Perpendikel *SR* auf *FG*, und zieht durch *R* die Parallele *KL* mit *MN*. Diese wird auf dem Meridian den Bogen *MK* abschneiden, welcher des Sterns Höhe mißt.

3.) Für eine gegebene Polhöhe findet man aus dem Azimuth und der Höhe eines Stern seine Polardistanz und den Stundenwinkel durch eine ähnliche Construktion. Das Azimuth *NH* Fig. 3. wird sowohl durch den Bogen *NH* des Horizonts, als auch durch den zwischen dem Meridian und dem Vertikalkreis *ZH* begriffenen Bogen *LS* des Parallelkreises des Horizonts gemessen. Nimmt man also (Fig. 4.) *MK* = *NL* = der Höhe des Sterns, zieht *KL*, beschreibt über *KL* einen Halbzirkel *KsL*, nimmt von *L* an den Bogen *Ls* dem Azimuth gleich, und fällt von *s* das Perpendikel *sR* auf *KL*; so hat man den Punkt *R*, in welchem die Durchmesser der durch den Stern gelegten Parallelkreise des Horizonts und des Aequators sich schneiden. Zieht man nun durch *R* die *FG* auf *Pp* senkrecht; so hat man die Polardistanz *PF* oder *PG* des Sterns, woraus sich hernach der Stundenwinkel wie vorhin ergiebt.

4.) Um aus der Polhöhe, Polardistanz und dem Stundenwinkel das Azimuth zu finden, macht man dieselbe Construktion wie in n. 2. beschreibt sodenn über *KL* einen Halbzirkel, und errichtet in *R* das Perpendikel *Rs* auf *KL*, welches von *L* an den Bogen *Ls* abschneidet, der dem Bogen *NH* Fig. 3 ähnlich ist, und daher eben so viele Grade enthält, als der Bogen *NH*, mithin das Azimuth bestimmt.

§. 7. Im Augenblick des Auf- oder Untergangs eines Sterns fällt sein Höhenkreis mit dem Horizont zusammen, der Punkt *R* Fig. 4. fällt in den Durchschnittspunkt *W* des Durchmessers *FG* seines Parallels mit dem Durchmesser *MN* des Horizonts, und der auf die Ebene des Meridians niedergelegte Höhenkreis fällt auf den Meridian selbst. Errichtet man also in dem Punkt *W* die Perpendikel *WV*, *Wv* auf den Linien *FG*, *MN*; so wird ersteres den Stundenwinkel *FV*, letzteres das Azimuth *Nv* für den Augen-

blick des Auf- oder Untergangs abſchneiden. Dieſer Stundenwinkel wird alſo durch die Hälfte der Anzahl Grade gemeſſen, welche auf den über dem Horizont liegenden Theil des Parallelkreiſes eines Sterns gehen, und heißt daher der halbe Tagbogen des Sterns. Wird die Zeit berechnet, welche der Stern gebraucht, um dieſen Bogen zu durchlaufen, indem man ſchließt: 360° : $\frac{1}{2}$ Tagbogen = Umlaufszeit des Sterns: geſuchten Zeit, und zu dem Augenblick des Durchgangs des Sterns durch den Meridian addirt und davon abgezogen; ſo hat man die Zeit ſeines Untergangs und Aufgangs.

Zieht man das Azimuth für den Augenblick des Aufgangs eines Sterns von 90° ab, oder nimmt ſeinen Ueberſchuß über 90°, wenn es 90° überſteigt; ſo hat man den zwiſchen dem Oſt- oder Weſtpunkt und dem Punkt des Auf- oder Untergangs des Sterns liegenden Bogen des Horizonts, welchen man die Morgen- und Abendweite (amplitudo ortiva et occidua) des Sterns nennt. Dieſe wird alſo in der vorhin gezeigten Conſtruktion durch den Bogen zv gemeſſen.

Wenn die Polardiſtanz eines Sterns = 90° iſt, und er folglich den Aequator beſchreibt; ſo fällt der Punkt W in O, das Azimuth für die Zeit des Auf- und Untergangs wird ebenfalls = 90°, die Morgen- und Abendweite verſchwindet, und er geht in dem Weſtpunkt unter. Die eine Hälfte ſeines ſcheinbaren Wegs fällt über, die andere Hälfte unter den Horizont, und unter der Vorausſetzung einer gleichförmigen Umdrehung der Himmelskugel verweilt er eben ſo lang über als unter dem Horizont.

Stehen zwey Sterne gleichweit von den ihnen zunächſtliegenden Polen, folglich gleichweit von dem Aequator der eine gegen dem Nordpol, der andere gegen dem Südpol hin ab; ſo wird, wenn man $\left.\begin{matrix} pF' \\ pG' \end{matrix}\right\} = PF$ nimmt und die gerade Linie $F'G'$ zieht, $OC' = OC$ und $OW' = OW$. Dieſe Sterne haben alſo gleiche Morgen- und Abendweiten, nur fällt ſie bey dem ſüdlichen Sterne in die ſüdliche, bey dem nördlichen in die nördliche Hälfte des Horizonts. Der-

ner werden CW und $C'W'$, mithin auch FW, und $G'W'$ GW und $F'W'$ einander gleich. Der südliche Stern verweilt also eben so lang unter dem Horizont, als der nördliche über demselben, und der halbe Tagbogen des nördlichen Sterns übertrift den halben Tagbogen eines im Aequator befindlichen, d. i. 90° um eben so viel, als dem südlichen zu 90° fehlt. Dieser Unterschied zwischen 90° und dem halben Tagbogen eines Sterns heißt seine Ascensionaldifferenz, (differentia ascensionalis) und wird also bey obiger Construktion durch den Bogen VX gemessen, wenn man OP bis an den Halbzirkel FSG hinaus verlängert.

§. 8. Die §. 6. und 7. gezeigte Construktionen können nun auf folgende Art mittelst der ebenen Trigonometrie berechnet werden. Man ziehe Rr und Kk auf MN senkrecht; so hat man

$$\left.\begin{matrix}\text{Rr}\\ \text{Kk}\\ \text{Sin. MK}\end{matrix}\right\} : RW = \left\{\begin{matrix}\text{Sin. } RWr\\ \text{Cos. } COW\\ \text{Cos. } PN\end{matrix}\right\} : \text{Sin. tot.}; \quad RW = \frac{\text{Sin. } MK \text{ Sin. tot.}}{\text{Cos. } PN}$$

$$\left.\begin{matrix}CO\\ \text{Cos. } PF\end{matrix}\right\} : CW = \left\{\begin{matrix}\text{Cos. } COW\\ \text{Cos. } PN\end{matrix}\right\} : \left\{\begin{matrix}\text{Sin. } COW\\ \text{Sin. } PN\end{matrix}\right\}; \quad CW = \frac{\text{Cos. } PF \text{ Sin. } PN}{\text{Cos. } PN}$$

$$\text{also } CR = RW - CW = \frac{\text{Sin. } MK \text{ Sin. tot.} - \text{Cos. } PF \text{ Sin. } PN}{\text{Cos. } PN}$$

Man ziehe CS; so verhält sich in dem bey R rechtwinklichten Dreyeck RCS

$$\left.\begin{matrix}CS\\ CF\\ \text{Sin. } PF\end{matrix}\right\} : CR = \text{Sin. tot.} : \text{Cos. } FS$$

Also ist

$$\text{Cos. } FS = \frac{CR \text{ Sin. tot.}}{\text{Sin. } PF}, \text{ oder wenn man obigen Werth von } CR$$

substituirt $\text{Cos. } FS = \dfrac{\text{Sin. } MK \text{ Sin. tot.} - \text{Cos. } PF \text{ Sin. } PN}{\text{Sin. } PF \text{ Cos. } PN}$ Sin. tot.

Setzt man zur Abkürzung die Polhöhe $= l$, die Polardistanz des Sterns $= d$, seine Höhe $= h$ und den Stundenwinkel $= t$; so wird:

1.) $\text{Cos. } t = \dfrac{\text{Sin. } h \text{ Sin. tot.} - \text{Cos. } d \text{ Sin. } l}{\text{Sin. } d \text{ Cos. } l}$ Sin. tot., und hieraus

2.) $\text{Sin. } h = \dfrac{\text{Sin. } l \text{ Cos. } d \text{ Sin. tot.} + \text{Cos. } l \text{ Sin. } d \text{ Cos. } t}{\text{Sin. tot.}}$.

$$\text{Sin. tot.}^2 \text{ Sin. } h = \text{Sin. } l \text{ Cos. } d \text{ Sin. tot.} + \text{Cos. } l \text{ Sin. } d \text{ Sin. tot.} - 2\text{Sin. } \tfrac{1}{2}t^2 \text{ Cos. } l \text{ Sin. } d$$

$$= \text{Sin. } (l + d) \text{ Sin. tot.}^2 - \frac{2\text{Sin. } \frac{1}{2}t^2 \text{ Cos. } l \text{ Sin. } d}{\text{Sin. tot.}}$$

3.) $\text{Sin. } h = \text{Sin. } (l + d) - 2\left(\dfrac{\text{Sin. } \frac{1}{2}t}{\text{Sin. tot.}}\right)^2 \dfrac{\text{Cos. } l \text{ Sin. } d}{\text{Sin. tot.}}$

$2\left(\frac{\text{Sin. } \frac{1}{2}t}{\text{Sin. tot.}}\right)\ \frac{\text{Cos. } l \text{ Sin. } d}{\text{Sin. tot.}} = \text{Sin. } (l+d) - \text{Sin. } h$

$= \frac{2\text{Sin. } \frac{1}{2}(l+d-h)\ \text{Cos. } \frac{1}{2}(l+d+h)}{\text{Sin. tot.}}$

4.) $\text{Sin. } \frac{1}{2}t^2 = \frac{\text{Sin. } \frac{1}{2}(l+d-h)\ \text{Cos. } \frac{1}{2}(l+d+h)\ \text{Sin. tot.}^2}{\text{Cos. } l\ \text{Sin. } d}$,

$= \frac{\text{Sin. } (\frac{1}{2}s-h)\ \text{Cos. } \frac{1}{2}s\ \text{Sin. tot.}^2}{\text{Cos. } l\ \text{Sin. } d}$, wenn man $l+d+h=s$ ſetzt.

Ferner verhält ſich:

$\left.\begin{matrix} CO \\ \text{Cos. } PF \end{matrix}\right\} : OW = \left\{\begin{matrix} \text{Cos. } COW \\ \text{Cos. } PN \end{matrix}\right\} : \text{Sin. tot.}$; folglich iſt $OW = \frac{\text{Cos. } PF \text{ Sin. tot.}}{\text{Cos. } PN}$.

$\left.\begin{matrix} Rs \\ Kk \\ \text{Sin. } MK \end{matrix}\right\} : rW = \left\{\begin{matrix} \text{Sin. } rWR \\ \text{Cosin. } PN \end{matrix}\right. : \left.\begin{matrix} \text{Sin. } rRW \\ \text{Sin. } PN \end{matrix}\right\}$; $rW = \frac{\text{Sin. } MK \text{ Sin. } PN}{\text{Cos. } PN}$

Daher iſt $\left.\begin{matrix} rW-W0 \\ r0 \\ RE \end{matrix}\right\} = \frac{\text{Sin. } MK \text{ Sin. } PN - \text{Cos. } PF \text{ Sin. tot.}}{\text{Cos. } PN}$.

Und nun $\left.\begin{matrix} sE \\ KE \\ \text{Cos. } MK \end{matrix}\right\} : RE = \text{Sin. tot.} : \text{Cos. } Ks$: folglich iſt

$\text{Cos. } Ks = \frac{RE \text{ Sin. tot.}}{\text{Cos. } MK}$, und wenn man obigen Werth von RE ſubſtituirt

$\text{Cos. } Ks = \frac{\text{Sin. } MK \text{ Sin. } PN - \text{Cos. } PF \text{ Sin. tot.}}{\text{Cos. } PN \text{ Cos. } MK}$ Sin. tot. mithin

$\text{Cos. } Ls = -\text{Cos. } Ks = \frac{\text{Cos. } PF \text{ Sin. tot.} - \text{Sin. } MK \text{ Sin. } PN}{\text{Cos. } PN \text{ Cos. } MK}$ Sin. tot.,

oder wenn man das Azimuth $= a$ ſetzt, und die obigen Benennungen beybehält.

5.) $\text{Cos. } a = \frac{\text{Cos. } d \text{ Sin. tot.} - \text{Sin. } h \text{ Sin. } l}{\text{Cos. } h \text{ Cos. } l}$ Sin. tot.

Daher 6.) $\overline{\text{Sin. tot.}}^2\ \text{Cos. } d = \text{Sin. } h \text{ Sin. } l \text{ Sin. tot.} + \text{Cos. } h \text{ Cos. } l \text{ Cos. } a$

$= \text{Sin. } h \text{ Sin. } l \text{ Sin. tot.} - \text{Cos. } h \text{ Cos. } l \text{ Sin. tot.}$

$+ \frac{2\overline{\text{Cos. } \frac{1}{2}a}^2\ \text{Cos. } h \text{ Cos. } l}{\text{Sin. tot.}}$

$= \frac{2\overline{\text{Cos. } \frac{1}{2}a}^2\ \text{Cos. } h \text{ Cos. } l}{\text{Sin. tot.}} - \text{Sin. tot.}^2 \text{ Cos. } (l+h)$

$2\left(\frac{\text{Cos. } \frac{1}{2}a}{\text{Sin. tot.}}\right)^2 \frac{\text{Cos. } h \text{ Cos. } l}{\text{Sin. tot.}} = \text{Cos. } d + \text{Cos. } (l+h)$

$= \frac{2\text{Cos. } \frac{1}{2}(l+h+d)\ \text{Cos. } \frac{1}{2}(l+h-d)}{\text{Sin. tot.}}$.

7.) $\overline{\text{Cos. } \frac{1}{2}a^2} = \frac{\text{Cos. } \frac{1}{2}(l+h+d)\,\text{Cos. } \frac{1}{2}(l+h-d)}{\text{Cos. } h\,\text{Cos. } l}\,\overline{\text{Sin. tot.}}^2$

$= \frac{\text{Cos. } \frac{1}{2}s\,\text{Cos. } (\frac{1}{2}s-d)}{\text{Cos. } h\,\text{Cos. } l}\,\text{Sin. tot.}$, wenn $l+h+d=s$.

Setzt man in n. 1. die Höhe $h=o$; so wird

$\text{Cos. } t = -\frac{\text{Cos. } d\,\text{Sin. } l}{\text{Sin. } d\,\text{Cos. } l}\,\text{Sin. tot.} = -\frac{\text{Cotang. } d\,\text{Tang } l}{\text{Sin. tot.}}$,

und der Stundenwinkel t ist dem halben Tagbogen gleich, welcher so lange $> 90°$ ist, als die Polardistanz $d < 90°$. Demnach ist

8.) $\text{Sin. diff. asc.} = \frac{\text{Cotang. } d\,\text{Tang } l}{\text{Sin. tot.}}$.

Für $h=o$ verwandelt sich die Formel n. 5. in folgende:

$\text{Cos. } a = \frac{\text{Cos. } d\,\text{Sin. tot.}}{\text{Cos. } l}$, und nun ist a das Azimuth für den Augenblick des Aufgangs oder Untergangs, mithin

9.) $\text{Sin. ampl. ort. aut. occid.} = \frac{\text{Cos. } d\,\text{Sin. tot.}}{\text{Cos. } l}$.

Aus n. 4. ergiebt sich, daß der Sinus der Höhe für $t=o$ am gröſten und für $t=180°$, wo $\text{Sin. } \frac{1}{2}t = \text{Sin. tot.}$ wird, am kleinsten ist. Im ersten Fall ist $h=l+d$ oder $=180°-(l+d)$ je nachdem $l+d$ kleiner oder gröſser als $90°$ ist; folglich die Meridianhöhe des Sterns in den nördlichen oder südlichen Quadranten des Meridians fällt. Im zweyten Fall wird

$\text{Sin. } h = \text{Sin. } (l+d) - \frac{2\,\text{Cos. } l\,\text{Sin. } d}{\text{Sin. tot.}} = \frac{\text{Sin. } l\,\text{Cos. } d - \text{Cos. } l\,\text{Sin. } d}{\text{Sin. tot.}}$

$= \text{Sin. } (l-d)$, und daher die Höhe unter dem Pol $= l-d$, welche negativ wird, oder unter den Horizont fällt, wenn $d > l$.

Die Sterne erreichen also in dem Meridian ihre gröſte und kleinste Höhe über dem Horizont, übereinstimmend mit §. 3. Für einerley Polhöhe, Polardistanz und Höhe werden vermöge n. 1. und 5. die Cos. t und a, also auch die Stundenwinkel und Azimuthe selbst auf beyden Seiten des Meridians einander, gleich, worauf sich die Methode der correspondierenden Höhen zur Bestimmung des Durchgangs eines Sterns durch den Meridian und der Lage der Mittagslinie gründet.

§. 9. Wenn der Beobachter seinen Standpunkt verändert, und gegen Norden fortgeht, so wird er finden, daß diejenigen Sterne, welche an seinem ersten Standpunkt bey ihrer kleinsten Höhe unter dem Pol den Horizont berührten, sich an seinem zweyten Standpunkt nicht mehr so tief gegen denselben herabsenken, und Sterne, welche vorher untergegangen sind, werden nun beständig über seinem Horizont *bleiben*. Auf der Südseite hingegen wird von dem über

dem Horizont liegenden Theil des Parallels ſüdlicher Sterne ein größerer Theil unter den Horizont fallen, und einige, die er vorher noch in kleinen Höhen in dem Meridian erblickte, werden für ihn ganz verſchwunden ſeyn. Das Gegentheil wird Statt finden, wenn er gegen Süden fortgeht. Sterne, welche auf der Nordſeite des Meridians beſtändig über dem Horizont blieben, werden jetzt untergehen, und auf der Südſeite wird er Sterne ſich über den Horizont erheben ſehen, welche ihm an ſeinem erſten Standpunkt niemals zu Geſicht kamen. Hat der Beobachter an ſeinem erſten Standpunkt *A* Fig. 5. einen Stern *S* in ſeinem Scheitel *Z*, und einen andern gegen Süden an dem Horizont nach der Richtung *AM* ſtehen ſehen; ſo wird er, wenn er gegen Süden nach *B* fortgegangen iſt, den Stern, welcher in ſeinem Scheitel war, bey ſeiner Meridianhöhe gegen Norden von dem Scheitel abſtehen ſehen. Wären die Richtungen der Schwere, welche ſeine Vertikallinien beſtimmen, mit einander parallel, und an ſeinem zweyten Standpunkt *B* die mit *AZ* gezogene Parallele *BS* ſeine Vertikallinie; ſo würde, wenn der Stern *S* ſich in einer nicht ſehr großen Diſtanz *AS* von der Erde befände, derſelbe nun nach der Richtung *BS* von dem Standpunkt *B* aus geſehen werden, und folglich übereinſtimmend mit der Beobachtung von dem Scheitel *S'* um den Winkel *S'Bs* gegen Norden abſtehen. Alsdenn müßte aber der Winkel *SAM* zwiſchen dem am Scheitel und dem am Horizont befindlichen Stern, welcher alſo an ſeinem Standpunkt *A* ein rechter war, in den ſtumpfen Winkel *SBM* übergegangen ſeyn. Allein er wird an ſeinem Standpunkt *B* dieſen Winkel noch einem rechten Winkel gleich finden, und daher werden die von *A* und *B* nach dem Stern gezogenen Geſichtslinien nicht bemerkbar von der parallelen Lage verſchieden ſeyn. Sein Horizont wird nun in die Lage *Bm* gekommen ſeyn, und der vorher am Horizont befindliche Stern wird ſich um eben ſo viel über den Horizont erhoben haben, als der am Scheitel geſtandene von demſelben gegen Norden hin abgerückt iſt. Die Richtungen der Schwere ſind alſo nicht mit einander parallel, und die *Veränderung des Scheitelabſtands* der Sterne rührt allein

von ihrer nicht parallelen Lage her. An dem Standpunkt B muß also, wenn man den Winkel $S'Bz$ dem in B beobachteten Scheitelabstand gleich macht, die Bz die Vertikallinie seyn, welche mit der erstern in einem Punkt C unterhalb der Erdoberfläche zusammenlauft. Hiezu kommt noch die Erfahrung, daß man auf der See von entfernten erhabenen Gegenständen zuerst nur die Spitzen erblickt, indem ihr unterer Theil durch die Oberfläche des Wassers bedeckt wird, und sie sich nach und nach immer mehr über dieselbe zu erheben scheinen, so wie man sich ihnen nähert. Die Oberfläche des stillstehenden Wassers und der Erde, so weit sie uns eben zu seyn scheint, ist also keine ebene, sondern eine krumme erhabene Fläche, und der Horizont ist eigentlich eine Ebene, welche die Oberfläche des stillstehenden Wassers berührt.

Wenn der Beobachter immer weiter nach der Richtung der Mittagslinie fortgeht; so wird er einen Stern, der vorher in seinem Scheitel stund, immer weiter von demselben nach einer Richtung abrücken sehen, welche der seiner Bewegung auf der Erdoberfläche entgegen gesetzt ist, und zwar bey gleichen auf der Erde zurückgelegten Wegen nahe um gleich viel, von welchem Ort der Erde man auch ausgehen mag. Die Gestalt der Erde muß also der Gestalt eines Körpers sehr nahe kommen, der allenthalben gleich starke Krümmung hat, d. i. einer Kugel. Unter dieser Voraussetzung werden die Richtungen der Schwere in dem Mittelpunkt der Erdkugel zusammenlaufen, und der Horizont wird eine die Erdkugel an dem Ort des Beobachters berührende Ebene seyn.

§. 10. Beobachtet man die Sterne vor dem Aufgang der Sonne; so bemerkt man, daß ihr Licht in dem Maas schwächer wird, als die Morgendämmerung anfangt stärker zu werden, und zuerst die kleineren, hernach bey dem Anbruch des Tags und dem Aufgang der Sonne die größeren ganz verschwinden. Der Mond, welcher vorher mit einem lebhaften Lichte glänzte, wird nach dem Aufgang der Sonne blaß erscheinen, und kaum noch sichtbar seyn. Des Abends

beob-

beobachtet man die umgekehrten Erscheinungen. So wie es anfangt dunkel zu werden, erscheinen die Sterne nach und nach wiederum, und glänzen mit einem desto lebhafteren Lichte, je gröſſer die Dunkelheit der Nacht wird. Der Mond, welcher neben dem Glanz der Sonne kaum sichtbar war, wird bey eintretender Nacht mit einem lebhafteren Lichte erscheinen. Daß wir die Sterne bey Tag nicht mehr sehen, kommt also nicht daher, daß sie aufhören zu leuchten, sondern von dem weit stärkeren Glanz der Sonne, welcher ihr Licht auslöscht. Die Fernröhren seţen uns in den Stand, dieses durch die Erfahrung zu bestätigen. Sie zeigen uns die Sterne selbst um die Mittagszeit, und diejenige, welche nahe genug bey dem Pol sind, um beständig über dem Horizont zu bleiben, können mittelst derselben zu jeder Tageszeit bey heiterem Himmel beobachtet werden.

Das Erscheinen und Verschwinden der Sterne bey ihrem Auf- und Untergang betreffend, ist es wahrscheinlich, daß sie unter dem Horizont ihre Parallelkreise nach demselben Geseţ wie oberhalb desselben fortbeschreiben. Die im vorhergehenden §. angeführten Erfahrungen bestätigen diese Vermuthung, indem sie uns einen vorher unsichtbar gewesenen Theil ihres scheinbaren Wegs zeigen, welcher nach demselben Geseţ als der anfangs sichtbare beschrieben wird. Die Himmelskugel umgiebt also die Erde von allen Seiten, und weil wir an jedem Ort der Erde die Sterne beständig in derselben Lage gegeneinander bemerken; so können wir voraussetzen, daß wir uns, wo auch unser Standpunkt auf der Erdoberfläche liegen mag, in dem Mittelpunkt dieser Kugel befinden, an deren Oberfläche die Sterne zu stehen scheinen. Man nennt daher auch denjenigen Theil der Astronomie, welcher die scheinbaren Bewegungen der Himmelskörper betrachtet, die sphärische Astronomie.

Uebrigens darf man aus den bisher angeführten Erscheinungen nicht schlieſſen, daß man sich wirklich in dem Mittelpunkt der Himmelskugel befinde, und alle Sterne gleichweit von uns entfernt seyen. Denn es lehrt uns die Erfahrung, daß wir von der Entfernung der Gegenstände nicht *mehr urtheilen können*, sobald sie die Distanz betrift,

auf welche unser Augenmaas in der Schätzung der Entfernungen reicht. Ueber diese Gränze hinaus können wir nur mittelst der bekannten wahren Größe der Gegenstände, oder der Veränderung ihrer Lage gegeneinander, welche entweder von ihrer wirklichen Bewegung oder der Veränderung unsers Standpunkts herrührt, von ihrer Entfernung urtheilen, und bestimmen, welche uns näher liegen oder entfernter seyen. Fallen aber, wie es bey dem ersten Anblick des Himmels der Fall ist, diese Mittel zur Schätzung der Entfernungen weg; so sind wir geneigt, alle dergleichen Gegenstände für gleich weit von uns entfernt zu halten. So scheinen demjenigen, der sich in einer großen Ebene befindet, die entfernten ihn umgebenden Gegenstände auf dem Umfang eines Kreises sich zu befinden, in dessen Mittelpunkt sein Standpunkt liegt. Die fernere Untersuchung wird zeigen, wie weit obige Voraussetzung richtig ist, und bey welchen Himmelskörpern sich eine merkliche Abweichung davon zeigt. Die genaue Beobachtung derselben wird uns in den Stand setzen ihre Entfernung zu bestimmen, und die Abweichungen selbst zu berechnen.

§. 11. Bey fortgesetzten Beobachtungen der Himmelskörper wird man zwey Arten derselben bemerken. Die meisten verändern ihre Lage nicht merklich gegeneinander, und heißen Fixsterne, andere, welche sich mit sehr ungleichen Geschwindigkeiten und bald nach dieser, bald nach einer andern Richtung an dem Fixsternhimmel hin zu bewegen, zuweilen auch einige Zeit stille zu stehen scheinen, heißen Planeten oder Irrsterne. Die ersteren wird man als feste Punkte der Himmelskugel betrachten können, auf welche man die Bewegung der letztern beziehen kann. Man hat daher von den ältesten Zeiten her ihre gegenseitige Lage so genau als möglich zu bestimmen gesucht, und sie nach der Lebhaftigkeit ihres Lichts in verschiedene Classen eingetheilt. Die hellsten nannte man Sterne der ersten Größe, die etwas minder hellen, Sterne der zweyten Größe, u. s. w. so, daß diejenige, welche man nur mit Mühe noch mit bloßen Augen sehen kann, Sterne von der sechsten Größe heißen. Um einen

jeden Fixſtern bequem bezeichnen zu können, ohne ihm, wie es bey den hellſten der Fall iſt, einen beſondern Namen zu geben, hat man ſich an dem Himmel verſchiedene Bilder verzeichnet gedacht, z. B. einen Bären, einen Stier, einen Herkules, u. ſ. w. ſo daß die Sterne beſtimmten Theilen dieſer Bilder entſprachen, und davon den Namen erhielten. So nannte man z. B. den Stern, welcher dem Auge des Stiers entſprach, das Stierauge, u. ſ. w. Hienach konnte man die Stellen am Himmel beyläufig bezeichnen, wo ein neuer Stern geſehen wurde, wenn man ſagte: er ſtehe im Schwanz des großen Bären, am Kopf des Stiers, u. ſ. w. Die zu einem ſolchen Bild gehörige Sterne machen ein ſogenanntes Sternbild oder eine Conſtellation aus. Die Aſtrognoſie giebt eine ausführliche Beſchreibung dieſer Sternbilder, lehrt ſie am Himmel aufſuchen, und die ihnen zugehörigen Sterne, welche zum Theil eigne Namen haben, gröſtentheils aber mit Buchſtaben bezeichnet werden, kennen *).

Zweytes Capitel.

Von der aſtronomiſchen Stralenbrechung und Parallaxe.

§. 12. Wir ſind in dem vorhergehenden Capitel von ſolchen Beobachtungen ausgegangen, weil ſich mit ganz einfachen Werkzeugen und zum Theil mit dem bloßen Auge anſtellen laſſen. Sie ſetzten uns in den Stand, die Geſetze der täglichen Bewegung der Himmelskörper im Allgemeinen zu beſtimmen, und es iſt jetzt zu unterſuchen, welche Modifikationen dieſelbige erleiden, wenn man ſie genauer betrachtet.

1.) Man meſſe den Abſtand zweyer Sterne, von welchen ſich der eine in der Nähe des Horizonts, der andere in einerley Vertikalkreis mit dem erſteren ſich befindet, und wiederhole die Beobachtung, wenn die zwey Sterne ſich mehr über den Horizont erhoben haben; ſo wird man beſtändig den letzteren Abſtand größer finden, als den er-

*) Anleitung zur Kenntniß des geſtirnten Himmels von J. E. Bode, 3te Auflage.

ſtern, und der Unterſchied wird deſto größer ſeyn, je näher der eine Stern am Horizont ſteht, und je größer ihr Abſtand iſt.

2.) Man beobachte die gröſte und kleinſte Höhe eines nicht untergehenden Sterns, und nehme ihre halbe Summe, oder die halbe Summe der kleinſten und die Ergänzung der gröſten Höhe zu 180°, wenn letztere in den ſüdlichen Quadraten des Meridians fällt; ſo iſt dieſe halbe Summe der Polhöhe gleich (§. 3. S. 4.), welche deſto größer herauskommen wird, je größer der Höhenunterſchied der Sterne iſt. Unter einer Polhöhe, welche größer iſt als 45° wird man einen Stern wählen können, deſſen gröſte Höhe nahe an den Scheitel fällt, und unter einer Polhöhe von $48\frac{1}{2}$° z. B. wird man mittelſt eines ſolchen Sterns die Polhöhe um mehr als zwey Minuten größer finden als diejenige, welche man aus den Höhen eines nahe beym Pol ſtehenden Sterns abgeleitet hat.

3.) Man lege eine Polhöhe zum Grund, welche man aus wenig von einander verſchiedenen Sternhöhen abgeleitet hat, beobachte die Höhe eines nahe bey dem Scheitel vorübergehenden Sterns im Meridian, und ziehe von ihr, oder ihrer Ergänzung zu 180°, wenn die Höhe in den ſüdlichen Quadranten des Meridians fiel, die Polhöhe ab; ſo wird der Reſt die Polardiſtanz des Sterns ſeyn. Für beliebige Stundenwinkel berechne man nach §. 8. aus dieſen Stücken das Azimuth und die Höhe dieſes Sterns; ſo wird man, wenn man die Zeiten abwartet, da der Stern dieſe Höhen erreicht, zwar die Azimuthe mit den berechneten ſehr nahe übereinſtimmend finden, die Höhen aber werden deſto größer ſeyn als die berechneten, je kleiner ſie ſind. Macht man den Verſuch mit anderen Sternen; ſo wird man wiederum die Azimuthe mit den berechneten übereinſtimmend, und bey gleichen Höhen gleiche Unterſchiede zwiſchen der Beobachtung und der Berechnung finden, welche nahe am Horizont bis auf einen halben Grad ſteigen werden.

Stellt man dieſe Unterſuchungen an anderen Orten der *Erde an; ſo wird* man unter übrigens gleichen Umſtänden

dieſelben Reſultate erhalten, Letzterer Umſtand macht es wahrſcheinlich, daß wir den Mittelpunkt der Himmelskugel in dem Mittelpunkt der Erde annehmen müſſen, und die bemerkten Unterſchiede vielleicht daher rühren, daß wir auf der Oberfläche der Erde uns auſſerhalb des Mittelpunkts der Himmelskugel befinden.

§. 13. Um dieſes zu unterſuchen, ſey *A* (Fig. 6.) ein Ort auf der Oberfläche der Erde, deren Mittelpunkt *C* ſey; ſo wird der verlängerte Halbmeſſer *CA* der Erde durch das Zenith *Z* des Orts *A* gehen. Steht nun ein Stern in *S*, und zieht man *CS*, *AS*; ſo wird *ZAS* der auf der Oberfläche der Erde beobachtete Abſtand vom Scheitel ſeyn, welcher von dem, vermöge der Vorausſetzung, gemeinſchaftlichen Mittelpunkt *C* der Erde und der Himmelskugel aus geſehen = *ZCS* ſeyn würde. Da nun die Punkte *C*, *A*, *S*, *Z* in einer durch die Vertikallinie *CZ* gehenden Ebene, mithin in einer Vertikalebene liegen; ſo wird der Winkel *ASC* der Ueberſchuß des von einem Punkt der Erdoberfläche aus beobachteten Abſtands vom Scheitel über den vom Mittelpunkt der Erde aus geſehenen ſeyn, welchen man die Parallaxe der Höhe nennt. Durch dieſe wird alſo das Azimuth mit den Beobachtungen §. 12. übereinſtimmend, nicht geändert, die Höhen aber werden vermindert. Die im vorhergehenden §. angeführten Erſcheinungen müſſen alſo wenigſtens zum Theil eine andere Urſache haben, wodurch die Höhe der Sterne einen größeren Zuwachs erhält, als ſie durch die Parallaxe, wenn ſie anders merklich iſt, vermindert wird.

§. 14. Die Erfahrung, daß die Lichtſtralen, wenn ſie ſchief aus einem Mittel in ein anderes übergehen, an der ſie von einander treunenden Fläche von ihrem geradlinigten Weg abgelenkt oder gebrochen werden, und wir daher die Gegenſtände nach einer andern Richtung ſehen, als wir ſie ohne dieſe Brechung ſehen würden, wird den Beobachter veranlaſſen zu unterſuchen, ob nicht auch die von den Himmelskörpern zu uns kommende Lichtſtralen eine ſolche Bre-

chung leiden, und sich daraus die im 12. §. angeführten Erscheinungen erklären lassen.

Die Erde ist allenthalben von einem durchsichtigen und elastischen Fluidum, der Luft, umgeben, welches unsere Atmosphäre bildet. Die Luft ist, wie andere Körper, schwer, und der Druck der Atmosphäre hält an der Oberfläche der See mit der Queckſilbersäule des Barometers von 28 pariser Zollen bey der Temperatur des schmelzenden Eises das Gleichgewicht. Unter diesem Druck, und bey der Temperatur des schmelzenden Eises verhält sich die specifische Schwere der Luft zu der des Queckſilbers = 1 : 10477,9 *), mithin würde, wenn die Atmosphäre durchaus einerley Dichtigkeit hätte, ihre Höhe 28 . 104 7,9 Zolle, d. i. 24448 pariser Fuß betragen. Die Dichtigkeit der Luft ändert sich aber, vermöge des Mariottischen Gesetzes, sehr nahe dem Druck oder den Barometerhöhen proportional: folglich müssen bey einerley Temperatur die unteren Schichten der Atmosphäre dichter seyn als die oberen, deren Gewicht die ersteren zusammendrückt. So wie man sich in der Atmosphäre erhebt, werden sie dünner und dünner, und wenn sie durchaus einerley Temperatur hätten; so würden ihre Dichtigkeiten, mithin auch die Barometerhöhen in einer geometrischen Progression abnehmen, wenn die Höhen über der Erdoberfläche in einer arithmetischen Progression wachsen. Auf der andern Seite wird die Luft durch die Wärme ausgedehnt und zieht sich bey der Kälte wieder zusammen, so daß die Räume, welche sie bey der Temperatur des unter einer Barometerhöhe von 28 pariser Zollen siedenden Wassers und der des schmelzenden Eises einnimmt, sich verhalten wie 1,375 : 1, oder wie 11 : 8. Die in den obern Theilen der Atmosphäre herrschende Kälte wird also die Dichtigkeit der obern Schichten wieder vermehren, und vielleicht der Atmosphäre Gränzen

*) Biot und Arrago wogen bekannte Volumina von sehr trockener Luft und Queckſilber sehr genau ab, und fanden dadurch das Queckſilber 10466 6mal schwerer als die Luft. Obige Zahl gilt für die Luft der Atmosphäre bey ihrem mittleren Zustand, welche wegen der in ihr enthaltenen Wasserdämpfe, die in dem Verhältniß von 5 : 7 leichter als die Luft sind, leichter als sehr trockene Luft ist, und ist aus Barometerbeobachtungen geschlossen.

ſetzen, welche nicht Statt finden würden, wenn das Mariotiſche Geſetz nach aller Schärfe wahr wäre, und ſie durchaus einerley Temperatur hätte. Da das Geſetz der Wärmeabnahme in der Atmoſphäre unbekannt, und beſtändigen Veränderungen unterworfen iſt; ſo iſt es nicht möglich, das Geſetz, nach welchem die Dichtigkeit der Luft ſich mit der Höhe wirklich verändert, zu beſtimmen. Den Beobachten zu Folge nimmt mit einer Erhöhung von 20,000 par. Fuß über die Oberfläche der Erde die Wärme um 30 Grade des Reaumurſchen Thermometers im Mittel genommen ab.

Endlich hat die Luft die Eigenſchaft, die Lichtſtralen nach demſelben Geſetz, wie die übrigen durchſichtigen Körper, zu brechen, daß nemlich der einfallende und gebrochene Stral mit dem Einfallsloth in einer Ebene liegen, und der Sinus des Einfallswinkels zum Sinus des Brechungswinkels bey einerley Dichtigkeit der Luft ein conſtantes Verhältniß hat. Dieſes Verhältniß iſt beym Uebergang aus einem ſo viel als möglich luftleer gemachten Raum in Luft von derjenigen Dichtigkeit, welche ſie bey 28 par. Zollen Barometerhöhe und der Temperatur des ſchmelzenden Eiſes hat, dem von 1,0002943321 : 1 gleich. Es verändert ſich mit der Dichtigkeit der Luft, und iſt, wenn man ihre obige Dichtigkeit = 1, bey einem anderen Barometer und Thermometerſtand aber = d ſetzt, dem Verhältniß von $\sqrt{1+0,0005887508\,d}$: 1, oder ſehr nahe von $1+0,0002943321\,d$: 1 gleich, und hängt nur in ſo fern von der Wärme ab, als dadurch die Dichtigkeit der Luft geändert wird. Für Luft in einem eingeſchloſſenen Raum bleibt das Brechungsverhältniß daſſelbe, wenn gleich die Temperatur ſich verändert.

§. 15. Es ſey nun C (Fig. 7.) der Mittelpunkt der Erde, und CAZ die Vertikallinie des Orts A. Man denke ſich eine beliebige Anzahl mit der Erde concentriſcher Kugeloberflächen, deren Halbmeſſer Ca, Cb, u. ſ. w. ſeyen; ſo wird die Luft an jeder dieſer Schichten einerley Dichtigkeit haben. Wir wollen zuerſt annehmen, daß die Dichtigkeit der Luft in jeder der zwiſchen zwey unmittelbar auf einander folgenden Kugeloberflächen befindlichen Schichten gleichförmig,

aber in jeder der Erde näher liegenden größer als in der oberhalb ihr befindlichen sey. In der Ebene eines durch den Stern *S* gehenden Vertikalkreises falle ein Lichtstral *Sa* auf die äusserste Gränze der Atmosphäre in *a* auf; so wird die Verlängerung *ap* des an den Punkt *a* gezogenen Halbmessers des Einfallsloth seyn, und der Lichtstrahl bey seinem Uebergang in die erste Luftschichte so gebrochen werden, daß die Verlängerung *ar* des gebrochenen Strals *ab* zwischen dem einfallenden Stral und dem Einfallsloth liegen wird. Wegen der vermöge der Voraussetzung gleichförmigen Dichtigkeit der Schichten wird sein Weg *ab* in der ersten Schichte geradlinigt seyn, und *Sa*, *ab*, *Ca* werden in einer Ebene liegen. Eben so wird er ferner beym Eintritt in die zweyte Luftschichte gegen dem Einfallsloth *Cbq* hin gebrochen werden, und in derselben geradlinigt durch *bc* fortgehen, so daß *ab*, *bc*, *Cq* in einer Ebene liegen, u. s. w. bis er bey *A* in das Aug des Beobachters kommt. Der Lichtstral wird also unter dieser Voraussetzung eine aus geraden zusammengesetzte gebrochene Linie *abcA* in der Atmosphäre beschrieben, welche ihre hole Seite gegen die Erde kehren, und ganz in einem durch den Stern gehenden Vertikalkreis liegen wird.

Vergrößert man die Anzahl der Schichten, und macht sie folglich dünner; so wird sich die Zunahme der Dichtigkeit der Luft von der obersten Schichte an immer mehr der in der Natur Statt findenden stetigen Zunahme, und die gebrochene Linie einer stetig krummen Linie nähern. Mithin wird der Weg eines Lichtstrahls durch die Atmosphäre eine gegen die Erde hole krumme Linie seyn, welche ganz in der Ebene des durch den Stern gehenden Vertikalkreises liegen wird. In *A* wird man den Stern nach der Richtung der Tangente *At* dieser krummen Linie, welche ebenfalls in der Ebene des Vertikalkreises liegen wird, erblicken, und *ZAt* wird sein scheinbarer Abstand vom Scheitel seyn. Um die Wirkung der Stralenbrechung von derjenigen, welche die Parallaxe (§. 13.) hervorbringt, zu trennen, ziehe man durch *A* die *As* mit *Sa* parallel; so wird *ZAs* derjenige Scheitelabstand *seyn*, welchen man bey unmerklicher Parallaxe finden würde,

und der Winkel *sAt*, welcher die ganze Ablenkung des Lichtstrals von seiner anfänglichen Richtung mißt, und die astronomische Stralenbrechung heißt, wird die Wirkung der Stralenbrechung allein angeben.

§. 16. Schon aus dieser allgemeinen Darstellung der astronomischen Stralenbrechung lassen sich folgende Schlüsse ziehen.

1.) Am Scheitel verschwindet die Stralenbrechung, weil daselbst der einfallende Stral mit dem verlängerten Halbmesser der Erde, oder dem Einfallsloth zusammenfällt.

2.) Die Stralenbrechung verändert, so wie die Parallaxe nur die Höhen den Sterne, ohne ihr Azimuth zu verändern, unterscheidet sich aber von letzterer darinn, daß sie die Höhen vergrößert, indeß die Parallaxe sie vermindert. (§. 13.). Denn der Weg des Lichtstrals ist eine gegen die Erde hole, ganz in der Ebene eines Vertikalkreises liegende, krumme Linie.

3.) Mit dem Scheitelabstand wächst die Stralenbrechung beständig, weil der von einem niedriger stehenden Stern herkommende Lichtstral schiefer auf die Atmosphäre auffällt, mithin stärker gebrochen wird, und ein größerer Theil seines Wegs in derselben liegt, als wenn er von einem höheren Stern herkommt.

4.) Unter übrigens gleichen Umständen ist in gleichen Höhen die Stralenbrechung gleich groß, weil die Sterne weit ausserhalb unserer Atmospähre liegen müssen, und die Stralenbrechung allein von letzterer abhängt.

5.) Wenn zwey Sterne sich in einerley Vertikalkreis befinden; so wird ihr Abstand um den Ueberschuß der Stralenbrechung des niedriger stehenden über die des höheren vermindert. Erheben sie sich mehr über den Horizont, und kommen schief gegen denselben zu stehen; so werden die Stralenbrechungen geringer, und verkürzen überdieß die Distanz nicht mehr um die volle Differenz der Stralenbrechungen. Der scheinbare Abstand wird also mit der Höhe der Sterne nach und nach größer werden.

6.) Die Stralen*brechungen müssen* mit dem Zustand der At-

mosphäre sich beständig verändern, und insbesondere von dem Stand des Barometers und Thermometers abhängen, wovon die Dichtigkeit der Luft, und mithin die Größe der Brechung abhängt. In Höhen unterhalb eines Grads geht der Lichtstral nahe an der Oberfläche hin, und leidet in den unteren, oft mit vielen Dünsten angefüllten, Theilen der Atmosphäre irreguläre Brechungen, welche die Refraktion in der Nähe des Horizonts sehr veränderlich machen werden.

Man sieht, daß die Wirkungen der astronomischen Stralenbrechung die im 12. §. angeführten Erscheinungen im Allgemeinen erklären. Aber erst die genaue Bestimmung derselben für alle Höhen wird uns in den Stand setzen, zu beurtheilen, ob jene Erscheinungen in der täglichen Bewegung der Fixsterne sich vollständig daraus erklären lassen.

§. 17. Unter den im Anfang des 15. §. gemachten Voraussetzungen sey e (Fig. 8.) der Mittelpunkt der Erde, a ein Punkt auf ihrer Oberfläche, caz die Vertikallinie des Orts a, und $sbb'b''a$ die aus geraden Linien zusammengesetzte Bahn des Lichts. Ferner seyen cb, cb', cb'' die Halbmesser der Kugeloberflächen, welche die Luftschichten von einander trennen, und die Einfallswinkel, wie z. B. pbs, seyen b, b', b'', die ihnen entsprechende Brechungswinkel, wie pbf, seyen $\epsilon, \epsilon', \epsilon''$. Bezeichnet man die Dichtigkeit der Schichten von oben an gerechnet mit d, d', d'', und setzt in dem Ausdruck des Brechungsverhältnisses aus dem leeren Raum in Luft (§. 14.) die Zahl $0{,}0005887508 = k$; so wird für den Uebergang aus dem leeren Raum in die erste Schichte das Brechungsverhältniß dem von $\sqrt{1+kd} : 1$, für den Uebergang aus der ersten in die zweyte dem von $\sqrt{1+kd'} : \sqrt{1+\kappa d}$, u. s. w. gleich seyn, und man wird haben:

$$\text{Sin.}\, b : \text{Sin.}\, \epsilon = \sqrt{1+kd} : 1$$
$$\text{Sin.}\, b' : \text{Sin.}\, \epsilon' = \sqrt{1+kd'} : \sqrt{1+kd}$$
$$\text{Sin.}\, b'' : \text{Sin.}\, \epsilon'' = \sqrt{1+kd''} : \sqrt{1+kd'};$$

folglich $\text{Sin.}\, b\, \text{Sin.}\, b'\, \text{Sin.}\, b'' : \text{Sin.}\, \epsilon\, \text{Sin.}\, \epsilon'\, \text{Sin.}\, \epsilon'' = \sqrt{1+kd''} : 1$.
Aber in den Dreyecken bcb', $b'cb''$ u. s. w. verhält sich

$$\text{Sin.}\, \epsilon : \text{Sin.}\, b' = cb' : cb$$
$$\text{Sin.}\, \epsilon' : \text{Sin.}\, b'' = cb'' : cb'$$
$$\text{Sin.}\, \epsilon'' : \text{Sin.}\, zat = ca : cb''$$

mithin $\text{Sin.}\, \epsilon\, \text{Sin.}\, \epsilon'\, \text{Sin.}\, \epsilon'' : \text{Sin.}\, b\, \text{Sin.}\, b'\, \text{Sin.}\, zat = ca : cb$
Verbindet man diese Proportion mit der oben gefundenen; so er-

hält man Sin. b : Sin. $zat = ca\sqrt{1+kd''}$ cb

Vergrößert man die Anzahl der Schichten, und vermindert folglich ihre Dicke; so bleibt dieſe Proportion, und zugleich nähert ſich die Bahn des Lichts einer ſtetig krummen Linie, und die Dichtigkeit an der Oberfläche der unterſten Schichte nähert ſich der Dichtigkeit D der Luft an der Oberfläche der Erde.

Man verlänge die sb, bis ſie der cz in q begegnet, und die verlängerte ab'' ſchneide die sq in r. Die Stralenbrechung arq oder srt ſetze man $= r$, und den Winkel $acb = c$; ſo wird $b = cbq = zqb - acb = zat + arq - acb = z + r - c$, wenn man den ſcheinbaren Abſtand vom Scheitel $= z$ ſetzt. Für die ſtetige Zunahme der Dichtigkeit der Luft von der oberſten Schichte an, und für die krummlinigte Bahn des Lichts wird man alſo haben

1.) Sin. $(z+r-c)$: Sin. $z = ca\sqrt{1+kD}$: cb.

Ferner verhält ſich für eine beliebige der aufeinander folgenden Brechungen, z. B. an dem Punkt b', wenn man das daſelbſt ſtatt findende Brechungsverhältniß dem von f : g gleich ſetzt,

Sin. b' : Sin. $c' = f$: g.

Aber Sin. c' : Sin. $b'' = cb''$: cb' :

folglich Sin. b' : Sin. $b'' = f.cb''$: $g.cb'$.

Man ſetze die Ergänzung des Winkels $bb'b''$ zu 180°, oder den gebrochenen Winkel an dem Punkt b' gleich r', und den Winkel $b'cb'' = c'$; ſo iſt $b'' = b' + c' - r'$, und daher

Sin. b' : Sin. $(b'+c'-r') = f.cb''$: $g.cb'$

Sin. $(b'+c'-r')$ + Sin. b' : Sin. $(b'+c'-r')$ − Sin. b'

oder Tang $\left(b' + \frac{c'-r'}{2}\right)$: Tg. $\frac{c'-r'}{2}$ $\Big\} = g.cb' + f.cb''$:

$g.cb' - f.cb'' = M$: N zur Abkürzung, welches Verhältniß ſich dem von $Tg.b' : \frac{c'-r'}{2}$ deſto mehr nähert, je größer die Anzahl der Schichten genommen wird. Und da auf der andern Seite $\left\{\begin{matrix}\text{Sin. } c' \\ \text{Sin. } (b'-r')\end{matrix}\right\} = f : g$; ſo wird man auf ähnliche Art haben $Tg.\frac{1}{2}r' : Tg.(b' - \frac{1}{2}r') = f - g : f + g$, und dieſes Verhältniß wird ſich dem von $\frac{1}{2}r' : Tg.b'$ deſto mehr nähern, je größer man die Anzahl der Schichten nimmt. Da nun

$Tg.b' : \frac{c'-r'}{2} = M : N$ $\Big\}$ deſto genauer, je dünner die Schichten ſind;

$\frac{1}{2}r' : Tg.b' = f-g : f+g$ $\Big\}$

ſo wird $\frac{\frac{1}{2}r' : \frac{c'-r'}{2}}{r' : c'-r'} = M(f-g) : N(f+g)$ deſto genauer ſeyn, je mehr ſich die gebrochene Bahn des Lichts einer ſtetig krummen Linie nähert. Es ſey p : q das Verhältniß, welchem ſich das von $M(f-g) : N(f+g)$ bey der Verminderung der Schich-

ten beſtändig nähert; ſo wird für die krummlinigte Bahn des Lichts $r' : c'-r' = p : q$
alſo 2.) $r' : c' = p : p+q$ ſeyn.

Nun iſt das Verhältniß von $M : N$, ſo wie das von $f : g$, mithin auch das von $p : p+q$ von den Einfallswinkeln unabhängig, und die Dichtigkeiten d, d' u. ſ. w. hängen von den Abſtänden cb, cb' u. ſ. w. ab. Folglich iſt das Verhältniß der zuſammengehörigen Veränderungen der Refraktion r und des Winkels c am Mittelpunkt der Erde ein von den Diſtanzen cb, cb' u. ſ. w. allein abhängiges Verhältniß. Wäre dieſes Verhältniß conſtant; ſo wäre auch das Verhältniß von $r : c$ eben dieſem conſtanten Verhältniß gleich. Da nun wegen der in Vergleichung mit dem Halbmeſſer der Erde nicht ſehr bedeutenden Höhe der Atmoſphäre, ſo weit ſie die Stralen noch merklich bricht, die Diſtanzen cb, cb' u. ſ. w. nicht ſehr von einander verſchieden ſind; ſo wird das Verhältniß von $r' : c'$ nahe einem conſtanten Verhältniß $1 : n$, mithin auch $r : c = 1 : n$, $c = nr$, $c-r = (n-1)r$, und, wenn man $n-1 = m$ ſetzt, vermöge der Proportion $n.1$

3.) $\text{Sin.}(z-mr) : \text{Sin.}z = ca\sqrt{1+kD} : bc$ ſeyn, welches die Simpſonſche Regel für die Stralenbrechung iſt, wenn man $m = 1\frac{1}{2}$ ſetzt.

Setzt man $z = 90°$; ſo wird für die Horizontalrefraktion R werden

$$\left.\begin{matrix}\text{Sin.}(90°-mR)\\ \text{Cos.}\,mR\end{matrix}\right\} : \left\{\begin{matrix}\text{Sin.}\,90°\\ 1\end{matrix}\right\} = ca\sqrt{1+kD} : cb$$

Mithin iſt 4.) $\text{Cos.}\,mR = \frac{ca}{cb}\sqrt{1+kD}$.

Aus n. 3. folgt alſo auch

$$\text{Sin.}\,z : \text{Sin.}\,(z-mr) = 1 : \text{Cos.}\,mR$$
$$\text{Sin.}\,z+\text{Sin.}\,(z-mr) : \text{Sin.}\,z-\text{Sin.}\,(z-mr) = 1+\text{Cos.}\,mR : 1-\text{Cos.}\,mR$$

oder 5.) $\text{Tang.}\,(z-\frac{1}{2}mr) : \text{Tg.}\,\frac{1}{2}mr = 1 : \text{Tg.}\,\frac{1}{2}mR.$

Für eine andere Zenithdiſtanz z' ſey die Refraktion $= r'$; ſo wird man haben

$$\text{Tg.}\,(z'-\tfrac{1}{2}mr') : \text{Tg.}\,\tfrac{1}{2}mr' = 1 : \text{Tg.}\,\tfrac{1}{2}mR \text{ : folglich}$$

$$\left.\begin{matrix}\text{Tang.}\,\frac{1}{2}mr : \text{Tg.}\,\frac{1}{2}mr'\\ \text{oder ſehr nahe } \frac{1}{2}mr : \frac{1}{2}mr'\\ 6.)\qquad r : r'\end{matrix}\right\} = \text{Tg.}\,(z-\tfrac{1}{2}mr) : \text{Tg.}\,(z'-\tfrac{1}{2}mr')$$

Mithin verhalten ſich die Refraktionen wie die Tangenten der um das $\frac{m}{2}$ fache dieſer Refraktionen verminderten ſcheinbaren Abſtände vom Scheitel, welches die Bradleyſche Regel iſt, wenn man $\frac{m}{2} = 3$ ſetzt.

Da $1 : \text{Tg.}\,\frac{1}{2}mR = \text{Tg.}\,(z-\frac{1}{2}mr) : \text{Tg.}\,\frac{1}{2}mr$, (n. 5.)

$$= \text{Tg.}\,z-\text{Tg.}\,\tfrac{1}{2}mr : \text{Tg.}\,\tfrac{1}{2}mr+\text{Tg.}\,z\,\text{Tg.}\,\tfrac{1}{2}mr$$

$= 1 - \text{Tg.}\frac{1}{2}mr \text{ Cotg. } z : \text{Tg.}\frac{1}{2}mr \text{ Cotg. } z + \sqrt{\text{Tg.}\frac{1}{2}mr^2}$:

so ist $1 + \left\{\frac{\text{Tg.}\frac{1}{2}mR^2}{\text{Sec.}\frac{1}{2}mR^2}\right\} : 1 = 1 + \sqrt{\text{Tg.}\frac{1}{2}mr^2} : 1 - \text{Tg.}\frac{1}{2}mr \text{ Cotg. } z$

$1 + \text{Tg.}\frac{1}{2}mr^2 = \text{Sec.}\frac{1}{2}mR^2 - \text{Sec.}\frac{1}{2}mR^2 \text{ Cotg. } z \text{ Tg.}\frac{1}{2}mr$

$\text{Tg.}\frac{1}{2}mr^2 + \text{Sec.}\frac{1}{2}mR^2 \text{ Cotg. } z \text{ Tg.}\frac{1}{2}mr = \left\{\frac{\text{Sec.}\frac{1}{2}mR^2 - 1}{\text{Tg.}\frac{1}{2}mR^2}\right\}$; folglich durch Auflösung dieſer quadratiſchen Gleichung

$\text{Tg.}\frac{1}{2}mr = \frac{1}{2}\text{Sec.}\frac{1}{2}mR^2 \text{ Cotang. } z \left(\sqrt{1 + (\text{Sin. } mR \text{ Tg. } z)^2} - 1\right)$

Sey 7.) $\text{Tang. } x = \text{Sin. } mR \text{ Tang. } z$; ſo iſt $1 + \left\{\frac{\text{Tg. } x^2}{\text{Sec. } x^2}\right\} =$

$= 1 + (\text{Sin. } mR \text{ Tg. } z)^2$, und $\sqrt{1 + (\text{Sin. } mR \text{ Tg. } z)^2} - 1 = \text{Sec. } x - 1$
$= \text{Tg. } x \text{ Tg.}\frac{1}{2}x = \text{Sin. } mR \text{ Tg. } z \text{ Tg.}\frac{1}{2}x = 2\text{Sin.}\frac{1}{2}mR \text{ Cos.}\frac{1}{2}mR \text{ Tg.}\frac{1}{2}x$
mithin $\text{Tg.}\frac{1}{2}mr = \text{Tg.}\frac{1}{2}mR \text{ Tg.}\frac{1}{2}x$, oder ſehr nahe

8.) $r = R \text{ Tg.}\frac{1}{2}x$.

§. 18. Wenn 1.) die Horizontalrefraktion R und die zur Zeitdiſtanz z gehörige Refraktion r gegeben ſind; ſo findet man $\text{Tang}\frac{1}{2}x = \frac{r}{R}$ (§. 17. n. 8.), mithin x ſelbſt.

Hieraus ferner $\text{Sin. } mR = \text{Tg. } x \text{ Cotg. } z$, alſo mR, und damit m.

Oder: da $\text{Sin. } (z - mr) = \text{Cos. } mR \text{ Sin. } z$ (§. 17. n. 3. und 4.): ſo iſt ſehr nahe $\text{Sin. } z - \frac{1}{2}m^2r^2\text{Sin. } z - mr\text{Cos. } z = \text{Sin. } z - \frac{1}{2}m^2R^2\text{Sin. } z$

$mr^2 \text{ Sin. } z + 2r \text{ Cos. } z = mR^2 \text{ Sin. } z$

alſo $m = \frac{2r \text{ Cotang. } z}{R^2 - r^2}$, wo r und R in Theilen des Halbmeſſers auszudrücken ſind. Sind R und r in Sekunden ausgedrückt: ſo hat man $m = \frac{2r \text{ Cotang } z}{(R+r)(R-r)\text{Sin. } 1''}$.

Sind 2) die den Zenithdiſtanzen z, z' entſprechende Refraktionen gegeben; ſo findet man m auf folgende Art:

Es iſt $\frac{\text{Sin. } (z - mr)}{\text{Sin. } z} = \frac{\text{Sin. } (z' - mr')}{\text{Sin. } z'}$ (§. 17. n. 3.);

alſo $\frac{\text{Sin. } z \text{ Cos. } mr - \text{Cos. } z \text{ Sin. } mr}{\text{Sin. } z} = \frac{\text{Sin. } z' \text{ Cos. } mr' - \text{Cos. } z' \text{ Sin. } mr'}{\text{Sin. } z'}$

$\text{Cos. } mr - \text{Sin. } mr \text{ Cotg. } z = \text{Cos. } mr' - \text{Sin. } mr' \text{ Cotg. } z'$

Aber $\text{Cos. } mr = 1 - \frac{1}{2}m^2r^2$, und $\text{Sin. } mr = mr - \frac{1}{6}m^3r^3$ ſehr nahe; folglich iſt, wenn man dieſe Ausdrücke der Sin. und Cos. von mr und mr' ſubſtituirt, und die gehörigen Reduktionen macht, unter der Vorausſetzung, daß $r' > r$,

$3m(r'^2 - r2) = 6(\text{Cotg. } z - r' \text{ Cotg. } z') + m^2(r'^3 \text{ Cotg. } z' - r3 \text{ Cotg. } z$,

oder zur Abkürzung $3ma = 6c + bm^2$, woraus man erhält

$$\left(m-\tfrac{3}{2}\tfrac{a}{b}\right)^2 = \tfrac{6c}{b}\left(\tfrac{3}{8}\tfrac{a^2}{bc}-1\right)$$

$$m = \tfrac{3}{2}\tfrac{a}{b} \pm \sqrt{\tfrac{6c}{b}} \times \sqrt{\tfrac{3}{8}\tfrac{a^2}{bc}-1}$$

$$= \sqrt{\tfrac{6c}{b}}\left(\sqrt{\tfrac{3}{8}\tfrac{a^2}{bc}} \pm \sqrt{\tfrac{3}{8}\tfrac{a^2}{bc}-1}\right)$$

Man ſetze $\text{Sin.}\, x = \frac{2}{a}\sqrt{\frac{2}{3}bc}$; ſo wird

$$m = \sqrt{\tfrac{6c}{b}}\left(\tfrac{1}{\text{Sin.}x} \pm \sqrt{\tfrac{1}{\text{Sin.}x^2}-1}\right)$$

$$= \sqrt{\tfrac{6c}{b}}\,(\text{Cosec.}\, x \pm \text{Cotg.}\, x)$$

$$= \text{Tang.}\tfrac{1}{2}x\sqrt{\tfrac{6c}{b}},$$ wenn man das untere Zeichen gebraucht.

Das obere Zeichen würde einen ſehr großen Werth von m geben, und kann hier nicht gebraucht werden. In dem Ausdruck des Sinus des Hülfswinkels x kommen die Refraktionen r, r' im Zähler und Nenner mit einerley Abmeſſung vor, und daher können ſie hier in Sekunden ausgedrükt, ohne Veränderung des Ausdruks gebraucht werden. Den Ausdruk für m hingegen muß man in dieſem Fall in folgenden verwandeln $m = \frac{\text{Tg.}\frac{1}{2}x}{\text{Sin.}1''}\sqrt{\frac{6c}{b}}$.

Da in obiger quadratiſchen Gleichung der Coefficent von m^2 ſehr klein iſt; ſo iſt auch nahe

$3ma = 6c$, $m = \frac{2c}{a} = \frac{2(r\,\text{Cotang}\,z - r'\,\text{Cotang}\,z')}{(r'+r)(r'-r)\,\text{Sin.}\,1''}$, wenn die Refraktionen in Sekunden ausgedrükt ſind. Man ſetze dieſen Werth von m $= m'$; ſo iſt $m = m' + \frac{b}{3a}m^2$, ſehr nahe $= m' + \frac{b}{3a}m'^2$

$$= m' + m'^2\,\frac{(r'^3\,\text{Cotg.}\,z' - r^3\,\text{Cotg.}\,z)\,\text{Sin.}\,1''}{3(r'+r)(r'-r)}$$

3.) Wenn m, und die zur Zenithdiſtanz z gehörige Refraktion r gegeben ſind; ſo hat man

$\text{Cos.}\, mR = \frac{\text{Sin.}\,(z-mr)}{\text{Sin.}\,z}$ (§. 17. n. 3. und 4.) woraus man mR und R ſelbſt findet.

Oder: $\left.\begin{matrix}1-\text{Cos.}\,mR\\ 2\,\text{Sin.}\frac{1}{2}mR^2\end{matrix}\right\} = \frac{\text{Sin.}\,z-\text{Sin.}\,(z-mr)}{\text{Sin.}\,z} = \frac{2\text{Sin.}\frac{1}{2}mr\,\text{Cos.}\,(z-\frac{1}{2}mr)}{\text{Sin.}\,z}$.

$\text{Sin.}\frac{1}{2}mR = \frac{\text{Sin.}\frac{1}{2}mr\,\text{Cos.}\,(z-\frac{1}{2}mr)}{\text{Sin.}\,z}$, woraus ſich wiederum $\frac{1}{2}mR$; alſo auch R ergiebt.

4.) Wenn man die Refraktionen r, r' u. ſ. w. in einem gegebenen Verhältniß vergrößert oder vermindert; ſo gehen ſie in

die fr, fr' über, wenn dieſes Verhältniß dem von $f : 1$ gleich iſt. Alsdenn wird die Zahl m ſich verwandeln in

$m' = \frac{2(fr \text{ Cotg. } z - fr' \text{Cotg. } z')}{f^2 (r'+r)(r'-r) \text{ Sin.}''}$, (n. 3.), $= \frac{m}{f}$. Folglich iſt, wenn ſich die Refraktionen in einerley Verhältniß verändern, der Coefficient m umgekehrt den Refraktionen proportional.

§. 19. Um die Stralenbrechung durch aſtronomiſche Beobachtungen zu beſtimmen, ſuche man die Polhöhe aus der gröſten und kleinſten Höhe eines nahe bey dem Pol ſtehenden Sterns, z. B. des Polarſterns, indem man die halbe Summe der beobachteten oder ſcheinbaren Höhen nimmt. Dieſe wird um die halbe Summe der den zwey Höhen entſprechenden Refraktionen zu groß ſeyn (§. 16.).

Man beobachte ferner die Mittagshöhe eines nahe am Scheitel vorübergehenden Stern, und leite daraus mittelſt der vorhin gefundenen Polhöhe ſeinen Abſtand vom Pol her, welcher um eben ſo viel zu klein ſeyn wird, als die beobachtete Polhöhe wegen der Refraktion zu groß iſt, weil nahe am Scheitel die Refraktion unmerklich iſt, und in demſelben ganz verſchwindet (§. 16.). Iſt nun die Polhöhe größer als 45°; ſo wird man eben dieſen Stern auch in ſeiner kleinſten Höhe unter dem Pol beobachten können, wo er nur eine kleine Höhe haben wird, wenn die Polhöhe nicht viel größer iſt als 45°. Dieſe Höhe wird man größer finden, als den Ueberſchuß der Polhöhe über die Polardiſtanz, welcher genau die kleinſte Höhe des Sterns ſeyn würde, wenn die Polhöhe und Polardiſtanz richtig wären. Erſtere iſt aber wegen der Refraktion zu groß, und letztere um eben ſo viel zu klein; mithin iſt die ſo gefolgerte kleinſte Höhe um das Doppelte des in der Polhöhe ſteckenden Fehlers, d. i. um die zwey Refraktionen, welche die in der Nähe des Pols ſtehenden Sterne hatten, zu groß. Nimmt man ſie als die wahre an, und zieht ſie von der beobachteten ab; ſo wird die dieſer Höhe entſprechende Refraktion um die Summe der in der Nähe des Pols Statt findenden Refraktionen zu klein heraus kommen. Weil aber die Refraktionen mit der Höhe abnehmen; ſo wird die in der Nähe des Pols Statt findende *beträchtlich kleiner* ſeyn, als diejenige, wel-

che dem nahe am Horizont ſtehenden Stern zugehört, und daher letztere auf dieſem Weg wenigſtens beynahe gefunden werden.

Sey zum Beyſpiel die gröſte ſcheinbare Höhe des

Polarſterns	= 50°	14′	18″
kleinſte « «	= 46	49	45:
ſo iſt die Summe	= 97	4	3
alſo die ſcheinbare Polhöhe	= 48	32	1,5
Ferner: ſcheinb. Höhe « Perſeus über dem Pol	= 89	20	40
mithin ſcheinbare Polardiſt. « Perſ.	= 40	48	38,5
Polhöhe	= 48	32	1,5
beynahe wahre Höhe « Perſ. u. d. P.	= 7	43	23,0
beobachte Höhe	= 7	48	28.0

folglich iſt Refraktion für die Höhe 8° 9′ beynahe = 5 5

§. 20. Genauer erhält man die Refraktionen durch folgendes Verfahren. Es ſey S die Summe der gröſten und kleinſten Höhe eines Circumpolarſterns, oder die Summe der kleinſten und des Supplements der gröſten Höhe, wenn letztere in den ſüdlichen Quadranten des Meridians fiele, und s ſey die Summe der dieſen Höhen entſprechenden Refraktionen oder ihre Differenz, wenn die gröſte Höhe in den ſüdlichen Quadranten des Meridians fällt; ſo wird die ſcheinbare Polhöhe $= \frac{1}{2} S$, die wahre $= \frac{1}{2} S - \frac{1}{2} s$ ſeyn. Für einen andern weiter vom Pol abſtehenden Stern ſeyen dieſe Summen S' und s' beziehungsweiſe; ſo wird aus dieſen die ſcheinbare Polhöhe $= \frac{1}{2} S'$ die wahre $= \frac{1}{2} S' - \frac{1}{2} s'$ ſeyn. Mithin muß ſeyn

$$\frac{1}{2} S' - \frac{1}{2} s' = \frac{1}{2} S - \frac{1}{2} s, \text{ und } S' - S = s' - s.$$

Aus den Beobachtungen iſt der Unterſchied $S' - S$ der ſcheinbaren Polhöhe gegeben: folglich kennt man den Ueberſchuß $s' - s$ der Summe der letzteren zwey Refraktionen über die Summe der zwey erſtern. In dem vorhergehenden Beyſpiel iſt

$$S' = 97° 9' 8'$$
$$S = \underline{97\ 4\ 3}$$
$$\left.\begin{matrix} S' - S \\ s' - s \end{matrix}\right\} = 0\ 5\ 5.$$

Wäre das Verhältniß dieſer Refraktionen zu einander bekannt;

bekannt; so könnte man die Refraktionen selbst finden. Nun erhellt aber aus §. 17. n. 6. daß die Refraktionen in nicht zu kleinen Höhen wenigstens beynahe wie die Tangenten der scheinbaren Abstände vom Scheitel oder die Cotangenten der scheinbaren Höhen sich verhalten müssen, weil $\frac{1}{2}mr$, $\frac{1}{2}mr'$ klein sind; man wird also schließen: wie sich verhält der Ueberschuß der Summe der Tangenten der letztern zwey Scheitelabstände über die Summe der Tangenten der zwey ersten zur Tangente eines Scheitelabstandes, so verhält sich die Differenz $S-s$ der zwey Refraktssummen zu der jenem Scheitelabstand zugehörigen Refraktion. In obigem Beyspiel ist

Die Cotangente der grösten Höhe des Polarsterns			=	0,832
— — kleinsten	—	—	=	0,938
	Summe	=		1,770
Die Cotangente der grösten Höhe α Perseus			=	0,011
— — kleinsten	—	—	=	6,976
	Summe	=		6,987
Ueberschuß der letztern Summe über die erste			=	5,217

5,217 : 0,832 = $\left\{\begin{matrix}5'\,5'' \\ 305''\end{matrix}\right\}$: 48.6 Refr. für 50° 14′ sch. H.

5,217 : 0,938 = 305 : 54,8 — 46 50

und eben so findet man 0,6 — 89 41

— — — 6′ 47.8 — 7 48

s = 1 43,4;
s' = 6 48,4;

s	=	97° 4	3,0
s'	=	97 9	8,0
$S-s$	=	97 2	19,6
$S'-s'$	=	97 2	19,6
Polhöhe	=	48 31	9,8
gröste Höhe α Pers.	=	89 20	40,0
Refr.		—	0,6
wahre Höhe	=	89 20	39,4
Polardistanz	=	40 49	29,6

Fällt eine Höhe in den südlichen Quadranten des Meridians; so wird ihre Cotangente subtraktiv, und die Summe verwandelt sich in die Differenz.

§. 21. Hat man nun die Polhöhe und die Polardistanz gefunden; so kann man daraus für beliebige Höhen den Stundenwinkel oder das Azimuth des Sterns berechnen (§. 8. n. 4. 7.) Im ersten Fall beobachtet man zwey Durchgänge des Sterns durch den Meridian, welche man auch independent von den Refraktionen durch correspondirende Höhen finden kann (§. 4. n. 3.) da die Refraktion in gleichen Höhen gleich gros ist, und bestimmt daraus die Zeit, zu welcher der Stern die angenommene Höhe erreichen muß. Im zweyten Fall stellt man den Winkelmesser in die Ebene des bey dieser Höhe durch den Stern gehenden Vertikalkreises, dessen Lage durch das berechnete Azimuth gegeben ist, und durch die Refraktion nicht geändert wird. Man wartet die Zeit ab, welche der angenommenen Höhe entspricht, oder zu welcher der Stern in die Ebene des auf das berechnete Azimuth gestellten Winkelmessers kommt, und vergleicht die in diesem Augenblik beobachtete Höhe mit der vorausgesetzten; so wird man die dieser Höhe entsprechende Refraktion erhalten, welche der Differenz der beobachteten und der angenommenen Höhe gleich seyn wird. Hiedurch kann man also die den kleineren Höhen entsprechende Refraktionen finden, bey welchen man die Regel nicht mehr anwenden kann, daß die Refraktionen den Cotangenten der scheinbaren Höhen proportional seyen.

Wollte man diese Methode auch in dem Fall anwenden, wo man nur die scheinbare Polhöhe und die mittelst derselben gefundene scheinbare Polardistanz kennt; so würde man nur die den kleineren Höhen entsprechende Refraktionen beyläufig finden können, weil durch die in der Polhöhe und Polardistanz steckenden Fehler die voraus berechneten Höhen vergrößert werden, mithin die aus ihrer Vergleichung mit den beobachteten Höhen geschlossene Refraktionen zu klein heraus kommen. Mit der Höhe nimmt zwar dieser Fehler ab, aber in einem kleineren Verhältniß als die Refraktionen, so daß in einer der Polhöhe gleichen Höhe der Fehler eben so groß wird, als die dieser Höhe entsprechende Refraktion, mithin die Refraktion zu verschwinden *scheint.*

Sind nämlich l' die ſcheinbare Polhöhe, d' die ſcheinbare Polardiſtanz; ſo wird man für die dem Stundenwinkel t entſprechende Höhe h' haben (§. 8. n. 3.) $\text{Sin. } h' = \text{Sin. } (l'+d') - 2\text{Sin. } \frac{1}{2}t^2 \text{ Cos. } l' \text{ Sin. } d'$ für den Halbmeſſer 1. Iſt nun die der Polhöhe l' entſprechende Refraktion $= r$, und die Polardiſtanz d' aus der Höhe eines ſehr nahe am Scheitel vorübergehenden Sterns abgeleitet; ſo wird die wahre Polhöhe $= l'-r$, die wahre Zenithdiſtanz $= d'+r$, und für die demſelben Stundenwinkel t zugehörige wahre Höhe h wird ſeyn $\text{Sin. } h = \text{Sin. } (l'-r+d'+r) - 2\text{Sin. } \frac{1}{2}t^2 \text{ Cos. } (l'-r)\text{ Sin. } (d'+r)$.

Aber $\text{Cos. } (l'-r) = \text{Cos. } l' \text{ Cos. } r + \text{Sin. } l' \text{ Sin. } r$

$\text{Sin. } (d'+r) = \text{Sin. } d' \text{ Cos. } r + \text{Cos. } d' \text{ Sin. } r$;

folglich $\text{Sin. } (d'+r)\text{Cos. } (l'-r) = \text{Cos. } l' \text{ Sin. } d' \text{ Cos. } r^2 + \text{Sin. } l' \text{ Sin. } d' \text{ Sin. } r \text{ Cos. } r + \text{Sin. } l' \text{ Cos. } d' \text{ Sin. } r^2 + \text{Cos. } l' \text{ Cos. } d' \text{ Sin. } r \text{ Cos. } r = \text{Cos. } l' \text{ Sin. } d' - \text{Cos. } (l'+d') \text{ Sin } r^2 + \frac{1}{2} \text{Sin } 2r \text{ Cos. } (l'-d')$

und daher $\left.\begin{array}{l}\text{Sin. } h' - \text{Sin. } h \\ 2\text{Sin. } \frac{1}{2}(h'-h) \text{ Cos. } \frac{1}{2}(h'+h)\end{array}\right\} = \text{Cos. } (l'-d') \text{ Sin. } \frac{1}{2}t^2 \text{ Sin. } 2r - \text{Cos. } (l'+d') \text{ Sin. } \frac{1}{2}t^2 \text{ Sin. } r^2$, oder, weil r und $\frac{1}{2}(h'+h)$ hier ſehr klein ſind, und $l'+d'$ nahe $= 90$ iſt, ſehr nahe

$$h'-h = \frac{2r \text{ Cos. } (l'-d') \text{ Sin. } \frac{1}{2}t^2}{\text{Cos. } h'}$$

die berechneten Höhen ſind alſo beſtändig zu groß, wenn man die ſcheinbare Polhöhe und Polardiſtanz anwendet, und die Refraktionen werden zu klein gefunden.

§. 22. Um die Refraktionen noch genauer zu erhalten; ſuche man aus zwey nach §. 20. gefundenen Refraktionen, die beträchtlich verſchiedenen Höhen zugehören, nach §. 17. n. 2. den Werth von m, und brauche jetzt bey der §. 20. gezeigten Berechnung ſtatt der Tangenten der ſcheinbaren Zenithdiſtanzen die Tangenten der um das $\frac{1}{m}$fache der ihnen entſprechenden Refraktionen, die man ſchon beynahe kennt, verminderten ſcheinbaren Abſtände vom Scheitel, oder die Cotangenten der um eben dieſe Größen vermehrten ſcheinbaren Höhen. Mittelſt der auf dieſem Weg erhaltenen genaueren Refraktionen wiederhole man die Berechnung von m, und ſetze dieſes Verfahren ſo lange fort, bis man zwey aufeinander folgende gleiche Werthe von m erhält. In den meiſten Fällen wird der zweyte Werth von m hinreichend genau ſeyn.

Daß durch die Bradley'ſche oder Simpſon'ſche Regel, von welchen die eine aus der andern abgeleitet werden kann, die

Refraktionen von 5° Höhe an sehr genau dargestellt werden, lehren die Beobachtungen. Es wird daher der Mühe Werth zu untersuchen, wie genau die auf die neuesten Untersuchungen von La Place, und die genauesten astronomischen Beobachtungen gegründeten Refraktionstafeln *) damit übereinstimmen. Nach diesen ist, wenn das Barometer auf 0,76^{m} oder 28 par. Zoll 0,93 Lin. steht und das Thermometer + 10° oder + 8 Grade nach Reaumurs Scale zeigt, für $Z = 45°$; $r = 58'',2$: für $Z' = 85$; $r' = 9' 54'',3$. Hieraus findet sich nach §. 18. n. 2. die Zahl $m = 7,31883$, $R = 30' 12'',4$; $mR = 3° 41' 4'',64$. Diese Horizontalrefraktion ist beträchtlich kleiner, als nach der Tafel, wo sie = 33 46″,3 ist. Piazzi setzt sie für denselben Zustand der Atmosphäre nur 32′ 24″, 1. Die Uebereinstimmung der mit obigen Werthen von m und R nach den Formeln §. 17. n. 7. und 8. berechneten Refraktionen mit denenjenigen, welche La Place's Theorie und die Beobachtungen Piazzi's geben, zeigt folgende Tafel:

Scheinbare Zenithdist.	Refraktion La Place.	Piazzi.	Formel.
10	10″,3	10″,3	10″,3
20	21,2	21,0	21,2
30	33,4	33,6	33,6
40	48,9	48,6	48,8
45	58,2		58,2
50	1′ 9,3	1′ 9,3	1′ 9,3
60	1 40,6	1 40,9	1 40,6
70	2 38,8	2 39,6	2 38,8
80	5 19,8	5 19,5	5 19,9
85	9 54,3	9 51,8	9 54,3
87	14 28,1		14 20,6
90	33 46,3	32 24,1	30 12,4

Die Simpson'sche, und folglich auch die Bradley'sche Formel giebt also für Höhen, die nicht kleiner als 5 Grad sind, die Refraktionen innerhalb 0″,2 mit La Place übereinstimmend.

Legt man La Place's Horizontalrefraktion und die von 45° zum Grund: so findet man nach §. 18. n. 1. die Zahl $m = 5,8503$, $mR = 3° 17' 38'',6$, und die Refraktionen stimmen mit La Place von 20° Höhe an innerhalb 0,2 Sek. überein. Bey 5 und 10 Graden Höhe giebt die Formel die Refraktionen um 11,6 und 2,0 Sek. beziehungsweise zu groß.

Setzt man endlich mit Piazzi die Horizontalrefraktion = 32′ 24″, 1 und behält für 45° die 58,2 Sek. bey; so wird $m = 6,3581$;

*) Tables astronomiques publiées par le Bureau des Longitudes de *France I. P. Tab.* IX. des Tables de Refrations.

$mR = 3° 6' 0'',86$, und die mit diesen Bestimmungsstücken nach §. 17. n. 7. 8. berechneten Refraktionen stimmen wiederum mit La Place von 20° Höhe an innerhalb 0,2 Sekunden überein, bey 3; 5; 10; Graden Höhe aber giebt diese Formel beziehungsweise 14'',0; 7,4''; 1'',6 zu viel.

Folgende Tafel giebt die in der Nähe des Horizonts Statt findende Refraktionen nach La Place, wenn das Barometer auf 28''0''',93 und das Reaumursche Thermometer auf + 48° steht:

scheinb. Zenithdist.		Refrakt.		scheinb. Zenithdist.		Refrakt.	
85°	0'	9'	54'',3	88°	0'	18'	22'',2
	10	10	10,9		10	19	11,5
	20	10	28,3		20	20	4,8
	30	10	46,7		30	21	1,9
	40	11	6,1		40	22	3,4
	50	11	26,6		50	23	9,6
86	0	11	48,3	89	0	24	21,2
	10	12	11,3		10	25	38,6
	20	12	35,6		20	27	2,2
	30	13	1,3		30	28	32,0
	40	13	28,5		40	30	9,3
	50	13	57,3		50	31	54,3
87	0	14	28,1	90	0	33	46,3
	10	15	0,9		10	35	45,9
	20	15	36,0		20	37	53,6
	30	16	13,4	90	30	40	10,0
	40	16	53,2				
	50	17	36,3				
88	0	18	22,2				

Für grösere Höhen findet man die Refraktionen durch die Formeln §. 17. n. 7. 8. wie oben schon bemerkt wurde, innerhalb 0'',2 genau mit La Place übereinstimmend, wenn man setzt $m = 7,31883$; $mR = 3°41'4'',64$; $R = 30'12'',4 = 1812'',4$, Lg. Sin. $mR = 8,8079709$; Lg. $R = 3,2582538$.

$$\text{Tg.}\, z = \text{Sin.}\, mR\, \text{Tg.}\, Z$$
$$r = R\, \text{Tg}\tfrac{1}{2} z.$$

Oder da $\text{Tg.}\, \frac{1}{2} mr = \text{Tg.}\, \frac{1}{2} mR^2\, \text{Tg.}\, (z - \frac{1}{2} mr)$ (§. 17. n. 5.)

so ist sehr nahe $\dfrac{2\,\text{Tg.}\, \frac{1}{2} mR^2}{m\,\text{Sin.}\, 1''}\, \text{Tg.}\, (z - \frac{1}{2} mr)$

$$= 58'',317\, \text{Tang}\, (z - 3\ 659\, r)$$

§. 23. Sowohl die Theorie als die Beobachtungen zeigen, daß die Stralenbrechungen in grösseren Höhen als 5° sehr nahe der Dichtigkeit der Luft an dem Beobachtungsort proportional

sind. Man nennt die für eine gewiße Dichtigkeit der Luft, z. B. für diejenige, welche bey 28″ 0,‴93 Barometerstand und bey +8° Reaum. Statt findet, berechnete Refraktionen die mittlere, und verwandelt sie mittelst der durch das Barometer und Thermometer für die Zeit der Beobachtung gegebenen Dichtigkeit der Luft in die wahre. Obige Refraktionen entsprechen +8°; folglich verhält sich bey einerley Barometerstand die Dichtigkeit der Luft d beym Eispunkt zu ihrer Dichtigkeit D bey +8°, wie $1+\frac{3}{8}\cdot\frac{8}{80} : 1 = 83 : 80$, (§. 14.) und ihre Dichtigkeit D' bey $+t°$:

Dichtigkeit $d = 80 : 80+\frac{3t}{8}$

Mithin ist $D' : D = 83 : 80+\frac{3t}{8} = 1 : \frac{80}{83}+\frac{3t}{8.83}$

$$= 1 : 1-\frac{3}{83}+\frac{3t}{8.83}$$

$$= 1 : 1+\frac{3(t-8)}{8.83}$$

$$= 1 : 1+\frac{t-8}{221\frac{1}{3}}$$

und daher $D' = \frac{D}{1+\frac{t-8}{221}}$, wenn der Barometerstand sich nicht verändert. Verändert sich auch dieser, und wird $= b$ pariser Zollen; so wird die Dichtigkeit D' werden $= \frac{b}{28,00775}\cdot\frac{D}{1+\frac{t-8}{221}}$.

Folglich muß man die §. 22. angegebene Refraktionen mit $\frac{b}{28,00775\left(1+\frac{t-8}{221}\right)}$ multipliciren, um sie in die wahre zu verwandeln, welche dem Barometerstand b und Thermometerstand t zur Zeit der Beobachtung entsprechen.

Auf diese Veränderungen der Refraktionen muß man Rücksicht nehmen, wenn sie durch Beobachtungen bestimmt werden sollen. Kennt man die Refraktionen schon beynahe; so kann man ihre Veränderungen während der Zeit der Beobachtungen genau genug berechnen, und dadurch die beobachteten scheinbaren Höhen auf diejenigen reduciren, welche bey einem gewißen Barometer und Thermometerstand würden beobachtet worden seyn, und die aus den reducirten Beobachtungen abgeleitete Refraktionen werden eben diesem Stand des Barometers und Thermometers entsprechen, den man übrigens so wählt, daß er dem während der Beobachtungen Statt gehabten mittleren Stand *nahe kommt, um* die Reduktionen zu vermindern.

§. 24. Die Atmosphäre der Erde ist ein Gemenge von verschiedenen Gasarten, welche bey einerley Dichtigkeit die Lichtstralen verschieden brechen. Aber das Verhältniß dieser Gasarten zu einander ist an sehr von einander entfernten Orten und zu verschiedenen Zeiten äusserst nahe immer dasselbe. Die atmosphärische Luft enthält in 100 Theilen 79 Theile Stikgas und 21 Sauerstoffgas oder Lebensluft den Volumen nach, und 3 oder 4 Theile kohlensaures Gas oder sogenannte fixe Luft sind in 1000 Theilen atmosphärischer Luft verbreitet. Gay-Lussac hat sich von Paris bis auf eine Höhe von 21487 par. Fuß über das Niveau der Seine erhoben, und die von dieser Höhe mitgebrachte Luft nach einer genauen Untersuchung mit der aus den niedrigsten Schichten der Atmosphäre genommenen übereinstimmend gefunden.

Endlich hat La Place noch Untersuchungen über den Einfluß der Feuchtigkeit der Luft auf ihre stralenbrechende Kraft angestellt, um wenn es nöthig wäre, auf das Hygrometer bey den Refraktionen Rükſicht zu nehmen. In Ermanglung direkter Versuche über diesen Gegenstand gieng er von der Hypothese aus, daß die Wirkungen des Wassers und seines Dampfs auf das Licht ihren Dichtigkeiten proportional seyen. Unter dieser Voraussetzung fand er mittelst des bekannten Brechungsverhältnißes für den Uebergang des Lichts aus Luft in Wasser, die stralenbrechende Kraft des Dampfs größer als die der Luft, wenn sie mit dem Dampf einerley Dichtigkeit hat. Aber bey einerley Druck übertrifft die Dichtigkeit der Luft die des Dampfs nahe in demselben Verhältniß: folglich ist die von dem in der Atmosphäre verbreiteten Wasserdampf herrührende Refraktion nahe dieselbe, welche die Luft hervorbringen würde, deren Stelle er einnimmt. La Place fand nemlich für 12; 16; 20; 24; 28; 32; Grade des Reaumurschen Thermometers über dem Gefrierpunkt die durch den Wasserdampf hervorgebrachte Vergrößerung der Refraktion in 45° scheinbarer Höhe beziehungsweise 0,182; 0,241; 0,316; 0,413; 0,535; 0,687 Sekunden, woraus man die einer gegebenen scheinbaren Höhe entsprechende Zunahme der Refraktion findet, wenn man obige Zahlen mit der Cotangente der scheinbaren Höhe multiplicirt. Biot hat dieses Resultat durch direkte Versuche bestätigt, welche zugleich zeigen, daß die Refraktion nur in so fern auf die Stralenbrechung Einfluß hat, als sie die Dichtigkeit der Luft verändert.

§. 25. Bringt man die Wirkungen der Stralenbrechung in Rechnung; so wird man die täglichen Bewegungen der Fixsterne sehr genau mit der Voraussetzung der Umdrehung der Himmelskugel *um eine* unbewegliche Axe überstim-

mend finden. Die scheinbaren Abstände zweyer Fixsterne von einander, wenn man sie auch in sehr verschiedenen Höhen dieser Sterne und an weit von einander entfernten Orten der Erde, beobachtet hat, werden, wenn man sie von der Einwirkung der Stralenbrechung befreyt, desto genauer einerley Resultat geben, je genauer die Beobachtungen sind. Die Parallaxe der Fixsterne ist also unmerklich, und die scheinbaren Irregularitäten ihrer täglichen Bewegung kommen allein von der Stralenbrechung her. Diese macht sie früher auf und später untergehen, als es nach den Gesetzen der täglichen Bewegung seyn sollte, und man kann mittelst der bekannten Stralenbrechung am Horizont berechnen, wie viel dieses für jeden gegebenen Stern unter einer gegebenen Polhöhe beträgt. Man findet nemlich den scheinbaren halben Tagbogen eines Sterns, wenn man nach §. 8. n. 1. oder 4. den Stundenwinkel sucht, für welchen der Stern eben so tief unter dem Horizont steht, als die Horizontalrefraktion beträgt.

Heißen der wahre und scheinbare halbe Tagbogen T, T', und die Horizontalrefraktion R; so ist (§. 8. n. 11.)

$$\text{Cos. } T' = \frac{-\text{Sin. } R \text{ Sin. tot.}^2}{\text{Sin. } d \text{ Cos. } l} - \frac{\text{Cos. } d \text{ Sin. } l \text{ Sin. tot.}}{\text{Sin. } d \text{ Cos. } l}$$

$$\text{Cos. } T = - \frac{\text{Cos. } d \text{ Sin. } l \text{ Sin. tot.}}{\text{Sin. } d \text{ Cos. } l}$$

$$\text{folglich Cos. } T - \text{Cos. } T' \text{ oder } 2 \text{ Sin. } \frac{T' - T}{2} \text{ Sin. } \frac{T + T}{2} = \frac{\text{Sin. } R \text{ Sin. tot.}^3}{\text{Sin. } d \text{ Cos. } l}.$$

Da nun R nur ungefähr einen halben Grad beträgt; so ist sehr nahe

$$T' - T = \frac{R \text{ Sin. tot.}^3}{\text{Sin. } d \text{ Cos. } l \text{ Sin. } T}$$

§. 26. Man beobachte mehrere Höhen eines Fixsterns, dessen Polardistanz man kennt, und bemerke die Beobachtungszeiten nach einer Sekundenuhr. Die beobachteten Höhen vermindere man um die ihnen zugehörige Refraktionen, und diese seyen entweder durch Meridianhöhen der Circumpolarsterne allein, oder zum Theil durch Höhen ausser dem Meridian und die ihnen zugehörigen Azimuthe statt der *Stundenwinkel bestimmt*. Man berechne die diesen vermin-

derten oder wahren Höhen zugehörige Stundenwinkel nach §. 8. n. 4.; so wird man die Differenz der Stundenwinkel, oder, wenn die Höhen auf verschiedenen Seiten des Meridians genommen worden sind, ihre Summe, desto genauer den Zwischenzeiten der Beobachtungen proportional finden, je mehrere Sorgfalt darauf verwendet worden ist, der zu den Beobachtungen gebrauchten Uhr einen gleichförmigen Gang zu geben. Die Fixsterne beschreiben also ihre Parallelkreise mit einer gleichförmigen Winkelgeschwindigkeit, d. h. so, daß sie in gleichen Zeiten gleich große Winkel beschreiben, oder eine gleiche Anzahl Grade ihrer Parallelkreise durchlaufen, und die tägliche Umdrehung der Himmelskugel selbst, geschieht mit einer gleichförmigen Geschwindigkeit.

Man kann sich von der Gleichförmigkeit der täglichen Bewegung der Himmelskugel auch noch auf folgende Art versichern. Aus dem scheinbaren Abstand *AB* zweyer Fixsterne (Fig. 9.) suche man ihren wegen der Stralenbrechung verbesserten Abstand *ab*, und aus diesem mittelst der Polardistanzen *Pa*, *Pb* dieser Sterne den Winkel *aPb* am Pol. Man messe ferner die Abstände *sa*, *sb* eines dritten Sterns *s* von den zwey erstern, und verbessere sie wegen der Refraktion; so ist dadurch die Lage dieses Sterns gegen die zwey vorhergehenden bestimmt, und daher kann der Winkel *bPs* gefunden werden, welchen am Pol die durch denselben und die Sterne *b* und *s* gelegten gröſten Kreise miteinander machen. So kann man fortfahren, und immer ein neues Dreyeck so an die vorhergehenden anhängen, daß es eine Seite mit einem der übrigen Dreyecke gemeinschaftlich hat. Durch dieses Verfahren kann man also die Lage der Fixsterne gegen einander an der Himmelskugel, und die ihnen zugehörigen Winkel am Pol oder die Unterschiede ihrer Stundenwinkel finden, die sich wiederum wie die Zwischenzeiten ihrer Durchgänge durch den Mittagskreis verhalten werden.

§. 27. Die Rechnungen, welche letzter Methode erfordert, können auf folgende Art geführt werden.

1. Reduktion der *Distanzen*. In dem sphärischen Dreyeck ABZ

kennt man die scheinbaren Zenithdistanzen ZA, ZB entweder durch Beobachtung oder Berechnung, und die scheinbare Distanz AB; folglich kann man den Winkel AZB finden. Es ist nemlich, wenn die scheinbaren Höhen H',h' und die scheinbare Distanz D' heißen

$$\text{Cos. } Z = \frac{\text{Sin. tot. Cos. } D' - \text{Sin. } H' \text{ Sin. } h'}{\text{Cos. } H' \text{ Cos. } h'} \text{ Sin. tot.}$$

Sodenn kennt man in dem Dreyeck aZb die wahren Zenithdistanzen, oder ihre Complemente, nemlich die wahren Höhen H,h, mittelst der bekannten Refraktionen, und nach dem vorhergehenden den Winkel Z. Die wahre Distanz heiße D; so ist

$$\text{Sin. tot. Cos. } D = \text{Sin. } H \text{ Sin. } h + \frac{\text{Cos. } H \text{ Cos. } h \text{ Cos. } Z}{\text{Sin. tot.}}$$

$$\text{Cos. } D = \frac{\text{Sin. } H \text{Sin. } h}{\text{Sin. tot.}} + \frac{\text{Cos. } H \text{Cos. } h}{\text{Cos. } H' \text{Cos. } h'}\left(\text{Cos. } D' - \frac{\text{Sin. } H' \text{Sin. } h'}{\text{Sin. tot.}}\right)$$

2.) Berechnung der Polardistanzen und der Winkel am Pol. In dem Dreyeck aPb kennt man die wahre Distanz $ab = D$ und die Polardistanzen $Pa = d$, $Pb = d'$; folglich ist, wenn man $D + d + d' = S$ setzt,

$$\text{Sin. } \tfrac{1}{2}P^2 = \frac{\text{Sin. } (\frac{1}{2}S - d) \text{ Sin. } (\frac{1}{2}S - d')}{\text{Sin. } d. \text{ Sin. } d'} \text{ Sin. tot.}^2$$

$$\text{und Sin. } Pba = \frac{\text{Sin. } d \text{ Sin. } aPb}{\text{Sin. } D}$$

$$\text{Sin. } Pab = \frac{\text{Sin } d' \text{ Sin. } aPb}{\text{Sin. } D}$$

Wäre aber in diesem Dreyeck statt der Distanz ab der Winkel am Pol gegeben; so hätte man

$$\textit{Tang.} \tfrac{1}{2} \text{ Summe d. übr. Winkel} = \frac{\text{Cos. } \frac{1}{2}(d' - d)}{\text{Cos. } \frac{1}{2}(d' + d)} \text{ Cotg. } \tfrac{1}{2} aPb,$$

$$\textit{Tang.} \tfrac{1}{2} \text{ Diff. d. übr. W.} = \frac{\text{Sin } \frac{1}{2}(d' - d)}{\text{Sin. } \frac{1}{2}(d' + d)} \text{ Cotg. } \tfrac{1}{2} aPb,$$

woraus sich die zwey übrigen Winkel selbst, und die Seite ab ergeben.

In dem Dreyeck asb, dessen drey Seiten man kennt, sey das Perpendikel sp auf ab gefällt; so ist

$$\text{Tang } \frac{ap - pb}{2} = \frac{\text{Tang. } \frac{1}{2}(as + bs) \text{ Tg. } \frac{1}{2}(as - bs) \text{ Cotang } \frac{1}{2} ab}{\text{Sin. tot.}^2}$$

$$\text{und } ap = \tfrac{1}{2} ab + \frac{ap - pb}{2}$$

$$\text{Cos. } sab = \frac{\text{Tang. } ap \text{ Cotang. } as}{\text{Sin. tot.}}$$

Man hat also auch $Pas = Pab - sab$, und, wenn sq senkrecht auf Pa gezogen wird

$$\textit{Tang. } aq = \frac{\text{Tang. } as \text{ Cos. } Pas}{\text{Sin. tot.}}$$

mithin $Pq = Ps - aq$,

und $\text{Tang. } aPs = \frac{\text{Tang. } Pas \text{ Sin. } aq}{\text{Sin. } Pq}$

$\text{Cos. } Ps = \frac{\text{Cos. } as \text{ Cos. } Pq}{\text{Cos. } aq}$

Drittes Capitel.

Von den ſcheinbaren Bewegungen der Sonne und der Zeitmeſſung.

§. 28. Die Sonne hat auſſer ihrer täglichen, mit den übrigen Himmelskörpern gemeinſchaftlichen Bewegung, noch eine eigene Bewegung in Beziehung auf die Fixſterne von Abend gegen Morgen. Man bemerkt dieſe Bewegung leicht, wenn man auf diejenige Sterne Achtung giebt, welche ſich am weſtlichen Theil des Horizonts in der Abend-Dämmerung zeigten. Man wird ſie nach einiger Zeit nicht mehr finden, dagegen werden andere Sterne, welche vorher bald nach dem Untergang der Sonne noch eine beträchtliche Höhe über dem Horizont hatten, nur noch kurze Zeit in der Abend-Dämmerung ſichtbar ſeyn, und nach einigen Tagen ebenfalls in den Sonnenſtralen verſchwinden. Nach Verfluß von etwa $1\frac{1}{2}$ Monaten wird man dieſelben Sterne wieder in der Morgen-Dämmerung finden, die in der Abend-Dämmerung unſichtbar geworden waren, ſie werden mit jedem Tage früher auf und ſpäter untergehen, bis ſie nach Verfluß eines Jahres wieder am weſtlichen Horizont in den Sonnenſtralen verſchwinden.

Zu gleicher Zeit wird man aber auch eine Veränderung in den täglich von der Sonne beſchriebenen Kreiſen bemerken. Zweymal des Jahrs, nemlich in der zweyten Hälfte der Monate März und September ſind Tag und Nacht einander gleich; folglich ſteht die Sonne um dieſe Zeit im Aequator. In der zweyten Hälfte des Junius wird der Tag am längſten, und nimmt von da an zuerſt kaum merklich, hernach geſchwinder in derſelben Ordnung wieder ab, wie er vorher zugenommen hatte, und in der zweyten Hälfte des Decembers wird er *am kürzeſten*, und eben ſo lang als

vorher die Nacht zur Zeit des längsten Tages war. Die Sonne steht also zur Zeit des längsten Tags eben so weit vom Nordpol, als zur Zeit des kürzesten Tags vom Südpol ab (§. 7.) Von dem Zeitpunkt des kürzesten Tags an nimmt derselbe eben so zu, wie er vorher abgenommen hatte, und die Veränderungen der Tageslänge auf beyden Seiten des Zeitpunkts des längsten Tags, sind den correspondirenden Veränderungen derselben in dem südlich vom Aequator liegenden Theil der scheinbaren Sonnenbahn gleich. Die scheinbare jährliche Bahn der Sonne durchschneidet also den Aequator in zwey Punkten, und sie wird durch denselben in zwey gleiche und ähnliche Theile getheilt, welche wiederum durch die Punkte, in welchen sich die Sonne zur Zeit des längsten und kürzesten Tags befindet, halbirt werden.

§. 29. Man nennt diese scheinbare Bahn der Sonne die Ekliptik, die zwey Durchschnittspunkte derselben mit dem Aequator, die Punkte der Tag- und Nachtgleichen oder die Aequinoktial-Punkte, und unterscheidet sie durch die Benennungen Frühlings- und Herbstpunkt. Diejenigen Punkte ihrer Bahn aber, in welchen sie sich zur Zeit des längsten und kürzesten Tags befindet, heißen die Sonnenstillstands- oder Solstitialpunkte, weil um diese Zeit die Länge des Tags und die Mittagshöhe der Sonne sich nicht merklich verändert. Legt man durch den Pol *P* (Fig. 10.) und den Ort *d* des Mittelpunkts der Sonne einen größten Kreis; so heißt das zwischen dem Aequator *ABQ* und der Ekliptik *AdDQ* begriffene Segment *bd* desselben, welches den Abstand der Sonne von dem Aequator mißt, Abweichung der Sonne, und man nennt sie nördlich oder südlich, je nachdem dieses Segment von dem Aequator an gegen dem Nordpol oder Südpol hin liegt. Die Abweichung ergänzt also den Abstand von dem nächsten Pol zu 90°. Endlich heißt das zwischen dem Frühlingspunkt *A* und dem Punkt *b*, in welchem der durch den Pol und den Mittelpunkt *d* der Sonne gelegte größte Kreis den Aequator trifft, liegende Segment desselben die gerade Aufsteigung der Sonne, welche von dem Frühlingspunkt *A*

an nach der Richtung der jährlichen Bewegung der Sonne bis auf 360° in einem fort gezählt wird. Eben so heißt *Aq* die gerade Aufsteigung, *sq* die Abweichung eines Sterns, und beyde zusammen bestimmen des Sterns Lage eben so in Beziehung auf den Aequator, wie Azimuth und Höhe in Beziehung auf den Horizont.

Zur Zeit der Tag- und Nachtgleichen ist also die Abweichung der Sonne = 0, und ihre Mittagshöhe wird den Winkel *AOM* (Fig. 1.) messen, welchen der Aequator *AQ* mit dem Horizont macht, und die Höhe des Aequators heißt. Diese ist dem Complement der Polhöhe gleich, weil $NOP + AOP + AOM = 180°$ und $AOP = 90°$ ist; mithin durch die Polhöhe gegeben. Die Abweichung eines Sterns ist also auch dem Unterschied der Aequatorshöhe und der Mittagshöhe des Sterns gleich, und nördlich oder südlich, je nachdem letztere größer oder kleiner ist als die erstere.

§. 30. Um nun die jährliche scheinbare Bahn der Sonne genauer zu bestimmen, beobachte man öfters die Höhe ihres Mittelpunkts, indem man die halbe Summe der um die Stralenbrechung verminderten Höhen ihres oberen und unteren Randes nimmt, oder die beobachtete Höhe um ihren scheinbaren Halbmesser vermindert oder vermehrt, je nachdem man den oberen oder unteren Rand der Sonne genommen hat. (Sollte bey ferneren Beobachtungen die Parallaxe der Sonne merklich werden; so muß man auch diese in Rechnung bringen.) Zu gleicher Zeit beobachte man die Durchgangszeiten ihres Mittelpunkts und eines Sterns *s* (Fig. 10.) durch den Meridian. Aus den Mittagshöhen ergeben sich die Abweichungen *bd*, *b'd'* u. s. w. der Sonne nach dem vorhergehenden §. und aus den Zwischenzeiten zwischen den Durchgängen des Sterns und der Sonne durch den Meridian findet man die Unterschiede *bq*, *b'q* u. s. w. der geraden Aufsteigungen des Sterns und der Sonne für den Augenblick einer jeden dieser Beobachtungen. Denn wegen der gleichförmigen Umdrehung der Himmelskugel (§. 26.) verhält sich die tägliche Umlaufszeit des Sterns zur Zwischenzeit *zwischen den* Durchgängen des Sterns und

der Sonne durch den Meridian, wie 360° zu dem Unterschied bq ihrer geraden Aufsteigungen. Dadurch wird also die Lage der Sonne gegen den Stern s bey jeder Beobachtung bestimmt. Man wird nun finden, daß alle Sonnenörter d, d' ꝛc. in einem gröſten Kreiſe der Sphäre liegen, welcher durch zwey dieſer Punkte d, d' bestimmt iſt, den Fall ausgenommen, wo d, d' genau um 180° von einander abſtehen. Man wird alſo den Frühlingspunkt A, mithin die gerade Aufſteigung Aq des Sterns s, und die geraden Aufſteigungen der Sonne für jede der Beobachtungen haben, und dieſer Punkt, welcher eben ſo wenig, als der Pol wirklich am Himmel durch einen daſelbſt ſtehenden Stern bezeichnet iſt, und in welchem ſich die Sonne in jedem Jahr nur einen Augenblick befindet, wird mittelſt des Sterns s können aufgefunden werden.

§. 31. Es ſeyen bd, $b'd'$ (Fig. 10.) die beobachteten Abweichungen der Sonne, welche hier nördlich angenommen werden, und bb' ſey die beobachtete Differenz ihrer geraden Aufſteigungen Ab, Ab': ſo verhält ſich, unter der Vorausſetzung, daß $Add'Q$ ein gröſter Kreis ſey,

in dem ſph. Dreyeck Abd : Tang. bAd : Tang. bd = Sin. tot. : Sin. Ab
u. in dem ſph. Dreyeck $Ab'd'$ Tg. $b'd'$: Tg. bAd = Sin. Ab' : Sin. tot.

folglich Tg. $b'd'$: Tg. bd = Sin. Ab' : Sin. Ab

Es ſey $b'd'$ die größere der beobachteten Abweichungen der Sonne; ſo iſt

Tg. $b'd'$ + Tg. bd : Tg. $b'd'$ − Tg. bd = Sin. Ab' + Sin. Ab : Sin. Ab − Sin. Ab

oder $\text{Sin.}(b'd'+bd) : \text{Sin.}(b'd'-bd) = \text{Tang.}\frac{Ab'+Ab}{2} : \text{Tg.}\frac{Ab'-Ab}{2}$

Man halbire bb' in c, AQ in B; ſo iſt, weil vermöge der Vorausſetzung ADQ ein gröſter Kreis iſt, $AB = BQ = 90°$, und

$$\begin{aligned}\text{Sin.}(b'd'+bd) : \text{Sin.}(b'd'-bd) &= \text{Tang. } Ac : \text{Tg. } bc \\ &= \text{Cotang. } bc : \text{Cotang. } Ac \\ &= \text{Cotang. } bc : \text{Tang. } Bc.\end{aligned}$$

Man hat alſo 1.) $\left.\begin{matrix}\text{Tang. } Bc \\ \text{Cotang. } Ac\end{matrix}\right\} = \frac{\text{Sin.}(b'd'-bd)}{\text{Sin.}(b'd'+bd)}\ \text{Cotang. } bc$

Hieraus ergiebt ſich $Ab = Ac - bc$
$Ab' = Ac + bc$
$Aq = Ab - bq$:

Mithin hat man auch mittelſt obiger Proportionen

2.) $\text{Tang. } bAd = \frac{\text{Tang. } bd \text{ Sin. tot.}}{\text{Sin. } Ab}$

$= \frac{\text{Tang. } b'd \text{ Sin. tot.}}{\text{Sin. } Ab'}$.

Endlich kann man aus der bekannten geraden Aufſteigung Ag des Sterns s, und der beobachteten Differenz $b''q$ der geraden Aufſteigung des Sterns und der Sonne für jede der übrigen Beobachtungen die gerade Aufſteigung $Ab = Ag + b''q$ der Sonne, und mittelſt des jetzt bekannten Winkels bAd ihre Abweichung finden durch die Formel

$$3.)\ \text{Tang.}\, b''d'' = \frac{\text{Sin.}\, Ab'' \cdot \text{Tang.}\, bAd}{\text{Sin. tot.}}$$

welche der beobachteten Abweichung der Sonne gleich ſeyn muß, wenn alle Punkte der ſcheinbaren Sonnenbahn in einem gröſten Kreis der Sphäre liegen.

Aus n. 1. ergiebt ſich, daß es zur Verminderung der Fehler der Beobachtungen vortheilhaft iſt, zwey nördliche oder zwey ſüdliche Abweichungen zu gebrauchen, welche nahe bey den Aequinoktialpunkten beobachtet worden ſind. Alsdenn wird nemlich bc einem rechten Winkel nahe kommen; folglich Cotang. bc klein werden. Zugleich wird die Differenz der Abweichungen der Differenz der Mittagshöhen der Sonne gleich, und daher von dem in der Beſtimmung der Polhöhe begangenen Fehler unabhängig ſeyn, welcher nur auf den Nenner Sin. $(b'd' + bd)$ Einfluß hat, und den Werth dieſes ächten Bruchs um weniger ändern wird, als der in ſeinem Nenner ſteckende Fehler beträgt. Sind die zwey Abweichungen der Sonne einander gleich; ſo wird $Ac = 90°$, $Bc = o$, und der Einfluß des Fehlers der Polhöhe verſchwindet gänzlich.

Hingegen ſieht man aus n. 2. daß es zur Beſtimmung des Winkels, unter welchem die Ekliptik den Aequator durchſchneidet, vortheilhaft iſt, eine in der Nähe der Solſtitien liegende Beobachtung zu wählen, weil alsdenn der Sinus der geraden Aufſteigung nahe dem Halbmeſſer gleich; folglich der Einfluß des in der Abweichung liegenden Fehlers vermindert wird.

§. 32. Da die Ekliptik ein gröſter Kreis der Sphäre iſt; ſo ſtehen ihre Durchſchnittspunkte mit dem Aequator oder die Aequinoktialpunkte 180° von einander ab. Von dem Frühlingspunkt an wächst die nördliche Abweichung der Sonne, bis ihre gerade Aufſteigung = 90° wird, und das Sommerſolſtitium eintritt, wo ſie am gröſten iſt, und den Winkel mißt, unter welchem die Ekliptik den Aequator durchſchneidet, welcher die Schiefe der Ekliptik heißt. Von da an nimmt ſie wieder ab, bis ſie bey einer geraden Aufſteigung von 180° oder in dem Herbſtpunkt wieder verſchwindet. Sie wird jetzt ſüdlich, und bey einer geraden

Aufsteigung der Sonne von 270° oder im Wintersolstitium wiederum der Schiefe der Ekliptik gleich, von welchem Punkt an die südliche Abweichung abnimmt, bis sie in dem Frühlingspunkt wieder verschwindet. Der Punkt D (Fig. 10.) des Sommersolstitiums steht von den Aequinoktialpunkten A, Q beyderseits um 90° ab, weil AB und $AF = 90°$ sind, und eben so verhält es sich mit dem Punkt des Wintersolstitiums. Mithin liegen die Solstitialpunkte in einem gröſten Kreis, welcher durch die Pole des Aequators geht, und den durch diese und die Aequinoktialpunkte gelegten gröſten Kreis rechtwinklicht schneidet. Der erstere heiſt der Kolur der Solstitien oder Sonnenwenden (Colurus solstitiorum), letzterer der Kolur der Nachtgleichen (Colurus æquinoctiorum). Nimmt man auf beyden Seiten des Kolurs der Solstitien die Bogen Bb, Bb' des Aequators einander gleich; so werden auch die den Punkten b, b' entsprechende Abweichungen bd, $b'd'$ der Sonne einander gleich seyn.

Das hier gesagte folgt aus §. 31. n. 3. Setzt man nemlich die gerade Aufsteigung der Sonne $= \alpha$, ihre Abweichung $= \delta$, die Schiefe der Ekliptik $= \varepsilon$; so ist $\text{Tang.}\,\delta = \frac{\text{Tg.}\,\varepsilon \cdot \text{Sin.}\,\alpha}{\text{Sin. tot.}}$. Die Tangente der Abweichung wächst also dem Sinus der geraden Aufsteigung proportional, und wird am gröſten, wenn $\text{Sin.}\,\alpha = \text{Sin. tot.}$, also wenn $\alpha = 90°$ oder $= 270°$ wird. Im letzteren Fall ist aber $\text{Sin.}\,\alpha$ negativ, mithin die Abweichung südlich. Wird $\alpha > 90°$; so nimmt $\text{Sin.}\,\alpha$ wieder ab, und wird dem Sinus seines Supplements gleich. Nimmt man $Bb' = Bb$; so wird $Ab = b'Q$, $\text{Sin.}\,Ab' = \text{Sin.}\,b'Q = \text{Sin.}\,Ab$, und

$$\text{Tang.}\,b'd' = \frac{\text{Tg.}\,\varepsilon \cdot \text{Sin.}\,Ab'}{\text{Sin. tot.}} = \frac{\text{Tg.}\,\varepsilon \cdot \text{Sin.}\,Ab}{\text{Sin. tot.}} = \text{Tg.}\,bd.$$

Mithin wird $b'd' = bd$ wenn $Bb' = Bb$.

§. 33. So wie man nun durch die Methode der correspondierenden Höhen die Lage des Meridians und den Augenblick des Durchgangs eines Sterns durch denselben bestimmen kann, eben so wird man durch Beobachtung gleicher Abweichungen der Sonne, wenn beyde nördlich, oder beyde südlich sind, die Lage des Kolurus der Sonnenwenden, und *den Augenblick* des Durchgangs der Sonne durch denselben

bestim-

bestimmen können. Weil aber die genaue Bestimmung der Abweichung der Sonne Mittagshöhen erfordert; so wird sie bey der zweyten Beobachtung nur sehr selten eine Abweichung haben, welche der zuerst beobachteten gleich ist. Um diese Lücke auszufüllen, beobachte man in der Nähe der zwey Aequinoktialpunkte, wo sich die Abweichung der Sonne am geschwindesten verändert, folglich der Einfluß der Beobachtungsfehler auf die zu bestimmende Größen am kleinsten ist, mehrere Mittagshöhen der Sonne, und die Unterschiede zwischen ihrer geraden Aufsteigung und der eines Sterns, wie im 30. §. gezeigt wurde. Man wird um diese Zeit die tägliche Veränderung ihrer Abweichung sehr nahe der täglichen Veränderung ihrer geraden Aufsteigung proportional finden, und daher die Veränderung ihrer geraden Aufsteigung berechnen können, welche einer gegebenen Veränderung ihrer Abweichung, die nicht größer als die tägliche Veränderung derselben ist, entspricht, wenn man schließt: wie sich verhält die tägliche Veränderung der Abweichung zur vorgegebenen Veränderung derselben, so verhält sich die tägliche Veränderung der geraden Aufsteigung zur gesuchten Veränderung derselben. Wenn also z. B. von den in der Nähe des Herbstpunkts beobachteten Abweichungen die eine größer, die am folgenden Tag genommene aber kleiner gefunden wurde, als die im Frühjahr beobachtete; so wird man berechnen können, um wie viel die der größeren Abweichung zugehörige gerade Aufsteigung der Sonne vergrößert werden müsse, damit die der so vergrößerten geraden Aufsteigung entsprechende Abweichung der im Frühjahr beobachteten gleich werde. Man wird also den Unterschied bb' (Fig. 10.) der geraden Aufsteigungen der Sonne für die zwey Zeitpunkte haben, da sie gleiche Abweichungen $bd, b'd'$ hatte, und $\frac{1}{2}\,bb'$ zu bq addirt wird den Bogen Bq geben, dessen Ergänzung Aq zu 90° die gerade Aufsteigung des bey den Beobachtungen gebrauchten Sterns s seyn wird. Mithin wird die Lage der Solstitial- und Aequinoktialpunkte gegen diesen Stern gegeben seyn.

Man wird ferner finden, daß während eines Zeitraums von einem oder zwey Tagen, die gerade Aufsteigung der

Sonne sich sehr nahe der Zeit proportional verändert. Folglich kann man auf ähnliche Art wie vorhin die Zeiten finden, da die Sonne auf beyden Seiten des Kolurus der Sonnenwenden gleiche und gleichnamige Abweichungen hatte. Aber der Zeitpunkt des Solstitiums wird nur unter der Voraussetzung einer gleichförmigen Bewegung der Sonne in der Ekliptik in die Mitte zwischen die zwey obige Zeitpunkte fallen. Folglich wird man, um diesen Zeitpunkt zu bestimmen, auch um die Zeit des Solstitiums die Unterschiede der geraden Aufsteigung der Sonne und des Sterns beobachten, aus der bekannten geraden Aufsteigung des Sterns die der Sonne für jede dieser Beobachtungen herleiten, und aus der täglichen Veränderung der letztern den Augenblick berechnen müssen, da die gerade Aufsteigung der Sonne = 90° oder = 270° war. Fällt dieser zwischen zwey nur um einen Tag von einander entfernte Beobachtungen; so wird der von der ungleichförmigen Veränderung der geraden Aufsteigung herrührende Fehler unbemerkbar. Eben so findet man den Augenblick der Frühlings- oder Herbstnachtgleiche, wenn man aus den in ihrer Nähe angestellten Beobachtungen den Augenblick sucht, da die gerade Aufsteigung der Sonne = 0 oder = 180° war, welcher am genauesten gefunden wird, wenn das Aequinoktium zwischen zwey nur einen Tag von einander entfernte Beobachtungen fällt.

Die Zeit des Aequinoktiums könnte man auch aus den beobachteten Abweichungen der Sonne unmittelbar finden wenn man den Augenblick suchte, da die Abweichung der Sonne = 0 ist. Aber ein kleiner in der Polhöhe liegender Fehler, mittelst welcher die Abweichungen bestimmt werden müssen, würde einen beträchtlichen Einfluß auf die Zeit des Aequinoktiums haben, welcher bey der vorhergehenden Methode wegfällt.

Wie man aus ungleichen Abweichungen die Lage der Aequinoktialpunkte unmittelbar finden könne, ist schon oben § 31. gezeigt worden.

§. 34. Weil die Schiefe der Ekliptik der grösten nördlichen oder südlichen Abweichung der Sonne gleich ist (§.

32.); ſo iſt der Unterſchied der gröſten oder kleinſten Mittagshöhe der Sonne, (oder das Supplement ihrer Summe, wenn die eine in den ſüdlichen, die andere in den nördlichen Quadranten des Meridians fällt,) der doppelten Schiefe der Ekliptik gleich, vorausgeſetzt, daß die Solſtitien zur Mittagszeit eintreten. Aber wegen der ſehr geringen täglichen Veränderung der Abweichung der Sonne werden zwey Mittagshöhen derſelben, zwiſchen welche der Augenblick des Solſtitiums fällt, nur wenig unter ſich und von der Solſtitialhöhe verſchieden ſeyn: folglich wird man mittelſt dieſer Höhen die Schiefe der Ekliptik wenigſtens beynahe finden. Um ſie genauer zu erhalten, beobachte man zugleich die gerade Aufſteigung der Sonne mittelſt eines Sterns, deſſen gerade Aufſteigung nach dem vorhergehenden §. beſtimmt worden iſt, berechne aus der ſchon nahe gefundenen Schiefe der Ekliptik und dem Abſtand der Sonne von dem Kolur der Solſtitien den Unterſchied zwiſchen der beobachteten Abweichung der Sonne und der Schiefe der Ekliptik, und vergrößere die beyläufig gefundene Schiefe um die halbe Summe der bey den zwey Solſtitien gefundenen Unterſchiede.

Es iſt nemlich $\text{Tang. } \varepsilon : \text{Tang. } \delta = \text{Sin. tot.} : \left\{\begin{matrix}\text{Sin. } \alpha \\ \text{Cos. } (90^\circ - \alpha)\end{matrix}\right\}$; folglich

$$\left.\begin{matrix}\text{Tg. } \varepsilon + \text{Tg. } \delta : \text{Tg. } \varepsilon - \text{Tg. } \delta \\ \text{Sin. } (\varepsilon + \delta) : \text{Sin. } (\varepsilon - \delta)\end{matrix}\right\} = \left\{\begin{matrix}\text{Sin.tot.} + \text{Cos.}(90^\circ - \alpha) : \text{Sin.tot.} - \text{Cos.}(90^\circ - \alpha) \\ \overline{\text{Sin. tot.}}^2 \quad : \quad \text{Tg.}(45^\circ - \tfrac{1}{2}\alpha)^2\end{matrix}\right.$$

Daher in der Nähe des Sommerſolſtitiums

$$\text{Sin. } (\varepsilon - \delta) = \frac{\text{Sin. } (\varepsilon + \delta)\ \overline{\text{Tg. } (45^\circ - \frac{1}{2}\alpha)}^2}{\overline{\text{Sin. tot.}}^2}, \text{ für } \alpha < 90^\circ$$

$$= \text{Sin. } (\varepsilon + \delta)\ \overline{\text{Tang. } (\tfrac{1}{2}\alpha - 45^\circ)}^2, \text{ für } \alpha > 90^\circ$$

und in der Nähe des Winterſolſtitiums, wenn die ſüdliche Abweichung als poſitiv betrachtet wird,

$$\text{Sin. } (\varepsilon - \delta) = \frac{\text{Sin. } (\varepsilon + \delta)\ \overline{\text{Tang. } (90^\circ - \frac{1}{2}\alpha)}^2}{\overline{\text{Sin. tot.}}^2}, \text{ für } \alpha < 180^\circ$$

$$= \frac{\text{Sin. } (\varepsilon + \delta)\ \overline{\text{Tang. } (\frac{1}{2}\alpha - 90^\circ)}^2}{\overline{\text{Sin tot.}}^2}, \text{ für } \alpha > 180^\circ.$$

Man ſieht aus dieſen Ausdrücken, daß bey kleinen Abſtänden von dem Kolur der Solſtitien ein kleiner Fehler in der Schie-

se der Ekliptik keinen merklichen Einfluß auf den Werth von ϵ-δ hat. Hat man einmal die Schiefe der Ekliptik genauer bestimmt; so kann man weiter von dem Solstitium entfernte Mittagshöhen auf die Solstitialhöhe reduciren, und die Anzahl der Beobachtungen vervielfältigen, um ein genaueres Resultat zu erhalten.

§. 35. Eben diese Beobachtungen dienen nun auch zur Bestimmung der Polhöhe und zur ferneren Berichtigung der Refraktionen. Nemlich das arithmetische Mittel zwischen den zwey Solstitialhöhen der Sonne im Sommer und Winter wird der Aequatorshöhe gleich seyn, deren Complement die Polhöhe ist. Sind nun die Refraktionen zu groß; so wird die aus den Solstitialhöhen gefolgerte Aequatorshöhe zu klein, mithin die Polhöhe zu groß gefunden. Die im nördlichen Quadranten des Meridians angestellte Beobachtungen der Circumpolarsterne hingegen werden die Polhöhe zu klein geben, und die Differenz dieser zwey verschiedenen Resultate wird die Summe der zwey in den Polhöhen steckenden Fehler seyn. Da nun die Stralenbrechungen nahe den Cotangenten der scheinbaren Höhen proportional sind; so wird dieses um so genauer bey den kleinen Aenderungen der Refraktionen zutreffen, und man wird die Verbesserungen der zwey Polhöhen haben, wenn man obige Differenz in dem Verhältniß der Summe der Cotangenten der Solstitialhöhen zur Summe der Cotangenten der gröſten und kleinſten Höhe des bey den Beobachtungen gebrauchten Circumpolarsterns theilt. Auf ähnliche Weise wird man verfahren, wenn die Refraktionen zu klein sind.

Wegen der Veränderlichkeit der Refraktionen in kleinen Höhen wird folgende Methode die Refraktionen zu berichtigen sicherer seyn. Um die Zeit der Nachtgleichen beobachte man die Mittagshöhe der Sonne und ihre gerade Aufsteigung. Aus letzterer und der Schiefe der Ekliptik berechne man ihre Abweichung, auf welche ein kleiner in der Schiefe der Ekliptik liegender Fehler keinen merklichen Einfluß haben wird. Man wird also die Aequatorshöhe haben, wenn man die Abweichung der Sonne von ihrer Mittagshöhe abzieht, oder sie dazu addirt, je nachdem die Abweichung nördlich oder südlich ist. Um eben diese Zeit su-

che man die Polhöhe aus der gröſten und kleinſten Höhe des Polarſterns, welche die Aequatorshöhe zu 90° ergänzen muß. Kommt mehr oder weniger heraus; ſo ſind die Refraktionen zu klein oder zu groß, und man vertheilt den Fehler im Verhältniß der Cotangente der ſcheinbaren Mittagshöhe der Sonne zur halben Summe der Cotangenten der gröſten und kleinſten ſcheinbaren Höhe des Polarſterns, um die Verbeſſerungen der beobachteten Aequatorshöhe und Polhöhe zu erhalten. Hat ſich die Dichtigkeit der Luft während der Beobachtungen geändert; ſo bringt man die daher rührende Aenderung der Refraktionen in Rechnung, wie §. 23. gezeigt wurde.

§. 36. Man bedient ſich der Ekliptik auf eine ähnliche Art wie des Aequators, um die Lage der Himmelskörper gegen einander anzugeben. Der Abſtand *SL* (Fig. 11.) eines Sterns *S* von der Ekliptik *D'AB*, welcher durch den Bogen *SL* eines gröſten Kreiſes gemeſſen wird, der auf der Ekliptik ſenkrecht iſt, und folglich durch den Pol *E* der Ekliptik geht, heißt die Breite des Sterns, welche nördlich oder ſüdlich iſt, je nachdem der Stern von der Ekliptik gegen ihren Nordpol oder Südpol hin abſteht. Der Bogen *AL* der Ekliptik zwiſchen dem Punkt *A* der Frühlings-Nachtgleiche und dem Punkt *L*, wo der durch den Stern gelegte Breitenkreis *ESLe* die Ekliptik ſchneidet, heißt die Länge des Sterns, welche man von *A* an nach der Richtung der jährlichen Bewegung der Sonne zählt. Eben ſo nennt man auch, wenn die Sonne in *L* ſteht, den Bogen *AL* der Ekliptik zwiſchen der Sonne und dem Frühlingspunkt die Länge der Sonne. Mithin beſtimmen Länge *AL* und Breite *SL* die Lage eines Sterns eben ſo gegen die Ekliptik, wie gerade Aufſteigung *AR* und Abweichung *RS* gegen den Aequator *B'AB*. Letztere können bequemer unmittelbar beobachtet werden als die erſteren, und man berechnet die Länge und Breite aus der beobachteten geraden Aufſteigung und Abweichung. Wenn nemlich von den fünf Stücken: Länge, Breite, gerade Aufſteigung, Abweichung

und Schiefe der Ekliptik drey gegeben sind; so lehrt die sphärische Trigonometrie die übrigen berechnen.

Es seyen die gerade Aufsteigung $AR = \alpha$, und $< 90°$, die nördliche Abweichung $= RS = \delta$, die Länge $AL = \lambda$, die nördliche Breite $LS = \beta$, und die Schiefe BAD der Ekliptik $= \varepsilon$; so verhält sich, wenn man durch A und S den Bogen AS eines größten Kreises legt, und $RAS = x$, $LAS = y$ setzt,

Sin. AR : Sin. tot. = Tang. RS : Tang. RAS

woraus man erhält:

1) $$\text{Tang. } x = \frac{\text{Tang. } \delta \text{ Sin. tot.}}{\text{Sin. } \alpha}$$

Mithin hat man $LAS = x - \varepsilon$.

Sodenn ist Sin. SL : Sin. SAL = Sin. AS : Sin. tot.
= Sin. RS : Sin. RAS;

also 2) $$\text{Sin. } \beta = \frac{\text{Sin. } \delta \text{ Sin. } (x - \varepsilon)}{\text{Sin. } x}$$

und weil Tang. AS : Tang. AL = Sin. tot. : Cos. SAL
Tang. AR : Tang. AS = Cos. RAS : Sin. tot.

so ist Tang. AR : Tang. AL = Cos. RAS : Cos. SAL;

daher 3) $$\text{Tang. } \lambda = \frac{\text{Tang. } \alpha \text{ Cos. } (x - \varepsilon)}{\text{Cos. } x}$$

Ferner ist Sin. AL : Sin. tot. = Tang. SL : Tang. SAL;

mithin 4) $$\text{Tang. } y = \frac{\text{Tang. } \beta \text{ Sin. tot.}}{\text{Sin. } \lambda},$$

und hieraus $RAS = \varepsilon + y$.

Mithin ist wie oben

5.) $$\text{Sin. } \delta = \frac{\text{Sin. } \beta \text{ Sin. } (\varepsilon + y)}{\text{Sin. } y}$$

und 6.) $$\text{Tg. } \alpha = \frac{\text{Tg. } \lambda \text{ Cos. } (\varepsilon + y)}{\text{Cos. } y}$$

Für einen Stern O in der Ekliptik oder auch für die Sonne hat man in dem rechtwinklichten Dreyeck ARO:

Tang. AO : Tang. AR = Sin. tot. : Cos. RAO
Sin. AO : Sin. OR = Sin. tot. : Sin. RAO
Sin. AR : Sin. tot. = Tg. OR : Tg. RAO

folglich ist 7.) $$\text{Tang. } \lambda = \frac{\text{Tg. } \alpha \text{ Sin. tot.}}{\text{Cos. } \varepsilon}$$

8.) $$\text{Sin. } \lambda = \frac{\text{Sin. } \delta \text{ Sin. tot.}}{\text{Sin. } \varepsilon}$$

9.) $$\text{Tang. } \delta = \frac{\text{Sin. } \alpha \text{ Tg. } \varepsilon}{\text{Sin. tot.}}$$

mittelst welcher Gleichungen man, wenn von den vier Größen $\lambda, \alpha, \delta, \varepsilon$ zwey gegeben sind, die übrigen finden kann.

Um nun aus der geraden Aufsteigung α, Abweichung δ und

der Schiefe der Ekliptik ε die Länge λ und Breite β zu finden, ſuche man zuerſt den Hülfswinkel x mit der Formel n. 1., indem man δ für eine ſüdliche Abweichung negativ ſetzt, und nehme x negativ, wenn Tg. x negativ wird. Nach n. 2. berechnet man Sin. β, und nimmt immer den ihm zugehörigen ſpitzen Winkel; ſo hat man die Breite, welche nördlich oder ſüdlich iſt, je nachdem Sin. β poſitiv oder negativ iſt. Nach n. 3. berechnet man Tg. λ. Der ſpitze Winkel, welcher dieſer Tangente ohne Rückſicht auf ihr Zeichen in den Tafeln entſpricht, heiße λ′; ſo iſt, wenn in dem Ausdruck der Tangente der Länge

Zähler und Nenner poſitiv ſind, λ = λ′;
Zähler poſitiv und Nenner negativ, λ = 180° — λ′;
— negativ — — negativ, λ = 180° + λ′;
— negativ — — poſitiv, λ = 360° — λ′,

wie man leicht findet, wenn man für die übrigen Fälle die Figur conſtruirt.

Sucht man aus der Länge λ, Breite β, und Schiefe der Ekliptik ε, die gerade Aufſteigung α, und Abweichung δ; ſo berechnet man zuerſt den Hülfswinkel γ nach n. 4, indem man β bey ſüdlicher Breite negativ ſetzt, und γ negativ nimmt, wenn ſeine Tangente negativ wird. Aus n. 5. ergiebt ſich ſodenn Sin. δ, wo δ negativ oder ſüdlich iſt, wenn Sin. δ negativ iſt, und mittelſt n. 6. erhält man Tg. α. Es ſey α′ der ſpitze Winkel, welcher der Tangente der geraden Aufſteigung ohne Rückſicht auf ihr Zeichen in den Tafeln entſpricht; ſo iſt, wenn in ihrem Ausdruck

Zähler und Nenner poſitiv ſind, α = α′;
Zähler poſitiv und Nenner negativ, α = 180° — α′;
— negativ — — negativ, α = 180° + α′;
— negativ — — poſitiv, α = 360° — α′.

Steht der Stern in der Ekliptik; ſo ſind immer λ und α von einerley Art. und die Abweichung δ wird negativ, wenn λ oder α > 180° iſt.

§. 37. Die neueren Beobachtungen geben die Länge der Fixſterne durchgehends größer als die ältern. Schon Hipparch bemerkte dieſe Zunahme der Länge der Fixſterne, als er ſeine 130 Jahr vor Chriſti Geburt angeſtellte Beobachtungen mit den 160 Jahre früheren des Timocharis verglich. Claudius Ptolemäus, welcher zwiſchen den Jahren 125 und 141 der chriſtlichen Zeitrechnung zu Alexandria in Aegypten beobachtete, ſetzte der Vergleichung ſeiner Beobachtungen mit den ältern zu Folge die Zunahme der Länge der Fixſterne in hundert Jahren auf einen Grad, und weil er wa

der eine Veränderung in der gegenseitigen Lage der Fixsterne noch eine Veränderung ihrer Breite bemerkte; so schloß er daraus, daß sich die Sphäre der Fixsterne um die Pole der Ekliptik von Abend gegen Morgen in Beziehung auf die Aequinoktialpunkte drehe. Man nennt diese Zunahme der Länge der Fixsterne die Präcession, und sie beträgt nach den neueren Beobachtungen jährlich 50,1 Sekunden; folglich in hundert Jahren $1°\,23'\,30''$, und in $71\frac{4}{5}$ Jahren einen Grad. Man kann übrigens eben so gut annehmen, daß die Aequinoktialpunkte in der Ekliptik jährlich um 50,1 Sekunden nach einer der Richtung der jährlichen Bewegung der Sonne entgegengesetzten Richtung zurückweichen, und es wird erst in der Folge können ausgemacht werden, welche von beyden Bewegungen wirklich Statt findet. Da es für die sphärische Astronomie gleichgültig ist, welches von beyden man annimmt; so wird in der Folge ein Zurückweichen der Aequinoktialpunkte in der Ekliptik vorausgesetzt werden.

§. 38. Man theilte die Ekliptik von dem Punkt der Frühlingsnachtgleiche an in 12 gleiche Theile ein, die man Zeichen (Signa) nannte, und jedes dieser Zeichen in 30 Grade, daß also auf den ganzen Umfang wieder 360 Grade kommen. Diese Zeichen bekamen nach den Sternbildern, welchen sie ehmals entsprachen, der Ordnung nach vom Frühlingspunkt an gerechnet, folgende Benennungen:

1.	Der Widder,	♈	7.	Die Wage,	♎
2.	Der Stier,	♉	8.	Der Scorpion,	♏
3.	Die Zwillinge,	♊	9.	Der Schüze,	♐
4.	Der Krebs,	♋	10.	Der Steinbok,	♑
5.	Der Löwe,	♌	11.	Der Wassermann,	♒
6.	Die Jungfrau,	♍	12.	Die Fische,	♓

Schon zu den Zeiten des Ptolemäus entsprachen die Zeichen nicht mehr ganz den Sternbildern, von welchen sie ihre Namen erhielten, und gegenwärtig sind die Aequinoktialpunkte um ein ganzes Zeichen verschoben; so daß das Zeichen des Widders in dem Sternbild der Fische, das Zeichen der Wage in dem Sternbild der Jungfrau sich befin-

den. Man hat die alten Benennungen beybehalten, und man muß daher Zeichen und Sternbild unterſcheiden; folglich einen Stern, welcher in einem gewiſſen Zeichen ſteht, immer in dem nächſtvorhergehenden Sternbild aufſuchen.

Dieſen Eintheilungen der Ekliptik zu Folge giebt man die Länge eines Sterns auf folgende Art an. Man benennt das Zeichen in welchem er ſteht, und bemerkt noch die Anzahl Grade und deren Unterabtheilungen von dem Anfang dieſes Zeichens an gerechnet, bis zu dem Punkt der Ekliptik, wo der durch den Stern gelegte Breitenkreis ihn trift. Iſt z. B. die Länge eines Sterns $30° 25' = 30° + 6° + 25'$; ſo iſt ſeine Länge $0° 25'$ im Stier, u. ſ. w. Gewöhnlich aber giebt man die Länge dadurch an, daß man die vollen Zeichen, welche auf die Länge gehen, und die noch darüber gehenden Grade und deren Unterabtheilungen zählt.

				Zeichen			
z. B.	25°	13'	20''	= 0	25°	13'	20''
	39	15	16	= 1	9	15	16
	183	23	19	= 6	3	23	19

Das Winterſolſtitium tritt alſo ein, wenn die Sonne in das Zeichen des Steinboks übergeht, und ihre Länge = 9 Zeichen iſt. Von dieſem Punkt an nähert ſie ſich dem Nordpol des Aequators, ihre Mittagshöhe wächst, und die Tage werden länger, bis ſie in das Zeichen des Krebſes tritt. Man nennt daher die Zeichen Steinbock, Waſſermann u. ſ. w. bis zu den Zwillingen inclusive aufſteigende, die übrige niederſteigende Zeichen. Die Parallelkreiſe des Aequators, welche durch die Anfangspunkte des Krebſes und des Steinbocks oder durch die Solſtitialpunkte gezogen werden, heißen Wendekreiſe, jener der Wendekreis des Krebſes (tropicus cancri) dieſer der Wendekreis des Steinbocks (tropicus capricorni). Der Abſtand der Wendekreiſe iſt folglich der doppelten Schiefe der Ekliptik gleich.

§. 39. Auch die Schiefe der Ekliptik iſt einer, wie wohl beynahe hundertmal langſamern, Veränderung, als die der Lage der *Aequinoktialpunkte* unterworfen. Ptolemäus

fand den Abstand der Wendekreise von einander = 47° 40' 45", und bemerkte dabey, dieser Abstand sey nahe derselbe, welchen Eratosthenes (geb. im Jahr 276. vor C. G.) gefunden und Hipparch beybehalten habe *). Demnach war die Schiefe der Ekliptik = 23° 50' 22". Im Anfang des Jahrs 1800 war sie = 23° 27' 57", also um 22' 24" kleiner, und so geben alle neuere Beobachtungen die Schiefe der Ekliptik kleiner als die älteren, wenn man sie so weit von einander entfernt nimmt, daß ihre Veränderung in der Zwischenzeit größer ist, als die Fehler der Beobachtungen, wie man aus folgender Tafel sieht.

		Schiefe der Ekliptik.		
Tcheou-Kong,	1100 Jahr v. C. Geb.	23°	54'	2"
Pytheas,	350 J. v. C. Geb.	23	49	20
Ebn-Junis,	im Jahr 1000 n. C. G.	23	36	36
Cocheou-King,	1280.	23	33	30
Ulug-Beigh,	1437.	23	31	48
Delambre,	1. Jan. 1800.	23	27	57
Maskelyne	— —	23	27	56,6
Piazzi	— —	23	27	56,3

In gegenwärtigem Jahrhundert beträgt nach den neuesten Beobachtungen und Berechnungen die jährliche Abnahme der Schiefe der Ekliptik 0,521 Sekunden.

Wegen des Zurückweichens der Aequinoktialpunkte und der Veränderung der Schiefe der Ekliptik verändern sich sowohl die gerade Aufsteigung als auch die Abweichung der Fixsterne. Die Verzeichnisse, welche die Angaben der geraden Aufsteigung und Abweichung der Fixsterne enthalten, gelten also nur für die Epoche der Beobachtungen, durch welche man dieselbige bestimmt hat. Aber man kann sie auf folgende Art auf einen andern vorgegebenen Zeitpunkt reduciren. Aus der geraden Aufsteigung und Abweichung suche man mittelst derjenigen Schiefe der Ekliptik, welche der Epoche des Fixsternverzeichnisses entspricht, nach §. 36. die Länge und Breite, vergrößere oder vermindere die Länge um die der Zwischenzeit zwischen der Epoche und dem vorgegebenen Zeitpunkt zugehörige Bewegung der Aequinok-

*) Eratosthenes setzt das Verhältniß des Abstands der Wendekreise zum Umfang des Meridians dem von 11 : 83 gleich, woraus die Schiefe der Ekliptik = 23° 51' 19",5 folgt.

ſtalpunkte, je nachdem die Epoche vor oder nach dem gegebenen Zeitpunkt fällt. Aus der unverändert beybehaltenen Breite und der veränderten Länge ſuche man ſodenn mittelſt derjenigen Schiefe der Ekliptik, welche dem gegebenen Zeitpunkt entſpricht, nach §. 36. die gerade Aufſteigung und Abweichung, welche das verlangte ſeyn werden. Man hat auch allgemeine Formeln zur Berechnung der Veränderung der geraden Aufſteigung und Abweichung ſelbſt, welchen aber die obige Berechnungsart vorzuziehen ſeyn möchte, wenn dieſe Veränderungen beträchtlich ſind. Zu mehrerer Bequemlichkeit hat man den Fixſternverzeichniſſen die jährliche Veränderung der geraden Aufſteigungen und Abweichungen beygefügt, mittelſt deren man die Angaben des Verzeichniſſes auf einen andern nicht zu weit entfernten Zeitpunkt reduciren kann.

Wie beträchtlich die Veränderung der Lage der Fixſterne gegen den Aequator werden könne, mag folgendes Beyſpiel zeigen. Im Anfang des Jahrs 1800 war die gerade Aufſteigung des Polarſterns = 13° 17′ 10″, und die Abweichung = 88° 14′ 25″,4, woraus man für dieſen Zeitpunkt mit der Schiefe der Ekliptik 23° 27′ 57″ erhält die Länge des Polarſterns = 85° 46′ 28″,4 die Breite = 66° 4′ 18″,8, und folglich ſeinen Abſtand vom Pol der Ekliptik = 23° 55′ 41″,2. Nimmt ſeine Länge um 4° 13′ 31″,6 zu, welches eine Zeit von 303,6 Jahren erfordert, wenn man 50,1 Sekunden auf ein Jahr rechnet; ſo fällt ſein Breitenkreis mit dem Kolurus der Sonnenwenden zuſammen, und ſein Abſtand vom Pol des Aequators wird am kleinſten und dem Ueberſchuß ſeines Abſtands vom Pol der Ekliptik über die alsdenn Statt findende Schiefe der Ekliptik gleich ſeyn, welche um 303,6 . 0,52 1 oder 158 Sek. kleiner, folglich = 23° 25′ 19″ ſeyn wird. Hienach würde im Jahr 2103 der Abſtand des Polarſterns vom Pol des Aequators nur noch 30′ 22″ ſeyn. Zur Zeit des Ptolemäus betrug dieſer Abſtand gegen 12 Grade, und der Stern verdiente die Benennung Polarſtern noch nicht.

§. 40. *Die Zeit von einer* Frühlingsnachtgleiche bis

zu der nächstfolgenden Herbstnachtgleiche wird man um mehr als sieben Tage größer finden, als die Zeit von der letztern bis wiederum zur erstern. Die Sonne durchlauft also die Ekliptik mit einer ungleichförmigen Winkelgeschwindigkeit, und wenn sie um die Erde einen Kreis mit gleichförmiger Geschwindigkeit beschreibt; so kann die Erde nicht in dem Mittelpunkt dieses Kreises seyn, und der durch den Mittelpunkt der Erde gezogene Durchmesser desselben wird die Bahn der Sonne in zwey Halbzirkel theilen, welche in gleichen Zeiten durchloffen werden. Man findet wirklich die Zwischenzeiten zwischen den Solstitien nur um ungefähr $\frac{1}{4}$ Tag voneinander verschieden, so daß jener Durchmesser nahe durch die Solstitialpunkte durchgehen muß. Durch Vergleichung einer Reihe von Beobachtungen der Sonne während eines Jahrs findet man, daß sie den Bogen von dem Punkt der Länge $3^{\mathfrak{z}}\,9^{\circ}\,\frac{1}{2}$ bis zu dem $9^{\mathfrak{z}}\,9^{\circ}\,\frac{1}{2}$ in derselben Zeit durchlauft, in welcher sie von dem letzteren Punkt bis wiederum zu dem ersten zurükkommt. An dem letzteren dieser Punkte durchlauft sie in einem Tag $1^{\circ}\,1'\,10'',3$, ihr scheinbarer Durchmesser ist am größten, und beträgt $32'\,35'',66$; folglich ist sie in diesem Punkt der Erde am nächsten. Er heißt die Erdnähe (Perigæum). Von der Erdnähe an nimmt die Winkelgeschwindigkeit der Sonne und ihr scheinbarer Durchmesser ab, bis sie zu dem gegenüberliegenden Punkt ihrer Bahn kommt, wo sie in einem Tag $57'\,11'',4$ durchlauft, ihr scheinbarer Durchmesser $= 31'\,30'',93$, und mit der Winkelgeschwindigkeit am kleinsten wird. Dieser Punkt entspricht also der größten Entfernung der Sonne von der Erde, und heißt die Erdferne (Apogæum). Erdnähe und Erdferne haben den gemeinschaftlichen Namen Apsiden (Apsides, Auges), und der sie verbindende Durchmesser der Sonnenbahn heißt die Apsidenlinie (Linea apsidum). Von der Erdferne an nehmen die Winkelgeschwindigkeit und der Durchmesser der Sonne wieder eben so ab, wie sie vorher zugenommen hatten, so daß die Sonne auf beyden Seiten der Apsidenlinie in gleichen Abständen von derselben gleiche Winkelgeschwindigkeiten und gleiche scheinbare Durchmesser hat. Demnach theilt die Absidenlinie die Bahn der

Sonne um die Erde in zwey gleiche und ähnliche Theile, welche von ihr in gleichen Zeichen beſchrieben werden. Man ſieht, daß durch eine excentriſche Kreisbewegung die veränderliche Geſchwindigkeit und die verſchiedene ſcheinbare Größe der Sonne im Allgemeinen dargeſtellt werden, und es wird in der Folge unterſucht werden, wie weit dieſe Vorausſetzung richtig iſt.

§. 41. Wegen der ungleichförmigen Bewegung der Sonne in der Ekliptik, und der ſchiefen Lage der letzteren gegen den Aequator können die Zeiten von einem Mittag bis zu dem nächſtfolgenden, oder die aſtronomiſchen Tage nicht unter ſich gleich ſeyn. Es gehe nemlich zu einer gewißen Zeit die Sonne mit einem Fixſtern zugleich durch den Meridian; ſo wird ſie bis zu dem nächſtfolgenden Mittag in der Ekliptik *NMB* (Fig. 12.) um den Bogen *NM* gegen Morgen fortgerückt ſeyn, welcher zwiſchen dem durch den Stern *s* gelegten Abweichungskreis *PsNq* und dem Meridian *PMAp* enthalten iſt, und der aſtronomiſche Tag wird größer ſeyn, als die tägliche Umlaufszeit eines Fixſterns oder als ein Sterntag, um die Zeit, welche der Bogen *qA* des Aequators *DAB* gebrauchte, ſich durch den Meridian durchzuſchieben.

Man denke ſich eine zweyte Sonne, welche die Ekliptik in derſelben Zeit mit gleichförmiger Geſchwindigkeit durchlaufe, in welcher die wahre Sonne einmal in der Ekliptik herumkommt, und mit letzterer zugleich durch den Punkt der Erdnähe, mithin auch (§. 40.) durch den Punkt der Erdferne gehe; ſo wird man dadurch die von der ungleichförmigen Bewegung der Sonne abhängende Ungleichheit der Tage verſchwinden machen, aber es wird noch die von der ſchiefen Lage der Ekliptik gegen den Aequator abhängende Ungleichheit übrig bleiben. Denn nimmt man zwey gleiche Bogen *NM*, *mB* der Ekliptik, den erſten von einem Solſtitialpunkt, den letzteren von einem Aequinoktialpunkt an, und legt durch ihre Endpunkte die Abweichungskreiſe *PNq*, *PMA*, *Pma*, *PB*; ſo wird der Bogen *Aq* des Aequators, welcher dem in der Nähe des Solſtitiums liegenden Bogen

NM der Ekliptik entspricht, gröſſer als *NM*, der dem Aequinoktialpunkt *B* aber anliegende Bogen *Ba* kleiner als *Bm* oder *NM* seyn, weil der Bogen *NM* nahe mit einem Wendekreis zusammenfällt, dessen Halbmesser in dem Verhältniß des Cosinus der Schiefe der Ekliptik zum Sinus totus kleiner ist als der Halbmesser des Aequators, und der Bogen *mB* die Hypotenuse eines rechtwinklichten Dreyecks *Bma* ist, welche wiederum in dem Verhältniß des Sinus totus zum Cosinus des Winkels *mBa* oder der Schiefe der Ekliptik gröſser ist als der Bogen *Ba*. Um auch diese Ungleichheit verschwinden zu machen, lasse man die Bahn der sich gleichförmig bewegenden erdichteten Sonne mit dem Aequator zusammenfallen; so wird ihre gerade Aufsteigung gleichförmig wachsen, und die Zwischenzeiten zwischen zwey aufeinander folgenden Durchgängen dieser erdichteten Sonne durch den Meridian werden gleich groß seyn. Man nennt die Zeit, welche diese erdichtete Sonne zeigen würde, die mittlere Zeit, und diejenige, welche die Sonne wirklich zeigt, die wahre Zeit. Der Unterschied zwichen beyden heißt die Zeitgleichung, welche hienach gefunden wird, wenn man den Unterschied zwischen der wahren geraden Aufsteigung der Sonne und der geraden Aufsteigung der erdichteten Sonne in Zeit verwandelt, indem man 15° auf eine Stunde rechnet. Die astronomischen Kalender geben unter der Aufschrift mittlere Zeit im wahren Mittag an, was eine gleichförmig nach mittlerer Zeit gehende Uhr zeigen muß, wenn die Sonne durch den Meridian geht. Man bedient sich in der Astronomie dieser mittleren Zeit bey der Untersuchung der Bewegung der Himmelskörper, und sie dient eben so gut wie die Sternzeit zur Prüfung des gleichförmigen Gangs der Uhren.

§. 42. Zur Messung gröſserer Zeiträume gebraucht man die Umlaufszeit der Sonne in der Ekliptik in Beziehung auf die Aequinoktialpunkte, oder ihre tropische Umlaufszeit, welche der Zwischenzeit zwischen zwey aufeinander folgenden gleichnamigen Nachtgleichen gleich ist. Um sie *genauer zu bestimmen*, nimmt man zwey weit von einander

entfernte Nachtgleichen, und dividirt die ganze Zwiſchenzeit mit der Anzahl der Umläufe. Auf dieſem Weg fand man die tropiſche Umlaufszeit der Sonne = 365 Tagen, 5 St. 48 Min. 51,6 Sekunden. Wegen des Zurückweichens der Aequinoktialpunkte iſt ſie um 20 Min. 19,88 Sek. kleiner als die Zeit, welche die Sonne gebraucht, um wieder zu demſelben Fixſtern zu kommen, und die ſideriſche Umlaufszeit heißt. Das Vorrücken der Nachtgleichen iſt eigentlich die Zeit, um welche die Sonne früher wieder zu den Aequinoktialpunkten, als zu demſelben Fixſtern kommt. Man verſteht aber auch zuweilen darunter das Zurückweichen der Aequinoktialpunkte ſelbſt, in ſo fern es die Länge der Fixſterne vergrößert.

Weil von der tropiſchen Umlaufszeit der Sonne die Jahrszeiten abhängen; ſo bedient man ſich derſelben in der Zeitrechnung unter dem Namen eines Jahrs, welches demnach in runder Zahl 365 Tage enthält. Rechnete man nun das bürgerliche Jahr durchgehends zu 365 Tagen, ſo würde der Anfang des Jahrs beſtändig um 5 St. 48 M. 51,6 Sek. zu frühe geſetzt, und er würde nach und nach in einer Periode von 1508 Jahren alle Jahrszeiten rückwärts durchlaufen. Man ſchaltet daher alle 4 Jahre einen Tag ein, wodurch das bürgerliche Jahr auf $365\frac{1}{4}$ Tage geſetzt wird. Nun rechnet man aber mit jedem Jahr 11 Min. 8,4 Sek. zu viel, welches man dadurch wieder ausgleicht, daß man an dem Ende dreyer aufeinander folgender Jahrhunderte das Einſchalten eines Tags unterläßt, und erſt an dem Ende des vierten Jahrhunderts wieder einen Schalttag ſetzt, wodurch das Jahr auf $365\frac{1}{4} - \frac{3}{400}$ oder $365\frac{97}{400}$ Tage, d. i. auf 365 Tag 5 St. 49 Min. 12 Sek. gebracht wird. Den Ueberſchuß 20,4 Sek. dieſes Jahrs über das tropiſche kann man wiederum ausgleichen, indem man alle viertauſend Jahre einen Schalttag unterdrückt, ſo daß auf viertauſend Jahre 969 Schalttage kommen, und das Jahr = $365\frac{969}{4000}$ Tagen = 365 T. 5 St. 48 M. 50,4 Sek. wird. Nach der bey den Perſern im eilften Jahrhundert eingeführten Einſchaltungsmethode wird ſiebenmal nach einander alle vier Jahr und das achtemal nach fünf Jahren ein Tag eingeſchaltet;

folglich kommen auf 33 Jahre 8 Schalttage, und das persische Jahr enthält $365\frac{8}{33}$ Tage, oder 365 T. 5 St. 49 Min. $5\frac{5}{11}$ Sek.

§. 43. Der bürgerliche Tag ist die Zeit von einer Mitternacht bis zu der nächstfolgenden, welchen man in 24 Stunden eintheilt, ohne 24 Stunden in einem fort zu zählen. Man zählt 12 Stunden von Mitternacht bis Mittag, und von da an 12 Stunden bis Mitternacht. Der astronomische Tag ist die Zeit von einem Mittag bis zu dem nächstfolgenden, welche ebenfalls in 24 Stunden eingetheilt wird. Man zählt die Stunden von Mittag an bis auf 24 in einem fort, und daher stimmt die astronomische Zeitangabe mit der bürgerlichen in den Nachmittagsstunden überein, zu den bürgerlichen Vormittagsstunden aber muß man 12 Stunden addiren, und dagegen einen Tag weniger zählen, um bürgerliche Zeit in astronomische zu verwandeln. Zum Beyspiel: 23. Sept. 5 Uhr 3 Min. Vormittags ist nach der bey den Astronomen gewöhnlichen Zeitangabe 22. Sept. 17 Uhr 3 Min. Jedoch ist in den neuesten astronomischen Tafeln *) die bürgerliche Art die Stunden zu zählen angenommen worden, welche übrigens wegen der Unterscheidung der Vor- und Nachmittagsstunden zu astronomischen Rechnungen weniger bequem zu seyn scheint, als diejenige, welcher sich bisher die Astronomen bedient haben.

Der Sterntag wird ebenfalls in 24 Stunden, die Stunde in 60 Minuten u. s. w. eingetheilt. Man bedient sich der Sternzeit bey der Bestimmung der geraden Aufsteigung der Himmelskörper, und stellt deßwegen die nach Sternzeit gehenden Uhren so, daß sie 0 St. oder 24 St. zeigen, wenn der Punkt der Frühlingsnachtgleiche durch den Meridian geht. Im Augenblick des Durchgangs eines Sterns durch den Meridian wird also die Sternuhr unmittelbar die gerade Aufsteigung des Sterns in Zeit angeben, welche man in Grade verwandelt, indem man auf 1 Stunde 15 Grade,

auf

*) Tables astronomiques publiées par le bureau des longitudes de *France*. A Paris 1806.

auf 1 Minute 15 Minuten im Bogen, u. ſ. w. rechnet. Mithin wird man die Uhr nach Sternzeit richten können, wenn man die gerade Aufſteigung eines Fixſterns nach §. 33. beſtimmt hat. Sie wird nemlich im Augenblick ſeines Durchgangs durch den Meridian ſeine in Zeit verwandelte gerade Aufſteigung angeben müſſen, und wenn die Uhr mehr oder weniger zeigt; ſo wird durch dieſe Beobachtung die Voreilung der Uhr oder ihr Zurückbleiben in Beziehung auf Sternzeit gegeben ſeyn. Statt eines Fixſterns wird man auch einen andern Himmelskörper, z. B. die Sonne, gebrauchen können, wenn man ſeine gerade Aufſteigung für den Augenblick ſeines Durchgangs durch den Meridian mittelſt der bekannten Geſetze ſeiner Bewegung anzugeben im Stande iſt.

§. 44. Aus der bekannten Länge des tropiſchen Jahrs ergiebt ſich leicht die Vergleichung mittlerer Sonnenzeit und Sternzeit. Nach Verfluß eines Jahrs wird nemlich ein Fixſtern einen vollen Umlauf mehr gemacht haben, als die Sonne, und wenn man das Jahr $= 365\frac{1}{4}$ Tagen ſetzt; ſo wird ein Fixſtern $366\frac{1}{4}$ Umläufe gemacht haben, wenn die Sonne $365\frac{1}{4}$ Umläufe gemacht hat. Mithin wird ſich verhalten

Sonnentag : Sterntag $= 366\frac{1}{4} : 365\frac{1}{4}$

Sonnentag — Sterntag : Sterntag $= 1 : 365\frac{1}{4}$

oder in Sekunden $= \frac{86400}{365\frac{1}{4}} : 86400,$

weil auf einen Tag 24. 60. 60 oder 86400 Sekunden gehen.

Eben ſo wird man haben

Sonnentag — Sterntag : Sonnentag $= 1 : 366\frac{1}{4}$

$= \frac{86400}{366\frac{1}{4}} : 86400.$

Gebraucht man bey dieſer Berechnung die obige genaue Angabe des tropiſchen Jahrs (§. 42.); ſo findet man nach der erſten der oben angegebenen Proportionen den Ueberſchuß eines Sonnentags über einen Sterntag $= 236,555$ Sek. Sternzeit.

Aus der zweyten Proportion ergiebt ſich der Ueberſchuß

eines Sonnentags über einen Sterntag = 235,909 Sek. mittl. Sonnenzeit. Demnach ist ein mittlerer Sonnentag = 24 St. 3 Min. 56,555 Sek. Sternzeit, und die erdichtete sich gleichförmig in dem Aequator bewegende Sonne, welche die mittlere Zeit zeigt (§. 41.), kommt mit jedem Tag nach einer auf Sternzeit gestellten Uhr um 3′ 56″,555 später in den Meridian.

Ein Sterntag aber beträgt 24 St. — (3′ 55,909″) oder 23 St. 56 M. 4,091 Sek. mittlerer Sonnenzeit, und die Fixsterne kommen mit jedem Tag nach einer die mittlere Zeit zeigenden Uhr um 3′ 55″,909 früher in den Meridian. Diese tägliche Voreilung der Fixsterne dient also zur Prüfung des Gangs einer auf mittlere Zeit gestellten Uhr.

Noch findet wegen des Zurückweichens der Aequinoktialpunkte ein kleiner Unterschied zwischen eigentlicher Sternzeit und der vorhin betrachteten Statt, welche der Punkt der Frühlingsnachtgleiche zeigt. Man setze bey der oben gezeigten Berechnung statt des tropischen Jahrs das siderische; so findet man den Ueberschuß eines mittleren Sonnentags über einen Sterntag = 3′ 56″,546 Sternzeit = 3′ 55″,900 mittlerer Sonnenzeit, und der eigentliche Sterntag beträgt 23 St. 56 Min. 4,1 Sek. mittlerer Sonnenzeit. Wegen des oben gezeigten Gebrauchs der Uhren zur Bestimmung der geraden Aufsteigung der Sterne bedient man sich in der praktischen Astronomie derjenigen Zeit, welche der Frühlingspunkt zeigt, und bringt die Veränderung der geraden Aufsteigung der Sterne in Rechnung.

§. 45. Wegen der kugelförmigen Gestalt der Erde können zwey Orte, von welchen der eine östlicher liegt als der andere, nicht in einerley Augenblick Mittag haben. Die Vergleichung der an verschiedenen Orten angestellten Beobachtungen erfordert also die Kenntniß ihrer gegenseitigen Lage. Um diese zu bestimmen, denke man sich den Mittelpunkt C (Fig. 13.) der Erde *ampqp′* in dem Mittelpunkt der Himmelskugel *AMPQP*. Die Axe *PP* der letztern wird der Oberfläche der Erde in den Punkten *p*, *p′* begegnen, *welche die Erdpole* heißen, und das innerhalb der Erde

fallende Stück *pp'* der Weltaxe wird die Erdaxe seyn. Die Durchschnittslinie der Ebene des Aequators *ABQ* der Himmelskugel mit der Erdoberfläche wird den Aequator *abq* der Erde bilden, welcher sie in die nördliche und südliche Halbkugel theilt. Man ziehe den Halbmesser *Cm* an einen beliebigen Ort *m* der Erde; so wird seine Verlängerung das Zenith *M* dieses Orts treffen, und ein durch den Pol *P* der Himmelskugel und das Zenith gelegter gröster Kreis wird sein Meridian seyn (§. 3.), dessen Ebene die Erdoberfläche in dem Meridian *pmap'* der Erde schneiden wird. Der Abstand des Orts *m* vom Erdäquator wird durch den Bogen *am* dieses Meridians gemessen, welcher die geographische Breite heißt. Man ziehe in der Ebene dieses Erdmeridians eine gerade Linie *mt* auf den Halbmesser *Cm* senkrecht; so ist diese als eine in der Ebene des Meridians liegende Horizontallinie die Mittagslinie des Orts *m* (§. 2.), und, wenn man *mP* zieht, der Winkel *tmP* die Polhöhe desselben. Nun ist sowohl $aCm+mCt$, als $Ctm+mCt=90°$; folglich $aCm = Ctm = tmP+mPt$ (I, 32.) Aber wegen der in Vergleichung mit dem Halbmesser der Erde sehr großen Entfernung der Fixsterne ist der Winkel *mPt* unmerklich (§. 25.) Mithin ist die geographische Breite *aCm* der Polhöhe *tmP* gleich.

Es sey *n* ein anderer Ort der Erde, *N* sein Zenith, *PNBP'* sein Meridian und *pnbp'* der correspondierende Erdmeridian, so wird *bn* die geographische Breite oder Polhöhe desselben seyn. Die Lage dieses Orts gegen den ersteren wird gegeben seyn, wenn man die Polhöhen *am*, *bn* derselben, und den Winkel *apb* kennt, unter welchem die durch sie gelegten Erdmeridiane *pmp'*, *pnp'* sich schneiden, und welcher durch den Bogen *ab* des Erdäquators gemessen wird. Dieser Bogen heißt der Unterschied der geographischen Länge der zwey Orte, welchen man durch die Benennungen östlich oder westlich unterscheidet, je nachdem der Ort auf der Ost- oder Westseite desjenigen Orts liegt, dessen Lage man als gegeben betrachtet. Der Punkt des Aequators, von welchem an die Längen selbst gerechnet werden, ist willkührlich. *Man legt durch* einen merkwürdigen Ort der

Erde, z. B. den Pik von Teneriffa, oder die westliche Küste der Insel Ferro einen Meridian, welcher der erste Meridian heißt, und zählt die Länge in der Richtung von Abend gegen Morgen von dem Punkt an, in welchem er den Aequator schneidet. Gewöhnlich nimmt man denjenigen Meridian als den ersten an, welcher von dem Meridian der pariser Sternwarte in runder Zahl 20 Grade gegen Westen liegt, und zwischen der westlichen Küste der Insel Ferro und der Stadt auf derselben durchgeht, so daß die geographische Länge jener Sternwarte zwanzig Grade beträgt. Länge und Breite bestimmen also die geographische Lage eines Orts.

§. 46. Es befinde sich nun die Sonne *S* (Fig. 13.) in dem Meridian *PBP'* des östlich von dem Ort *m* liegenden Orts *n*; so wird die Sonne noch den Stundenwinkel *APB*, welcher durch den Bogen *AB* des Aequators, oder den Bogen *ab* des Erdäquators gemessen wird, beschreiben müssen, um in den Meridian *PMAP'* des Orts *m* zu kommen. Der östlich liegende Ort *n* wird also früher Mittag haben, als der Ort *m*, und der Unterschied, welcher der Unterschied der Meridiane oder der Mittagsunterschied heißt, wird dem in Zeit verwandelten Längenunterschied *ab* gleich seyn, indem man eine Stunde auf 15 Grade rechnet.

Der Mittagsunterschied zweyer Orte wird also durch die Beobachtung einer an den zwey Orten sichtbaren und für beyde in einerley Augenblick sich ereignenden Erscheinung unmittelbar gefunden werden können. An jedem der zwey Orte befinde sich ein Beobachter mit einer nach der Zeit seines Orts gestellten oder um eine gegebene Größe davon abweichenden Uhr, um den Augenblick der Erscheinung genau angeben zu können. Liegen nun die zwey Orte nicht einerley Meridian; so werden die an denselben beobachtete Zeiten der Erscheinung ungleich, und ihr Unterschied wird der Mittagsunterschied der zwey Orte seyn. Eben dieses kann auch mittelst einer gleichförmig gehenden und während des Transports von einem Ort an den andern diesen gleichförmigen Gang beybehaltenden Uhr geschehen, welche dazu dienen wird, die Zeit eines Orts an einen andern überzutra-

gen, und so die vorher berichtigten Uhren der zwey Orte mit einander zu vergleichen. Man nennt dergleichen tragbare Uhren Längen- oder Seeuhren, weil man sich derselben auf der See zur Bestimmung der Länge bedient. Aus dem Mittagsunterschied ergiebt sich sodenn der Unterschied der Länge, wenn man auf eine Stunde 15 Grade rechnet, und derjenige Ort wird eine größere Länge haben, dessen Uhr früher geht.

§. 47. Es wird jetzt noch nöthig seyn, zu untersuchen, ob die Sonne eine merkliche Parallaxe hat. Man beobachte zu dem Ende um die Zeit des Sommersolstitiums, wo die Sonne in unsern Gegenden die gröste Mittagshöhe hat, folglich ihre Höhenparallaxe gering ist, die Mittagshöhe derselben, und leite daraus ihre Abweichung her. Die tägliche Veränderung der letztern wird man, ohne die Schiefe der Ekliptik genau zu kennen, sehr genau berechnen (§. 34.) und dadurch die Abweichung, mithin auch die Polardistanz der Sonne für nicht weit von dem Solstitium entfernte Zeitpunkte angeben können. Nach §. 8. suche man für beliebige Stundenwinkel mittelst der alsdenn Statt findenden Polardistanz und der Polhöhe die Höhe der Sonne. Man warte die Zeiten ab, da die Sonne diese voraus berechnete Höhen erreicht, beobachte dieselben, vermindere sie um die Refraktion, und bringe den scheinbaren Halbmesser der Sonne gehörig in Rechnung; so wird man nur bey kleinen Höhen einen Unterschied von einigen Sekunden zwischen den berechneten und den beobachteten Höhen, und zwar die letztern beständig kleiner finden als die erstern. Man wird daraus schließen, daß die Parallaxe der Sonne zwar merklich, aber so klein sey, daß sie durch dieses Verfahren wegen der Unbeständigkeit der Refraktionen in sehr kleinen Höhen, welche zu ihrer genauen Bestimmung tauglicher wären, nicht mit der erforderlichen Genauigkeit ausgemittelt werden könne.

§. 48. Da die Höhenparallaxe dem Winkel *ASC* (Fig. 6.) gleich ist, unter welchem die von dem Himmelskör-

Erde, z. B. den Pik von Teneriffa, oder die westliche Küste der Insel Ferro einen Meridian, welcher der erste Meridian heißt, und zählt die Länge in der Richtung von Abend gegen Morgen von dem Punkt an, in welchem er den Aequator schneidet. Gewöhnlich nimmt man denjenigen Meridian als den ersten an, welcher von dem Meridian der pariser Sternwarte in runder Zahl 20 Grade gegen Westen liegt, und zwischen der westlichen Küste der Insel Ferro und der Stadt auf derselben durchgeht, so daß die geographische Länge jener Sternwarte zwanzig Grade beträgt. Länge und Breite bestimmen also die geographische Lage eines Orts.

§. 46. Es befinde sich nun die Sonne *S* (Fig. 13.) in dem Meridian *PBP'* des östlich von dem Ort *m* liegenden Orts *n*; so wird die Sonne noch den Stundenwinkel *APB*, welcher durch den Bogen *AB* des Aequators, oder den Bogen *ab* des Erdäquators gemessen wird, beschreiben müssen, um in den Meridian *PMAP'* des Orts *m* zu kommen. Der östlich liegende Ort *n* wird also früher Mittag haben, als der Ort *m*, und der Unterschied, welcher der Unterschied der Meridiane oder der Mittagsunterschied heißt, wird dem in Zeit verwandelten Längenunterschied *ab* gleich seyn, indem man eine Stunde auf 15 Grade rechnet.

Der Mittagsunterschied zweyer Orte wird also durch die Beobachtung einer an den zwey Orten sichtbaren und für beyde in einerley Augenblick sich ereignenden Erscheinung unmittelbar gefunden werden können. An jedem der zwey Orte befinde sich ein Beobachter mit einer nach der Zeit seines Orts gestellten oder um eine gegebene Größe davon abweichenden Uhr, um den Augenblick der Erscheinung genau angeben zu können. Liegen nun die zwey Orte nicht einerley Meridian; so werden die an denselben beobachtete Zeiten der Erscheinung ungleich, und ihr Unterschied wird der Mittagsunterschied der zwey Orte seyn. Eben dieses kann auch mittelst einer gleichförmig gehenden und während des Transports von einem Ort an den andern diesen gleichförmigen Gang beybehaltenden Uhr geschehen, welche dazu dienen wird, die Zeit eines Orts an einen andern überzutra-

gen, und ſo die vorher berichtigten Uhren der zwey Orte mit einander zu vergleichen. Man nennt dergleichen tragbare Uhren Längen- oder Seeuhren, weil man ſich derſelben auf der See zur Beſtimmung der Länge bedient. Aus dem Mittagsunterſchied ergiebt ſich ſodenn der Unterſchied der Länge, wenn man auf eine Stunde 15 Grade rechnet, und derjenige Ort wird eine gröſsere Länge haben, deſſen Uhr früher geht.

§. 47. Es wird jetzt noch nöthig ſeyn, zu unterſuchen, ob die Sonne eine merkliche Parallaxe hat. Man beobachte zu dem Ende um die Zeit des Sommerſolſtitiums, wo die Sonne in unſern Gegenden die gröſte Mittagshöhe hat, folglich ihre Höhenparallaxe gering iſt, die Mittagshöhe derſelben, und leite daraus ihre Abweichung her. Die tägliche Veränderung der letztern wird man, ohne die Schiefe der Ekliptik genau zu kennen, ſehr genau berechnen (§. 34.) und dadurch die Abweichung, mithin auch die Polardiſtanz der Sonne für nicht weit von dem Solſtitium entfernte Zeitpunkte angeben können. Nach §. 8. ſuche man für beliebige Stundenwinkel mittelſt der alsdenn Statt findenden Polardiſtanz und der Polhöhe die Höhe der Sonne. Man warte die Zeiten ab, da die Sonne dieſe voraus berechnete Höhen erreicht, beobachte dieſelben, vermindere ſie um die Refraktion, und bringe den ſcheinbaren Halbmeſſer der Sonne gehörig in Rechnung; ſo wird man nur bey kleinen Höhen einen Unterſchied von einigen Sekunden zwiſchen den berechneten und den beobachteten Höhen, und zwar die letztern beſtändig kleiner finden als die erſtern. Man wird daraus ſchlieſsen, daſs die Parallaxe der Sonne zwar merklich, aber ſo klein ſey, daſs ſie durch dieſes Verfahren wegen der Unbeſtändigkeit der Refraktionen in ſehr kleinen Höhen, welche zu ihrer genauen Beſtimmung tauglicher wären, nicht mit der erforderlichen Genauigkeit ausgemittelt werden könne.

§. 48. Da die Höhenparallaxe dem Winkel *ASC* (Fig. 6.) *gleich iſt, unter welchem die* von dem Himmelskör-

per *S* in der Ebene des durch ihn gelegten Vertikalkreises *ZSH* nach dem Mittelpunkt *C* und dem Ort *A* auf der Oberfläche der Erde gezogenen geraden Linien *SC*, *SA* sich schneiden, (§. 13.) und dieser Winkel gegeben ist, wenn man das Verhältniß von *SC*: *CA* und den Winkel *ZCS* oder *ZAS*, d. i. den wahren oder scheinbaren Abstand vom Scheitel kennt; so wird es bey der Bestimmung der Parallaxe darauf ankommen, das Verhältniß zu finden, in welchem der Halbmesser zu der Entfernung des Himmelskörpers von dem Mittelpunkt der Erde steht, dessen Parallaxe gesucht wird. Man wird dieses Verhältniß durch ein Verfahren finden, welches demjenigen ähnlich ist, dessen man sich in der praktischen Geometrie zur Bestimmung der Entfernung unzugänglicher Gegenstände bedient.

An zwey unter einerley Meridian *pap'* (Fig. 14.) liegenden Orten *b*, *d* beobachte man zu gleicher Zeit die Abstände des Himmelskörpers *s* von den Scheiteln *z*, *v* dieser Orte im Augenblick seines Durchgangs durch den Meridian, und verbessere dieselben wegen der Refraktion; so wird man die Winkel *zbs*, *vds* haben, welche die von den Beobachtungsorten *b*, *d*, nach dem Körper *s* gezogenen geraden Linien mit den Vertikallinien *zbz*, *vdv* der zwey Orte einschließen. Es sey *acq* der Aequator der Erde; so werden die Bogen *ab*, *ad* des Erdmeridians die geographischen Breiten oder Polhöhen (§. 45.) der zwey Orte messen, welche durch Beobachtungen der Fixsterne gefunden werden können. Man ziehe die Chorde *bd*; so kennt man in dem gleichschenklichten Dreyeck *bcd* den Winkel *bcd*, welcher im Fall der Figur der Summe der Polhöhen, aber wenn die zwey Orte auf einerley Seite des Aequators liegen, ihrer Differenz gleich ist. Mithin kennt man auch die zwey einander gleichen Winkel *dbc*, *bdc* an der Grundlinie *bd*, (I, 5, 32.) und damit das Verhältniß von *cb* : *bd*, oder man kann, wenn man *cb* als gegeben betrachtet, und z. B. = 1 setzt, *bd* finden. Zieht man die Summe der bekannten Winkel *cbd* und *zbs* von zwey rechten Winkeln ab; so erhält man den Winkel *sbd*, und eben so mittelst der Winkel *bdc* und *vds* den Winkel *bds*, mithin auch den Winkel *bsd* (I, 32.) Da

nun *bd* in Theilen des zur Einheit angenommenen Erdhalbmeſſers ausgedrückt gegeben iſt; ſo findet man durch Auflöſung des Dreyecks *bds* die Diſtanzen *bs*, *ds* durch dieſelben Theile ausgedrückt. Man ziehe *cs*; ſo kennt man in dem Dreyeck *cbs* die Seiten *bc*, *bs* und ihren Zwiſchenwinkel *cbs*, welcher mit dem durch Beobachtung gefundenen *zbs* zwey rechte Winkel macht; folglich kann man *cs* in Theilen des Erdhalbmeſſers ausgedrückt, oder das Verhältniß von *cs* zu *cb* finden. Hieraus ergiebt ſich endlich die gröſte Höhenparallaxe *AHC* (Fig. 6.), welche am Horizont *H* Statt findet, und daher die Horizontalparallaxe heißt, durch Auflöſung des bey *A* rechtwinklichten Dreyecks *AHC*, in welchem das Verhältniß von *CH* : *CA* gegeben iſt, und die einem beobachteten Scheitelabſtand *ZAS* entſprechende Höhenparallaxe *ASC* findet man durch die Auflöſung des Dreyecks *ASC*, in welchem man den Winkel *CAS* als Supplement des beobachteten Scheitelabſtands und das Verhältniß von *CS* oder *CH* : *CA* kennt.

§. 49. Setzt man nemlich die Horizontalparallaxe $AHC = p$, die dem ſcheinbaren Abſtand *ZAS* oder z zugehörige Höhenparallaxe $ASC = p'$, und den wahren Abſtand $ZCS = z'$; ſo hat man

1.) $CH : CA = \text{Sin. tot.} : \left\{\begin{matrix}\text{Sin. } AHC\\ \text{Sin. } p\end{matrix}\right\}$;

alſo ſind die Sinus der Horizontalparallaxen ungleich entfernter Himmelskörper umgekehrt ihren Abſtänden vom Mittelpunkt der Erde proportional, und da die Sinus kleiner Winkel ſich beynahe wie die Winkel ſelbſt verhalten; ſo ſind kleine Horizontalparallaxen nahe im umgekehrten Verhältniß der Entfernungen vom Mittelpunkt der Erde.

Ferner iſt $\left\{\begin{matrix}\text{Sin. } CAS\\ \text{Sin. } ZAS\end{matrix}\right\} : \text{Sin. } ASC = \left\{\begin{matrix}CS\\ CH\end{matrix}\right\} : CA$, oder nach n. 1. iſt

2.) $\text{Sin. } z : \text{Sin. } p' = \text{Sin. tot.} : \text{Sin. } p$

Der Sinus der Höhenparallaxe iſt alſo dem Sinus des ſcheinbaren oder des wegen der Refraktion allein verbeſſerten beobachteten Abſtands vom Scheitel proportional, und man kann hier wiederum, wenn die Parallaxen klein ſind, ſtatt der Sinus die Winkel ſelbſt ſetzen.

Da $ZAS = ZCS + ASC$, oder $z = z' + p'$; ſo iſt

$$\text{Sin. } p : \text{Sin. tot.} = \text{Sin. } p' : \text{Sin. } (z' + p'). \quad \text{(n. 2.)}$$
$$= \text{Sin. tot. Sin. } p' : \text{Sin. } z' \text{ Cos. } p' + \text{Cos. } z' \text{ Sin. } p'$$
$$= \text{Tg. } p' : \text{Sin. } z' + \text{Tg. } p' \frac{\text{Cos. } z'}{\text{Sin. tot.}}$$

Daher 3.) $\text{Tang. } p' = \frac{\text{Sin. } p \text{ Sin. } z' \text{ Sin. tot.}}{\text{Sin. tot.}^2 - \text{Sin. } p \text{ Cos. } z'}$,

mittelſt welcher Formel man die einem gegebenen wahren Abſtand z' vom Scheitel zugehörige Parallaxe finden kann.

Ferner verhält ſich in dem Dreyeck ASC

$$\left.\begin{matrix} CS \\ CH \end{matrix}\right\} : AS = \left\{\begin{matrix} \text{Sin. } CAS \\ \text{Sin. } ZAS \end{matrix}\right\} : \text{Sin. } ZCS$$
$$= \text{Sin. } z : \text{Sin. } z'$$
$$= \text{Sin. } z : \text{Sin. } (z - p'),$$

alſo iſt 4.) $= \frac{CH}{AS} = \frac{\text{Sin. } z}{\text{Sin. } z'} = \frac{\text{Sin. } z}{\text{Sin. } (z - p')}$

Ein Himmelskörper, der eine merkliche Parallaxe hat, wird alſo dem auf der Erdoberfläche liegenden Beobachtungsort A deſto näher ſeyn, als dem Mittelpunkt C der Erde, je größer ſeine Höhe iſt. Mithin wird ſein ſcheinbarer Halbmeſſer mit ſeiner Höhe wachſen. Es ſey nemlich ca (Fig. 15.) die gerade Linie, welche den Beobachtungsort a mit dem Mittelpunkt c eines kugelförmigen Körpers verbindet, ab berühre dieſe Kugel in b, und an den Berührungspunkt ſey der Halbmeſſer cb gezogen; ſo iſt der Winkel cab der von a aus geſehene ſcheinbare Halbmeſſer der Kugel, und eben ſo iſt, wenn ed eben dieſe Kugel in d berührt, und cd gezogen wird, ced der ſcheinbare von e aus geſehene Halbmeſſer derſelben. In den rechtwinklichten Dreyecken abc, edc verhält ſich nun

$$ca : cb = \text{Sin. tot.} : \text{Sin. } cab$$
$$\left.\begin{matrix} cd \\ cb \end{matrix}\right\} : ce = \text{Sin. } ced : \text{Sin. tot.};$$

folglich 5.) $ca : ce = \text{Sin. } ced : \text{Sin. } cab.$

Mithin ſind die Sinus der ſcheinbaren Halbmeſſer einer Kugel, und, wenn die ſcheinbaren Halbmeſſer klein ſind, ſehr nahe dieſe ſelbſt umgekehrt den Abſtänden ihres Mittelpunkts vom Auge des Beobachters proportional.

Eine Kugel, deren Halbmeſſer $= gf$ ſey, befinde ſich in der Entfernung $ag = ac$ von dem Punkt a; ſo verhält ſich, wenn af dieſe Kugel berührt,

$$ag : fg = \text{Sin. tot.} : \text{Sin. } gaf$$
$$\text{aber } cb : \left\{\begin{matrix} ca \\ ag \end{matrix}\right\} = \text{Sin. } cab : \text{Sin. tot.}$$

folglich 6.) $cb : fg = \text{Sin. } cab : \text{Sin. } gaf.$

Alſo verhalten ſich die Sinus der ſcheinbaren Halbmeſſer gleich weit entfernter Kugeln wie ihre wahren Halbmeſſer. Sind die ſcheinbaren Halbmeſſer klein; ſo verhalten ſich ſehr nahe die ſcheinbaren Halbmeſſer ſelbſt wie die wahren.

§. 50. Um die Sonnenparallaxe mit der zur Ver-

wandlung der beobachteten Sonnenhöhen in wahre erforderlichen Genauigkeit zu finden, möchte zwar die im 48ten §. gezeigte Methode hinreichend seyn, aber das Verhältniß des Abstands der Sonne von der Erde zu dem Halbmesser der letztern, wird selbst durch kleine in der Bestimmung der Parallaxe begangene Fehler beträchtlich geändert werden, und daher kommen die so verschiedenen Angaben des Abstands der Sonne von der Erde. Der Einfluß der Sonnenparallaxe auf einige andere astronomische Erscheinungen dient, wie man in der Folge sehen wird, zu ihrer genauern Bestimmung. Man weißt jetzt, daß die Horizontalparallaxe der Sonne, wenn sie sich in ihrer mittleren Entfernung von der Erde, d. i. derjenigen, welche der halben Summe ihrer größten und kleinsten Entfernung gleich ist, befindet, sehr nahe 8,8 Sekunden beträgt, woraus die mittlere Entfernung der Sonne von der Erde = 23439 Erdhalbmessern folgt. Nimmt man sie nur um $,\frac{1}{5}$ Sek. kleiner; so wird dieser Abstand schon um 215 Erdhalbmesser größer, woraus sich die Verschiedenheit älterer und neuerer Bestimmungen desselben leicht wird erklären lassen.

§. 51. Von der jährlichen Bewegung der Sonne in einem gegen den Aequator geneigten größten Kreis hängt, wie wir gesehen haben, die Veränderung der Mittagshöhe der Sonne, der Dauer von Tag und Nacht, und die Abwechslung der Jahrszeiten ab. Eben diese Bewegung verbunden mit der verschiedenen geographischen Lage der Orte, bringt sehr merkwürdige und mannigfaltige Erscheinungen in den täglichen Bewegungen der Sonne hervor, die man bey dem ersten Anblick nicht erwartet hätte, und jetzt, doch ohne Rücksicht auf die Refraktion, betrachtet werden sollen.

Liegt ein Ort unter dem Aequator; so fallen die Pole in den Horizont, und dieser halbirt alle von den Himmelskörpern bey ihrer täglichen Bewegung beschriebenen Parallelkreise. Folglich sind hier Tag und Nacht beständig einander gleich, und alle sowohl auf der nördlichen als südlichen Hälfte der Himmelskugel befindlichen Sterne kommen während eines *Sterntags über den Horizont*. Der Aequator

der Himmelskugel geht, weil seine Pole in den Horizont fallen, durch den Scheitelpunkt, und die Sonne erhebt sich zur Zeit der Tag- und Nachtgleichen bis zu dem Scheitel; so daß zu dieser Zeit ein senkrecht stehender Stab keinen Schatten wirft. Zur Zeit des Sommer- und Wintersolstitiums steht also die Sonne im Mittag am weitesten von dem Scheitel, im ersten Fall gegen Norden, im zweyten gegen Süden ab, ihre Mittagshöhe ist am kleinsten und dem Complement der Schiefe der Ekliptik gleich, und die Schatten fallen im Sommersolstitium auf die Südseite, im Wintersolstitium auf die Nordseite der Körper, welche ihn werfen. Versteht man, wie in unsern Gegenden, unter dem Sommer die Zeit der größten, und unter dem Winter die Zeit der kleinsten Mittagshöhe der Sonne; so giebt es an einem unter dem Aequator liegenden Ort in jedem Jahr zwey Sommer und zwey Winter. Aehnliche Erscheinungen müssen sich an jedem Ort der Erde zeigen, dessen Polhöhe kleiner als die Schiefe der Ekliptik ist, weil alsdenn der Durchschnittspunkt des Aequators mit dem Meridian einen kleineren Abstand vom Scheitel hat, als die größte Abweichung der Sonne oder die Schiefe der Ekliptik beträgt.

Wird die nördliche Breite oder Polhöhe der Schiefe der Ekliptik, folglich die Aequatorshöhe (§. 29.) ihrem Complement gleich; so steht der im Meridian befindliche Punkt des Aequators um die Schiefe der Ekliptik vom Zenith gegen Süden ab. Folglich geht die Sonne im Sommersolstitium durch den Scheitel, und steht im Wintersolstitium um die doppelte Schiefe der Ekliptik von dem Scheitel gegen Süden ab. Eben so verhält es sich bey einer der Schiefe der Ekliptik gleichen südlichen Breite, wenn man Sommer und Wintersolstitium miteinander verwechselt. Zwey Parallelkreise des Erdäquators, welche beyderseits um die Schiefe der Ekliptik von ihm abstehen, und, wie die ihnen ähnlich liegenden an der Himmelskugel (§. 38.), Wendekreise heißen, schließen also eine Zone der Erdoberfläche ein, auf welcher alle diejenige Orte liegen, deren Scheitel die Sonne erreichen kann, und die man daher den heißen Erdstrich (Zona torrida) nennt.

Iſt die Polhöhe gröſſer als die Schiefe der Ekliptik, mithin die Aequatorshöhe kleiner als das Complement dieſer Schiefe; ſo iſt die gröſte Mittagshöhe der Sonne, welche der Summe der Aequatorshöhe und der Schiefe der Ekliptik gleich iſt, kleiner als 90°. Die Sonne erreicht alſo den Scheitel niemals, und es giebt des Jahrs nur einen Sommer und Winter. Mit der Polhöhe wächst der längſte Tag, und wenn ſie dem Complement der Schiefe der Ekliptik gleich wird; ſo berührt die Sonne, wenn ſie unter dem Pol durch den Meridian geht, den Horizont zur Zeit des Sommerſolſtitiums, wenn die Polhöhe nördlich iſt, weil alsdenn die Polardiſtanz der Sonne dem Complement der Schiefe der Ekliptik, mithin auch, vermöge der Vorausſetzung, der Polhöhe gleich wird (§. 3.). Alsdenn dauert alſo der bürgerliche Tag 24 Stunden. Und da die Aequatorshöhe in dem hier betrachteten Fall der Schiefe der Ekliptik gleich iſt; ſo wird die Sonne im Winterſolſtitium gar nicht aufgehen; ſondern nur noch den Horizont berühren, und die Nacht wird 24 Stunden dauern.

Eben ſo verhält es ſich auf der Südſeite der heiſſen Zone, wo ſich nur die Jahrszeiten miteinander verwechſeln. Zwey Parallelkreiſe des Erdäquators, welche um einen der Schiefe der Ekliptik gleichen Bogen von den Erdpolen abſtehen, und die Polarkreiſe heiſſen, ſchlieſſen alſo, jeder mit dem ihm zunächſt liegenden Wendekreis, auf beyden Seiten des heiſſen Erdſtrichs zwey Kugelzonen ein, auf welcher alle diejenigen Orte liegen, deren Scheitel die Sonne niemals erreicht, über deren Horizont aber ſie ſich zu jeder Jahrszeit erhebt. Sie heiſſen die gemäſſigten Erdſtriche (Zonæ temperatæ). Auf den nördlichen dieſer Erdſtriche beziehen ſich die bisher angeführten aſtronomiſchen Beobachtungen, und auch die noch ferner anzuführenden werden als in eben dieſem Erdſtrich angeſtellt vorausgeſetzt werden, wenn nicht ausdrücklich das Gegentheil erinnert wird.

Wird endlich die Polhöhe gröſſer als das Complement der Schiefe der Ekliptik, oder als die Polardiſtanz der Sonne zur Zeit der Solſtitien; ſo geht die Sonne, wenn die Polhöhe *nördlich iſt*, um die Zeit des Sommerſolſti-

tiums so lange nicht unter, als ihre Polardistanz kleiner als die Polhöhe ist (§. 3.) und um die Zeit des Wintersolstitiums so lange nicht auf, als bis ihre südliche Abweichung der Aequatorshöhe gleich, oder kleiner als dieselbe, mithin ihr Abstand vom Südpol der Polhöhe gleich oder größer als dieselbe wird. Bey südlicher Polhöhe findet dasselbe Statt, nur verwechseln sich Sommer und Winter. Am Pol der Erde selbst fällt der Pol der Himmelskugel in den Scheitel; folglich der Aequator mit dem Horizont zusammen. Die Parallelkreise der Sterne werden Parallelkreise des Horizonts, und die Sonne geht dem am Nordpol liegenden Ort so lange nicht auf, als sie eine südliche Abweichung hat. Mit der Tag- und Nachtgleiche erscheint sie am Horizont, und bleibt so lange über demselben, als sie eine nördliche Abweichung hat. Hier ist also die Dauer des Tags der Zeit von der Frühlingsnachtgleiche bis zu der des Herbsts, und die Dauer der Nacht der Zeit gleich, welche von letzterer bis wiederum zu ersterer verfließt. Am Südpol findet dasselbe Statt, wenn man nördliche Abweichung der Sonne statt südlicher setzt. Diejenigen Orte, welche einen mehr als 24 Stunden betragenden Tag haben, und an welchen auf der andern Seite die Nacht länger als 24 St. dauert, liegen also innerhalb der von den Polarkreisen eingeschlossenen Theilen der Erdoberfläche, und diese heißen die kalten Erdstriche (Zonæ frigidæ).

§. 52. Durch die Wirkung der Atmosphäre der Erde, erhalten wir schon vor Aufgang und noch nach dem Untergang der Sonne einiges Licht von ihr, welches die Morgen- und Abend-Dämmerung ausmacht. Die Erfahrung lehrt, daß, wenn die Sonne 18° unter dem Horizont steht, die kleinsten mit bloßen Augen sichtbaren Sterne sich zeigen, und, wenn sie dem Horizont näher rückt, diese nach und nach verschwinden. Steht sie um weniger als 18° unter dem Horizont; so bemerkt man in ihrer Nähe einen Theil der Atmosphäre erleuchtet, welcher durch einen Bogen begränzt erscheint. Bey einer Tiefe von 6° 23′ ½ unter dem Horizont zieht sich dieser Bogen in der Gestalt eines größten

Kreiſes durch den Scheitel, die größeren Sterne fangen an der Oſtſeite des Himmels an ſichtbar zu werden, während die noch ſtarke Abend-Dämmerung dieß an der Weſtſeite verhindert, und man iſt in Wohnungen, welche nicht gerade gegen den Ort der auf- oder untergehenden Sonne gekehrt ſind, genöthigt, ein Licht anzuzünden. Man nennt daher dieſe Dämmerung die bürgerliche.

Die Dauer der Dämmerung ergiebt ſich aus der Zeit, welche die Sonne gebraucht, um aus einem in einer Tiefe von 18° mit dem Horizont parallel gezogenen Kreis in den Horizont zu kommen, und hängt alſo von der Polhöhe und der Abweichung der Sonne ab. Unter dem Aequator durchſchneidet zur Zeit der Nachtgleichen der Tagkreis der Sonne, welcher in dieſem Fall mit dem Aequator der Himmelskugel zuſammenfällt, den Horizont und die Parallelkreiſe deſſelben rechtwinklicht; mithin iſt daſelbſt zur Zeit der Nachtgleichen, die Dauer der Dämmerung der Zeit gleich, welche die Sonne bey ihrer täglichen Bewegung gebraucht, um einen Bogen von 18° zu beſchreiben, welches 1 St. 12 Min. beträgt. Je größer die Abweichung der Sonne wird, deſto kleiner wird der Halbmeſſer ihres Tagekreiſes, und deſto größer die Dauer der Dämmerung, welche alſo zur Zeit der Solſtitien am gröſten wird. Um für eine gegebene Polhöhe und Abweichung oder Polardiſtanz der Sonne die Dauer der Dämmerung zu finden, ſuche man nach §. 8. n. 1. oder 4. den Stundenwinkel, welcher einer Tiefe von 18° unter dem Horizont, oder einer negativen Höhe von 18° zugehört, ziehe von demſelben den halben Tagbogen, welchen man nach §. 8. n. 8. findet, ab, und verwandle den Reſt in Zeit, indem man auf 15° eine Stunde rechnet; ſo wird dieſe die geſuchte Dauer der Dämmerung ſeyn. Eben ſo findet man die Dauer der bürgerlichen Dämmerung, wenn man die negative Sonnenhöhe = 6° 23′ 30″ ſetzt. Kommt die Sonne nicht bis auf eine Tiefe von 18° unter den Horizont; ſo dauert die Dämmerung die ganze Nacht hindurch. Unter einer Polhöhe von 48° 39′ z. B. ſenkt ſich die Sonne um Mitternacht 18° tief unter den Horizont, wenn ihre Polardiſtanz die Polhöhe um 18° übertrifft; alſo = 66°

39′ wird. Mithin wird zur Zeit des Sommersolstitiums, wo die Polardistanz der Sonne = 66° 32′ wird, die Dämmerung die ganze Nacht hindurch dauern. Man sieht aber, daß, wenn diß möglich seyn soll, die Polhöhe nicht kleiner seyn darf, als der Ueberschuß des Complements der Schiefe der Ekliptik über 18°, d. i. nicht kleiner als 48° 32′. Soll die bürgerliche Dämmerung die ganze Nacht hindurch dauern können; so darf die Polhöhe nicht kleiner seyn als 60° 9′. Die Bestimmung der Zeit der kürzesten Dämmerung erfordert die Auflösung der Aufgabe, die Polardistanz eines Sterns zu finden, bey welcher er unter einer gegebenen Polhöhe in der kürzesten Zeit von einem gegebenen Parallelkreis des Horizonts in diesen selbst kommt. Man kann im Allgemeinen beweisen, daß die Zeit, innerhalb welcher ein Stern von einem gegebenen Parallelkreis des Horizonts in einen andern gegebenen Parallel desselben kommt, am kleinsten ist, wenn der Parallelkreis des Sterns die zwey gegebenen Parallelkreise des Horizonts unter gleichen Winkeln durchschneidet, oder die zwey Winkel einander gleich sind, welche die von den Durchschnittspunkten des von dem Stern beschriebenen Parallels mit den zwey gegebenen Almucantharat an das Zenith und den Pol des Aequators gezogenen grösten Kreise miteinander einschließen.

§. 53. Es sey nemlich z (Fig. 16.) das Zenith, p der Pol, zs, zh die gegebenen zwey Zenithdistanzen, welche die Abstände der zwey gegebenen Almucantharat vom Scheitel messen, s und h die zwey Punkte, in welchen der um $ps = ph$ vom Pol abstehende Parallelkreis eines Sterns den zwey Almucantharat so begegne, daß $psz = phz$. Ein anderer Stern s', dessen Polardistanz $= ps'$ sey, stehe in s' um $zs' = zs$ vom Scheitel ab. Man mache den Winkel $s'ph' = sph$, $ph' = ps'$ und ziehe die Bogen grösster Kreise ss', hh'. Da nun $sph = s'ph'$; so ist auch $sps' = hph'$, und weil $ph = ps$, $ph' = ps'$; so sind die Dreyecke pss' und phh' congruent, und daher $phh' = pss'$. Aber $zhp = zsp$ (Voraussetz.); folglich $zhh' = zss'$. Man nehme $sv = zh$, und ziehe vs'; so congruiren auch die Dreyecke zhh' und vss', und es ist $vs' = zh'$.

Nun ist zs
$zv + vs$ $\Big\} = zs' < zv + vs' < zv + zh'$:
$zv + zh$

folglich iſt $zh < zh'$. Da nun $s'ph' = sph$; ſo erhebt ſich der Stern s von der Zenithdiſtanz zs auf die zh in derſelben Zeit, in welcher ſich der Stern s' von derſelben Zenithdiſtanz zs' auf die zh', welche gröſſer als zh iſt, erhebt, und gebraucht alſo, um ſich vollends auf eine der zh gleiche Zenithdiſtanz zu erheben, eine gröſſere Zeit, als der Stern s, deſſen Polardiſtanz $= ps$. Eben ſo wird der Beweiß für einen Stern geführt, deſſen Polardiſtanz $> ps$ iſt. Ein Stern erhebt ſich alſo in der kürzeſten Zeit von zs auf zh, wenn $psz = phz$ iſt.

Da $zh = sv$, $ph = ps$, und $zhp = zsp$; ſo ſind, wenn man pv zieht, die Dreyecke zhp, vsp congruent. Mithin iſt $pv = pz$, $zph = vps$, und das Perpendickel pr auf zv halbiert ſowohl den Winkel zpv, als die Grundlinie zv des gleichſchenklichten Dreyecks zpv. Ferner iſt $\left.\begin{matrix} zph + hpv \\ zpv \end{matrix}\right\} = vps + hpv = hps$; folglich $\frac{1}{2} zpv = zpr = \frac{1}{2} hps$. Und nun verhält ſich

$$\begin{aligned} \text{Sin. } pz : \text{Sin. tot.} &= \text{Sin. } zr : \text{Sin. } zpr \\ &= \text{Sin. } \tfrac{1}{2}(zs - vs) : \text{Sin. } zpr \\ &= \text{Sin. } \tfrac{1}{2}(zs - zh) : \text{Sin. } \tfrac{1}{2} hps \end{aligned}$$

Daher iſt 1.) $$\text{Sin. } \tfrac{1}{2} hps = \frac{\text{Sin. } \frac{1}{2}(zs - zh) \text{ Sin. tot.}}{\text{Sin. } pz}$$

Da pr auf der Grundlinie zs ſenkrecht iſt; ſo verhält ſich in dem Dreyeck zps

$$\begin{aligned} \text{Cos. } pz : \text{Cos. } ps &= \text{Cos. } zr : \text{Cos. } sr \\ &= \text{Cos. } \tfrac{1}{2}(zs - zh) : \text{Cos. } \tfrac{1}{2}(zs + zh); \end{aligned}$$

Alſo iſt 2.) $$\text{Cos. } ps = \frac{\text{Cos. } pz \text{ Cos. } \frac{1}{2}(zs + zh)}{\text{Cos. } \frac{1}{2}(zs - zh)}$$

Aus n. 1. ergiebt ſich der Winkel hps mittelſt der gegebenen Abſtände zs, zh der zwey Almucantharat vom Scheitel und des Complements pz der Polhöhe, und, wenn man dieſen Winkel in Zeit verwandelt, die kürzeſte Zeit, in welcher ſich ein Stern von dem einen Almucantharat in den andern erhebt. Aus eben dieſen Stücken erhält man nach n. 2. die Polardiſtanz ps des Sterns.

In Beziehung auf die Beſtimmung der kürzeſten Dämmerung ſey m die Tiefe der Sonne unter dem Horizont, bey welcher die Dämmerung anfängt und aufhört; ſo wird man haben $zs = 90° + m$; $zh = 90°$, und, wenn die Polhöhe $= l$, die Polardiſtanz $= d$ geſetzt wird,

$$4.) \quad \text{Sin. } \tfrac{1}{2} hps = \frac{\text{Sin. } \frac{1}{2} m \text{ Sin. tot.}}{\text{Cos. } l},$$

$$5.) \quad \text{Cos. } d = -\frac{\text{Tg. } \frac{1}{2} m \text{ Sin. } l}{\text{Sin. tot.}}.$$

Für $m = 18°$, $l = 48° 31' 10''$ erhält man $\frac{1}{2} hps = 13° 39' 39''$, $d = 96° 48' 53''$. Die Dauer der kürzesten Dämmerung beträgt also 1 St. 49 M. 17,2 Sek. und diese findet Statt, wenn die südliche Abweichung der Sonne $= 6° 48' 53''$ ist, welche sie zwischen dem 3. und 4. März und dem 10. und 11. October hat.

§. 54. Man hat sich der Dämmerung bedient, um die Höhe der Atmosphäre, so weit sie noch die Sonnenstralen merklich zurückwirft, zu bestimmen. Es sey *ca* (Fig. 17.) der Halbmesser der Erde, und *ef* der Halbmesser der mit der Erde concentrischen sphärischen Oberfläche der Atmosphäre. Die Tangente *da* an dem Punkt *a* treffe in dem Punkt *d* die Oberfläche der Atmosphäre. Man ziehe *cd*, welche der Erdoberfläche in *g* begegne, nehme in der durch *ac* und *cd* gelegten Ebene $gb = ga$, und ziehe *cb*, *bd*; so wird auch die *db* den aus *c* mit dem Halbmesser *ca* in der Ebene *acd* beschriebenen Kreis in dem Punkt *b* berühren, und $bdc = adc$ seyn. Ein Sonnenstral *cbd* wird also noch eben an der Oberfläche der Erde bey *b* vorübergehen, und an dem Punkt *d* der Gränze der Atmosphäre nach der Richtung der Horizontallinie *da* des Orts *a* zurückgeworfen werden; folglich wird, wenn die Sonne um den Winkel *eds* unter dem Horizont des Orts *a* stehet, die Dämmerung anfangen oder sich endigen. Da in dem Viereck *acbd* sowohl *dac* als $dbc = 90°$; so ist $eds = acb$, und $acd = \frac{1}{2} eds = 9°$, weil nach den Beobachtungen $eds = 18°$. Mithin ist in dem rechtwinklichten Dreyeck *acd* das Verhältniß von *cd* : *ac* gegeben, welches dem vom 1,0124651 : 1 gleich ist. Bey dieser Berechnung sind aber die Wege *ad*, *db* des Lichtstrals durch die Atmosphäre als gerade Linien angenommen, welche wegen der Refraktion krumme gegen die Erde hole Linien sind (§. 15.). Man findet daher auf dem oben gezeigten Weg die Höhe der Atmosphäre noch etwas zu groß. Indessen können mehrere Zurückwerfungen des Sonnenlichts nach einander Statt finden, wodurch diese Methode, die Höhe der Atmosphäre zu bestimmen, unsicher gemacht wird.

§. 55. In kleinen Massen ist die atmosphärische Luft unsicht-

unsichtbar, aber die von allen Schichten der Atmosphäre zurückgeworfenen Lichtstralen machen einen merklichen Eindruck, und zeigen sie mit einer blauen Farbe, welche sich auch über sehr entfernte Gegenstände der Erde verbreitet, und dem Himmel das Ansehen eines blauen Gewölbes giebt. Könnten wir die Gränze der Atmosphäre sehen, und die Entfernungen der an ihrer äußern Oberfläche befindlichen Punkte beurtheilen; so würde uns der Himmel als die Oberfläche eines Kugelabschnitts erscheinen, welcher durch den Horizont des Beobachtungsorts oder durch eine die Erdoberfläche berührende Ebene abgeschnitten wird. Ob wir aber gleich die äußerste Oberfläche der Atmosphäre nicht unterscheiden können; so müßen wir doch, da die horizontalen Lichtstralen, welche sie uns zusendet, aus einer größeren Tiefe kommen, als die vertikalen, die Ausdehnung der Atmosphäre nach der horizontalen Richtung für größer halten, als nach der vertikalen. Hiezu kommen noch unsere Erfahrungen über die Entfernung irdischer Gegenstände, welche nur in horizontaler Richtung beträchtlich werden kann. Erscheinen uns die auf der Erde befindlichen Gegenstände in einiger Höhe über dem Horizont; so wissen wir schon, daß sie nicht sehr entfernt seyn können, und wir sind daher geneigt, auch die höher über dem Horizont liegende Punkte des scheinbaren Himmelsgewölbes für näher zu halten, als die am Horizont befindlichen, zwischen welchen und unserm Aug noch überdiß gewöhnlich eine Menge Gegenstände liegen, wodurch wir veranlaßt werden, den an den Horizont angränzenden Theil des Himmels für entfernter zu halten. Der Himmel muß uns also als ein zusammengedrücktes Gewölbe, oder als ein Kugelabschnitt erscheinen, welcher durch den Horizont gebildet wird, und seine Gestalt muß sich mit den Ursachen der optischen Täuschungen, welche hier im Spiel sind, verändern. Im Mittel genommen scheint uns ein Punkt, welcher 23 Grade über den Horizont erhaben ist, den vom Scheitel bis an den Horizont gehenden Bogen zu halbiren, woraus folgt, daß, wenn dieser Bogen ein Kreisbogen ist, dessen Mittelpunkt

in den der Erde fällt, der Halbmeſſer des Kugelabſchnitts ſich zu ſeiner Höhe wie 3,36 : 1 verhält.

§. 56. Um diß zu zeigen, ſey *aba'* (Fig. 18.) ein Durchſchnitt des Himmelsgewölbes mit einer Vertikalebene, und *c* der gemeinſchaftliche Mittelpunkt der ſcheinbaren Himmelskugel und der Erde. Auf dem vertikalen Durchmeſſer *bd* wird alſo ein Punkt *e* ſo zu beſtimmen ſeyn, daß, wenn man *ae* auf *bd* ſenkrecht und die *ne* an die Mitte *n* des Bogens *ab* zieht, der Winkel *aen* = 23 Gr. wird. Man ziehe noch *nf* auf *bd* ſenkrecht; ſetze $\left.\begin{matrix} aen \\ enf \end{matrix}\right\} = a$, und den Bogen $\left\{\begin{matrix} an \\ nb \end{matrix}\right\} = y$; ſo iſt, für den Halbmeſſer 1,

die gerade Linie $ef = \text{Cos. } y$

— — — $\frac{1}{2}ef = \text{Cos. } 2y$

mithin $fe = \text{Cos } y - \text{Cos. } 2y$,

und die $nf = \text{Sin. } y$.

Daher $\left.\begin{matrix} fn : fe \\ 1 : \text{Tg } a \end{matrix}\right\} = \text{Sin. } y : \left\{\begin{matrix} \text{Cos. } y - \text{Cos. } 2y \\ \text{Cos. } y - 2\,\overline{\text{Cos. } y}^2 + 1 \\ (1 - \text{Cos. } y)\,(1 + 2\,\text{Cos. } y) \end{matrix}\right.$

$1 : \overline{\text{Tg. } a}^2 = \overline{\text{Sin. } y}^2 : (1 - \text{Cos. } y)^2\,(1 + 2\,\text{Cos. } y)^2$

$= (1 - \text{Cos. } y)\,(1 + \text{Cos. } y) : (1 - \text{Cos. } y)^2\,(1 + 2\,\text{Cos. } y)^2$

$= 1 + \text{Cos. } y : (1 - \text{Cos. } y)\,(1 + 2\,\text{Cos. } y)^2$

alſo $(1 + \text{Cos. } y)\,\overline{\text{Tg. } a}^2 = 1 + 3\,\text{Cos. } y - 4\,\overline{\text{Cos. } y}^3$,

oder $4\,\overline{\text{Cos. } y}^3 - 3\,(1 - \frac{1}{2}\,\overline{\text{Tg. } a}^2)\,\text{Cos. } y = 1 - \overline{\text{Tg. } a}^2$

Aber in einem Kreis, deſſen Halbmeſſer $= r$, iſt für einen beliebigen Winkel z

$4\,\overline{\text{Cos. } z}^3 - 3\,r^2\,\text{Cos. } z = r^2\,\text{Cos. } 3z$:

folglich iſt der Coſinus des Bogens y für den Halbmeſſer 1 dem Coſinus des dritten Theils eines Winkels in einem Kreiſe gleich, welcher $\sqrt{\frac{}{1 - \frac{1}{3}\,\overline{\text{Tg. } a}^2}}$ zum Halbmeſſer, und $\frac{1 - \overline{\text{Tg. } a}^2}{1 - \frac{1}{3}\,\overline{\text{Tg. } a}^2}$ zum Coſinus in eben dieſem Kreiſe hat.

Setzt man dieſen Winkel $= 3z$; ſo iſt

$$\text{Cos. } 3z = \frac{1 - \overline{\text{Tg. } a}^2}{(1 - \frac{1}{3}\,\overline{\text{Tg. } a}^2)^{\frac{3}{2}}} \left.\begin{matrix} \\ \\ \end{matrix}\right\} \begin{matrix} \text{für den} \\ \text{Halbm.} \\ = 1. \end{matrix}$$

und $\text{Cos. } y = \text{Cos. } z\,\sqrt{1 - \frac{1}{3}\,\overline{\text{Tg. } a}}$

Man ziehe *ab*, *ad*; ſo verhält ſich

$ae : eb = de : ae$

$= 1 : \text{Tg. } y$

$= \text{Cotg. } y : 1$

Für a = 23 Gr. erhält man nun

$$3z = 25^\circ\ 53'\ 21'',2$$
$$y = 16\ \ 33\ \ 30,7$$

Cotg. $y = 3,3633243 = \frac{ae}{be}$.

Da $1 : \text{Tg. } a = \text{Sin. } y : (1 - \text{Cos. } y)(1 + 2\,\text{Cos. } y)$;

so ist $\text{Sin. } y : \text{Tg. } a = \text{Sin. } y^2 : (1 - \text{Cos. } y)(1 + 2\,\text{Cos. } y)$
$= 1 + \text{Cos. } y : 1 + 2\,\text{Cos. } y$.

$\text{Sin. } y : \frac{1}{2}\,\text{Tg. } a = 1 + \text{Cos. } y : \frac{1}{2} + \text{Cos. } y$

$\text{Sin. } y - \frac{1}{2}\,\text{Tg. } a : \frac{1}{2}\,\text{Tg. } a = \frac{1}{2} : \frac{1}{2} + \text{Cos. } y$

Man ziehe den Durchmesser gh auf den bd senkrecht, nehme $ek = \text{Tg. } a$ für den zur Einheit angenommenen Halbmesser ed, halbire ck in l, cd in r, und ziehe durch l und r die pq mit bd, die sqr mit gh parallel. Es begegne die pq der nf in p; so ist

$$\left.\begin{matrix} nf - cl \\ nf - pf \\ np \end{matrix}\right\} : \left\{\begin{matrix} cl \\ lk \end{matrix}\right\} = \left\{\begin{matrix} cr \\ ql \end{matrix}\right\} : \left\{\begin{matrix} cr + of \\ rf \\ pq \end{matrix}\right.$$

also $np \times pq = ql \times lk$. Demnach liegt der Punkt n auf einer gleichseitigen Hyperbel, deren Asymptoten gh, pq sind, und welche durch den gegebenen Punkt k geht, mithin gegeben ist. Der Punkt n, und daraus ferner das Verhältniß von $ae : eb$ kann also auch mittelst des Durchschnitts einer gleichseitigen Hyperbel und des Kreises $abdg$ gefunden werden.

§. 57. Es ist eine bekannte Erfahrung, daß uns die Sonne und der Mond, wenn sie am Horizont stehen, viel größer zu seyn scheinen, als wenn sie beträchtlich über denselben sich erhoben haben. Die wirkliche Messung zeigt bey der Sonne keinen merklichen Unterschied, wenn man auf den Einfluß der Stralenbrechung Rücksicht nimmt, und der Durchmesser des Monds wird sogar desto größer gefunden, je größer seine Höhe wird. Ein Himmelskörper, welcher eine merkliche Parallaxe hat, muß wirklich einen desto größern scheinbaren Halbmesser haben, je größer seine Höhe ist (§. 49.). Diese Vergrößerung ist bey der Sonne wegen ihrer sehr kleinen Parallaxe nicht merklich, und da sie bey dem Mond merklich wird; so muß er der Erde beträchtlich näher seyn, als die Sonne. Die scheinbare Vergrößerung des Mondes und der Sonne am Horizont ist also ebenfalls eine optische Täuschung. Diese Himmelskörper scheinen uns an der Oberfläche des zusammengedrückten Gewölbes des *Himmels zu stehen*, und wir halten sie daher am

Horizont für entfernter als in der Höhe. Ihre scheinbaren Durchmesser, d. h. die Winkel, unter welchen sie erscheinen, sind in beyden Fällen nahe dieselben. Wir halten sie also am Horizont, wo sie uns weiter entfernt zu seyn scheinen, für größer, als in der Höhe, wo wir sie uns näher glauben. Das Dazwischenliegen mehrerer Gegenstände trägt, wie bey der eingedrückten Gestalt des Himmels, vieles dazu bey, die horizontalen Abstände für größer zu halten als die schiefen, woher es kommt, daß der aufgehende Mond ungewöhnlich groß erscheint, wenn man ihn durch eine lange Straße oder Allee, oder auch hinter einer Reihe weit entfernter Berge erblickt. Betrachtet man ihn durch eine Röhre ohne Gläser; so fällt die Täuschung großen Theils weg, und er erscheint verkleinert.

§. 59. Gewöhnlich erblickt man auf der Sonne einzelne oder mehrere schwarze Flecken, welche alle eine gemeinschaftliche Bewegung vom östlichen Rand der Sonne gegen den westlichen haben. Wenn die Länge der Sonne = 2 Z. 10° ist; so sind die Wege der Flecken miteinander parallele gerade Linien, welche um einen Winkel von $7\frac{1}{2}$ Graden gegen die Ekliptik geneigt sind, und zwar so, daß der auf der Südseite der Ekliptik liegende Theil zuerst beschrieben wird. So wie die Länge der Sonne wächst, fangen die Wege der Flecken an, sich in elliptische Bogen zu krümmen, welche ihre erhabene Seite gegen Norden kehren, und wenn die Länge der Sonne = 5 Z. 10°; so ist die Krümmung am stärksten. Sie nimmt jetzt nach und nach wieder ab, bis die Wege der Sonnenflecken bey einer Länge der Sonne von 8 Z. 10° wieder geradlinigt, und um $7\frac{1}{2}$ Gr. gegen die Ekliptik geneigt erscheinen, wo nun die Bewegung von der Nordseite der Ekliptik in die südliche geschieht. Nun fangen die Wege der Flecken wieder an, sich zu krümmen, und zwar gegen Norden, die Krümmung wird bey einer Länge der Sonne von 11 Z. 10° am stärksten, und nimmt von da an beständig ab, bis die Länge der Sonne wieder = 2 Z. 10° wird. Die Geschwindigkeit mit welcher diese Wege beschrieben werden, ist in der Mitte am

gröſten, an den Rändern der Sonne am kleinſten, und zugleich ſcheinen die Flecken an den Rändern der Sonne ſchmäler, als wenn ſie auf der Mitte ihres Wegs ſind. Die Zeit der Sichtbarkeit eines Sonnenfleckens beträgt gegen 14 Tage, und ungefähr eben ſo lang iſt er unſichtbar, worauf er wiederum aufängt, am öſtlichen Sonnenrande zu erſcheinen. Uebrigens verändern die Sonnenflecken oft ihre Geſtalt in kurzer Zeit, zertheilen ſich in mehrere, oder verſchwinden auch gänzlich. Die Sonne dreht ſich alſo um eine gegen die Ekliptik unter einem Winkel von 82 $\frac{1}{2}$ Gr. geneigte Axe nach derſelben Richtung, nach welcher ſie ihre jährliche Bewegung macht, und die durch ihre Umdrehungsaxe gelegte Ebene ſchneidet die Ekliptik in den Punkten 5 Z. 10° und 11 Z. 10° ſo, daß auf der Seite des letztern Punkts der ſpitze Winkel liegt, unter welchem ihre Umdrehungsaxe gegen die Ebene der Ekliptik geneigt iſt. Die Veränderlichkeit der Sonnenflecken, und zuweilen auch ihre eigene Bewegung auf der Oberfläche der Sonne geſtatten keine ſehr genaue Beſtimmung der Lage ihrer Axe und ihrer Umdrehungszeit. Letztere fällt zwiſchen 25 Tag 10 St. und 25 T. 14 St. Da die Sonne bey der Umdrehung um ihre Axe beſtändig kreisförmig erſcheint; ſo iſt ſie eine Kugel. Man nennt den gröſten Kreis der Sonne, welcher auf ihrer Umdrehungsaxe ſenkrecht iſt, den Sonnenäquator, deſſen Neigung gegen die Ekliptik alſo 7 $\frac{1}{2}$ Gr. beträgt, und deſſen Ebene die Ekliptik in den Punkten 2 Z. 10 Gr. und 8 Z. 10 Gr. durchſchneidet.

§. 59. Die Aufgabe, die Lage der Umdrehungsaxe der Sonne durch die Beobachtung der auf ihrer Oberfläche befindlichen Flecken zu beſtimmen, zerfällt in die zwey folgende. Erſtlich die Punkte beſtimmen, wo die von dem Mittelpunkt der Sonne an ihre Flecken gezogene und verlängerte gerade Linien die Himmelskugel treffen, und zweytens aus drey vom Mittelpunkt der Sonne aus geſehenen (heliocentriſchen) Lagen eines Sonnenfleckens den Punkt beſtimmen, in welchem die verlängerte Umdrehungsaxe der Sonne der Himmelskugel begegnet. In Beziehung auf die erſte dieſer Aufgaben ſey *acbd* (fig. 19.) der Umkreis der Sonne, welcher ihre gegen die Erde gekehrte Hälfte von der *andern trennt*, *c* der Mittelpunkt der Sonne, ab

die Durchschnittslinie der Ebene der Ekliptik und der Oberfläche der Sonne, welche dem Beobachter auf der Erde als eine gerade Linie erscheint. Ferner sey durch den Beobachtungsort und den Mittelpunkt der Sonne eine auf die Ekliptik senkrechte Ebene gelegt, welche der Oberfläche der Sonne in einem gröſten Kreis begegnen, und ebenfalls als eine gerade auf der *ab* senkrechte Linie *ed* erscheinen wird. Man beobachte die scheinbaren Gröſsen der senkrechten Abstände *fh*, *fk* eines Sonnenfleckens *f* von den Durchmessern *ab*, *de*; so ergiebt sich durch Auflösung des bey *h* rechtwinklichten geradlinigten Dreyecks *cfh* die Hypotenuse *cf* und der Winkel *hcf*. Durch die auf der Oberfläche der Sonne liegenden, dem Beobachter aber in der Ebene des Kreises *aebd* zu liegen scheinende Punkte *c* und *f*, *e* und *f* seyen gröſte Kreise gelegt, und letzterer begegne dem gröſten Kreis *ab* in *g*. Der Bogen *cf* wird wiederum als eine gerade Linie erscheinen, welche dem Sinus desselben für den Halbmesser *ca* gleich seyn wird, und man wird mittelst des scheinbaren Halbmessers der Sonne und der aus Beobachtungen gefundenen scheinbaren Gröſse von *cf* das Verhältniſs von *cf* : *ca*, also den Sinus des Bogens *cf* und den Bogen *cf* selbst haben. Und da vermöge der Voraussetzung die Ebene *aebd* auf der vom Auge des Beobachters an den Mittelpunkt der Sonne gezogenen geraden Linie senkrecht steht, so ist der oben gefundene geradlinigte Winkel *hcf* dem Winkel *fcg* des bey *g* rechtwinklichten sphärischen Dreyecks *cfg* gleich, dessen Hypotenuse *cf* ebenfalls gegeben ist. Und nun verhält sich

Sin. tot. : Sin. *fcg* = Sin. *cf* : Sin. *fg*,
Sin. tot. : Cos. *fcg* = Tg. *cf* : Tg. *cg*.

Der Bogen *fg* mißt die heliocentrische Breite des Sonnenfleckens, und der Bogen *cg* den Unterschied der heliocentrischen Länge der Erde und des Sonnenfleckens. Letztere ist der um 180° oder 6 Zeichen vergröſserten Länge der Sonne für den Augenblick der Beobachtung gleich, und man findet also die heliocentrische Länge des Sonnenfleckens, wenn man zu der um 6 Z. vermehrten Sonnenlänge den Bogen *cg* addirt, oder davon abzieht, je nachdem *cg* westlich oder östlich vom Mittelpunkt *c* fällt.

Es seyen nun *f*, *f'*, *f''* (Fig. 20.) die drey Punkte der Himmelskugel, in welchen derselben die von dem Mittelpunkt der Sonne an einen ihrer Flecken gezogenen geraden Linien nach und nach bey der ersten, zweyten und dritten Beobachtung begegneten, und *e* sey der Nordpol der Ekliptik, *p* der Punkt, wo die verlängerte Sonnenaxe auf der Nordseite die Himmelskugel trifft.

Man ziehe die gröſten Kreise *ef*, *ef'*, *ef''*, *pf*, *pf'*, *pf''*, wo die drey letzteren Bogen einander gleich seyn werden. In den Dreyecken *fep*, *f'ep*, *f''ep* kennt man die Unterschiede der heliocentrischen Längen *fef'* = *a*, *fef''* = *a'*, und die Complemente *fe* =

$d, f'o = d'$, $f''o = d''$ der heliocentriſchen Breiten des Sonnenfleckens. Man ſetze $fep = x$, und $ep = y$; ſo iſt in den Dreyecken pef, pef', pef''

1.) Cos. pf = Cos. y Cos. d + Sin. y Sin. d. Cos. x,

2.) Cos. pf' = Cos. y Cos. d' + Sin. y Sin. d' Cos. $(x-a)$,

3.) Cos. pf'' = Cos. y Cos. d'' + Sin. y Sin. d'' Cos. $(x-a')$. Da nun $pf = pf'$; ſo iſt Cos. y (Cos. d - Cos. d') = Sin. y Sin. d' Cos. $(x-a)$ - Sin. y Sin. d Cos. x,

$$\text{Cotg. } y\,(\text{Cos. } d - \text{Cos. } d') = \text{Sin. } d' \text{ Cos. } (x-a) - \text{Sin. } d \text{ Cos. } x$$

$$= \frac{\text{Sin. } d' + \text{Sin. } d}{2}\,(\text{Cos. } (x-a) - \text{Cos. } x)$$

$$+ \frac{\text{Sin. } d' - \text{Sin. } d}{2}\,(\text{Cos. } (x-a) + \text{Cos. } x)$$

$$2\text{Sin. }\frac{d'-d}{2}\,\text{Sin. }\frac{d'+d}{2}\,\text{Cotg. } y = 2\text{Sin. }\frac{d'+d}{2}\,\text{Cos. }\frac{d'-d}{2}\,\text{Sin. }\tfrac{1}{2}a\,\text{Sin. }(x-\tfrac{1}{2}a)$$

$$+ 2\text{Sin. }\frac{d'-d}{2}\,\text{Cos. }\frac{d'+d}{2}\,\text{Cos. }\tfrac{1}{2}a\,\text{Cos. }(x-\tfrac{1}{2}a)$$

$$\text{Cotg. } y = \text{Cotg. }\frac{d'-d}{2}\,\text{Sin. }\tfrac{1}{2}a\,\text{Sin. }(x-\tfrac{1}{2}a) + \text{Cotg. }\frac{d'+d}{2}\,\text{Cos. }\tfrac{1}{2}a\,\text{Cos. }(x-\tfrac{1}{2}a)$$

$$= A\,\text{Sin. } m\,\text{Sin. }(x-\tfrac{1}{2}a) + A\,\text{Cos. } m\,\text{Cos. }(x-\tfrac{1}{2}a),$$

wenn man $A\,\text{Sin. } m = \text{Cotg. }\frac{d'-d}{2}\,\text{Sin. }\tfrac{1}{2}a$

$$A\,\text{Cos. } m = \text{Cotg. }\frac{d'+d}{2}\,\text{Cos. }\tfrac{1}{2}a,$$

folglich $\text{Tg. } m = \text{Tang. }\frac{1}{2}a\,\text{Cotg. }\frac{d'-d}{2}\,\text{Tg. }\frac{d'+d}{2}$

und $A = \dfrac{\text{Cotg. }\frac{d'-d}{2}\,\text{Sin. }\frac{1}{2}a}{\text{Sin. } m}$

$$= \frac{\text{Cotg. }\frac{d'+d}{2}\,\text{Cos. }\frac{1}{2}a}{\text{Cos. } m}$$ ſetzt.

Daher iſt 4.) $\text{Cotang, } y = A\,\text{Cos. }(x - \frac{1}{2}a - m)$

$= A\,\text{Cos. }(x-c)$, wenn $\frac{1}{2}a + m = c$.

Eben ſo erhält man durch die Verbindung der Gleichungen n. 1. und 3, wenn man

$$A'\,\text{Sin. } m' = \text{Cotg. }\frac{d''-d}{2}\,\text{Sin. }\tfrac{1}{2}a'$$

$$A'\,\text{Cos. } m' = \text{Cotg. }\frac{d''+d}{2}\,\text{Cos. }\tfrac{1}{2}a';$$

folglich $\text{Tang. } m' = \text{Tang. }\frac{1}{2}a'\,\text{Cotg. }\frac{d''-d}{2}\,\text{Tg. }\frac{d''+d}{2}$

und $A' = \dfrac{\text{Cotg. }\frac{d''-d}{2}\,\text{Sin. }\frac{1}{2}a'}{\text{Sin. } m}$

$$= \frac{\text{Cotg. }\frac{d''+d}{2}\,\text{Cos. }\frac{1}{2}a'}{\text{Cos. } m'}$$ ſetzt,

5.) Cotang. $y = A'$ Cos. $(x-c')$, wenn $\frac{1}{2}a' + m' = c'$.
Daher iſt Cos. $(x-c)$: Cos. $(x-c') = A' : A$ (n. 4. und 5.)

$= 1 : \frac{A}{A'}$

$= 1 :$ Tg. z, wenn Tg. $z = \frac{A}{A'}$.

Cos. $(x-c)$ + Cos. $(x-c')$: Cos. $(x-c)$ − Cos. $(x-c') = 1 +$ Tg. $z : 1 -$ Tg. z,
oder 6.) Cotg. $\frac{c-c'}{2}$: Tg. $(x - \frac{c+c'}{2}) = 1 :$ Tg. $(45° - z)$.

Da die Winkel m, m' durch ihre Tangenten gegeben ſind; ſo bleibt im Allgemeinen die Wahl zwiſchen dem erſten und dritten Quadranten, wenn die Tangenten poſitiv, und zwiſchen dem zweyten und vierten, wenn ſie negativ ſind. Man beſtimmt hier dieſe Winkel immer ſo, daß Sin. m mit Cotg. $\frac{d'-d}{2}$ Sin. $\frac{1}{2}a$, und Cos. m mit Cotg. $\frac{d'+d}{2}$ Cos. $\frac{1}{2}a$ einerley Zeichen bekommen, mithin in A poſitiv wird. Ebenſo verhält es ſich mit m'. Bey der Berechnung von A gebraucht man denjenigen Ausdruck, welcher Sin. m enthält, wenn $m > 45°$, den andern aber wenn $m < 45°$. Endlich nimmt man bey der Berechnung des Winkels $x - \frac{c+c'}{2}$ immer den ſeiner Tangente entſprechenden ſpitzen Winkel poſitiv oder negativ, je nachdem ſeine Tangente poſitiv oder negativ iſt. Hat man x gefunden, ſo ergiebt ſich y durch n. 4. oder 5, welches aus beyden Gleichungen einerley Werth erhalten muß. Den Abſtand pf des Sonnenflecken vom Pol der Sonne kann man durch n. 1, 2 oder 3 finden, welcher aus jeder dieſer Gleichungen gleich groß herauskommen muß *). Endlich hat man in dem Dreyeck fep

Sin. pf : Sin. ef = Sin. fep : Sin. fpe

woraus ſich der Winkel fpe ergiebt, und eben ſo findet man die Winkel $f'pe, f''pe$. Man kennt alſo auch fpf', fpf'', und da die Zwiſchenzeiten t, t' der Beobachtungen gegeben ſind; ſo erhält man hieraus die Umdrehungszeit, wenn man ſchließt:

$\left.\begin{matrix} fpf' : t \\ fpf'' : t' \end{matrix}\right\} = 360°$: Umdrehungszeit. Hat der Sonnenfleck nahe einen vollen Umlauf, oder darüber gemacht; ſo dienen die Winkel am Pol der Sonne dazu, zu beſtimmen, wie viel noch zu einem vollen Umlauf fehlte, oder wie viel Grade darüber von dem Sonnenflecken durchloffen wurden. Heißt nun der in

*) Die hier gezeigte Methode, aus den Gleichungen, 1, 2 und 3. die unbekannten Winkel x und y zu finden, iſt diejenige, welche H. Prof. Gauß in der Monatl. Correſpondenz zur Beförderung der Erd- und Himmels-Kunde, Oct. 1808. pag. 282 u. f. bey der Auflöſung einer aſtronomiſchen Aufgabe gelehrt hat, die auf der Entwicklung dreyer ähnlichen Gleichungen beruht.

der Zwischenzeit T der Beobachtungen beschriebene Winkel 360° ∓ n.; so verhält sich 360° ∓ n. : 360 = T : Umdrehungszeit.

Nach Lalande (Astronomie. III edit. n. 3260.) waren im Junius 1775 die heliocentrischen Längen und Breiten eines Sonnenfleckens folgende:

Jun. 14.	7	3.	8°	34′	21″	0°	38′	6″	südlich
— 18.	9	5	48	51		7	30	8	—
— 21.	10	19	0	14		11	35	16	—

also $\frac{1}{2}a$ = 28° 37′ 15; d = 90° 38′ 6″
$\frac{1}{2}a'$ = 30 12 56,5; d' = 97 30 8
d'' = 101 35 16.

Hieraus Lg Tg. m = 12,1067424
Lg Tg. m' = 12,0681433.

Da nun Cotg. $\frac{d'+d}{2}$ Cos. $\frac{1}{2}a$ negativ, und Cotg. $\frac{d'-d}{2}$ Sin. $\frac{1}{2}a$ positiv ist; so fällt m in den zweyten Quadranten, und es ist

m = 90° 26′ 53″,14
Eben so m' = 90 29 23,08
Mithin e = 119 4 8,14
c' = 140 42 19,58
$\frac{e-c'}{2}$ = −10 49 5,72
$\frac{e+c'}{2}$ = 129 53 13,86

Lg Tg. z = 9,9982706; z = 44° 53′ 9″,31

Lg Tg. $(x-\frac{e+c'}{2})$ = 8,0171606; $x-\frac{e+c'}{2}$ = −0° 35′ 45″,7

$\frac{e+c'}{2}$ = 129 53 13,9
x = 129 17 28,2
= 43 9 17 28,2
erste Länge des Sonnenfl. = 7 8 34 21
Länge des Nordpols der Sonne = 11 17 51 49,2.

Endlich nach n. 4. und 5. wird γ = $\left\{\begin{matrix}70° 15′ 11″,7\\70 15 11,5\end{matrix}\right\}$ = dem Winkel, unter welchem der Sonnenäquator die Ekliptik schneidet.

Viertes Capitel.

Von den Bewegungen des Monds, seinen Lichtgestalten, und den Finsternissen.

§. 60. Der Mond hat mit der Sonne eine beynahe gleiche scheinbare Größe, und zeichnet sich durch die Veränrung seiner Lichtgestalten (Phases) aus, welche nach bestimmten Perioden wiederkehren, und schon in den ältesten Zeiten zu Unterabtheilungen des Jahrs gedient haben. Wenn der Mond kurz nach Untergang der Sonne in der Abend-Dämmerung sich zeigt; so erscheint er in einer sichelchelförmigen Gestalt erleuchtet, und die Ergänzung der Figur zu einem Kreis hat ein bey heiterem Himmel bemerkbares mattes aschenfarbiges Licht. An dem folgenden Tag wird er später nach der Sonne untergehen, von ihr um ungefähr zwölf Grade, von einem Fixstern aber, bey dem er am ersten Tage befindlich war, um etwas über dreyzehn Grade gegen Morgen fortgerückt seyn, und die Breite seines erleuchteten Theils wird zugenommen haben. Mit jedem Tag wird er um nahe 50 Min. später in den Meridian kommen, sein erleuchteter Theil wird wachsen, und, wenn er Abends um 6 Uhr durch den Meridian geht, mithin sein östlicher Abstand von der Sonne 90° beträgt, die Gestalt eines Halbzirkels angenommen haben, welches das erste Viertel (Quadratura prima) heißt. Von diesem Zeitpunkt an geht die Linie, welche den erleuchteten Theil des Monds von dem übrigen trennt, oder die Lichtgränze, wieder in eine krumme Linie über, welche aber nun ihren erhabenen Theil von der Sonne und dem hellen Rande des Monds abkehrt. Geht der Mond um Mitternacht durch den Meridian; so erscheint als eine ganz erleuchtete Scheibe, und diese Lichtgestalt heißt der Vollmond (Pleniluni-um). Von da an nimmt sein heller Theil nach und nach wieder ab, wie er vorher zugenommen hatte, er erscheint als ein Halbzirkel, wenn er Morgens um 6 Uhr durch den Meridian geht, mithin sein östlicher Abstand von der Sonne 270° und sein westlicher 90° beträgt, welches man das

letzte Viertel (Quadratura ultima) nennt, zeigt ſich ſodann wieder in einer ſichelförmigen Geſtalt, bis er in den Sonnenſtralen verſchwindet, und hierauf mit der Sonne zuſammenkommt, was wir den Neumond (Novilunium) nennen. Der Neumond heißt auch die Zuſammenkunft (Conjunctio), der Vollmond der Gegenſchein (Oppositio), welche mit ☌ und ☍ bezeichnet werden, und den gemeinſchaftlichen Namen Syzygien (Syzygiæ) führen. Zwey bis drey Tage nach dem Neumond zeigt er ſich wieder in der Abend-Dämmerung ſichelförmig, und die erwähnten Erſcheinungen kehren in derſelben Ordnung wieder. Der helle Theil des Mondes iſt beſtändig der Sonne zugekehrt, die Lichtgränze iſt an dem Rand des Mondes ſtärker gekrümmt, als in der Mitte, und ihre Chorde ſteht nahe auf der Ebene der Ekliptik ſenkrecht.

§. 61. Die Zeit zwiſchen zwey zunächſt auf einander folgenden Voll- oder Neumonden heißt ein ſynodiſcher Monat, und dieſer muß ſchon wegen der ungleichförmigen Bewegung der Sonne (§. 40.) von verſchiedener Dauer ſeyn. Man findet aber größere Unterſchiede, als diejenige ſind, welche von der ungleichförmigen Bewegung der Sonne allein herrühren können; folglich muß die Bewegung des Monds ebenfalls ungleichförmig ſeyn. Nimmt man zwey weit von einander entfernte Voll- oder Neumonde, und dividirt die Zwiſchenzeit mit der Anzahl der verfloßenen Monate; ſo heben ſich in der Zwiſchenzeit die Irregularitäten des Sonnen- und Mondslaufs nicht allein gröſtentheils gegeneinander auf, ſondern es wird auch der noch übrig bleibende Theil mit den Beobachtungsfehlern zugleich durch dieſe Diviſion vermindert, und man erhält den ſogenannten mittleren ſynodiſchen Monat, welcher 29 Tage, 12 St. 44 Min. 2,82 Sek. beträgt. Hieraus ergiebt ſich die Umlaufszeit des Monds in Beziehung auf die Aequinoktialpunkte, oder die periodiſche Umlaufszeit mittelſt des bekannten tropiſchen Sonnenjahrs. Man bezeichne das tropiſche Sonnenjahr mit T, die periodiſche und ſynodiſche Umlaufszeiten des Monds aber beziehungsweiſe mit t und

S; so durchlauft der Mond in der Zeit S so viel über 360 Grade, als der in eben dieser Zeit S von der Sonne beschriebene Bogen enthält, welcher also $\frac{360.S}{T}$ Grade beträgt. Man wird daher die Proportion haben

$$\left.\begin{array}{rcl} 360 + \frac{360.S}{T} & : & 360 \\ T + S & : & T \end{array}\right\} = S : t$$

woraus $t = \frac{T.S}{T+S}$ folgt.

Demnach ist, wenn man obigen Werth von S und den §. 42. angegebenen Werth von T gebraucht, die periodische Umlaufszeit des Monds = 27 T. 7 St. 43 Min. 4,68 Sek. Setzt man in obiger Formel die siderische Umlaufszeit der Sonne statt T; so erhält man die Umlaufszeit des Mondes in Beziehung auf die Fixsterne, oder seine siderische Umlaufszeit = 27 T. 7 St. 43 Min. 11,51 Sek.

Eine Periode von zwölf synodischen Monaten macht ein Mondjahr aus, welches demnach 354 T. 8 St. 48 M. 33,84 Sek. beträgt, und um 10 T. 21 St. 0 M. 17,76 Sek. kürzer ist als das tropische Sonnenjahr. Wenn also ein Jahr mit einem Neumond anfängt; so sind im Anfang des nächstfolgenden Jahrs ungefähr 11 Tage von dem nächstvorhergehenden Neumond an verflossen, und die Mondsveränderungen fallen jetzt auf andere Tage des Jahrs. Aber 19 tropische Sonnenjahre machen beynahe 235 synodische Monate; folglich fallen nach Verfluß dieser Periode die Neu- und Vollmonde wieder nahe auf dieselben Tage des Jahrs.

§. 62. Der Mond zeigt in seinen täglichen Bewegungen ähnliche Veränderungen wie die Sonne. Zur Zeit des Vollmonds nimmt er nahe denselben Weg am Himmel, welchen die Sonne ein halbes Jahr vorher genommen hat, und verweilt z. B. um die Zeit des Wintersolstitiums ungefähr eben so lang über dem Horizont, als die Sonne im Sommersolstitium. Im ersten Viertel ist sein Tagbogen

nahe derſelbe, welchen die Sonne ein Vierteljahr nachher beſchreibt, im letzten Viertel kommt er nahe mit demjenigen überein, welchen die Sonne ein Vierteljahr vorher beſchrieben hat. Die Bahn des Monds kann alſo nicht ſehr von der jährlichen Bahn der Sonne oder der Ekliptik verſchieden ſeyn. Eben dieſes wird man auch finden, wenn man auf diejenigen Sterne Achtung giebt, an welchen der Mond nach und nach vorüber geht, oder welche er bedeckt. Sie werden ſämmtlich in der Nähe der Ekliptik ſtehen. Hienach kann man durch eine ganz einfache Rechnung die Zeiten des Auf- und Untergangs des Monds beyläufig finden, wenn man zuerſt die Zeit ſeines Durchgangs durch den Meridian, hernach ſeinen halben Tagbogen mittelſt der in jedem Kalender ſtehenden Länge des Tages ſucht, welche demjenigen Punkt der Ekliptik entſpricht, in deſſen Nähe ſich der Mond befindet. Nun geht der Neumond mit der Sonne zugleich durch den Meridian, und in einem ſynodiſchen Monat iſt die Anzahl der täglichen Umläufe des Monds um eine Einheit kleiner als die Anzahl der verfloßenen Tage; folglich verhält ſich

tägl. Uml. Zeit ☽ : mittl. ☉♉ = 29♉. 12St. 44′ 2″,82 : 28♉. 12 St. 44′ 2″,82,

woraus ſich wie im §. 44. der Ueberſchuß der täglichen Umlaufszeit des Monds über einen mittleren Sonnentag = 50′ 28″, 32872 mittlerer Sonnenzeit ergiebt. Mithin geht der Mond am erſten Tag nach dem Neumond um 0 U. 50½ Min., am zweyten um 1 U. 41 M. am dritten um 2 U. 31½ Min. Nachmittags u. ſ. w. durch den Meridian. Eben ſo kann man vom erſten Viertel, dem Vollmond und dem letzten Viertel an zählen, wenn man ſtatt Mittag beziehungsweiſe 6 Uhr Ab. Mitternacht, und 6 U. Morg. ſetzt. Da ferner der Mond in ungefähr 29½ Tagen einen Umlauf in Beziehung auf die Sonne macht; ſo entfernt er ſich von der Sonne in 5 Tagen um beyläufig 60 Grade, welche die Sonne in zwey Monaten durchlauft. Folglich muß man für jede 4 von dem Neumond an verfloßene Tage 2 Monate rechnen, und dieſe Zeit zu der des Neumondes hinzufügen, um die Zeit zu erhalten, da die Sonne denſelben Weg *an dem Himmel nimmt.* Man nimmt die halbe Ta-

geslänge, welche diesem Zeitpunkt entspricht, addirt sie zur Durchgangszeit des Monds durch den Meridian, und zieht sie davon ab; so hat man die Zeit des Untergangs und Aufgangs des Monds. Zählt man von dem Vollmond an; so gebraucht man statt der Länge des Tags die Nachtlänge, und rechnet wiederum für jede 5 vom Vollmond an verfloßene Tage 2 Monate.

§. 63. Beobachtet man die täglichen Bewegungen des Monds genauer; so findet man, daß seine tägliche Umlaufszeit bald größer, bald kleiner ist als 24 St. 50′ 28″,3, welche bey einer gleichförmigen Bewegung des Monds in dem Aequator Statt finden würde, und daß die Unterschiede öfters über eine Viertelstunde betragen. Indessen kann man dennoch den Stundenwinkel des Monds für eine gegebene Zeit ziemlich genau finden, wenn man mehrere Tage nacheinander die tägliche Umlaufszeit des Monds beobachtet hat, wenn man der durch diese Beobachtungen bestimmten Ungleichförmigkeit dieser Bewegung Rechnung trägt. Demnach wird man über die Parallaxe des Monds ähnliche Untersuchungen anstellen können, wie in §. 47. über die Sonnenparallaxe, welche wenigstens zeigen, daß der Mond der Erde viel näher seyn muß, als die Sonne. Aber ohne das Gesetz der Mondsbewegungen zu kennen, wird man auf diesem Weg die Mondsparallaxe nur durch Vervielfältigung der Beobachtungen mit einiger Genauigkeit bestimmen können.

Die Methode des 48. §. welche zwey Beobachter an sehr von einander entfernten Orten der Erde, die genau oder nahe unter einerley Meridian liegen, erfordert, ist genauer. De la Lande und de la Caille haben dergleichen Beobachtungen, ersterer in Berlin, letzterer auf dem Vorgebürg der guten Hoffnung angestellt, welchen zufolge die mittlere Mondsparallaxe unter dem Aequator 57′ 5″ ist *). Nach den neuesten Untersuchungen von Prof. Bürg **) ist die

*) Astronomie par la Lande. n 1701. Edit. 3.

**) *Man sehe* in den oben S. 64. angeführten öftr. Tafeln feuille k. *pag. 8. und feuille* m *pag.* 1. nach.

mittlere Horizontalparallaxe des Monds unter dem Aequator = 57′ 1″; folglich sein mittlerer Abstand von der Erde = 60,2965 Halbmessern des Erdäquators, und der Halbmesser des Monds erscheint, wenn er am Horizont steht, und die obige Parallaxe hat, unter einem Winkel von 15′ 33″,7.

Da sowohl die Horizontalparallaxe als der scheinbare Halbmesser des Monds umgekehrt dem Abstand des Monds von der Erde proportional sind (§. 49. n. 1. und 5.); so ist die Horizontalparallaxe des Monds seinem scheinbaren Halbmesser proportional, wenn er am Horizont steht, welcher aus dem in einer gegebenen Höhe beobachteten Halbmesser nach §. 49. n. 4. kann gefunden werden, und dieses Mittels könnte man sich bedienen, um die Horizontalparallaxe des Monds, welche er bey einer gewißen Beobachtung hatte, und daraus ferner seine Höhenparallaxe nach §. 49. n. 2. zu berechnen.

Weil, wie man in der Folge sehen wird, die Erde etwas von der Kugelgestalt abweicht; so ist die Horizontalparalaxe des Monds bey gleichen Abständen von der Erde nicht überall gleich groß, und man muß daher bey schärferen Rechnungen darauf Rücksicht nehmen.

§. 64. Die gröste Mittagshöhe des Monds wird man zuweilen um mehr als 5 Grade größer, zuweilen um eben so viel kleiner finden, als die gröste Mittagshöhe der Sonne; folglich fällt die Bahn des Mondes nicht mit der Ekliptik zusammen, wie es den ersten gröberen Beobachtungen zufolge (§. 62.) den Anschein hatte. Beobachtet man ferner die gerade Aufsteigung und Abweichung des Monds in verschiedenen Punkten seiner Bahn, und sucht daraus nach §. 36. n. 1, 2. und 3. seine Länge und Breite; so wird man finden, daß er bald eine nördliche, bald eine südliche Breite hat, und daß die Punkte, in welchen seine Bahn die Ekliptik schneidet, um 180° unter sich, und 90° von denjenigen Punkten entfernt sind, wo er seine gröste nördliche und südliche Breite hat. Seine Bahn könnte also wohl *ein gröster Kreis* seyn, welcher die Ekliptik un-

ter einem Winkel schneidet, der durch die gröste Breite des Monds gemessen wird. Die Lage der Mondsbahn gegen die Ekliptik würde also durch zwey Oerter des Monds gegeben seyn, wenn sie nur nicht gerade einander gegenüber liegen. Man wird die Punkte haben, in welchen die Mondsbahn die Ekliptik schneidet und den Winkel finden, welchen diese zwey Ebenen miteinander machen. Hieraus wird man die Breite des Monds herleiten können, welche den aus andern Beobachtungen der geraden Aufsteigung und Abweichung des Monds abgeleiteten Längen entsprechen, und den aus den letztern allein gefolgerten Breiten gleich seyn müssen, wenn die scheinbare Bahn des Monds wirklich ein gröster Kreis ist. Ueberhaupt wird durch dasselbe Verfahren die Lage der Mondsbahn gegen die Ekliptik bestimmt, und die Hypothese, daß sie ein gröster Kreis sey, geprüft werden können, dessen man sich oben (§. 30. bis 34.) bey der Bestimmung der Lage der Ekliptik gegen den Aequator bedient hat, wenn man Breite statt Abweichung, und Unterschied der Länge statt Unterschied der geraden Aufsteigungen setzt.

§. 65. Die zwey Punkte, in welchen die Bahn des Monds die Ekliptik durchschneidet, heißen die Knoten (nodi), und zwar derjenige, in welchem er sich gegen dem Nordpol der Ekliptik erhebt, der aufsteigende Knoten (nodus ascendens), der andere der niedersteigende Knoten (nodus descendens). Jenen bezeichnet man mit ☊, diesen mit ☋, und die sie verbindende gerade Linie nennt man die Knotenlinie. Diese Punkte sind aber nicht fest am Himmel, wie man leicht ohne genaue astronomische Beobachtungen findet, wenn man auf diejenige in der Nähe der Ekliptik stehende Sterne, z. B. auf den Regulus (α leonis), Achtung giebt, welchen der Mond bey seiner Bewegung begegnet. Nach vier bis fünf Jahren wird man den Mond in einem Abstand von 5° neben denjenigen Sternen vorüber gehen sehen, welche er vorher bedeckte, oder mit welchen er sehr nahe zusammen kam, und er wird nun andern in der Nähe der Ekliptik stehenden Sternen begegnen, deren

Länge

Länge um 80 bis 90 Grade kleiner iſt. Die Mondsknoten bewegen ſich alſo nach einer den eigenen Bewegungen der Sonne oder des Monds entgegengeſetzten Richtung, oder von Morgen gegen Abend. Beſtimmt man die Lage der Knoten nach dem vorhergehenden §. zu verſchiedenen Zeiten genauer; ſo findet man, daß ihre Bewegung nicht gleichförmig, und periodiſchen Veränderungen unterworfen iſt. Durch die Vergleichung weit von einander entfernter Beobachtungen erhält man dieſe Bewegung nicht allein genauer, ſondern es heben ſich auch die periodiſchen Ungleichheiten derſelben zum Theil gegeneinander auf. Auf dieſem Weg hat man gefunden, daß die mittlere Bewegung der Mondsknoten, welche bald größer, bald kleiner iſt als die wahre, aber von Zeit zu Zeit wieder mit der leztern zuſammentrifft, in einem gemeinen Jahr von 365 Tagen 19° 19′ 43″,36 in Beziehung auf die Aequinoktialpunkte, mithin (§. 37.) 19° 20′ 33″,46 in Beziehung auf die Fixſterne beträgt. Demnach iſt die tropiſche Umlaufszeit der Mondsknoten = 6798 T. 4 St. 14 M. 56 Sek. und die ſideriſche = 6793 T. 6 St. 51 M. 39 S. Am erſten Januar 1801 um Mitternacht nach dem Pariſer Meridian war die mittlere Länge des aufſteigenden Mondsknotens = 0 Z. 13° 54′ 21″,2.

Auch die Neigung der Mondsbahn gegen die Ekliptik iſt veränderlich. Im Mittel beträgt ſie 5° 8′ 47″.

Da die Neigung der Mondsbahn veränderlich iſt; ſo wird man ſie durch die Beobachtung der größten Breite des Monds genauer finden, als wenn man nach §. 64. zwey Oerter des Monds zum Grund legt, welches eine unveränderliche Neigung erfordert. Die Länge des Knotens kann man auch dadurch finden, daß man mehrere Längen und Breiten des Monds durch die Beobachtung ſeiner geraden Aufſteigung und Abweichung zu derjenigen Zeit beſtimmt, da er ſich in der Nähe eines ſeiner Knoten befindet. Der Mond wird nemlich durch ſeinen aufſteigenden Knoten gegangen ſeyn, wenn ſeine ſüdliche Breite in eine nördliche übergieng, und *man wird aus* der täglichen Veränderung *ſeiner Länge und Breite durch* Interpolation die Länge für

den, bey welcher seine Breite = o war, welche der Länge des aufsteigenden Knotens gleich seyn wird. Eben so wird man verfahren, wenn sich der Mond in der Nähe seines niedersteigenden Knotens befindet.

§. 66. So wohl die Ungleichheit der Bewegung der Knoten des Monds, als die Veränderung der Neigung seiner Bahn hängen gröstentheils von der Lage der Sonne gegen die Knoten ab. Denn die Ungleichheit der Bewegung der Mondsknoten verschwindet, wenn der Ort der Sonne in einen der zwey Knoten fällt, oder 90° davon entfernt ist. Uebertrifft die Länge der Sonne die des aufsteigenden Knotens um 45°, so ist die wahre Länge des letztern um 1° 30′ 26″ gröſser, als die mittlere, und zugleich die Ungleichheit am gröſten. Sie nimmt jetzt ab; verschwindet bey 90° Abstand der Sonne vom aufsteigenden Knoten, wird sodenn subtraktiv, und am gröſten, wenn die Länge der Sonne die des aufsteigenden Knotens um 135° übertrifft, worauf sie bey 180° Abstand der Sonne vom aufsteigenden Knoten, also wenn sie sich im niedersteigenden Knoten befindet, verschwindet. Von da an kommen die Erscheinungen in derselben Ordnung wieder. Die Beobachtungen zeigen, daſs diese Ungleichheit dem Sinus des doppelten Ueberschuſses der Länge der Sonne über die des aufsteigenden Knotens proportional ist.

Die Veränderung der Neigung ist dem Cosinus eben dieses doppelten Abstands der Sonne vom aufsteigenden Knoten proportional, und steigt bis auf 8′ 47″. Befindet sich die Sonne in einem der Knoten; so ist die Neigung = 5° 17′ 34″, und wenn sie 90° von den Knoten absteht; so beträgt sie nur noch 5°. Sie wird der mittlern Neigung gleich, wenn die Sonne 45° von einem der Knoten entfernt ist.

Man muſs übrigens diese Darstellung der Bewegungen des Monds in der Breite blos als eine geometrische Hypothese betrachten, welcher man sich bey ihrer Berechnung *bedienen kann.* Man kann auch eben so gut die Breite des *Monds suchen*, welche er bey der mittleren Neigung seiner

Bahn und der mittleren Länge ſeines Knotens haben würde, und hernach berechnen, um wie viel dieſe wegen der Ungleichheit der Bewegung der Knoten und der Veränderung der Neigung vermehrt oder vermindert werden müße, um die wahre Breite zu erhalten.

§. 67. Kennt man die Lage der Mondsbahn gegen die Ekliptik; ſo kann man aus der beobachteten Länge des Monds ſeinen Ort in der veränderlichen Ebene ſeiner Bahn finden. Sey nemlich Vl (Fig. 21.) ein Bogen der Ekliptik, V der Punkt der Frühlingsnachtgleiche, N der Ort des aufſteigenden Knotens, und NL die Bahn des Monds, Vl ſeine Länge, lL ſeine Breite; ſo kennt man in dem bey l rechtwinklichten ſphäriſchen Dreyeck NlL den Bogen Nl = dem Ueberſchuß der Länge des Monds über die Länge des aufſteigenden Knotens, und die Neigung LNl der Mondsbahn, woraus man den Bogen NL berechnen kann. Addirt man zu NL die Länge VN des aufſteigenden Knotens; ſo hat man die ſogenannte Länge des Monds in ſeiner Bahn. In eben dieſem Dreyeck kann man aus Nl und dem Winkel N die Breite Ll finden, welche mit der beobachteten übereinſtimmen muß, wenn die Lage der Bahn richtig beſtimmt iſt.

Es verhält ſich Tg. NL : Tg. Nl = Sin. tot. : Cos. LNl
und Sin. tot. : Sin. Nl = Tg. LNl : Tang. Ll.

Setzt man zur Abkürzung $NL = l$, $Nl = l'$, und die Neigung $LNl = i$; ſo iſt für den Halbmeſſer 1

$$\text{Tg. } l = \frac{\text{Tg. } l'}{\text{Cos. } i}$$

$$\text{Tg. } l - \text{Tg } l' = \frac{\text{Tg. } l'}{\text{Cos. } i} - \text{Tg. } l' = \frac{2\,\text{Sin.}\,\frac{1}{2}i^2\ \text{Tg. } l'}{\text{Cos. } i}$$

$$\text{Tg. } l\ \text{Tg. } l' = \frac{\text{Tg. } l'^2}{\text{Cos. } i}$$

$$\text{alſo Tg. } (l - l') = \frac{2\,\text{Sin.}\,\frac{1}{2}i^2\ \text{Tang. } l'}{\text{Cos. } i + \text{Tg. } l'^2}$$

$$= \frac{2\,\text{Sin.}\,\frac{1}{2}i^2\ \text{Sin. } l'\ \text{Cos. } l'}{\text{Cos. } i\ \text{Cos. } l'^2 + \text{Sin. } l'^2}$$

$$= \frac{2\,\overline{\text{Sin.}\,\tfrac{1}{2}i}^{2}\ \text{Sin.}\,2l'}{1+\text{Cos.}\,i-(1-\text{Cos.}\,i)\,\text{Cos.}\,2l'}$$

$$= \frac{\overline{\text{Tg.}\,\tfrac{1}{2}i}^{2}\ \text{Sin.}\,2l'}{1-\overline{\text{Tg.}\,\tfrac{1}{2}i}^{2}\ \text{Cos.}\,2l'}$$

woraus man durch Auflösung in eine Reihe erhält

$$l-l' = \frac{\overline{\text{Tg.}\,\tfrac{1}{2}i}^{2}}{\text{Sin.}\,1''}\,\text{Sin.}\,2l' + \tfrac{1}{2}\frac{\overline{\text{Tg.}\,\tfrac{1}{2}i}^{4}}{\text{Sin.}\,1''}\,\text{Sin.}\,4l' + \tfrac{1}{3}\frac{\overline{\text{Tg.}\,\tfrac{1}{2}i}^{6}}{\text{Sin.}\,1''}\,\text{Sin.}\,6l' + \&c.$$

und eben so findet sich

$$\text{Tang.}\,(l-l') = \frac{\overline{\text{Tg.}\,\tfrac{1}{2}i}^{2}\ \text{Sin.}\,2l}{1+\overline{\text{Tg.}\,\tfrac{1}{2}i}^{2}\ \text{Cos.}\,2l}$$

$$l-l' = \frac{\overline{\text{Tg.}\,\tfrac{1}{2}i}^{2}}{\text{Sin.}\,1''}\,\text{Sin.}\,2l - \tfrac{1}{2}\frac{\overline{\text{Tg.}\,\tfrac{1}{2}i}^{4}}{\text{Sin.}\,1''}\,\text{Sin.}\,4l + \tfrac{1}{3}\frac{\overline{\text{Tg.}\,\tfrac{1}{2}i}^{6}}{\text{Sin.}\,1''}\,\text{Sin.}\,6l - \&c.$$

Diese Ausdrücke geben den Unterschied zwischen der Länge in der Bahn und der Länge in der Ekliptik, welchen man die **Reduktion auf die Ekliptik** nennt.

Ist die Länge in der Bahn gegeben; so findet man das sogenannte **Argument der Breite** (argumentum latitudinis) $\left\{\begin{smallmatrix} NL \\ l \end{smallmatrix}\right\}$ = Länge in der Bahn — Länge des aufst. Knotens, und hieraus

$$\text{Sin.}\,Ll = \text{Sin.}\,l\,\text{Sin.}\,i$$

§. 68. Die Bewegung des Monds in seiner Bahn ist sehr ungleichförmig, und der jährlichen Bewegung der Sonne in so fern ähnlich, als seine gröste und kleinste Winkelgeschwindigkeit in diejenigen Punkte seiner Bahn fällt, wo sein scheinbarer Halbmesser am gröstem und kleinsten, mithin sein Abstand von der Erde am kleinsten und gröstem ist. Man nennt diese Punkte, wie bey der Sonne, die **Erdnähe** und **Erdferne** des Monds, und die sie verbindende gerade Linie die **Apsidenlinie**. Von der Erdnähe an nimmt seine Winkelgeschwindigkeit, und sein scheinbarer Halbmesser bis zu der Erdferne ab, und von da an bis zu der Erdnähe eben so wieder zu, wie sie vorher abgenommen hatten. Mithin wird seine Bahn durch die Apsidenlinie in zwey gleiche und ähnliche Theile getheilt, so daß *diese ungleichförmige* Bewegung des Monds auf ähnliche *Art, wie die der* Sonne im Allgemeinen durch eine excen-

trische Kreisbewegung dargestellt werden kann (§. 40.). Wiederholt man nach einiger Zeit die Beobachtungen über die gröste und kleinste Winkelgeschwindigkeit des Monds; so wird man finden, daß die Punkte seiner Erdnähe und Erdferne nach eben der Richtung in seiner Bahn fortgerückt sind, nach welcher seine Bewegung geschieht. Die Apsidenlinie des Monds hat also eine eigene vorwarts gehende Bewegung, welche in einem gemeinen Jahr von 365 Tagen 40° 39′ 45″,79 in Beziehung auf die Aequinoktialpunkte, und 40° 38′ 55″,69 in Beziehung auf die Fixsterne beträgt. Hienach ist die tropische Umlaufszeit der Apsidenlinie des Monds = 3231 T. 11 St. 4 M. 7,3 S. und die siderische = 3232 T. 13 St. 37 M. 14,6 S. Am ersten Januar 1801 um Mitternacht war die Länge der Erdnähe des Monds in seiner Bahn = 8 Z. 26° 6′ 46″,4.

§. 69. Der Mond zeigt aber in seinen Bewegungen noch andere Ungleichheiten, welche nicht von seiner Lage gegen die Apsidenlinie abhängen, sondern offenbare Beziehungen auf die Lage der Sonne haben. Die beträchtlichste ist diejenige, welche die Evektion (Evectio) heißt, und zuerst bemerkt worden ist. Sie kann sich auf 1° 20′ 29″,5 belaufen, ist dem Sinus des Ueberschußes des doppelten Abstands des Monds von der Sonne über den Abstand des Monds von seiner Erdnähe proportional, und additiv oder subtraktiv, je nachdem dieser Sinus positiv oder negativ ist. In den Syzygien hängt also diese Ungleichheit von dem Abstand des Monds von seiner Erdnähe allein ab, und vermengt sich mit der §. 68. bemerkten Ungleichheit seiner Bewegung. Mithin wird die letztere Ungleichheit, wenn man nur die Beobachtungen der Neu- und Vollmonde bey ihrer Bestimmung gebraucht, um die Evektion zu klein gefunden.

Ferner beobachtet man eine Ungleichheit in der Mondsbewegung, welche in den Syzygien und Quadraturen verschwindet, und ihren gröstn Werth von 35′ 41″,7 erhält, wenn der Mond 45° von einem dieser Punkte absteht, oder sich in den Oktanten befindet, woraus man geschlossen hat, daß sie dem Sinus des doppelten Abstands des Mon[illegible] von *der Sonne proportional* sey. Diese Ungleichheit, [illegible]

che die Variation (Variatio) heißt, hat mit dem Sinus, von welchem sie abhängt, einerley Zeichen, und konnte, da sie in den Syzygien verschwindet, durch die Beobachtungen der Neu- und Vollmonde nicht entdekt werden.

Endlich beschleunigt sich die Bewegung des Monds, wenn die der Sonne sich verzögert, und umgekehrt, woraus eine unter dem Namen der jährlichen Gleichung (Aequatio annua) bekannte Ungleichheit entsteht, welche mit der jährlichen Ungleichheit der Bewegung der Sonne genau einerley Gesetz befolgt, und das entgegengesetzte Zeichen von jener hat. Ihr gröster Werth beträgt 11′ 7″,8.

Man sieht leicht ein, daß eine lange Reihe von Beobachtungen dazu erfordert wurde, alle diese Ungleichheiten der Mondsbewegungen zu entdecken, sie von einander abzusondern, und das Gesetz zu bestimmen, nach welchem sich jede derselben richtet. Genauere Beobachtungen zeigen noch eine Menge kleiner Ungleichheiten, deren Gesetz man allein durch die Theorie der Bewegungen der Himmelskörper ausfindig machen konnte, von welcher in der sogenannten physischen Astronomie die Rede seyn wird.

§. 70. Die Vergleichung der neueren Beobachtungen mit den alten beweißt eine Beschleunigung in der mittleren Bewegung des Monds, welche mit der Zeit beträchtlich werden wird. Die wegen dieser Beschleunigung erforderliche Verbesserung der mittleren Länge des Monds nennt man, weil sie erst nach Jahrhunderten merklich wird, die Seculargleichung des Monds, welche den Beobachtungen zufolge nahe dem Quadrat der Zeit proportional wächst. La Place aber hat gezeigt, daß auch diese Ungleichheit periodisch, mithin die mittlere Bewegung des Monds constant ist. Aehnlichen Seculargleichungen sind die mittleren Bewegungen der Knoten und der Apsidenlinie unterworfen, deren Bewegungen sich verzögern, indem die des Monds sich beschleunigt. Wenn i die Anzahl der von 1700 an verflossenen Jahrhunderte bezeichnet; so ist die Seculargleichung *für die* mittlere Länge des Monds $= +\ 10'',18\ 6{:}1268\ i^2 + 0'',018538440\,8\ i^3$, welcher Ausdruck zwar nur eine

Näherung, aber für 2000 Jahre vor und nach 1700 hinreichend genau iſt. Die Seculargleichungen der mittleren Länge des Monds, ſeiner Erdnähe und ſeines Knotens verhalten ſich wie die Zahlen 1; 3,00052; 0,735452, und alſo ſind die zwey letztern durch die erſte gegeben.

Am erſten Januar 1801 um Mitternacht war nach den S. 64. angeführten aſtronomiſchen Tafeln die mittlere Länge des Monds in ſeiner Bahn = 3 Z. 21° 36′ 30″,6, zu welcher man die Seculargleichung 10″,2 addiren muß. Zu der §. 65. angegebenen Länge des aufſteigenden Knotens muß man, weil ſeine retrograde Bewegung ſich verzögert, 7″,5 addiren, und von der §. 68. angegebenen Länge der Erdnähe 30″,6 abziehen.

Nach eben dieſen Tafeln war am 25. Jan. 1800 um 11 U. 0 M. 22,4 S. Vormittags die mittlere Länge der Sonne der mittleren Länge des Monds gleich, nemlich = 10 Z. 4° 29′ 59″,7, und am 2. Dec. 1880 um 1 U. 7 M. 51,9 S. nach Mitternacht wird ſo wohl die mittlere Länge der Sonne als die des Monds = 8 Z. 11° 14′ 26″,3 ſeyn. Die Zwiſchenzeit beträgt, weil 26 Schalttage in dieſe Periode fallen, 29530 Tage 14 St. 7 M. 29,5 S. und iſt 1000 ſynodiſchen Monaten gleich. Mithin iſt der eigentliche mittlere ſynodiſche Monat = 29 T. 12 St. 44 M. 2,8495 Sek. Bringt man aber die Seculargleichung, und zugleich noch eine andere, welche eine Periode von 185 Jahren hat, in Rechnung; ſo iſt die Länge des Monds zur Zeit des erſteren der oben angegebenen mittleren Neumonde um 11″,7, und zur Zeit des zweyten um 26″,1 größer; folglich tritt der erſte dieſer Neumonde um 23″,03 der zweyte um 51″,36 früher ein, die Periode wird um 28″,33, und ein ſynodiſcher Monat um 0″,0283 kürzer, deſſen mittlere Dauer alſo in dieſem Jahrhundert = 29 T. 12 St. 44 M. 2,8212 Sek. iſt.

§. 71. Der Mond erſcheint uns zwar als eine platte Scheibe, aber die §. 60. angeführte Veränderungen ſeiner Lichtgeſtalten zeigen, daß ſeine Oberfläche nicht eben ſeyn kann. Dieſe Erſcheinungen beweiſen offenbar, daß der Mond kein ſelbſtleuchtender Körper iſt, ſondern ſein Licht von der Sonne empfängt. Wäre ſeine uns zugekehrte Oberfläche eben; ſo müßte ſie auf einmal ganz von der Sonne beleuchtet werden, welches nur nach und nach geſchiehet. Die Sonne beleuchtet den ihr zugekehrten Theil des Monds, und wir ſehen dieſen beleuchteten Theil ganz, wenn er zugleich gegen die Erde gekehrt iſt, welches Statt

findet, wenn die Sonne 180° Grad von dem Mond absteht. In den übrigen Stellungen sehen wir auch einen Theil der dunkeln Seite, und da die Lichtgränze nicht als ein Kreisbogen, sondern als ein an den Rändern des Monds stärker als in der Mitte gekrümmter elliptischer Bogen, und nur in den Quadraturen als eine gerade Linie erscheint; so muß seine uns zugekehrte Oberfläche nahe kugelförmig seyn. Unter dieser Voraussetzung ist die Lichtgränze ein Kreis, dessen Ebene auf der von der Sonne nach dem Mittelpunkt des Monds gezogenen geraden Linie senkrecht ist, welcher dem auf der Erde befindlichen Beobachter nur zur Zeit des Vollmonds, wo die Gesichtslinie ebenfalls nahe auf der Ebene dieses Kreises senkrecht steht, als ein Kreis, in den Quadraturen als eine gerade Linie, und in den übrigen Lagen des Monds als eine Ellipse erscheint. Es sey *E* (Fig. 22.) der Mittelpunkt der Erde, 1; 2; 3; 4 die Bahn des Monds um die Erde, welche mit der Sonne *S* beynahe in einer Ebene liegt. Die Lichtgränze *ab* ist ein Kreis, dessen Ebene auf der die Mittelpunkte der Sonne und des Monds verbindenden geraden Linie *Se* senkrecht ist, und ein gröster Kreis *cd* der Mondskugel, dessen Ebene auf der von dem Mittelpunkt der Erde *E* an den Mittelpunkt *e* des Monds gezogenen geraden Linie senkrecht steht, wird den gegen die Erde gekehrten Theil der Oberfläche des Monds von dem übrigen trennen. Befindet sich der Mond in r. 1. auf der geraden Linie zwischen *S* und *E*; so wird die Nachtseite des Monds ganz gegen die Erde gekehrt seyn, und man wird vor der Sonne eine dunkle Scheibe erblicken, welches bey einer sogenannten Sonnenfinsterniß Statt findet. Hat aber der Mond zu dieser Zeit eine nördliche oder südliche Breite, welche gröser ist, als die Summe der scheinbaren Halbmesser der Sonne und des Monds; so wird der Mond oberhalb oder unterhalb der Sonne vorübergehen. Steht der Mond in n 2., wo die Linien *Se*, *Ee* am Mittelpunkt *e* des Monds einen rechten Winkel miteinander machen; so fällt die Gesichtslinie *Ee* in die Ebene der Lichtgränze *ab*, diese erscheint also als ein Durchmesser des Monds, und man *sieht, wenn der Mond* nach der Richtung 1; 2; 3; 4 um die

Erde lauft, das erste Viertel. Zu dieser Zeit ist die Elongation des Monds von der Sonne dem Winkel *SEe* gleich, welcher um den Winkel *ESe* kleiner ist als ein rechter. Es verhält sich aber *SE* : *Ee* im Mittel wie 388,75 : 1 (§. 50. und 63.), und daher ist der Winkel *ESe* zur Zeit der Quadraturen = 8′ 50″,6, und *SEe* = 89° 51′ 9″,4. Mithin hat der Mond noch um diesen Bogen sich von der Sonne weiter zu entfernen, wozu er beyläufig 17½ Min. gebraucht, in welcher Zeit die Veränderung seiner Lichtgestalt kaum merklich ist. Folglich wird er bey 90° Elongation von der Sonne noch sehr nahe halb erleuchtet erscheinen. Eben so verhält es sich in dem Punkt n. 4., wo der Winkel *EeS* = 90° ist, und das letzte Viertel eintritt. Steht der Mond in n. 3. mit der Erde und der Sonne in einer geraden Linie; so fällt der Schatten, welchen die Erde als ein dunkler Körper wirft, auf den Mond, und verursacht eine Mondsfinsterniß, wie hernach wird gezeigt werden. Ist aber die Breite des Monds größer, als die Summe der Halbmesser des Monds und des Erdschattens; so geht der Mond unverfinstert vorüber, und man sieht seine ganze gegen die Erde gekehrte Seite beleuchtet. Beträgt die Elongation des Monds von der Sonne weniger als 89° 51′ 9″, wie in n. 5.; so ist der gegen die Sonne gekehrte Theil *ac* seiner uns sichtbaren Hälfte *cad* beleuchtet. Und da so wohl *aev* als *ceE* = 90°; so ist *aec* = *Eev* = *SEe* + *ESe*, wo in der hier betrachteten Lage der Winkel *ESe* < 8′ 50″, also nahe *aec* = der Elongation *SEe* des Monds von der Sonne ist. Man ziehe *af* auf *Ee* senkrecht; so verhält sich der Abstand der Lichtgränze von dem Mittelpunkt des Monds zu seinem Halbmesser, wie *af* : *ae*, d. i. wie der Cosinus der Elongation des Monds von der Sonne zum Sinus totus. Steht endlich der Mond in n. 6., wo seine Elongation von der Sonne mehr als 90° beträgt, so fällt die Lichtgränze *a* zwischen den Mittelpunkt des Monds und seinen dunkeln Rand *d*, wie sich auch aus obiger Regel ergiebt, weil jetzt der Cosinus der Elongation negativ wird, und man sieht leicht daß zwischen n. 3. und 4. die Erscheinungen der *Lichtgestalten* denen zwischen n. 2. und 3., so

wie die zwischen n. 4. und 1. denen zwischen n. 1. und 2. ähnlich sind.

Hienach kann man für jede gegebene Elongation des Monds seine Lichtgestalt verzeichnen, wenn man mit einem beliebigen Halbmesser einen Kreis *odwe* (Fig. 23.) beschreibt, zwey Durchmesser *wo*, *de* desselben auf einander senkrecht zieht, von dem Punkt *w* an, den man als den westlichen Mondrand betrachtet, den Bogen *wa* der Elongation des Monds von der Sonne gleich nimmt, *af* auf *wo* senkrecht zieht, und um *de* als große Axe eine halbe Ellipse durch den Punkt *f* beschreibt, deren halbe kleine Axe der *cf* gleich ist. Die Uebereinstimmung der nach dieser Regel bestimmten Lichtgestalten des Monds mit den §. 60. angeführten Erscheinungen zeigt, daß die uns zugekehrte Oberfläche des Monds nahe sphärisch ist.

§. 72. Wegen der Neigung der Mondsbahn gegen die Ekliptik erfordert die genauere Bestimmung der Mondsphasen noch folgende Betrachtungen. Die gerade Linie, welche die Mittelpunkte der Erde und des Monds miteinander verbindet, ist gegen die Ekliptik um einen Winkel geneigt, dessen Maas die Breite des Monds ist, und der Neigungswinkel der von dem Mittelpunkt des Monds an den Mittelpunkt der Sonne gezogenen geraden Linie ist der von der Sonne aus gesehenen Breite des Monds gleich, welcher übrigens unbeträchtlich ist, da vermöge des vorhergehenden §. der Halbmesser der Mondsbahn von der Sonne aus gesehen nur unter einem Winkel von etwa 9 Min. erscheint. Demnach kann letztere Linie als in der Ekliptik liegend angenommen werden, und alsdenn ist, wenn *VS* (Fig. 21.) die Länge der Sonne, *Vl* die Länge des Monds, und *Ll* seine Breite ist, der Bogen *SL* eines größten durch die Sonne und den Mond gelegten Kreises der Abstand des Monds von der Sonne. In dem sphärischen Dreyeck *SLl* verhält sich nun

Sin. tot. : Cos. *Ll* = Cos. *Sl* : Cos. *SL*

wodurch man mittelst des Ueberschußes *Sl* der in der Ekliptik gerechneten Länge des Monds über die der Sonne und der Mondsbreite den Bogen *SL* findet. Zu diesem muß man noch den Winkel *ESe* (Fig. 22.) hinzufügen, welcher nahe

$$= (8'50'',6)\,\frac{\text{Sin. } SEe}{\text{Sin. tot.}} \text{ ist, weil}$$

Se : *Ee* = Sin. *SEe* : Sin. *ESe*

also nahe $ES_e = \frac{E_e}{S_e \text{ Sin. } 1''} \text{ Sin. } SE_e$

beynahe $= \frac{E_e}{SE \text{ Sin. } 1''} \text{ Sin. } SE_e$ ist.

Man setze die Länge der Sonne $= \odot$, die Länge des Monds $\mathfrak{D}$, seine Breite $= b$, und $SL = E$; so ist

$$\text{Cos. } E = \frac{\text{Cos. } (\mathfrak{D} - \odot) \text{ Cos. } b}{\text{Sin. tot.}}$$

und die halbe kleine Axe der elliptischen Lichtgränze verhält sich zu ihrer halben großen Axe oder dem Halbmesser des Monds wie $\text{Cos.} \left(E + (8'50'',6) \frac{\text{Sin. } (\mathfrak{D} - \odot)}{\text{Sin. tot.}} \right) : \text{Sin. tot.}$ Wenn der Ueberschuß der Länge des Monds über die Länge der Sonne $= \left\{ \begin{matrix} 90^\circ \\ 270 \end{matrix} \right\}$ ist; so wird dieses Verhältniß dem von Sin. 8'50'',6 : Sin. tot. gleich, und die kleine Axe der Ellipse erscheint, wenn der Mond in seinem mittleren Abstand von der Erde, mithin sein scheinbarer Halbmesser $= 15'33'',7$ ist, unter einem Winkel von 2'',4, so daß die Krümmung der Lichtgränze kaum bemerkbar ist.

In den Syzygien verhält sich die halbe kleine Axe zur halben großen Axe wie Cos. b : Sin. tot., weil $E = b$ wird. Daher erscheint, wenn der Mond in seiner mittleren Distanz von der Erde, und seine Breite $= 5^\circ 17' \frac{1}{2}$, also am größten ist, die erstere unter einem Winkel von 15'29'',7, welcher um 4 Sekunden kleiner ist, als der scheinbare Halbmesser des Monds, und es wird, je nachdem die Mondsbreite nördlich oder südlich ist, selbst im Neumond ein kleiner Theil seiner beleuchteten Hälfte, dessen Breite höchstens 4 Sekunden beträgt, an dem südlichen oder nördlichen Rande auf die der Erde zugekehrte Seite fallen, aber diese sehr schmale sichelförmige Gestalt nicht wohl bemerkbar seyn. Im Vollmond hingegen wird ein kleiner Theil des nördlichen oder südlichen Randes dunkel seyn, je nachdem die Breite des Monds südlich oder nördlich ist. Wenn nemlich (Fig. 24.) SEV die Ekliptik, die Erde in E, und der Mond in L ist; so ist der auf LE senkrechte Kreis cd der Mondskugel um den Winkel LVE gegen die Ekliptik geneigt, welcher die Breite LEV des Monds zu einem rechten Winkel ergänzt, und weil die von L nach der Sonne gezogene LS' nahe mit der Ebene der Ekliptik parallel ist; so steht die Ebene der Lichtgränze ab auf der Ekliptik senkrecht. Man ziehe bf auf LE senkrecht; so ist bf die halbe kleine Axe der Lichtgränze, und wenn sich die Sonne auf der Seite S' befindet, ein kleiner Theil des südlichen Randes dunkel, hingegen erleuchtet, wenn sie auf der Seite S'' steht. Umgekehrt verhält es sich bey einer südlichen Breite des Monds.

Um endlich noch die Lage der elliptischen Gränze der Beleuchtung gegen den durch den Mittelpunkt des Monds gelegten Breitenkreis zu bestimmen, sey *olwk* (Fig. 25.) der kreisförmige Umfang des Monds, dessen Ebene folglich auf der von dem Mittelpunkt der Erde an den des Monds gezogenen geraden Linie senkrecht steht, und um das Complement der Mondsbreite gegen die Ebene der Ekliptik geneigt ist. Der durch den Mittelpunkt *c* des Monds gelegte Breitenkreis sey *lk*, welcher dem Beobachter als eine gerade Linie erscheint, und *dfef'* sey die Lichtgränze, *dfe* ihre sichtbare, *df'e* ihre unsichtbare Hälfte. Da so wohl die Ebene der letztern, als die des Breitenkreises auf der Ebene der Ekliptik senkrecht sind; so steht ihre gemeinschaftliche Durchschnittslinie *ab*, welche hier scheinbar mit dem Breitenkreis zusammenfällt, auf der Ebene der Ekliptik senkrecht (XI. 19.). Da ferner die von dem Mittelpunkt der Erde an den des Monds gezogene gerade Linie auf der Ebene *olwk* senkrecht ist; so steht der Breitenkreis *lk* ebenfalls auf dieser Ebene senkrecht (XI. 18.). Mithin ist das sphärische Dreyeck *adl*, dessen Seiten *la* und *ad* bey der in der Figur vorausgesetzten nördlichen Mondsbreite in die von der Erde abgekehrte Hälfte des Monds fallen, bey *l* rechtwinklicht, seine Seite *la* ist der Breite des Monds, und der Winkel *lda* oder *fdw* ist dem Winkel an dem Mittelpunkt des Monds gleich, unter welchem die von der Erde an den Mond gezogene gerade Linie die Verlängerung der geraden Linie schneidet, welche die Mittelpunkte der Sonne und des Monds miteinander verbindet, also $=$
$E+(8'50'',6)\frac{\text{Sin.}(☽-⊙)}{\text{Sin. tot.}}$. Endlich ergänzt der Winkel *lad* den Winkel
$☽-⊙+(8'50'',6)\frac{\text{Sin.}(☽-⊙)}{\text{Sin. tot.}}$ zu einem rechten. Man wird also den Bogen *dl* mittelst einer der zwey Proportionen erhalten

Sin. tot. : Cotg. *lda* = Tg. *al* : Sin. *dl*
Sin. tot. : Tg. *dal* = Sin. *al* : Tg. *dl*.

Nach der letztern ist $\text{Tg. } dl = \frac{\text{Sin. } al \text{ Tg. } dal}{\text{Sin. tot.}}$

$$= \frac{\text{Sin. } b}{\text{Sin. tot.}} \text{ Cotg. } \left(☽-⊙+(8'50'',6)\frac{\text{Sin.}(☽-⊙)}{\text{Sin. tot.}}\right)$$

$$\text{nahe} = \frac{\text{Sin. } b \text{ Cotg. } (☽-⊙)}{\text{Sin. tot.}}$$

Demnach ist in den Quadraturen die Chorde der Lichtgränze auf der Ebene der Ekliptik senkrecht, in den Oktanten ist ihr Winkel mit dem durch den Mond gehenden Breitenkreis nahe der Mondsbreite gleich, und zwey Tage vor oder nach dem Neumond kann er bis auf 12 Grade sich belaufen. In der Nähe des Vollmonds ist ohne wirkliche Messungen die Lage der Chorde

der Lichtgränze nicht bemerkbar. Folglich steht wenigstens alsdenn, wo man den Mond theils bequem beobachten, theils ohne wirkliche Messungen die Abweichung seiner Lichtgestalt von einem Kreis bemerken kann, jene Chorde nahe auf der Ekliptik senkrecht, übereinstimmend mit den §. 60. angeführten Erfahrungen.

Wollte man noch darauf Rücksicht nehmen, daß der Beobachter nicht in den Mittelpunkt der Erde, sondern auf ihrer Oberfläche sich befindet; so müßte man statt der vom Mittelpunkt der Erde aus gesehenen Länge und Breite des Monds seine scheinbare von dem Beobachtungsort gesehene Länge und Breite setzen. Aber diese von der Mondsparallaxe herrührenden Unterschiede werden nicht sehr merklich seyn.

§. 73. In dem Dreyeck *ESe* (Fig. 22.), an dessen Spitzen sich die Erde, die Sonne und der Mond befinden, ist, wenn der Mond halb erleuchtet erscheint, der Winkel *e* an dem Mond ein rechter. Hierauf gründet sich Aristarchs Methode, das Verhältniß der Abstände der Sonne und des Monds von der Erde zu finden. Man beobachtet in dem Augenblick, da die Lichtgränze gerade erscheint, den scheinbaren Abstand des Monds von der Sonne, oder den Winkel *SEe* (n. 2.). Alsdenn ist der Winkel *e* an dem Mond ein rechter, und da auch der Winkel *E* gegeben ist; so ist das Verhältniß von *SE* : *Ee* gegeben, welches dem Verhältniß des Sinus totus zu dem Cosinus des beobachteten Winkels *SEe*, oder der Sekante eben dieses Winkels zum Sinus totus gleich ist. Diese sehr einfache Methode ist zwar wegen der Schwierigkeit, den Augenblick genau anzugeben, da die Lichtgränze als eine gerade Linie erscheint, wenig genau, aber man verdankt ihr die erste richtigere Begriffe von der sehr großen Entfernung der Sonne von der Erde. Man findet nemlich immer den Winkel an der Erde in dem Augenblick, da der Mond halb erleuchtet erscheint, nahe einem rechten gleich. Nach der Angabe einiger älteren Astronomen ist er = 89° 30′, oder 89° 45′; folglich wäre nach der ersteren der Abstand der Sonne von der Erde 114,59, nach der zweyten 229,18 mal größer, als der Abstand des Monds von der Erde. Diese Winkel sind aber noch beträchtlich zu klein, weil in den mittle-

ren Abständen der Winkel an der Erde 89° 51' 9",4 ist (§. 71.)

§. 74. Von dem Mond aus gesehen muß die Erde Veränderungen in ihren Lichtgestalten zeigen, welche denjenigen ganz ähnlich sind, die wir an dem Mond bemerken. Zur Zeit des Neumonds (Fig. 22. n. 1.) ist die ganze erleuchtete Hälfte *ADB* der Erde gegen der Nachtseite des Monds gekehrt, und umgekehrt verhält es sich zur Zeit des Vollmonds n. 3, wo die Nachtseite der Erde gegen die beleuchtete Hälfte des Monds gekehrt ist. Zwischen dem Neumond und dem ersten Viertel in n. 5. fällt, wenn man *DC* auf *Ee* senkrecht zieht, der Bogen *AC* der Nachtseite der Erde in die dem Mond zugekehrte Hälfte *DAC* ihrer Oberfläche, welcher den Winkel *AEC* oder den ihm gleichen *SEe* mißt. Man ziehe *AF* auf *Ee* senkrecht; so ist *AF* die halbe kleine Axe der elliptischen Lichtgränze der Erde, und da *ES*, *Se*, mithin auch *AB* und *ab* beynahe einander parallel sind (§. 71.); so ist das Axenverhältniß der Lichtgränze des Monds und der Erde nahe dasselbe. Aber von dem Mond ist ein eben so großer Theil *ad* dunkel, als der beleuchtete *AD* der Erde beträgt. Die gleichzeitigen Lichtgestalten des Monds und der Erde sind also einander gerade entgegengesetzt, und wenn der Mond zunimmt; so nimmt vom Mond aus gesehen die Lichtgestalt der Erde ab, und umgekehrt. So wie nun der Mond unsere Nächte beleuchtet, eben so beleuchtet die Erde die Nachtseite des Monds, und zwar zur Zeit des Neumonds am stärksten, welches wir aber wegen der Sonne nicht bemerken können. Von da an nimmt zwar die Beleuchtung des Monds durch die Erde ab, aber der Mond entfernt sich von der Sonne, das schwache Licht auf der Nachtseite des Monds wird nach Untergang der Sonne sichtbar, und gegen dem dritten Tag nach dem Neumond am merklichsten. In der Mitte des Mai nimmt der Mond, wenn drey Tage von Neumond an verflossen sind, nahe denselben Weg am Himmel, welchen die Sonne im Sommersolstitium *nimmt* (§. 62.), und wenn er zugleich 90° von seinem

aufſteigenden Knoten entfernt iſt, alſo ſeine gröſte nördliche Breite hat; ſo wird bey ſeinem hohen Stand am Himmel das aſchenfarbichte Licht des Monds uns am lebhafteſten erſcheinen. In den Quadraturen verſchwindet es beynahe gänzlich, theils weil jeſt die Erde vom Mond aus geſehen nur halb erleuchtet erſcheint, und daher den Mond ſchwächer beleuchtet, theils weil die von der Sonne beleuchtete Hälfte des Monds den Eindruck jenes ſchwachen Lichts vermindert. Von dem lebhaften Eindruck des von der Sonne beleuchteten Theils auf unſer Aug kommt es auch her, daß uns dieſer Theil des Monds zu einer gröſeren Kugel zu gehören ſcheint, als der übrige, welcher nur das von der Erde zurückgeworfene Licht uns zuſendet.

§. 75. Zur Zeit einer Sonnenfinſterniß ſieht man eine ſchwarze Scheibe von nahe gleicher ſcheinbarer Gröſe mit der Sonne vor der leztern von Abend gegen Morgen mit einer Geſchwindigkeit ſich vorüber bewegen, welche dem Ueberſchuß der ſcheinbaren Geſchwindigkeit des Monds über die der Sonne gleich iſt. Dieſe Erſcheinung ereignet ſich nur zur Zeit des Neumonds, und wenn zugleich die Sonne nahe bey einem der Mondsknoten ſteht, mithin die Mondsbreite klein iſt. Man findet ferner, daß der Ort des Mittelpunkts dieſer ſchwarzen Scheibe mit dem Ort des Mittelpunkts des Monds übereinſtimmt, den man für den Augenblick der Beobachtung berechnet hat. Folglich iſt es der Mond, welcher uns die Sonne oder einen Theil von ihr zu bedecken ſcheint, und die Sonne wird nicht wirklich verfinſtert. Wenn der ſcheinbare Halbmeſſer des Monds dem der Sonne gleich, oder noch gröſer iſt; ſo kann der Mond die Sonne ganz bedecken, und eine ſogenannte totale Sonnenfinſterniß Statt finden, im erſten Fall ohne, im leztern mit Dauer, (Eclipsis solis totalis sine mora, cum mora), und der ſcheinbare Abſtand der Mittelpunkte der Sonne und des Monds darf nicht gröſer ſeyn, als die Differenz ihrer ſcheinbaren Halbmeſſer. Iſt der ſcheinbare Halbmeſſer des Monds kleiner als der ſcheinbare *Sonnenhalbmeſſer*, und wird der ſcheinbare Abſtand

der Mittelpunkte kleiner als die Differenz derselben; so bleibt rund um die Sonne herum ein heller Ring übrig, und die Finsterniß heißt eine ringförmige (annularis). Man beobachtet aber auch bey den totalen Sonnenfinsternissen einen hellen Ring um den Mond, welcher von der Ablenkung der Lichtstralen herrührt, die sie beym Vorübergehen an der Oberfläche des Monds leiden. Wenn endlich der scheinbare Abstand der Mittelpunkte der Sonne und des Monds größer wird, als die Differenz ihrer scheinbaren Halbmesser; so wird nur ein Theil der Sonnenscheibe von dem Mond bedeckt, und die Finsterniß heißt eine partiale (Eclipsis solis partialis). Soll überhaupt eine Sonnenfinsterniß möglich seyn; so muß der scheinbare Abstand der Mittelpunkte der Sonne und des Monds kleiner seyn, als die Summe ihrer Halbmesser. Nun kann der vom Mittelpunkt der Erde gesehene Abstand der Mittelpunkte durch die Parallaxe höchstens um den Ueberschuß der Horizontalparallaxe des Monds über die Horizontalparallaxe der Sonne vermindert werden; folglich darf der von dem Mittelpunkt der Erde gesehene Abstand der Mittelpunkte der Sonne und des Monds, welcher nahe der wahren Mondsbreite zur Zeit des Neumonds gleich ist, nicht größer seyn als die Summe der scheinbaren Halbmesser der Sonne und des Monds samt der Differenz der Horizontalparallaxe des Monds und der Sonne, welches in den mittleren Distanzen $16' 1'',4 + 15' 33'',7 + 57' 1'' - 8'',8$ oder $1° 28 27'',3$ ausmacht, und diese Breite hat der Mond, wenn er $16° \frac{2}{3}$ von einem seiner Knoten entfernt ist. Ueberhaupt findet sich, daß, wenn zur Zeit eines mittleren Neumonds der Abstand des Monds, und folglich auch der Sonne von dem nächsten Mondsknoten kleiner als $13\frac{1}{2}$ Grade ist, eine Sonnenfinsterniß gewiß, hingegen unmöglich ist, wenn dieser Abstand 19 Grade übertrifft. Zwischen $13\frac{1}{2}$ und 19 Graden Abstand vom nächsten Mondsknoten bleibt es zweifelhaft, und man muß die wahren Oerter der Sonne und des Monds, ihre scheinbaren Halbmesser und Parallaxen *berechnen*, um auf die oben gezeigte Art beurtheilen zu können, *ob eine* Sonnenfinsterniß möglich ist.

Die

Die Größe einer Sonnenfinsterniß bestimmt man gewöhnlich dadurch, daß man den Durchmesser der Sonne in 12 gleiche Theile, die man Zolle nennt, jeden dieser in 60 Minuten eintheilt, und in solchen Theilen die Breite des verfinsterten Theils der Sonne angiebt.

§. 76. Die Mondsfinsternisse ereignen sich nur zur Zeit des Vollmonds, und wenn der Mond zugleich in der Nähe eines seiner Knoten, mithin die Sonne nahe bey dem gegenüberliegenden Mondsknoten sich befindet. Eine dunkle nicht scharf begränzte Scheibe scheint sich von Morgen gegen Abend mit einer Geschwindigkeit vor dem Mond vorüber zu bewegen, welche dem Ueberschuß der scheinbaren Geschwindigkeit des Monds über die der Sonne gleich ist. So wohl aus der Krümmung des auf den Mond fallenden Theils dieser Scheibe, als auch daraus, daß der Mond zuweilen über $1\frac{2}{3}$ Stunden lang ganz verdunkelt erscheint, ergiebt sich, daß ihre von der Erde aus gesehene scheinbare Größe die des Monds beträchtlich übersteigen muß. Es wird sich nun leicht zeigen lassen, daß der Erdschatten noch weit über den Mond hinausreicht, und in der Gegend des Monds einen Durchmesser hat, welcher mit der beobachteten Dauer seiner gänzlichen Verdunklung übereinstimmt. Durch die Mittelpunkte *s* und *e* (Fig. 26.) der Sonne und der Erde sey eine Ebene gelegt, und *rt*, *pq* seyen die größten Kreise der Sonne und der Erde, welche durch den Schnitt dieser Ebene mit den Oberflächen der letzteren entstehen. Da der Halbmesser der Erde kleiner ist als der Halbmesser der Sonne; so werden die geraden in der erwähnten Ebene liegenden Linien *rp*, *tq*, welche die Kreise *rt*, *pq* berühren, sich in einem Punkt *c* schneiden, und dieser wird auf der Verlängerung *ec* der geraden Linie *es* liegen, welche die Mittelpunkte der Sonne und des Monds miteinander verbindet. Man lasse sich das Dreyeck *ers* um *es* als um eine Axe drehen; so wird die *cr* eine Kegeloberfläche beschreiben, deren Spitze in *c* ist, und welche die Oberflächen der Sonn und der Erde berührt. Innerhalb des durch die Erdoberfläche *abgeschnittenen Theils pcq* dieses Kegels wird nichts

von der Sonne können gesehen werden, und er wird den sogenannten wahren Schatten bilden. Zieht man die Halbmesser *sr*, *ep* an die Berührungspunkte; so verhält sich *rs* : *ep* = *cs* : *ce*, und *rs* - *ep* : *ep* = *cs* - *ce* oder *se* : *ce*. Aber der von der Sonne aus gesehene scheinbare Halbmesser der Erde ist der Horizontalparallaxe der Sonne gleich; folglich verhält sich in den mittleren Distanzen *rs* : *ep* = 16′1″,4 : 8″,8 (§. 49. n. 6.), und $\left\{\begin{matrix} rs - ep : ep \\ se : ce \end{matrix}\right\}$ = 15′ 52″,6 : 8″,8 = 4763 : 44. Es ist aber *cs* = 23439 Erdhalbmesser (§. 50.), mithin *ce* = 216,5 Erdhalbmesser, welches nach §. 63. über das Dreyfache des Abstands des Monds von der Erde beträgt. Um jetzt noch den von der Erde gesehenen scheinbaren Halbmesser des Erdschattens zu finden, sey aus dem Mittelpunkt *e* der Erde in der durch *cr* und *ct* gelegten Ebene mit einem Halbmesser, welcher der Distanz *em* des Monds von der Erde gleich sey, ein Kreisbogen *klm* beschrieben, welcher der *cr* in *l* begegne. Man ziehe *len* und *er*; so ist der Winkel *pre* dem von dem Punkt *r* der Sonne, mithin auch sehr nahe dem aus dem aus ihrem Mittelpunkt *s* gesehenen scheinbaren Halbmesser der Erde, oder der Horizontalparallaxe der Sonne, und der Winkel *ple* der Horizontalparallaxe des Monds gleich. Man kennt also den Winkel *ren* = *ple* + *pre* (I, 32.), und da der scheinbare Sonnenhalbmesser *res* ebenfalls gegeben ist; so hat man $\left\{\begin{matrix} sen \\ lem \end{matrix}\right\}$ = *ple* + *pre* - *res*. Demnach ist der aus dem Mittelpunkt der Erde gesehene scheinbare Halbmesser des Schattens an der Stelle, wo ihn die Mondsbahn durchschneidet, dem Ueberschuß der Summe der Horizontalparallaxen des Monds und der Sonne über den scheinbaren Halbmesser der letzteren gleich, welcher also in den mittleren Distanzen 57′1″ + 8″,8 — 16′1,4″ oder 41′8″,4 beträgt. Da nun die Axe des Schattenkegels der Erde in der Ebene der Ekliptik liegt, so muß der Vollmond von dem Erdschatten getroffen werden, wenn die Breite des Monds *kleiner ist als* die Summe der Halbmesser des Schattens *und des Monds*, welche in den mittleren Distanzen 41′

8″,4 + 15′ 33″,7 oder 56′ 42″,1 ausmacht. Folglich wird eine Mondsfinsterniß eintreffen, wenn der Vollmond, weniger als 10° 35′ von einem seiner Knoten, also die Sonne weniger als 10° 35′ von dem gegenüberliegenden Knoten entfernt ist, und Sonne und Mond in den mittleren Distanzen von der Erde sich befinden. Bey einer Veränderung dieser Distanzen ändern sich die Parallaxen und die scheinbaren Halbmesser, mithin auch die Gränzen, innerhalb welcher eine Mondsfinsterniß möglich ist. Wenn zur Zeit des mittleren Vollmonds der Abstand der Sonne von einem der Mondsknoten kleiner ist als 9 Grade; so ist eine Mondsfinsterniß gewiß. Ist aber dieser Abstand größer als 12 Grade 36 Minuten; so ist keine Mondsfinsterniß möglich. Zwischen 9° und 12° 36′ ist sie zweifelhaft, und man muß durch eine genauere Rechnung untersuchen, ob die Breite des Monds zur Zeit seiner wahren Opposition kleiner ist, als die Summe der alsdenn Statt findenden Halbmesser des Monds und des Erdschattens.

Die Dauer einer totalen Mondsfinsterniß wird am größten seyn, wenn der Vollmond in einem der Mondsknoten eintrifft, mithin die Mittelpunkte des Monds und des Erdschattens zusammenfallen, und die Finsterniß central ist. Im Augenblick des Anfangs und des Endes der totalen Verfinsterung ist der Abstand der Mittelpunkte des Monds und des Erdschatten der Differenz ihrer Halbmesser, also in den mittleren Distanzen = 41′ 8″,4 − 15′ 33″,7 = 25′ 34″,7. Die relative Bewegung des Monds in Beziehung auf den Mittelpunkt des Schattens, der mit derselben Geschwindigkeit von Abend gegen Morgen fortrückt, welche die Sonne hat, beträgt also während der Dauer der totalen Verfinsterung 51′ 9″,4. Da nun der Mond in einem synodischen Monat 360° in Beziehung auf die Sonne durchlauft; so gebraucht er zu einem Grad 1,9687 Stund, zu 1 Min. eine Zeit von 1,9687 Min. u. s. w. und daher zu 51′ 9″,4 eine Zeit von 1 St. 40 Min. 42,7 Sek. welches im Mittel genommen die Dauer einer totalen und centralen Mondsfinsterniß ist, und mit den Beobachtungen *übereinstimmt.*

Weil der Mittelpunkt des Erdschattens von Abend gegen Morgen mit der scheinbaren Geschwindigkeit der Sonne in der Ekliptik fortrückt, und diese kleiner ist, als die scheinbare Geschwindigkeit des Monds; so muß der Mond an der Ostseite zuerst verfinstert werden, und daher eine dunkle Scheibe mit den Beobachtungen übereinstimmend sich von Morgen gegen Abend vor dem Mond vorüber zu bewegen scheinen.

§. 77. Man ziehe die gerade Linie kt' (Fig. 26.) welche die Erde und die Sonne auf entgegengesetzten Seiten der Axe es in p' und t' berühre, und lasse sich die Figur um es als Axe drehen; so wird eine Kegeloberfläche beschrieben werden, deren Spitze zwischen e und s in dem Punkt f der Axe liegt, wo sie von der kt' geschnitten wird. In dem Punkt k dieser Linie, in welchem sie dem mit dem Halbmesser me beschriebenen Kreisbogen begegnet, wird man die Ränder t' und p' der Sonne und der Erde sich nur noch berühren sehen, einem zwischen k und l befindlichen Auge wird aber ein Theil der Sonne von der Erde bedeckt erscheinen. Demnach wird in dem Raum, welcher zwischen der kegelförmigen Oberfläche des Erdschattens, und der hier betrachteten Kegeloberfläche auf der von der Sonne abgekehrten Seite der Erde liegt, ein Theil des Sonnenlichts von der Erde aufgefangen, und es entsteht zwischen k und l der sogenannte Halbschatten (Penumbra), welcher von k gegen l hin immer dunkler wird. Zieht man ke; so ist, weil lp und kp' die Erde berühren, und $ek = el$ ist, der Winkel $p'ke$ dem Winkel ple, und daher sehr nahe der Winkel $kel = kpl = rpt' =$ dem von der Erde gesehenen scheinbaren Durchmesser der Sonne. Also ist die von der Erde gesehene scheinbare Größe kem des Halbmessers des Halbschattens um den scheinbaren Sonnendurchmesser größer als der scheinbare Halbmesser des wahren Schattens, und daher der Summe der Horizontalparallaxen des Monds und der Sonne samt dem scheinbaren Halbmesser der letztern gleich, demnach im Mittel $= 57'\,1'' + 8'',8 + 16'\,1'',4 = 1^{\circ}\,13'\,11'',2$. *Dieser Halbschatten* ist bey den Mondsfinsternißen nur dar-

an bemerkbar, daß er vor dem Anfang und nach dem Ende der eigentlichen Finſterniß die Flecken des Monds etwas unkenntlich macht. Die nicht ſcharfe Begränzung des wahren Schattens kommt zum Theil von dem Halbſchatten, zum Theil von der Brechung der Sonnenſtralen in der Atmoſphäre der Erde her. Wegen dieſer Brechung fallen auch noch Sonnenſtralen auf den beſchatteten Theil des Monds, ſo daß dieſer nur ſehr ſelten bey einer totalen Verfinſterung ganz unſichtbar wird, und gewöhnlich, wenn er ganz in dem Schatten der Erde ſich befindet, wie eine hell- oder dunkelrothe Scheibe erſcheint. So lange der Mond nur zum Theil verfinſtert iſt, ſcheint der Schatten, wahrſcheinlich wegen des anliegenden ſtark von der Sonne beleuchteten Theils, ſchwärzer zu ſeyn.

Die Brechung der Lichtſtralen vergrößert auch den ſcheinbaren Halbmeſſer des wahren Schattens, wozu noch der Halbſchatten, welcher in der Nähe des erſteren ziemlich dunkel ſeyn muß, etwas beytragen mag. Die Beobachtungen zeigen, daß man zu dem nach der Regel des vorhergehenden §. gefundenen Halbmeſſer des wahren Schattens den ſechzigſten Theil des letztern, oder eben ſo viele Sekunden addiren müße, als er Minuten enthält, welches im Mittel 41″ ausmacht.

Die Mondsfinſterniße theilt man ebenfalls in centrale, totale und partiale ein, je nachdem zur Zeit der gröſten Verfinſterung die Mittelpunkte des Monds und des Erdſchattens zuſammenfallen, oder ihr Abſtand kleiner oder größer iſt, als die Differenz ihrer Halbmeſſer. Die Größe der Verfinſterung pflegt man in Zwölftheilen des Mondsdurchmeſſers anzugeben, die man auch hier Zolle nennt und in 60 Minuten eintheilt. Die totale Verfinſterung beträgt alſo zwölf Zolle, zu welchen man aber noch die Anzahl Zolle hinzufügt, um welche ſich der Mond noch weiter, als bey dem Anfang der totalen Verfinſterung in den Schatten einſenkt. Die Verfinſterung geſchiehet an dem nördlichen oder ſüdlichen Theil des Monds, je nachdem ſeine Breite ſüdlich oder nördlich iſt.

§. 78. *Ungeachtet die* Gränzen der Möglichkeit der

Mondsfinsterniße enger sind, als die der Sonnenfinsterniße; so sind doch die ersteren öfter als die letztern an einem gegebenen Ort der Erde sichtbar. Da nemlich die Mondsfinsterniße wirkliche Verdunklungen des Monds durch den Schatten der Erde sind; so sind sie an jedem Ort sichtbar, über dessen Horizont sich der Mond zur Zeit der Finsterniß befindet. Die Sonnenfinsterniße hingegen sind keine wirkliche Verdunklungen der Sonne, sondern eigentlich Erdfinsterniße, bey welchen uns der zwischen der Erde und der Sonne befindliche Mond des Lichts der letztern ganz oder zum Theil beraubt. Wegen der beträchtlichen Mondsparallaxe kann daher der Mond von vielen Orten der Erde aus gesehen neben der Sonne vorübergehen, und man wird nur an denjenigen, auf der Tagseite der Erde befindlichen Orten eine Sonnenfinsterniß sehen können, an welchen der scheinbare durch die Parallaxe geänderte Abstand der Mittelpunkte der Sonne und des Monds kleiner ist, als die Summe ihrer Halbmesser.

Da die Möglichkeit der Sonnen- und Mondsfinsterniße von dem Abstand abhängt, welchen die Sonne zur Zeit des Neu- und Vollmonds von einem der Mondsknoten hat; so wird im Allgemeinen die Periode ihrer Wiederkehr von der Umlaufszeit der Sonne in Beziehung auf einen der Mondsknoten, und von der synodischen Umlaufszeit des Monds zugleich abhängen. Nun durchlauft die Sonne in 365 Tagen 11 Z. 29° 45′ 40″,4, und die Knotenlinie bewegt sich in eben dieser Zeit rückwarts oder der Sonne entgegen um 19° 19′ 43″,30 (§. 68.); folglich durchlauft die Sonne in Beziehung auf einen der Knoten des Monds in 365 Tagen 12 Z. 19° 5′ 23″,76, woraus die Zeit zwischen zwey aufeinander folgenden Zusammenkünften der Sonne mit demselben Knoten = 346 T. 14 St. 52 M. 13,2 S. folgt, welche sich zu einem synodischen Monat nahe wie 223 : 19 verhält. Mithin befinden sich nach einer Periode von 223 synodischen Monaten, oder nach 18 Jahren (worunter 4 Schaltjahre sind) 11 T. 7 St. 42 M. 28,86 S. die Sonne und der Mond wiederum beynahe in derselben Lage gegen den Mondsknoten, und folglich müßen die

Finſterniße ungefähr in derſelben Ordnung wiederkehren, welches ein einfaches Mittel giebt, ſie vorherzuſagen. Uebrigens erfordern 19 Umläufe der Sonne in Beziehung auf den Mondsknoten eine Periode, welche um 10 St. 49 M. 42 S. größer iſt, als 223 ſynodiſche Monate, dieſer Unterſchied häuft ſich mit der Länge der Zeit an, und verändert die Ordnung der während einer dieſer Perioden beobachteten Finſterniße. Schon die alten Aſtronomen bemerkten dieſe Wiederkehr der Finſterniße, und bedienten ſich obiger und anderer genauer zutreffender Perioden, um ſie vorherzuſagen. Aber die Ungleichheiten der Bewegungen der Sonne und des Monds müßen merkliche Unterſchiede hervorbringen, und was die Sonnenfinſterniße betrifft, ſo kann nur von ihrer Wiederkehr für die ganze Erde, nicht aber für einen beſtimmten Ort die Rede ſeyn, weil im letzteren Fall ihre Möglichkeit auch noch von der Parallaxe, mithin von der Höhe des Monds und der Sonne über dem Horizont dieſes Orts, oder von der Tageszeit abhängt.

§. 79. Die Mondsfinſterniße gehören zu denjenigen Erſcheinungen, durch deren Beobachtung man den Unterſchied der Meridian zweyer Orte unmittelbar finden kann (§. 46.). Der Anfang ſo wohl als das Ende derſelben ereignen ſich als Veränderungen, welche auf der Oberfläche des Monds ſelbſt vorgehen, für verſchiedene Orte der Erde in einerley Augenblick, aber die Beobachter zählen verſchiedene Zeiten an ihren Uhren, wenn die Beobachtungsorte nicht unter einerley Meridian liegen. Schon Ptolemäus macht auf dieſe Unterſchiede der Beobachtungszeiten aufmerkſam, und bemerkt dabey, daß, weil man an den öſtlicher liegenden Orten in demſelben Verhältniß mehr zähle als an den weſtlichen, in welchem die öſtlichen Entfernungen größer ſind, die Erde in der Richtung von Abend gegen Morgen gleich ſtark gekrümmt ſeyn, und daher eine kugelförmige Oberfläche haben müße. Dieſe kugelförmige Geſtalt der Erde haben auch die Aſtronomen aus der kreisförmigen Begränzung des Schattens der Erde auf dem Mond geſchloſſen, welcher

bey allen Lagen des Monds gegen den Horizont und an allen Orten der Erde beständig diese Figur behält.

Wegen der undeutlichen Begränzung des Erdschattens ist es nicht möglich, den Augenblick des Anfangs oder des Endes einer Mondsfinsterniß genau anzugeben, und daher können die Mondsfinsternisse nur zur ersten genäherten Bestimmung des Mittagsunterschieds gebraucht werden. Die Beobachtungen des Anfangs und des Endes einer Sonnenfinsterniß verstatten eine größere Genauigkeit, erfordern aber wegen des Einflußes der Parallaxe eine vorläufige Reduktion auf den Mittelpunkt der Erde, welche hier noch nicht vollständig kann gezeigt werden.

Durch die Beobachtungen der Mondsfinsternisse hat Hipparch die Entfernung der Sonne von der Erde zu bestimmen gesucht. Da nemlich der scheinbare Halbmesser des Erdschattens dem Ueberschuß der Summe der Horizontalparallaxen des Monds und der Sonne über den Halbmesser der letztern gleich ist (§. 77.); so übertrifft die Summe der Halbmesser der Sonne und des Erdschattens die Horizontalparallaxe des Monds um die Horizontalparallaxe der Sonne, und die letztere ist durch die drey erstern gegeben. Da aber der Anfang und das Ende einer Mondsfinsterniß, mithin auch ihre Dauer, von welcher die Bestimmung des Halbmessers des Erdschattens abhängt, nicht genau können beobachtet werden; so ist diese Methode sehr unsicher. Wollte man aus der Chorde des verfinsterten Theils des Monds, der Breite des hellen Theils, und aus dem Mondshalbmesser den Halbmesser des Erdschattens ableiten; so würde wegen der Schwierigkeit, die zwey ersteren Grössen genau zu messen, wiederum der Halbmesser des Schattens nicht mit der hier erforderlichen Genauigkeit gefunden werden. Ptolemäus setzt den Halbmesser des Erdschattens $= 40' 45''$, den Halbmesser der Sonne $= 15' 40''$ und die Horizontalparallaxe des Monds, wenn er in der Erdferne ist, $= 53' 35''$. Hienach wäre die Sonnenparallaxe $= 40' 45'' + 15' 40'' - 53' 35'' = 2' 50''$, und der Abstand der Sonne von der Erde $= 1213$ Erdhalbmessern, welcher bey-

nahe zwanzigmal kleiner iſt, als der §. 50. aus der genauern Angabe der Sonnenparallaxe gefolgerte.

§. 80. Der Mond zeigt ſchon dem unbewafneten Auge, noch mehr aber durch Fernröhren eine große Anzahl unveränderlicher Flecken, welche man ſorgfältig beobachtet und abgebildet hat. Da ihre Lage gegen den Mittelpunkt des Monds beſtändig nahe dieſelbe bleibt; ſo kehrt er uns immer nahe dieſelbe Seite zu, und nur von dieſer wiſſen wir aus den §. 71. angeführten Erſcheinungen, daß ſie ſphäriſch iſt. Er dreht ſich alſo in Beziehung auf die Fixſterne in derſelben Zeit einmal um ſeine Axe, in welcher er in Beziehung auf dieſelbige einen Umlauf am Himmel macht, mithin in 27 T. 7 St. 43 M. 11,51 S. (§. 61.). Auf dem uns zugekehrten Mittelpunkt der Mondſcheibe iſt es zur Zeit des Neumonds Mitternacht, und zur Zeit des Vollmonds Mittag. Da nun dieſer Punkt beſtändig nahe derſelbe Punkt der Oberfläche des Monds iſt; ſo iſt die Zeit von Mitternacht bis Mittag einem halben ſynodiſchen Monat, und die Dauer eines aſtronomiſchen Tags auf dem Mond dem ſynodiſchen Monat gleich.

Uebrigens bemerkt man bey fortgeſetzten genauen Beobachtungen der Mondsflecken kleine periodiſche Veränderungen in ihrer Lage gegen den ſcheinbaren Mittelpunkt und den Rand des Monds. Die nahe an dem Rand liegende Flecken verſchwinden und erſcheinen wechſelsweiſe, und die in der Nähe des Mittelpunkts liegende ſtehen bald auf dieſer, bald auf jener Seite deſſelben. Die letzteren Bewegungen ſind größer als die erſteren, man findet aber, daß dieſer Unterſchied allein von der ſchiefen Richtung der Bewegung am Rand gegen das Aug des Beobachters herrührt, und von dem Mittelpunkt des Monds geſehen die Bewegungen der Flecken gleich groß erſcheinen, mithin ihre gegenſeitige Lage ſich nicht verändert. Man nennt dieſe periodiſchen Oſcillationen die Libration des Monds, und zwar diejenigen, welche nach einer mit der Ekliptik parallelen Richtung geſchehen; die Libration in der Länge, die darauf ſenkrechten aber die Libration in der Breite.

ge und Breite eines Fleckens eine kleine Aenderung erfordert. Man hat gefunden, daß der Mondäquator gegen die Ebene der Ekliptik um 1° 29', mithin die Umdrehungsaxe um 88° 31', geneigt, und die gerade Linie, in welcher eine durch den Mittelpunkt des Monds mit der Ekliptik parallel gelegte Ebene von der Ebene seines Aequators geschnitten wird, beständig mit der geraden Linie parallel ist, welche die mittleren Orte der Mondsknoten mit einander verbindet, und dabey immer die der Ekliptik parallel gelegte Ebene zwischen die des Mondäquators und die Ebene der Mondsbahn fällt.

Bey den Beobachtungen der Mondsfinsternisse pflegt man auch die Zeiten der Ein- und Austritte der kenntlichsten Mondsflecken in und aus dem Erdschatten zu bemerken, welche so wie der Anfang und das Ende der Finsterniß, wenn man correspondirende Beobachtungen von zwey Orten hat, zur genaueren Bestimmung des Mittagsunterschieds derselben dienen, weil man aus vielen Beobachtungen ein Mittel nehmen kann, wo sich die Beobachtungsfehler zum Theil gegen einander aufheben.

§. 81. Durch Fernröhren gesehen erscheint die Lichtgränze des Monds, besonders zur Zeit der Quadraturen ausgezackt, und man bemerkt zuweilen einzelne Punkte in der Nachtseite des Monds, welche schon von der Sonne beleuchtet sind, so wie sich die Lichtgränze ihnen nähert, gröſser werden, und endlich mit dem hellen Theil des Monds zusammenfließen. Auf der Oberfläche des Monds müßen sich also viele Erhöhungen befinden, deren Spitzen von den Sonnenstralen erleuchtet werden, während die niedriger liegenden Theile seiner Oberfläche noch im Schatten sind, so wie die Sonne die Spitzen der Berge unserer Erde zuerst, und hernach die Ebenen und Thäler beleuchtet. Ferner beobachtet man kleine schwarze Flecken, welche sich verkürzen, so wie die Lichtgränze von ihnen weiter abrückt, im Vollmond verschwinden, und durch die Veränderungen ihrer Gröſse und Lage deutlich genug zeigen, daß sie die Schatten *von Bergen sind*. Vertiefungen, dergleichen es auf dem

Mond ebenfalls giebt, unterſcheiden ſich von den Bergen theils durch Lage des Schattens an ihren Rändern, theils dadurch, daß ihr Grund noch dunkel iſt, wenn die rund um liegende Theile ſchon beleuchtet ſind.

Aus dem Abſtand der in der Nachſeite liegenden hellen Punkte von der Lichtgränze kann man das Verhältniß der Erhöhungen dieſer Punkte über die Oberfläche des Monds zu ſeinem Halbmeſſer finden. Der einfachſte Fall iſt, wenn der helle Punkt in der Nähe des Mittelpunkts liegt, mithin der Mond ungefähr halb erleuchtet iſt. Sey *akk* ein durch den ſcheinbaren Mittelpunkt *a* der Mondſcheibe und den leuchtenden Punkt *b* gelegter gröſter Kreis des Monds; ſo berührt, wenn zur Zeit einer Quadratur die Spitze *b* des Bergs *bh* eben von der Sonne beſchienen wird, die gerade Linie *ab* jenen Kreis in *a*. Man ziehe die *bk* durch den Mittelpunkt *c*; ſo iſt (III, 36.) $kb \times bh = \overline{ab}^2$ und $bh = \frac{\overline{ab}^2}{bk}$ ſehr nahe $= \frac{\overline{ab}^2}{hk}$. Nun iſt durch die Beobachtungen das Verhältniß von *ab* zu *ch* gegeben; folglich kennt man das Verhältniß von *bh* zu *ch*. Hevel fand z. B. den Abſtand eines ſolchen Punkts von der Lichtgränze $= \frac{1}{113}$ des Halbmeſſers des Monds; folglich iſt hier $bh = \frac{ch}{338}$. Es giebt aber noch höhere Berge auf dem Mond, wie Schröter durch ſehr ſorgfältige Beobachtungen gefunden hat *).

Es iſt im 72. §. gezeigt worden, daß, wenn der Vollmond eine groſe nördliche oder ſüdliche Breite hat, ein ſchmaler Theil ſeines ſüdlichen oder nördlichen Randes noch in die Nachtſeite fällt. Die Unebenheiten auf der Oberfläche des Monds machen dieſes dadurch ſehr merklich, daß der ſüdliche oder nördliche Rand ausgezackt erſcheint, je nachdem die Mondsbreite nördlich oder ſüdlich iſt.

*) Schröters ſelenotopographiſche Fragmente. 1791. welches intereſſante Werk eine genaue Beſchreibung und Abbildung der Oberfläche des Monds und der darauf befindlichen Merkwürdigkeiten enthält.

Fünftes Capitel.

Von den Bewegungen der Planeten.

§. 82. Die Planeten, von welchen hier die Rede seyn wird, entfernen sich niemals um mehr als 8 bis 9 Grade von der Ekliptik, und befinden sich folglich beständig auf einer Zone der Himmelskugel, welche durch zwey auf beyden Seiten der Ekliptik mit ihr in einem Abstand von 9 Graden gezogene Parallelkreise eingeschlossen wird, und der Thierkreis (Zodiacus) heißt. Die Planetenbahnen liegen also beynahe in der Ebene der Ekliptik, weswegen man bey der ersten Untersuchung dieser Bahnen sie als in der Ebene der Ekliptik liegend wird annehmen können.

Zwey der Planeten entfernen sich niemals über gewiße Gränzen von der Sonne, der eine höchstens um 29, der andere um 48 Grade, und daher ist der erstere, welchen man den Merkur nennt, nur in der Morgen- und Abenddämmerung, und zwar wegen seines kleinen scheinbaren Durchmessers nicht ohne einige Anstrengung mit dem unbewafneten Auge sichtbar. Von demjenigen Zeitpunkt an gerechnet, da sich der Merkur zuerst in der Morgendämmerung zeigt, entfernt er sich mit beständig abnehmender scheinbarer Geschwindigkeit immer weiter gegen Abend hin von der Sonne, bis er bey seiner gröſten Digression einige Zeit hindurch seinen Abstand von der Sonne nicht merklich verändert. Er nähert sich jetzt der Sonne wieder, anfangs kaum merklich, mit beständig zunehmender Geschwindigkeit, bis er in den Sonnenstralen unsichtbar wird. Nach einiger Zeit bemerkt man in der Abenddämmerung einen ähnlichen Stern, welcher sich eben so nach und nach immer weiter von der Sonne entfernt, wie sich der in der Morgendämmerung verschwundene ihr genähert hatte, eine gröſte Digression erreicht, welche der bey jenem beobachteten nahe gleich ist, und sich hierauf mit zunehmender Geschwindigkeit der Sonne nähert, bis er in ihren Stralen verschwindet. Da nicht beyde Sterne zugleich sich zeigen, und alle übrigen Umstände dieser Erscheinungen auf der Ost- und Westseite der

Sonne dieſelben ſind; ſo iſt der Merkur ſelbſt der Stern, welcher in der Abenddämmerung ſich zeigte.

§. 83. Dieſe Bewegungen des Merkurs in Beziehung auf die Sonne ſind denjenigen ganz ähnlich, welche man beobachtet, wenn ein Körper ſich in einem Kreis mit gleichförmiger Geſchwindigkeit nach einerley Richtung herum bewegt, und der Ort des Augs auſſerhalb des Kreiſes in ſeiner erweiterten Ebene, oder wenigſtens nahe bey derſelben liegt. Es ſey *e* (Fig. 29.) der Mittelpunkt der Erde, und die gerade Linie *ecb* ſey beſtändig gegen die Sonne hin gerichtet. Um den Punkt *c* dieſer Linie als Mittelpunkt ſey ein Kreis mit dem Halbmeſſer *ca*, welcher kleiner als *ce* ſey beſchrieben, in welchem ſich der Merkur nach der Richtung *m*, *m'*, *m''* herumbewege. Man ziehe aus dem Mittelpunkt *e* der Erde die Tangenten *em'*, *em''* an dieſen Kreis, und die Halbmeſſer *cm'*, *cm''* an die Berührungspunkte; ſo werden die Winkel *cem'*, *cem''* die gröſten Digreſſionen des Merkurs von der Sonne ſeyn. Da man dieſe aus den Beobachtungen kennt; ſo wird in dem bey *m'* rechtwinklichten Dreyeck *eem'* das Verhältniß von *ce* : *cm'* oder von *ce* : *ca* gegeben ſeyn, und man wird daher, wenn man *ce* nach Belieben nimmt, den Halbmeſſer *ca* ſo beſtimmen können, daß die beobachteten gröſten Digreſſionen dem Winkel *cem'* gleich werden. So wie nun der Merkur von dem Punkt *m* an weiter gegen *m'* fortrückt, wird die Richtung ſeiner Bewegung immer ſchiefer gegen die von der Erde *e* gezogenen Geſichtslinien *em*, alſo ſeine ſcheinbare Geſchwindigkeit, mit welcher er von der Sonne ſich entfernt, immer kleiner, bis ſie bey ſeiner gröſten Digreſſion in *m'*, wo die Richtung ſeiner Bewegung mit der Richtung der ſeine Bahn berührenden Geſichtslinie *em'* zuſammenfällt, verſchwindet, und er in Beziehung auf die Sonne ſtille zu ſtehen ſcheint. Bey fortgeſetzter Bewegung gegen *n* wird er ſich der Sonne nähern, und die Geſchwindigkeit dieſer Annäherung wird wachſen, weil ſich jetzt der Winkel, welchen die Richtung ſeiner Bewegung mit der Geſichtslinie *ne* macht, einem rechten nähert. *Da nun, wenn der Merkur in der Morgendämme-*

rung zuerst erscheint, er gegen Abend hin von der Sonne sich entfernt, und sich ihr nach seiner grösten westlichen Digression von Abend gegen Morgen nähert; so geht die angenommene Richtung seiner Bewegung von *a* nach *m*, *m'* u. s. w. von Abend gegen Morgen. In der anderen Hälfte *bm"a* werden die Erscheinungen in umgekehrter Ordnung wiederkehren, und in *m"* wird die gröste östliche Digression von der Sonne eintreffen. Demnach wird man die scheinbare Bewegung des Merkurs im Allgemeinen dadurch darstellen können, daß man ihn von Abend gegen Morgen sich in einem Kreis bewegen läßt, dessen Mittelpunkt beständig auf der geraden Linie liegt, welche die Mittelpunkte der Erde und der Sonne mit einander verbindet, und dessen Halbmesser sich zu dem Abstand seines Mittelpunkts von der Erde wie der Sinus der grösten östlichen oder westlichen Digression des Merkurs von der Sonne zum Sinus totus verhält.

§. 84. Der Merkur zeigt, wenn man ihn durch Fernröhren beobachtet, ähnliche Veränderungen in seinen Lichtgestalten, wie der Mond. Bey seinem ersten Erscheinen in der Morgendämmerung hat er eine sichelförmige Gestalt, wie der Mond zwischen dem Neumond und dem ersten oder letzten Viertel. Er erscheint halb erleuchtet, wie der Mond in den Vierteln, wenn er in seiner grösten Digression von der Sonne ist. Nähert er sich nach seiner grösten westlichen Digression der Sonne wiederum; so wächst sein heller Theil, und hat die Gestalt des Monds zwischen dem Vollmond und den Quadraturen. Bey seinem Wiedererscheinen in der Abenddämmerung nimmt seine Lichtgestalt ab, er erscheint halb erleuchtet, wenn er in seiner grösten östlichen Digression ist, und zeigt sich hernach wieder sichelförmig. Da nun zur Zeit der grösten Digressionen der Halbmesser *cm'* oder *cm"* der kreisförmigen Bahn des Merkurs auf der geraden Linie *em'* oder *em"* senkrecht ist, welche seinen Mittelpunkt mit dem der Erde verbindet, eben dieser Halbmesser aber, weil die Lichtgränze als eine gerade Linie erscheint, *gegen den* Mittelpunkt der Sonne muß gerichtet seyn; so *fällt unter der* Voraussetzung einer kreisförmigen Bahn

des

des Merkurs ihr Mittelpunkt in den der Sonne, und das Verhältniß von $cm' : ce$ ist dem Verhältniß des Abstands des Merkurs von der Sonne zu dem Abstand der letztern von der Erde gleich. Schon der Anblick der 29. Fig. zeigt, wenn man die Sonne in c setzt, die mit den Beobachtungen übereinstimmende Veränderungen der Lichtgestalten des Merkurs nach seinen verschiedenen Stellungen gegen die Sonne, welche man nach Anleitung dessen, was §. 71. und 72. über die Bestimmung der Lichtgestalten des Monds gesagt worden ist, für jede gegebene Lage des Merkurs gegen die Sonne und die Erde verzeichnen oder berechnen kann.

Die gröſten Digressionen des Merkurs von der Sonne sind veränderlich und fallen zwischen $28° 48'$ und $16° 12'$, im Mittel genommen sind sie $= 22° 46' 27''$. Sie müssen sich zwar schon wegen der ungleichen Entfernungen der Sonne von der Erde verändern, und gröſser oder kleiner werden, je nachdem jene Entfernungen abnehmen oder wachsen, aber diese Veränderungen können, den kleinen Unterschieden der Sonnenhalbmesser in der Erdnähe und Erdferne (§. 40.) nach zu urtheilen, nicht so beträchtlich seyn. Folglich müſsen sich die Abstände des Merkurs von der Sonne selbst verändern, und daher, wenn eine kreisförmige Bahn beybehalten werden soll, die Sonne ausserhalb des Mittelpunkts dieses Kreises gesetzt werden. Aus obiger mittlerer Digression folgt das Verhältniß der mittleren Abstände des Merkurs und der Erde von der Sonne $387 : 1000$.

Der Merkur hat während eines Umlaufs in Beziehung auf die Sonne oder eines synodischen Umlaufs, wozu er nahe 115 T. 21 St. gebraucht, von der Erde aus gesehen mit der Sonne zweymal einerley Länge, oder kommt mit ihr zweymal in Conjunktion, nemlich in a und b (Fig. 29.), und man nennt jene, in welcher er der Erde am nächsten ist, die untere, diese, bey welcher sein Abstand von der Erde am gröſten wird, die obere Conjunktion.

Die Veränderungen des scheinbaren Durchmessers des Merkurs stimmen mit den hier angenommenen Bewegungen überein. Von seinem Erscheinen in der Morgendäm-

merung an, bis er bey seiner oberen Conjunktion in den Sonnenstralen verschwindet nimmt sein scheinbarer Durchmesser beständig ab, und auf der andern Seite eben so wieder zu, wie er abgenommen hatte. In seiner mittleren Distanz von der Erde, welche der mittleren Distanz der Sonne von der Erde gleich ist, beträgt sein scheinbarer Durchmesser 6 Sekunden.

§. 85. Der zweyte der §. 82. erwähnten Planeten ist der hellste unter allen, und führt den Namen Venus. Sie bietet dieselben Erscheinungen dar, wie der Merkur, nur daß ihre Digressionen von der Sonne beträchtlicher und von längerer Dauer sind. Die Zeit ihrer Wiederkehr zu derselben Lage in Beziehung auf die Sonne, oder ihre synodische Umlaufszeit beträgt nahe 583 T. 22 St. Die Veränderungen ihrer Lichtgestalten, welche wegen ihres grössern scheinbaren Durchmessers und ihrer größeren Digressionen von der Sonne leichter als bey dem Merkur beobachtet werden können, zeigen, daß sie ihr Licht von der Sonne empfängt, und der Mittelpunkt ihrer Bahn, wenn sie ein Kreis ist, in den Mittelpunkt der Sonne fällt. Da aber die gröstен Digressionen der Venus von 45 bis auf 48 Grade sich verändern, und auch diese Veränderungen, wie wohl sie beträchtlich kleiner als bey dem Merkur sind, nicht von den kleinen Veränderungen des Abstands der Sonne von der Erde allein herrühren können; so muß ihr Abstand von der Sonne selbst veränderlich seyn, und, wenn anders die Venusbahn kreisförmig ist, die Sonne etwas ausserhalb des Mittelpunkts dieser Bahn sich befinden. Im Mittel ist die gröste Digression der Venus $= 46^\circ\ 19'\ 49''$, und daher verhält sich der mittlere Abstand der Venus von der Sonne zu dem mittleren Abstand der Erde von der Sonne wie 723 : 1000.

Der scheinbare Durchmesser der Venus nimmt von der unteren Conjunktion an bis zu der oberen beständig ab, und von dieser bis zu der ersteren wieder eben so zu, übereinstimmend mit III, 8. und §. 49. n. 5. In ihrer mittleren *Distanz* von der Erde, welche der mittleren Distanz der *Sonne von der* Erde gleich ist, belauft sich ihr scheinbarer

Durchmeſſer auf 16,6 Sekunden, in der Nähe ihrer unteren Conjunktion aber beyläufig auf 1 Minute.

Man nennt die Venus auch den Morgen- und Abendſtern, je nachdem ſie vor dem Aufgang oder nach dem Untergang der Sonne ſichtbar iſt, mithin eine weſtliche oder öſtliche Digreſſion hat. In ihrer oberen Conjunktion kehrt ſie ihre ganze erleuchtete Hälfte der Erde zu, und ihre Lichtgeſtalt nimmt von da an ab. Zu gleicher Zeit nähert ſie ſie ſich aber der Erde, und rückt von der Sonne ab, weswegen ihr ſcheinbarer Glanz zunimmt. Nach ihrer gröſten Digreſſion, nemlich wenn ihr ſcheinbarer Abſtand von der Sonne = 44° 37′ 36″ iſt, wird ihr Glanz am ſtärkſten *), worauf er ihrer Annäherung an die Erde ungeachtet wieder abnimmt, weil ihre Phaſen kleiner werden. Zur Zeit ihres gröſten Glanzes iſt ſie am hellen Tage mit bloßen Augen ſichtbar.

§. 86. Wenn die Bahnen des Merkurs und der Venus in der Ebene der Ekliptik lägen; ſo müßte man dieſe Planeten bey jeder unteren Conjunktion als eine ſchwarze Scheibe vor der Sonne von Morgen gegen Abend vorübergehen ſehen. Es zeigen aber die Beobachtungen, daß ſie bald eine nördliche, bald eine ſüdliche Breite haben; folglich können ſich dieſe Erſcheinungen nur alsdenn ereignen, wenn ihre Breite kleiner iſt als der Halbmeſſer der Sonne. Den Merkur hat man ſchon oft vor der Sonne beobachtet, die Venus aber nur dreymal, nemlich in den Jahren 1639, 1761, und 1769. Der nächſte Durchgang der Venus vor der Sonne wird erſt am 6. December 1882 eintreffen.

Da die Venus in ihrer unteren Conjunktion um den Halbmeſſer ihrer Bahn näher bey der Erde iſt als die Sonne, mithin alsdenn ihr Abſtand von der Erde zu dem Abſtand der Sonne von der Erde ſich wie 277 : 1000 verhält (§. 85.); ſo muß ihre Parallaxe, wenn ſie vor der Sonne vorübergeht über $3\frac{1}{2}$ mal gröſſer ſeyn, als die Parallaxe der Sonne (§. 49. n. 1.), und daher einen beträchtl-

*) Mém. de l'Académie de Prusse pour 1750. Astron. Jahrbuch für 1780. S. 59. Astron. Jahrb. für 1803. S. 183.

lichen Einfluß auf die Dauer ihres Vorübergangs vor der Sonne haben, welche demnach an verschiedenen Orten der Erde nicht gleich lang wird gefunden werden. Denn wegen der Parallaxe sehen verschiedene Beobachter die Venus an verschiedenen Punkten der Sonnenscheibe, auf welcher sie kürzere oder längere Chorden des Umkreises der Sonne zu beschreiben scheinen wird. Auf den Mittelpunkt der Erde reducirt muß die Dauer des Vorübergangs aus allen Beobachtungen gleich heraus kommen. Legt man bey diesen Reduktionen eine schon beynahe gefundene Parallaxe der Sonne, wodurch zugleich die Parallaxe der Venus wegen des bekannten Verhältnißes ihrer Abstände von der Erde gegeben ist (§. 49. n. 1.); so wird man finden, um wie viel die angenommene Sonnenparallaxe vermehrt oder vermindert werden müsse, damit die auf den Mittelpunkt der Erde reducirte Dauer des Vorübergangs aus den Beobachtungen, welche an weit von einander entfernten Orten angestellt wurden, gleich lang herauskomme. Auf die Beobachtungen des Durchgangs der Venus vor Sonne im Jahr 1769 gründet sich die genauere Angabe der Sonnenparallaxe im 50ten §.

§. 87. Es giebt noch einige andere Arten die scheinbaren Bewegungen des Merkurs und der Venus um die Erde aus zwey Umlaufsbewegungen zusammenzusetzen. Man hat angenommen, um die Erde e' (Fig. 30.) beschreibe die Sonne s' eine beynahe kreisförmige Bahn $s'r$, und zugleich bewege sich einer der genannten Planeten, z. B. der Merkur m' um die Sonne s' in einer ebenfalls nahe kreisförmigen Bahn $a'm'b'$ nach derselben Richtung, nach welcher die Sonne sich um die Erde zu bewegen scheint, nemlich nach der Richtung der beygesetzten Zahlen 1, 2, 3, u. s. w. Man verbinde die gleichzeitigen Orte des Merkurs m', der Sonne s' und den Mittelpunkt e' der Erde durch die geraden Linien $m's'$, $s'e'$ und $m'e'$; so wird der Winkel $s'e'm'$ die Elongation des Merkurs von der Sonne, die gerade Linie $e'm'$ sein Abstand von der Erde, und, wenn $e'v'$ an den Punkt der Frühlingsnachtgleiche gezogen wird, $v'e's'$ die Länge der Sonne, $v'e'm'$ die Länge des Merkurs seyn, wie sie von

der Erde aus erſcheinen. Anſtatt die Erde ruhen zu laſſen, nehme man jetzt an, die Sonne ſey unbeweglich in *s* (Fig. 31.), ziehe durch *s* die *se*, *sm* mit *s'e'*, *s'm'* in Fig. 30. beziehungsweiſe parallel, und nehmen auf dieſen Parallelen von *s* an und auf derſelben Seite von *s*, auf welcher *e'*, *m'* in Fig. 30. in Beziehung auf *s'* liegen, die *se*, *sm* den Linien *s'e'*, *s'm'* gleich, ſo daß *ss'e'e*, *ss'm'm* Parallelogramme bilden. Man ziehe *mr*; ſo ſind die Dreyecke *sem*, *s'e'm'* congruent (I, 4), und daher die *em* der *e'm'* gleich und parallel. Da nun *se* der *s'e'* beſtändig gleich und parallel iſt; ſo wird die Erde *e* um die als unbeweglich angenommene Sonne *s* in derſelben Zeit und nach derſelben Richtung die Bahn *eqp* beſchreiben, in welcher man ſie vorher um die Erde ſich bewegen ließ, und die Bahn der Erde um die Sonne wird der in Fig. 30. angenommenen Bahn der Sonne um die Erde gleich und ähnlich ſeyn. Eben ſo, weil *sm* der *s'm'* beſtändig gleich und parallel iſt; ſo wird der Merkur *m* um die ruhende Sonne *s* die Bahn *amb* beſchreiben, welche der *a'm'b'* (Fig. 30.) gleich und ähnlich iſt, und da immer, wenn *e'm's'* in einer geraden Linie liegen, auch *ems* (Fig. 31.) vermöge der Conſtruktion in einer geraden Linie liegen müſſen, ſo wird die ſynodiſche Umlaufszeit des Merkurs um die Sonne *s* ſeiner ſynodiſchen Umlaufszeit in der Bahn *e'm'b'* (Fig. 30.) gleich ſeyn. Folglich werden auch in beyden Fällen die tropiſchen Umlaufszeiten einander gleich ſeyn, und beyde Bahnen werden nach einerley Richtung beſchrieben werden. Endlich weil die von der Erde nach dem Merkur gezogene gerade Linie *em* in Fig. 31. der ihr in Fig. 30. entſprechenden *e'm'* beſtändig gleich und parallel iſt; ſo wird der Beobachter, welcher ſich auf der Erde in Ruhe glaubt, dieſelben ſcheinbaren Bewegungen des Merkurs bemerken, welche er in dem Fig. 30. angenommenen Fall wahrgenommen haben würde. Wenn man alſo den Merkur und die Venus ſich um die in Ruhe angenommene Sonne in derſelben Bahn und mit derſelben Geſchwindigkeit bewegen läßt, die man bey der erſten Hypotheſe gefunden hatte, und annimmt, die Erde bewege ſich um die *Sonne in derſelben* Bahn, in welcher man ſich die

Sonne um die Erde bewegen ließ, so daß beyde Bahnen mit beziehungsweise gleichen Geschwindigkeiten beschrieben werden; so werden die aus den Bewegungen des Merkurs und der Venus um die Sonne und aus der eigenen Bewegungen der Erde zusammengesetzte relative Bewegungen dieser Planeten für einen Beobachter, der sich auf der Erde in Ruhe glaubt, dieselben seyn, welche er unter der ersten Voraussetzung beobachtet haben würde.

§. 88. Um diese relative Bahn zu verzeichnen, nehme man einen Punkt *E* (Fig. 32.) als Mittelpunkt der Erde an, verbinde in Fig. 31. zwey gleichzeitige Orte *e* der Erde und *m* des Planeten durch eine gerade Linie *me*, ziehe mit dieser durch *E* (Fig. 32.) eine Parallele *EM*, und nehme auf derselben von dem Punkt *E* an die *EM* der *em* in Fig. 31. gleich, so daß *EM* und *em* sich nach einerley Seite hin von *E* und *e* an sich erstrecken. Eben so verfahre man mit den übrigen gleichzeitigen Orten der Erde und des Planeten, welche in der Figur mit denselben Zahlen bezeichnet sind; so wird man in Fig. 32. die relative Bahn *M*, 1, 2, 3, u. s. w. des Planeten um die in dem Punkt *E* als unbeweglich angenommene Erde erhalten. Und da vermöge der in dem vorhergehenden §. gezeigten Ableitung der Anordnung der Bahnen in Fig. 31. aus der in Fig. 30. angenommenen beständig die geraden Linien, welche zwey gleichzeitige Orte der Erde und des Planeten in Fig. 30. und 31. mit einander verbinden, wie z. B. *e'm'* und *em*, einander gleich und parallel sind; so wird die erste Hypothese, nach welcher die 30ste Figur entworfen ist, dieselbe relative Bahn des Planeten um die Erde *E* geben, welche man aus Fig. 31. abgeleitet hat. Man sieht, daß der Planet in *M*, wo die Gesichtslinie *EM* seine Bahn berührt, mithin die Richtung seiner Bewegung mit der Richtung der Gesichtslinie zusammenfällt, seine geocentrische Länge während einiger Zeit nicht merklich ändern, und daher stille zu stehen scheinen wird. Von da an wird er sich von Abend gegen Morgen bewegen, sein Abstand von der Erde wird wachsen, bis er zwischen 6 und 7 bey seiner oberen Conjunktion mit

der Sonne am gröſten wird. Sein Abſtand von der Erde wird wieder abnehmen, bey 13 wird er ſtille zu ſtehen ſcheinen, von da an bis 16 ſich von Morgen gegen Abend bewegen, oder rückläufig werden, und während dieſer Zeit zwiſchen 14 und 15 in ſeiner unteren Conjunktion der Erde am nächſten kommen. Von 16 an, wo ein Stillſtandspunkt eintrifft, wird er ſich wieder von Abend gegen Morgen zu bewegen ſcheinen, oder rechtläufig werden, wobey ſeine Bahn einen Knoten bilden wird. Die Bewegungen des Merkurs und der Venus zeigen wirklich dieſe Erſcheinungen, wenn man ſie nicht auf die Sonne, ſondern auf die Fixſterne oder die Aequinoktialpunkte bezieht. Nimmt man die Bahnen als kreisförmig, und in Fig. 31. als concentriſch mit dem Mittelpunkt der Sonne, in Fig. 30. aber die Erde im Mittelpunkt der kreisförmigen Bahn der Sonne, und letztere im Mittelpunkt der Bahn des Planeten an; ſo iſt die relative Bahn Fig. 32. um die Erde diejenige krumme Linie, welche ein Punkt beſchreibt, der ſich in einem Kreis bewegt, deſſen Mittelpunkt wiederum den Umfang eines Kreiſes durchlauft, und welche man eine Epicycloide nennt.

§. 89. Man vollende das Parallelogramm $e's'm'k$ (Fig. 30.); ſo iſt $e'k = s'm'$, und $e's' = m'k$ (I, 34.). Nimmt man, wie in der erſten Hypotheſe, die Erde in e' unbeweglich an; ſo beſchreibt der Punkt k um e dieſelbe Bahn, welche man den Punkt m' um s' hat beſchreiben laſſen, und wegen der Parallelen $s'm'$ und $e'k$ werden auch die Umlaufszeiten in dieſen zwey Bahnen einander gleich, und die Richtungen der Bewegungen dieſelben ſeyn. Ferner, weil km' beſtändig der $e's'$ gleich und parallel iſt; ſo beſchreibt m' um den ſich bewegenden Punkt k eine Bahn, welche der zuerſt angenommenen Bahn des Punkts s' um e' gleich und ähnlich iſt, und es werden auch die Umlaufszeiten in dieſen zwey Bahnen einander gleich ſeyn. Demnach kann man z. B. die ſcheinbaren Bewegungen des Merkurs auch dadurch darſtellen, daß man einen Punkt k um die ruhende Erde e' dieſelbe *Bahn beſchreiben läßt*, welche man vorher dem

Merkur um die Sonne angewiesen hatte, und annimmt, der Merkur beschreibe um den beweglichen Punkt k während eines Jahrs eine Bahn, welche der scheinbaren Bahn der Sonne um die Erde gleich und ähnlich sey, so daß km' der es' beständig parallel bleibt.

§. 90. Die Stillstandspunkte, welche §. 88. aus der Betrachtung der relativen Bahn um die Erde hergeleitet wurden, können unter der Voraussetzung gleichförmiger Kreisbewegungen auf folgende Art gefunden werden. Um die Sonne s (Fig. 31.) als Mittelpunkt seyen die Kreise amb, eqp beschrieben, und der erstere sey die Bahn des Merkurs oder der Venus, der letztere die Bahn der Erde, welche beyde nach der Richtung von Abend gegen Morgen vermöge der hier gemachten Voraussetzung mit gleichförmiger Geschwindigkeit beschrieben werden. Man setze $se = R$, $sm = r$, die Umlaufszeit der Erde $= T$, die Umlaufszeit des Planeten $= t$; so durchlauft die Erde in der Zeiteinheit, durch welche diese Umlaufszeiten ausgedrückt sind $\frac{360}{T}$ und der Planet $\frac{360}{t}$ Grade, und ihre Geschwindigkeiten v und V sind beziehungsweise $\frac{360\,R}{T}$ und $\frac{360\,r}{t}$. Sind nun die Umlaufszeiten und die mittleren Distanzen gegeben; so kennt man das Verhältniß der Geschwindigkeit V des Planeten zu der Geschwindigkeit v der Erde, welches dem Verhältniß von $\frac{r}{t} : \frac{R}{T}$ oder dem von $rT : Rt$ gleich ist. Es stehe zur Zeit des Stillstands die Erde in e, der Planet in m, man ziehe se, sm, me und an die Punkte m und e die Tangenten mt, et', welche die Richtungen bezeichnen, nach welchen sich der Planet und die Erde bewegen. Man nehme auf diesen Tangenten von den Berührungspunkten an auf derselben Seite von se, nach welcher sich die Erde und der Planet bewegen, also von Abend gegen Morgen, die mt und et' so, daß $mt : et' = V : v = rT : Rt$, und ziehe tt'. Da nun in dem Punkt m der Planet stille zu stehen *scheinen*, oder seine geocentrische Länge nicht ändern soll; so

muß die Geſichtslinie *em* ſich ſelbſt parallel fortrücken, und daher *tt'* mit *me* parallel ſeyn. Man verlängere *mt* und *et'*, bis ſie ſich ſchneiden in *l*, die *lm* und ihre Verlängerung begegne der Erdbahn in *p* und *q*, und es ſeyen *ls* und *sp* gezogen. Wegen der Parallelen *me* und *tt'* verhält ſich

$$\left.\begin{matrix} me : et' \\ V : v \end{matrix}\right\} = ml : le$$

alſo $V^2 : v^2 = \overline{ml}^2 : \overline{le}^2$

$= ql \times lp + \overline{pm}^2 : ql \times lp$; (II, 6 u. III, 36.)

mithin $V^2 : V^2 - v^2 = \overline{ml}^2 : \overline{pm}^2$.

Betrachtet man den Punkt *m* als gegeben; ſo iſt die *pm*, und, weil man ihr Verhältniß zu *ml* kennt, die *ml* gegeben. Folglich findet man den correſpondirenden Ort *e* der Erde, wenn man aus dem gegebenen Punkt *l* eine Tangente *le* an die Erdbahn zieht.

Da $\overline{pm}^2 = \overline{ps}^2 - \overline{sm}^2$ (I, 47.) $= R^2 - r^2$; ſo verhält ſich

$R^2 - r^2 : r^2 = \overline{pm} : \overline{sm}$

aber $V^2 : V^2 - v^2 = \overline{ml}^2 : \overline{pm}^2$

folglich $V^2 (R^2 - r) : r^2 (V^2 - v^2) = \overline{ml}^2 : \overline{sm}^2$

und $V\sqrt{R^2 - r^2} : r\sqrt{V^2 - v^2} = ml : sm$.

In dem bey *m* rechtwinklichten Dreyeck *lms* kennt man alſo das Verhältniß der zwey um den rechten Winkel liegenden Seiten, und daher iſt der Winkel *slm* gegeben. Da nun ſo wohl *lms* als *les* ein rechter Winkel iſt; ſo geht ein über *ls* beſchriebener Halbzirkel durch die Punkte *m* und *e*. Folglich iſt *slm* = *sem* (III, 27.), woraus ſich die Elongation des Planeten von der Sonne zur Zeit ſeines Stillſtands ergiebt.

Soll ein Stillſtand möglich ſeyn; ſo darf *v* nicht gröſſer als *V*, oder, weil $v : V = Rt : rT$, Rt nicht $> rT$, $R : r$ nicht $> T : t$ ſeyn. Iſt $R : r = T : t$; ſo verſchwindet der Winkel *sem*, und der Stillſtandspunkt fällt mit der unteren Conjunktion zuſammen. Iſt aber $R : r < T : t$; ſo finden zwey Stillſtände, der eine vor, der andere nach der unteren Conjunktion in gleichen öſtlichen und weſtlichen *Elongationen von der Sonne* Statt. Nun erge-

ben sich aus den synodischen Umlaufszeiten des Merkurs und der Venus (§. 84. und 85.) und der Umlaufszeit der Sonne mittelst der Proportion §. 61. ihre periodischen Umlaufszeiten 87 T. 23 $\frac{1}{4}$ St. und 224 T. 16 $\frac{2}{3}$ St. folglich verhält sich bey dem Merkur $T : t = 1000 : 241$, bey der Venus $= 1000 : 615$. Für den Merkur ist aber $R : r = 1000 : 387$, und für die Venus $= 1000 : 723$ (§. 84. und 85.). Mithin finden wirklich bey diesen zwey Planeten Stillstandspunkte auf beyden Seiten ihrer unteren Conjunktion Statt, welches mit den Beobachtungen übereinstimmt.

Da $V : v = rT : Rt$; so verhält sich

$$V^2 : v^2 = r^2T^2 : R^2t^2$$
$$V^2 : V^2 - v^2 = r^2T^2 : r^2T^2 - R^2t^2$$
$$(R^2 - r^2)\,V^2 : r^2(V^2 - v^2) = (R^2 - r^2)\,T^2 : r^2T^2 - R^2t^2$$

Mithin verhält sich auch vermöge des bewiesenen

$$\left.\begin{matrix} \overline{ml}^2 : \overline{sm}^2 \\ \text{oder } \overline{\text{Sin. tot.}}^2 : \overline{\text{Tg. } ml}^2 \end{matrix}\right\} = (R^2 - r^2)\,T^2 : r^2T^2 - R^2t^2$$

$$\text{Sin. tot.} : \left\{\begin{matrix} \text{Tg. } mls \\ \text{Tg. } sem \end{matrix}\right\} = T\sqrt{R^2 - r^2} : \sqrt{r^2T^2 - R^2t^2}$$

Es ist aber, wie Kepler gefunden hat, und es sich auch für die Venus und den Merkur aus den oben angegebenen Umlaufszeiten und mittleren Entfernungen ergiebt,

$$R^3 : r^3 = T^2 : t^2$$

also

$$R : r = rT^2 : R^2t^2$$
$$\left.\begin{matrix} R - r : R \\ R^2 - r^2 : R\,(R + r) \end{matrix}\right\} = r^2T^2 - R^2t^2 : r^2T^2$$
$$(R^2 - r^2)\,T^2 : T^2R\,(R + r) = r^2T^2 - R^2t^2 : r^2T^2$$
$$\left.\begin{matrix} (R^2 - r^2)\,T^2 : r^2T^2 - R^2t^2 \\ \overline{\text{Sin. tot.}}^2 : \overline{\text{Tg. } sem}^2 \end{matrix}\right\} = \left\{\begin{matrix} T^2R\,(R + r) : r^2T^2 \\ R\,(R + r) : r^2 \end{matrix}\right\}$$

mithin $\text{Sin. tot.} : \text{Tg. } sem = \sqrt{R\,(R + r)} : r$

$$\text{Tang. } sem = \frac{r\ \text{Sin. tot.}}{\sqrt{R\,(R + r)}} = \frac{\frac{r}{R}\ \text{Sin. tot.}}{\sqrt{1 + \frac{r}{R}}}$$

$$= \frac{0{,}387\ \text{Sin. tot.}}{\sqrt{1{,}387}} \text{ für den Merkur,}$$

$$= \frac{0{,}723\ \text{Sin. tot.}}{\sqrt{1{,}723}} \text{ für die Venus.}$$

Merkur und Venus ſcheinen alſo ſtille zu ſtehen, wenn ihre öſtlichen oder weſtlichen Elongationen von der Sonne beziehungsweiſe 18° 11′ und 28° 51′ ſind.

§. 91. Auf der Venus hat man Flecken beobachtet, deren ſcheinbare Bewegungen den §. 58. beſchriebenen ſcheinbaren Bewegungen der Sonnenflecken ähnlich waren, und woraus man die Umdrehung der Venus von Abend gegen Morgen um eine gegen die Ebene der Ekliptik geneigte Axe geſchloſſen hat. Caſſini ſetzte ihre Umdrehungszeit zu 23 St. 20 Minuten, Bianchini zu 24 T. 8 St. an. Letzterer hat wahrſcheinlich 25 Umdrehungen der Venus mit einer Umdrehung verwechſelt. Schröter ſetzt ſie nahe mit Caſſini übereinſtimmend zu 23 St. 21 Min. an. Nach Schröters Beobachtungen dreht ſich auch Merkur in 24 St. von Abend gegen Morgen um ſeine Axe.

Die Lichtgränze dieſer Planeten iſt ſo wie die des Monds ausgezackt, und daher giebt es Berge auf ihrer Oberfläche, welche nach Caſſini und Schröter noch höher als die Berge des Monds ſind. Die Art der Berechnung iſt der im 81ſten §. gezeigten ähnlich.

§. 92. Die zwey Planeten, welche wir bisher betrachtet haben, ſcheinen die Sonne beſtändig zu begleiten, die übrigen hingegen nehmen in Abſicht auf die Sonne jede mögliche Stellung an dem Himmel ein. Die ſcheinbaren Bewegungen der letztern ſind aber einander ſo ähnlich, daß es hinreichend ſeyn wird, die Bewegung eines derſelben genauer zu betrachten, um einzuſehen, wie man auch dieſe aus zwey Umlaufsbewegungen um verſchiedene Mittelpunkte zuſammenſetzen könne.

Unter dieſen Planeten iſt der Mars an ſeinem röthlichten Lichte kenntlich. Wenn man ihn des Morgens bey ſeinem Heraustreten aus den Sonnenſtralen erblickt; ſo bewegt er ſich am geſchwindeſten, und von Abend gegen Morgen. Seine Geſchwindigkeit nimmt nach und nach ab, und er ſcheint in Beziehung auf die Fixſterne ſtille zu ſtehen, wenn er ſich um 137 Grade von der Sonne entfernt hat.

Nun wird er rückläufig, und die Geschwindigkeit seiner retrograden Bewegung wächst, bis er sich um 180 Grade von der Sonne entfernt hat, wo er mit ihr in Opposition kommt, und er sich am geschwindesten von Morgen gegen Abend bewegt. Seine Geschwindigkeit nimmt nach der Opposition nach und nach wieder ab, bis er bey seiner Annäherung zu der Sonne nur noch 137 Grade von ihr entfernt ist, und er wieder in Beziehung auf die Fixsterne stille zu stehen scheint. Nachdem er ungefähr 73 Tage rückwarts sich bewegt, und während dieser Zeit von Morgen gegen Abend einen Bogen von etwa 16 Graden beschrieben hat, wird er wiederum rechtläufig, und seine Geschwindigkeit wächst, bis er in den Sonnenstralen verschwindet. Diese Erscheinungen kommen bey jeder Opposition des Mars in derselben Ordnung wieder. Während dieser Bewegungen verändert sich sein scheinbarer Durchmesser beträchtlich. Er ist in der Opposition am gröſten, und am kleinsten in der Nähe der Sonne.

Man sieht hieraus, daß die scheinbare Bewegung des Mars um die Erde überhaupt von Abend gegen Morgen gerichtet ist, dieser Planet aber außer dieser Bewegung noch eine andere haben muß, welche bald mit der Richtung seiner Bewegung von Abend gegen Morgen übereinstimmend, bald ihr entgegen ist, und jener ersteren Bewegung gleich seyn, oder sie übertreffen kann, je nachdem der Planet stillstehend ist, oder sich rückwarts bewegt. Diese letztere Bewegung kann wiederum im Allgemeinen durch eine Kreisbewegung dargestellt werden, wenn man annimmt, daß die Erde sich beständig außerhalb des Umfangs dieses Kreises sich befinde. Die relative Bahn des Mars um die Erde wird alsdenn so wie die relative Bahnen des Merkurs und der Venus, eine Epicycloide werden, welche, wie §. 88. gezeigt worden ist, von der Erde aus gesehen, mit eben solchen Veränderungen in der Geschwindigkeit und Richtung der Bewegung wird beschrieben werden, dergleichen man in der scheinbaren Bewegung des Mars um die Erde beobachtet.

§. 93. Es sey nun SS' (Fig. 33.) die scheinbare Bahn

der Sonne um die Erde E und der Mars beſchreibe einen Kreis MN, deſſen Mittelpunkt C in einer kreisförmigen Bahn CC' ſich um die Erde E von Abend gegen Morgen bewege. Da der Mars zur Zeit ſeiner Oppoſition ſich am geſchwindeſten rückwarts bewegt, und zugleich ſein ſcheinbarer Durchmeſſer am gröſten iſt; ſo müſſen, wenn er in M mit der Sonne S in Oppoſition iſt, ſo wohl M, E, S, als C, M, E (III, 8.) in einer geraden Linie liegen, und er muß von C aus betrachtet den Kreis MN ebenfalls in der Richtung von Abend gegen Morgen beſchreiben, damit er zur Zeit ſeiner Oppoſition von E aus geſehen rückläufig erſcheine. Bey der nächſtfolgenden Oppoſition befinde er ſich in M' die Sonne in S', und der Mittelpunkt des ſich fortbewegenden Kreiſes ſey in C'; ſo müſſen wiederum C', M', E, S' in einer geraden Linie liegen, und die Zeit von einer Oppoſition bis zu der nächſtfolgenden wird der ſynodiſchen Umlaufszeit des Punkts C in Beziehung auf die Sonne gleich ſeyn. Demnach ſind wenigſtens in den Oppoſitionen die Halbmeſſer CM, CM' nach der Sonne gerichtet. Eben dieſes muß in der Nähe der Conjunktionen Statt finden, weil alsdann der ſcheinbare Durchmeſſer des Mars am kleinſten iſt. Man laſſe daher den Mars den beweglichen Kreis MN in derſelben Zeit beſchreiben, in welcher die Sonne ihren ſcheinbaren Umlauf um die Erde vollendet; ſo wird er, wenn er bey einer Oppoſition der Erde am nächſten war, auch bey jeder der übrigen ihr am nächſten, und bey jeder Conjunktion von ihr am weiteſten entfernt ſeyn.

Die Umlaufszeit des Punkts C wird ſich aus der ſynodiſchen Umlaufszeit dieſes Punks, und der Dauer des Jahrs ergeben. Man findet nemlich auf ähnliche Art, wie §. 61. für die Sonne und den Mond bewieſen worden iſt, daß, wenn T, t die zwey Umlaufszeiten ſind, T die größere, S die ſynodiſche Umlaufszeit iſt, und beyde Körper ſich nach einerley Richtung bewegen, $T + S : S = T : t$, mithin auch $S : T = S - t : t$ ſich verhält. Alſo iſt durch die ſynodiſche Umlaufszeit und eine der zwey periodiſchen Umlaufszeiten die andere gegeben, wenn man weiß, ob die gegebene *Umlaufszeit die größere* oder die kleinere iſt. Da

nun der Mars schon bey einer Elongation von 137° von der Sonne stillstehend, und von da an rückläufig ist; so muß, weil $CE > CM$ und vermöge eines ähnlichen Beweises wie in §. 90. die Umlaufszeit des Punkts C um die Erde größer seyn, als die Umlaufszeit des Mars in dem Kreis MN, oder als die Umlaufszeit der Sonne, und man wird die zweyte der oben angegebenen Proportionen anwenden müssen, um die Umlaufszeit T des Punkts C zu finden, zu deren Bestimmung jetzt noch die Zwischenzeit zwischen zwey zunächst aufeinander folgenden Oppositionen des Mars erfordert wird. Man findet aber, wenn man verschiedene Oppositionen mit einander vergleicht, Unterschiede in den Zwischenzeiten, welche zu beträchtlich sind, als daß sie der ungleichförmigen Bewegung der Sonne allein könnten zugeschrieben werden; folglich muß auch die Bewegung des Punkts C ungleichförmig seyn. Im Mittel genommen wird man die synodische Umlaufszeit des Mars = 779 T. 22 St. finden, welche sich zu der Umlaufszeit der Sonne nahe wie 32 zu 15 verhält. Um sie genauer zu bestimmen, nehme man eine Periode von 15 synodischen Umläufen des Mars, welche hienach 32 Jahre ausmachen wird; so wird die auf das Ende dieser Periode fallende Opposition des Mars wiederum nahe in demselben Punkt der Ekliptik Statt finden, in welchem man die erste Opposition beobachtete, und die von der ungleichförmigen Bewegung der Sonne herrührenden Unterschiede müssen sich während dieser Periode gegen einander aufheben, weil die Sonne in denselben Punkten ihrer Bahn dieselben Ungleichheiten in ihrer Bewegung zeigt (§. 40.). Eben dieses muß auch bey der Bewegung des Punkts C der Fall seyn, weil die Periode von 15 synodischen Umläufen des Mars sehr nahe gleich lang gefunden wird, wenn man zwey andere nahe in einerley Punkt der Ekliptik sich ereignende Oppositionen beobachtet, welcher von demjenigen verschieden ist, in welchem die zwey ersteren sich ereigneten. Aus einer großen Anzahl von Beobachtungen hat man die mittlere synodische Umlaufszeit des Mars = 779 T. 22 St. 28 M. 32,56 S. gefunden, woraus sich, wie oben gezeigt wurde, die tropische Umlaufszeit

von C = 686 T. 22 St. 18 M. 43,73 S. und die ſideriſche = 686 T. 23 St. 30 M. 39,05 S. ergiebt, je nachdem man *t* der tropiſchen oder ſideriſchen Umlaufszeit der Sonne gleich ſetzt.

§. 94. Nachdem man die Länge des Mars zur Zeit ſeiner Oppoſition in *M* beobachtet hat, beſtimme man ſeine Länge wiederum, wenn von dem Augenblick dieſer Oppoſition an ein Zeitraum verfloßen iſt, welcher der Umlaufszeit von *C* gleich iſt, mithin der Punkt *C* ſich wiederum an demſelben Ort befindet, wo er bey der Oppoſition ſich befand. Da man nun die Umlaufszeit des Mars in dem Kreis *MN*, welche der Umlaufszeit der Sonne gleich iſt, kennt; ſo wird man unter der Vorausſetzung einer gleichförmigen Bewegung den Ort *m* des Mars in dieſem Kreis angeben können, wenn man ſchließt: wie ſich verhält die Umlaufszeit der Sonne zu der Umlaufszeit von *C*, ſo verhalten ſich 360° zu der Anzahl Grade, welche der Mars von dem Punkt *M* an in der Zwiſchenzeit der Beobachtungen durchloffen hat. Man wird 677° 4′ 13″ oder 360 + 317° 4′ 13″ finden, und daher wird, wenn der Mars zur Zeit der zweyten Beobachtung in *m* war, der Winkel *ECm* = 42° 55′ 47″ ſeyn. Da man die Länge des Mars ſo wohl in der Oppoſition, als da er in *m* war beobachtet hat; ſo kennt man auch den Unterſchied *CEm* der Längen, welcher = 40° 46′ 50″ ſey. Mithin kennt man die Winkel *ECm*, *CEm* des Dreyecks *ECm*, alſo auch das Verhältniß von *CE* : *Cm*, welches hier dem Verhältniß von 1,52179 : 1 gleich ſeyn wird. Wenn der Punkt C von der Oppoſition an gerechnet zwey Umläufe gemacht hat, beobachte man wiederum die Länge des Mars, welcher jetzt in *n* ſtehe. In dem Dreyeck *ECn* wird der Winkel *ECn* = 2 *ECM* = 85° 51′ 34″, und der Winkel *CEn*, welcher dem Unterſchied der Längen des Mars bey dieſer Beobachtung und bey ſeiner Oppoſition gleich ſeyn wird, gegeben ſeyn. Folglich wird man das Verhältniß von *EC* : *Cn* angeben können, und dadurch wird auch das Verhältniß von *Cn* : *Cn* gegeben ſeyn, weil man das Verhältniß von *CE* : *Cm* kennt. Eben ſo kann man die Zeiten abwarten, da der Punkt C

drey, vier Umläufe u. s. w. von der Opposition an gerechnet gemacht hat, und dadurch die Verhältnisse der Abstände des Mars von dem Punkt *C* an mehreren Stellen bestimmen. Man wird finden, daß diese Abstände sich nur wenig verändern, und daher die Bahn *MN* einem Kreis nahe kommt, dessen Mittelpunkt in *C* fällt. Sie werden am kleinsten seyn, wenn der scheinbare Halbmesser der Sonne am gröſten, und am gröſten, wenn dieser am kleinsten ist. Wegen dieses genaueren Zusammenhangs der Bahn *MN* mit der scheinbaren Bahn der Sonne um die Erde, lasse man jetzt den Mars diese Bahn nicht mehr gleichförmig, sondern mit denselben Veränderungen der Geschwindigkeit beschreiben, welche die Sonne in ihrer jährlichen Bewegung zeigt, bestimme daher den Ort *m* des Mars immer so, daß *Cm* mit der an den gleichzeitigen Ort *s* der Sonne gezogenen *Es* parallel sey, und beobachte um den Winkel *ECm* zu erhalten, jedesmal auch die Länge der Sonne. Man wird alsdenn den Unterschied *SEs* der Länge der Sonne bey der Opposition und derjenigen, welche sie in *s* hatte, mithin auch den Winkel *ECm* = *SEs* haben, und wie vorhin das Verhältniß von *EC* : *Cm* finden. Unter dieser Voraussetzung werden die Abstände des Mars von dem Punkt *C* sehr nahe den correspondirenden scheinbaren Halbmessern der Sonne umgekehrt, mithin ihren Abständen von der Erde direkt (§. 49. n. 5.) proportional gefunden werden; folglich ist die Bahn *MN* der scheinbaren Bahn der Sonne um die Erde ähnlich.

§. 95. Um jetzt noch die Bahn *CC'* genauer zu bestimmen, gehe man von einer andern Opposition *M'* des Mars aus, und stelle ähnliche Untersuchungen, wie im vorhergehenden §. an. Wenn von dieser Opposition an die Umlaufszeit von *C* verflossen ist, stehe die Sonne in *s'*, man ziehe *C'm'* mit der *Es'* parallel, welche der Bahn *M'N'* in *m'* begegne; so steht vermöge des vorhergehenden §. der Mars in *m'*, und man erhält wie vorhin aus den Beobachtungen den Winkel *EC'm'* = *S'Es'*, und, wenn *Em'* gezogen wird, den Winkel *C'Em'*. Hieraus ergiebt sich das Verhältniß

hältniß von $EC' : C'm'$, und, weil $C'm' : Cm = Es' : Es$, das Verhältniß von $EC' : Cm$. Man hat aber das Verhältniß von $Cm : CE$ gefunden; folglich kennt man das Verhältniß von $C'E : CE$. Diese Unterſuchungen zeigen, daß die Bahn CC' beträchtlich von einem mit der Erde E concentriſchen Kreis abweicht, und der Abſtand CE bey einer Länge von 11 Z. $2° \frac{1}{2}$ am kleinſten, bey 5 Z. $2° \frac{1}{2}$ am gröſten iſt. Die gerade Linie, welche dieſe zwey Punkte mit einander verbindet, iſt alſo die Apſidenlinie dieſer Bahn, und da diejenigen Abſtände, welche auf beyden Seiten gleiche Winkel mit der Apſidenlinie machen, einander gleich ſind; ſo wird ſie durch die Apſidenlinie in zwey gleiche und ähnliche Theile getheilt. Wenn die Sonne ſich in ihrem mittleren Abſtand von der Erde befindet, verhält ſich $CE : Cm = 1{,}0056012 : 1$, wenn CE am gröſten, und wie $1{,}3817858 : 1$, wenn CE am kleinſten iſt, und daher verhält ſich der mittlere Werth von CE zu dem mittleren Werth von $Cm = 1{,}5236935 : 1$.

§. 96. Man ziehe durch den Ort m (Fig. 33.) des Mars eine Parallele mk mit CE, welche der von der Erde E an den gleichzeitigen Ort s der Sonne gezogenen Es in k begegne. Da vermöge des vorhergehenden §. immer Cm mit Es parallel iſt; ſo iſt $ECmk$ ein Parallelogramm, und daher $mk = CE$, $Cm = kE$ (I, 34.). Die ſcheinbaren Bewegungen des Mars um die Erde werden alſo dieſelben wie vorhin ſeyn, wenn man den Punkt k um die Erde eine Bahn beſchreiben läßt, welche der MN, mithin auch, vermöge des vorhergehenden §. der ſcheinbaren Bahn der Sonne um die Erde ähnlich iſt, und mit dieſer in gleicher Zeit beſchrieben wird, und annimmt, daß der Mars um den ſich fortbewegenden Punkt k dieſelbe Bahn beſchreibe, welche man dem Punkt C um die Erde E angewieſen hatte, ſo daß dieſe zwey letztern Bahnen in gleichen Zeiten beſchrieben werden. Aber wenn man EC und Cm oder mk und kE in einerley Verhältniß vergrößert oder vermindert, ſo bleiben die Winkel CEm, sEm, mithin auch die ſcheinbaren Bewegungen des Mars, dieſelben wie vorhin. Man kann alſo

den Punkt *k* mit dem gleichzeitigen Ort *s* der Sonne zusammenfallen lassen, und alsdenn wird das Verhältniß von *Cm* : *CE*, oder von *mk* : *Ek* dem Verhältniß des Abstands der Sonne von der Erde zu dem Abstand des Mars von der Sonne gleich werden, welches in den mittleren Distanzen dem Verhältniß von 1 : 1,5236935 gleich seyn wird (§. 95.). Von dem Merkur und der Venus wissen wir schon aus §. 84. und 85. daß sie um die Sonne sich bewegen, man wird also der Analogie nach auch den Mars seine Bahn um die Sonne beschreiben lassen, und der Hauptunterschied zwischen den zwey ersteren Bahnen und der Bahn des letzteren wird blos darinn bestehen, daß die Bahnen des Merkurs und der Venus von der Bahn der Sonne um die Erde eingeschlossen werden, die Bahn des Mars aber größer ist als die letztere. Man nennt daher auch diejenige Planeten, deren Bahnen kleiner sind, als die Sonnenbahn, die unteren, diejenige aber, deren Bahnen größer als die Bahn der Sonne um die Erde sind, die oberen Planeten.

§. 97. Daß die zwey unteren Planeten um die Sonne laufen, hat man §. 84. und 85. aus den Veränderungen ihrer Lichtgestalten geschlossen. Auch der Mars zeigt solche Veränderungen, nur mit dem Unterschied, daß er niemals sichelförmig, sondern, wenn seine Lichtgestalt am kleinsten ist, ungefähr so, wie der Mond vier Tage vor oder nach dem Vollmond erscheint. Zur Zeit seiner Opposition zeigt er sich als eine ganz beleuchtete Scheibe, und dieser Gestalt nähert er sich wieder, wenn er von da an bis auf die erwähnte Gränze abgenommen hat, bey seinem Verschwinden in den Stralen der Sonne. Sein scheinbarer Durchmesser ist zu klein, als daß man aus seinen Phasen mit einiger Genauigkeit den Winkel finden könnte, welchen die aus seinem Mittelpunkt an die Erde und an die Sonne gezogenen geraden Linien mit einander einschließen. Indessen liegen die Abweichungen der Beobachtungen und Berechnungen innerhalb der Gränzen der Fehler, welchen man *bey dieser Art* von Beobachtungen ausgesetzt ist. Man

meſſe z. B. wenn man den Mars nach ſeiner Oppoſition, und nachdem der Punkt C von da an einen Umlauf gemacht hat, beobachtet, ſeinen gröſten und kleinſten Durchmeſſer, und man wird finden, daß ſie ſich nahe wie 7 : 8 verhalten. Hienach verhält ſich der Abſtand der Lichtgränze von dem Mittelpunkt des Mars zu ſeinem Halbmeſſer = 3 : 4, und der Winkel, unter welchem die von dem Mars an die Erde E und die Sonne s gezogenen geraden Linien mE, ms ſich ſchneiden, wird ungefähr 41 Grade betragen (§. 71.). Man hat aber zu dieſer Zeit den Winkel $CEm = 40° 46' 50''$ gefunden (§. 94.), und daher ſind ms und CE einander ſo nahe parallel, als man von dergleichen Beobachtungen erwarten kann. Der Winkel Ems wird unter der Vorausſetzung, daß ms und CE parallel ſeyen, am gröſten, wenn mE den Kreis MN berührt, und das Verhältniß von $CE : Cm$ am kleinſten iſt. Mithin kann dieſer Winkel nicht größer werden als $47° 23'$, woraus mit den Beobachtungen übereinſtimmend folgt, daß die Phaſen des Mars nicht kleiner werden können, als die Phaſen des Monds ſind, wenn er um $47° 23'$ von der Oppoſition abſteht, alſo ſein Durchmeſſer zu der Breite des beleuchteten Theils wie 200 : 1677 oder nahe wie 6 : 5 ſich verhält.

§. 98. Man ſetze jetzt, wie es §. 87. bey den unteren Planeten geſchehen iſt, die Sonne unbeweglich in s (Fig. 34.), ziehe durch s die Parallelen se, sm mit den Linien kE, km in Fig. 33., und nehme auf dieſen Parallelen von dem Punkt s an immer $se = kE$, $sm = km$; ſo wird die me in Fig. 34. der correſpondirenden mE in Fig. 33. beſtändig gleich und parallel, mithin die ſcheinbare Bahn des Mars von e aus geſehen dieſelbe wie vorhin ſeyn. Und da man den Punkt k (Fig. 33.) in einer beliebigen Diſtanz von E nehmen darf, wenn man nur zugleich die mk oder CE ſo nimmt, daß das Verhältniß von $kE : km$ oder CE das vorige bleibt (§. 96.); ſo wird, wenn man den Punkt k mit der Sonne s zuſammenfallen läßt, welches ohnehin wenigſtens ſehr nahe Statt finden muß (§. 97.), der Punkt e in *Fig. 34. eine Bahn um die* ruhende Sonne s beſchrei-

ben, welche der scheinbaren Bahn der Sonne um die Erde in Fig. 33. gleich und ähnlich ist, und die Bahn der Erde um die Sonne seyn wird, und zugleich wird der Mars *m* (Fig. 34.) um die Sonne in der Bahn *mpq* sich herum bewegen, welche der Bahn *CC'* in Fig. 33. ähnlich seyn, und mit ihr in gleicher Zeit beschrieben werden wird. Vergleicht man hiemit das, was §. 87. von den unteren Planeten bewiesen worden ist; so wird sich um die ruhende Sonne zunächst der Merkur, hierauf die Venus, hernach die Erde, und nach dieser der Mars in beynahe kreisförmigen Bahnen bewegen, welche in desto größeren Zeiten beschrieben werden, je größer die mittleren Abstände von der Sonne sind. Von der Sonne aus gesehen werden diese Planeten mit der Erde beständig nach einerley Richtung sich bewegen, nemlich von Abend gegen Morgen.

§. 99. Die Stillstandspunkte eines oberen Planeten werden auf eine ähnliche Art gefunden, wie es §. 90. bey den unteren Planeten gezeigt worden ist, wenn man auch hier die Bahnen kreisförmig und mit gleichförmiger Geschwindigkeit beschrieben voraussetzt. Es seyen nemlich *mpq*, *aeb* die kreisförmigen Bahnen eines obern Planeten *m* und der Erde *e* um den Mittelpunkt *s*, in welchem sich die Sonne befinde. Zur Zeit eines Stillstands befinde sich der Planet in *m*, die Erde in *e*. Man ziehe die Tangenten *ml*, *el* an *m* und *e*, welche die Richtungen der Bewegung des Planeten und der Erde bestimmen, und auf denselben seyen von *m* und *e* an die *mt*, *et'* auf einerley Seite der geraden Linie *me* so genommen, daß *mt* zu *et'* sich verhalte wie die Geschwindigkeit *V* des Planeten zu der Geschwindigkeit *v* der Erde. Man ziehe *tt'*, und die Tangente *mt* schneide die *et'* in *t*, letztere begegne der Planetenbahn in *p*, und ihre Verlängerung begegne ihr in *q*. Endlich seyen *st*, *sp* gezogen. Da der Planet seine geocentrische Länge nicht verändern soll; so müssen *me* und *tt'* parallel seyn, und es wird sich verhalten

$$\left.\begin{matrix} et' : mt \\ v : V \end{matrix}\right\} = te : mt$$

$v^2 : V^2 = \overline{le}^2 : \overline{ml}^2$

$= ql \times lp + \overline{pe}^2 : ql \times lp$ (II, 6. u. III, 36.)

$v^2 : v^2 - V^2 = \overline{le}^2 : \overline{pe}^2$

Betrachtet man den Punkt e als gegeben; ſo iſt die pe, mithin auch die le gegeben, deren Verhältniß zu pe dem gegebenen von $v : \sqrt{v^2 - V^2}$ gleich iſt. Man findet alſo den Ort m des Planeten, wo er ſtehen muß, wenn er von dem gegebenen Ort e der Erde geſehen ſtillſtehend erſcheinen ſoll, wenn man aus dem gegebenen Punkt l eine Tangente lm an die Planetenbahn zieht.

Aus obiger Proportion folgt ferner

$V^2 : v^2 - V^2 = \overline{ml}^2 : \overline{pe}^2$

Es iſt aber, wenn man $se = R$, sm oder $sp = r$ ſetzt

$\overline{pe}^2 = \overline{ps} - \overline{se}^2 = r^2 - R^2$ (I, 47.);

$r^2 - R^2 : r^2 = \overline{pe}^2 : \overline{sm}^2$

$V^2 (r^2 - R^2) : r^2 (r^2 - V^2) = \overline{ml}^2 : \overline{sm}^2$

und $V\sqrt{r^2 - R^2} : r\sqrt{v^2 - V^2} = ml : sm.$

Demnach kennt man in dem bey m rechtwinklichten Dreyeck lms das Verhältniß der um den rechten Winkel liegenden Seiten, woraus man den Winkel lsm findet, welcher dem Winkel lem gleich iſt, weil ſo wohl lms als les rechte Winkel ſind, und ſich daher ein Kreis um das Viereck $lmes$ beſchreiben läßt. Man addire 90° zu dem Winkel lsm oder lem; ſo erhält man den Winkel mes, welcher der Elongation des Planeten von der Sonne zur Zeit des Stillſtands gleich iſt.

Heißt die Umlaufszeit der Erde oder die Zeit eines ſcheinbaren Umlaufs der Sonne T, und die Umlaufszeit des Planeten t; ſo verhält ſich, wie in §. 90.

$v : V = Rt : rT$

$v^2 : V^2 = R^2t^2 : r^2T^2$

$V^2 : v^2 - V^2 = r^2T^2 : R^2t^2 - r^2T^2$

$\left.\begin{matrix} V^2 (r^2 - R^2) : r^2 (v^2 - V^2) \\ \overline{ml}^2 : \overline{sm}^2 \end{matrix}\right\} = (r^2 - R^2) T^2 : R^2t^2 - r^2T^2$

Da in gegenwärtigem Fall $r > R$; ſo darf, wenn ein

Stillſtand möglich ſeyn ſoll Rt nicht kleiner als rT, mithin $R : r$ nicht $< T : t$ ſeyn. In Beziehung auf den Mars iſt $R : r = 1000 : 1524$, und $T : t = 10000 : 18807$, alſo $R : r > T : t$, und daher finden wirklich auf beyden Seiten der Oppoſition Stillſtände des Mars Statt, welches mit den §. 92. angeführten Erfahrungen übereinſtimmt.

Weil $ml : sm$ = Sin. tot. : Tang. mls
= Sin. tot. : Tg. ($180^\circ - mes$), (III, 22.);
ſo verhält ſich auch

$$T\sqrt{r^2 - R^2} : \sqrt{R^2t^2 - r^2T^2} = \text{Sin. tot.} : \text{Tg.}(180^\circ - mes),$$

woraus ſich die Elongation mes des Planeten von der Sonne zur Zeit ſeines Stillſtands ergiebt.

Unter der Vorausſetzung, daß $r^3 : R^3 = t^2 : T^2$, welche auch bey dem Mars zutrifft, verhält ſich

$$r : R = R^2t^2 : r^2T^2$$

$$\left.\begin{array}{l} r - R : R \\ r^2 - R^2 : R(r+R) \\ T^2(r^2 - R^2) : T^2R(r+R \end{array}\right\} = R^2t^2 - r^2T^2 : r^2T^2$$

$$T^2(r^2 - R^2) : R^2t^2 - r^2T^2 = T^2R(r+R) : r^2T^2,$$

oder $\overline{ml}^2 : \overline{sm}^2 = R(r+R) : r^2$

$$= \frac{r}{R} + 1 \quad : \frac{r^2}{R^2};$$

folglich Sin. tot. : Tg. (180° - mes) $= \sqrt{\frac{r}{R} + 1} : \frac{r}{R}$

Demnach iſt, wenn man die mittleren Diſtanzen nimmt, für den Mars

$$\text{Tg.}(180^\circ - mes) = \frac{1{,}5236935}{\sqrt{2{,}5236935}} \text{ Sin. tot.}$$

$$= \text{Tang. } 43^\circ\ 48'\ 18''$$

$$mes = 136^\circ\ 11'\ 42''.$$

Wegen der ungleichförmigen Bewegung des Mars und der Ungleichheit ſeiner Abſtände von der Sonne, verändern ſich dieſe Elongationen von der Sonne beträchtlich, und fallen zwiſchen 130 und 146 Gr.

§. 100. Die beträchtlichen Veränderungen des ſcheinbaren Durchmeſſers des Mars ſtimmen genau mit den Veränderungen ſeines Abſtands von der Erde, welche ſich aus

den §. 95. und 96. angeführten Verhältnißen ergeben. In der Oppoſition ſteigt er bis auf 24,7 Sekunden, in der Nähe ſeiner Conjunktion aber beträgt er nur noch 4 Sekunden. Seßt man den mittleren Abſtand der Sonne von der Erde = 1; ſo iſt der kleinſte Abſtand des Mars von der Sonne = 1,3817858, und daher ſein Abſtand von der Erde in der Oppoſition = 0,3817858, wenn die leßtere in ihrem mittleren Abſtand von der Sonne iſt. Dieſer iſt aber um 0,0168532 kleiner als der gröſte Abſtand der Sonne von der Erde, und daher wird der kleinſte Abſtand des Mars von der Erde = 0,3649326 ſeyn. Der gröſte Abſtand des Mars von der Erde findet in der Conjunktion mit der Sonne Statt, wenn er und die Erde zugleich am weiteſten von der Sonne abſtehen, und iſt demnach = 2,6824544. In dieſer Diſtanz beträgt alſo der ſcheinbare Durchmeſſer des Mars nur noch 3″,35, und in einer Diſtanz, welche dem mittleren Abſtand der Sonne von der Erde gleich iſt, 9″, (§. 49. n. 5.)

Wenn der Mars der Erde am nächſten iſt; ſo muß ſeine Horizontalparallaxe 2,74 mal größer ſeyn, als die mittlere Parallaxe der Sonne (§. 49. n. 1.), mithin nahe = 24″,1. Man hat daher ſeine Parallaxe, wenn er in Oppoſition mit der Sonne war, nach der §. 48. gezeigten Methode beſtimmt, und aus dieſer mittelſt des bekannten Verhältnißes ſeines Abſtands von der Erde zu dem mittleren Abſtand der Sonne von der Erde nach §. 49. n. 1. die mittlere Sonnenparallaxe geſchloſſen, welche man auf dieſem Weg ſchon genauer, als durch die Beobachtungen der Sonne ſelbſt, gefunden hat, weil ein in der Beſtimmung der Parallaxe des Mars begangener Fehler einen ungefähr 2¾ mal kleineren Fehler in der Parallaxe der Sonne hervorbringt.

Da der Mars der Erde in ſeiner Oppoſition ſo nahe kommen kann; ſo fragt es ſich, ob er nicht wie der Mond von dem Schatten der Erde, getroffen werden könne? Es ergiebt ſich aber aus dem in Halbmeſſern der Erde ausgedrückten mittleren Abſtand der Sonne von der Erde, und aus dem *oben angegebenen* Verhältniß dieſes Abſtands zu

dem kleinsten Abstand des Mars von der Erde, dieser letztere = 8553 Halbmessern der Erde, da hingegen der Schatten der Erde sich nur auf eine Distanz von etwa 216 Erdhalbmessern sich erstreckt (§. 76.). Folglich kann der Mars niemals von dem wahren Schatten der Erde getroffen werden. Wenn er zur Zeit seiner Opposition eine geringe Breite hat; so muß man auf ihm die Erde als eine dunkle Scheibe, deren scheinbarer Durchmesser nicht über 48″,2 gehen kann, vor der Sonne vorübergehen sehen, und daher kann auch der Halbschatten der Erde von dieser aus nicht bemerkbar seyn.

§. 101. Durch Fernröhren beobachtet man auf der Scheibe des Mars große dunkle Flecken, welche nicht immer deutlich begränzt sind, und ihre Gestalt öfters verändern. Aus ihren Bewegungen ergiebt sich, daß dieser Planet in 24 St. 39 M. 21 S. sich von Abend gegen Morgen um seine Axe dreht, und er folglich, wie auch schon aus den Veränderungen seiner Lichtgestalt erhellt, ein kugelförmiger Körper ist, welcher vermöge der Veränderung seiner Phasen sein Licht von der Sonne erhält. Seine Umdrehungsaxe ist gegen die Ebene der Ekliptik um einen Winkel von 59° 42′ geneigt, und die Durchschnittslinie der Ebene seines Aequators mit einer Ebene, welche durch seinen Mittelpunkt mit der Ekliptik parallel gelegt ist, ist einer geraden Linie parallel, welche die Punkte 2 ♈. 17° 47′ und 8 ♈. 17° 47′ der Ekliptik mit einander verbindet, so daß dem ersteren dieser Punkte derjenige Punkt entspricht, von welchem bey der Axendrehung die Bewegung der unter seinem Aequator liegenden Punkte aus der südlichen Seite der Ekliptik gegen die nördliche geschieht. Der Mars hat übrigens nicht genau die Gestalt einer Kugel, sondern ist unter den Polen etwas zusammengedrückt. Seine Umdrehungsaxe verhält sich zu dem Durchmesser seines Aequators nahe wie 15 : 16.

§ 102. Der glänzendste Planet nach der Venus ist der Jupiter, welcher sie zuweilen noch an Helligkeit über-

trifft. Ehe er mit der Sonne in Oppoſition kommt, und wenn er ungefähr 116 Grade von ihr abſteht, wird er ſtillſtehend, und fängt hernach an, ſich rückwarts zu bewegen. Die Geſchwindigkeit dieſer retrograden Bewegung wächst bis zu dem Augenblick der Oppoſition, worauf er ſich nach und nach langſamer bewegt, bis er auf der andern Seite nur noch 116 Grade von der Sonne abſteht, wo er wiederum ſtille zu ſtehen ſcheint. Von dieſem Punkt an wird er wieder rechtläufig, bis er in den Sonnenſtralen verſchwindet. Die Dauer der retrograden Bewegung, ſo wie der ganze Bogen des Rückgangs ſind aber merklich ungleich, und im Mittel beträgt die erſtere 119 Tage, der letztere 10 Grade. Es folgt aus dieſen Erſcheinungen daß die Bewegung des Jupiters im Allgemeinen von Abend gegen Morgen gerichtet iſt, und man ſie, wie die des Mars, in zwey Umlaufsbewegungen zerfällen kann, nemlich in eine kreisförmige Bewegung *MNm* (Fig. 33.), welche zu einem Umlauf ein Jahr erfordert, und in eine fortrückende Bewegung des Mittelpunkts *C* dieſes Kreiſes in der Bahn *CC'* um die Erde *E*. Die Umlaufszeit in der Bahn *CC'* ergiebt ſich, wie bey dem Mars gezeigt wurde, aus der Zeit zwiſchen zwey zunächſt aufeinander folgenden Oppoſitionen des Jupiters und der Umlaufszeit der Sonne. Die erſtere iſt im Mittel = 398 T. 21 St. 12 M. 58,41 S. woraus ſich die tropiſche Umlaufszeit von *C* = 4330 T. 14 St. 39 M. 6 S. und die ſideriſche = 4332 T. 14 St. 18 M. 41 S. ergiebt. Sodenn findet ſich, daß die Bahn *MN* der ſcheinbaren Bahn der Sonne um die Erde ähnlich, und die an den Ort *m* des Jupiters gezogene *Cm* beſtändig mit der von der Erde *E* an den gleichzeitigen Ort *s* der Sonne gezogenen *Es* parallel iſt, endlich daß die Bahn *CC'* von einem mit der Erde concentriſchen Kreis merklich, aber nicht ſo beträchtlich, wie bey dem Mars verſchieden iſt. Im Mittel iſt das Verhältniß von *Cm* : *CE* dem von 1 : 5,20:7011 gleich, wenn aber die Sonne in ihrer mittleren Entfernung von der Erde ſich befindet; ſo verhält ſich *Cm* : *CE* = 1 : 5,2534532, und wie 1 : 4,9521290, je nachdem *CE* am gröſten oder am kleinſten iſt.

Der scheinbare auf der Ekliptik senkrechte Durchmesser des Jupiters ist in der Opposition am grösten, wo er bis auf 47″,0 steigt, in der Nähe seiner Conjunktion mit der Sonne beträgt er noch 28″,7.

§. 103. Um den Jupiter beobachtet man vier kleine Sterne, welche ihn beständig begleiten, und daher seine Trabanten (Satellites) heißen. Sie verändern jeden Augenblick ihre Lage unter sich und gegen den Jupiter, und stehen bald auf dieser, bald auf jener Seite desselben, jeder entfernt sich aber von ihm nur bis auf gewisse Gränzen. Man nennt denjenigen Trabanten den ersten bey welchem diese Gränzen am engsten sind, und bestimmt nach ihren grösten Digressionen von dem Jupiter ihren Rang. Sie scheinen sich nahe in einer mit der Ekliptik parallen geraden Linie, oder in einer sehr schmalen Ellipse hin und her zu bewegen, in der Nähe ihrer grösten Digressionen in Beziehung auf den Jupiter stille zu stehen, und mit ihrer Annäherung zu dem Jupiter ihre relative Bewegungen zu beschleunigen. Jeder der Trabanten entfernt sich auf beyden Seiten nahe gleich weit von dem Jupiter, und überhaupt sind ihre Bewegungen um den Jupiter denjenigen ähnlich, welche man bey den unteren Planeten um die Sonne beobachtet. Folglich bewegen sie sich nahe in concentrischen Kreisen um den Jupiter als Mittelpunkt, deren Ebenen nur wenig gegen die Ebene der Ekliptik geneigt sind.

Man sieht die Trabanten des Jupiters, wenn sie sich ihm nähern, oft verschwinden, ob sie gleich noch weit von ihm abstehen, der dritte und vierte erscheinen zuweilen wieder ehe sie noch die Scheibe des Jupiters erreichen, sehr selten beobachtet man dieses auch bey dem zweyten. Zuweilen sieht man sie auch bey ihrem Abrücken von dem Jupiter in einem kleinen Abstand von ihm verschwinden, und nach einiger Zeit in einem größeren Abstand wieder zum Vorschein kommen. Diese Verschwindungen sind den Mondsfinsternissen vollkommen ähnlich, und die sie begleitende Umstände lassen in dieser Hinsicht keinen Zweifel übrig. Man sieht die Jupitertrabanten beständig auf derjenigen Seite des

Jupiters verschwinden, welche der Sonne entgegengesetzt ist, und folglich auf derselben Seite, auf welche, wenn der Jupiter ein dunkler Körper ist, der Schattenkegel fällt, welchen er wirft. Je näher der Jupiter seiner Opposition kommt, desto näher bey ihm ereignen sich die Verfinsterungen. Endlich entspricht die Dauer ihrer Verfinsterungen genau der Zeit, welche sie gebrauchen müssen, um diesen Schattenkegel zu durchlaufen. Daß aber der Jupiter so wohl als seine Trabanten dunkle Körper seyen, welche nur von der Sonne ihr Licht empfangen, erhellt daraus, daß man einigemal seine Trabanten hat vor seiner Scheibe vorübergehen, und auf sie ihren Schatten werfen sehen, welcher während ihrer Bewegung eine mit der Richtung derselben parallele Chorde der Jupitersscheibe beschrieb. Herschel sahe den 6. April 1780 den Schatten des dritten Trabanten und den Trabanten selbst auf der Jupitersscheibe. Der Schatten war so schwarz und scharf begränzt, daß er seinen scheinbaren Durchmesser messen konnte, welchen er = 1″,562 fand *). Wenn diese Trabanten zwischen den Jupiter und die Sonne zu stehen kommen; so bilden sie also auf ihm wahre Sonnenfinsternisse, welche denenjenigen vollkommen ähnlich sind, die der Mond auf der Erde verursacht.

Da die Jupitertrabanten um die Zeit ihrer Verfinsterungen sich in dem von der Erde abgekehrten Theil ihrer Bahnen befinden, und diesen in der Richtung von Abend gegen Morgen durchlaufen; so bewegen sie sich um den Jupiter nach eben dieser Richtung.

§. 104. Die Beobachtung der Verfinsterungen der Jupitertrabanten ist das sicherste Mittel, ihre Bewegungen zu bestimmen. Man erhält ihre synodischen Umlaufszeiten um den Jupiter sehr genau, wenn man weit von einander entfernte in der Nähe der Opposition des Jupiters beobachtete Finsternisse mit einander vergleicht, und die Zwischenzeit mit der Anzahl der synodischen Umläufe dividirt.

*) Philos. Trans. 1794.

Die synodischen Umlaufszeiten der vier Trabanten des Jupiters sind folgende:

	T.	St.	M.	S.
I.	1	18	28	35,9454
II.	3	13	17	53,7309
III.	7	3	59	35,8251
IV.	16	18	5	7,0210

Hieraus ergeben sich mittelst der Proportion §. 61. die siderischen Umlaufszeiten, wenn man T der siderischen Umlaufszeit des Jupiters gleich setzt,

	T.	St.	M.	S.
I.	1	18	27	33,5049
II.	3	13	13	42,0399
III.	7	3	42	33,3605
IV.	16	16	32	11,2712

Eben so finden sich die periodischen Umlaufszeiten in Beziehung auf die Aequinoktialpunkte, wenn man T der periodischen Umlaufzeit des Jupiters gleich setzt,

	T.	St.	M.	S.
I.	1	18	27	33,4763
II.	3	13	13	41,9483
III.	7	3	42	33,8924
IV.	16	16	32	8,7244

Dividirt man 360° mit den periodischen Umlaufszeiten; so erhält man folgende Bewegungen der Trabanten in Beziehung auf die Aequinoktialpunkte während eines mittleren Sonnentags:

I.	63.	23°	29′	20″,375052
II.	3	11	22	29,148068
III.	1	20	19	3,534822
IV.	0	21	34	15,988200

Die tägliche siderische Bewegung erhält man aus der hier angegebenen, wenn man die Bewegung der Aequinoktialpunkte in einem Tag, d. i. 0″,137166 davon abzieht.

Zwischen den Bewegungen der Jupitertrabanten finden folgende merkwürdige Verhältniße Statt. Nimmt man 247 synodische Umläufe des ersten Jupitertrabanten,

123 des zweyten, 61 des dritten und 26 des vierten; so erhält man folgende Perioden:

			T.	St.	M.	S.
247	Uml. d. I.	=	437	3	43	58,51
123	— —	II. =	437	3	41	8,90
61	— —	III. =	437	3	35	25,33
26	— —	IV. =	435	14	13	2,55.

Also kommen nach Verfluß von 437 Tagen $3\frac{2}{3}$ St. die drey ersten Trabanten des Jupiters wiederum sehr nahe in dieselbe Lage so wohl unter sich, als in Beziehung auf die Sonne und Jupiter.

Es seyen die täglichen Bewegungen des ersten, zweyten und dritten Trabanten beziehungsweise n', n'', n'''; so ist

n' =	$0^{3.}$	23°	$29'$	$20'',375652$
$2n'''$ =	3	10	38	7,069644
$n'+2n'''$ =	10	4	7	27,445196
$3n''$ =	10	4	7	27,444204
$n'+2n'''-3n''$ =	0	0	0	0,001092,

welcher Unterschied nach 100 Jahren noch nicht ganz 40 Sekunden ausmacht.

§. 105. Um die aus dem Mittelpunkt des Jupiters gesehene (jovicentrische) Länge der Trabanten zu bestimmen, beobachte man, wenn sie von dem Jupiter bedeckt werden, oder vor demselben vorübergehen, die Zeiten der Eintritte und Austritte an der Jupitersscheibe; so wird der in die Mitte zwischen die zwey Beobachtungen fallende Augenblick sehr nahe die Zeit seyn, wo der Trabant mit dem Jupiter von der Erde aus gesehen einerley Länge hatte. Beobachtet man auch die Länge des Jupiters; so wird man zugleich die jovicentrische Länge des Trabanten haben, welche der geocentrischen Länge des Jupiters gleich, oder um 180° davon verschieden seyn wird, je nachdem der Trabant von dem Jupiter bedeckt wurde, oder vor demselben vorübergieng, welche zwey Fälle leicht dadurch von einander zu unterscheiden sind, daß der Trabant im ersten Fall von Abend gegen Morgen, im letztern von Morgen gegen Abend

sich bewegt. Da man nun die Bewegungen der Trabanten kennt; so kann man ihre Länge, wenn sie einmal für irgend einen Zeitpunkt bestimmt ist, für eine andere gegebene Zeit unter der Voraussetzung berechnen, daß sie sich gleichförmig um den Jupiter bewegen, welche den Beobachtungen ihrer Verfinsterungen zu Folge wenigstens beynahe richtig ist.

Hieraus ergiebt sich eine einfache Methode, das Verhältniß des Abstands des Jupiters von der Sonne zu dem Abstand der Erde von der Sonne zu finden. Zu einer Zeit, da der Jupiter ungefähr 90 Grade von der Sonne absteht, beobachte man eine Verfinsterung des dritten Trabanten des Jupiters, wo so wohl der Anfang als das Ende derselben sichtbar seyn wird. Die Erde sey in E (Fig. 35.) die Sonne in S, der Jupiter in J, und man ziehe SE, EJe, SJ. Der zwischen den Anfang und das Ende der Verfinsterung in die Mitte fallende Augenblik wird sehr nahe die Zeit seyn, da der Trabant in m mit dem Mittelpunkt S der Sonne und dem Mittelpunkt J des Jupiters in einer geraden Linie stund. Von der Erde E sey die EV nach dem Punkt der Frühlingsnachtgleiche hin und durch J die Jv mit EV parallel gezogen; so ist VEJ die geocentrische Länge des Jupiters, VES die Länge der Sonne, welche beyde durch Beobachtungen, die man um die Zeit der Finsterniß angestellt hat, können gefunden werden, und daher ist der Punkt SEJ als Unterschied dieser Längen gegeben. Vermöge des vorhergehenden kann man für den Augenblik der Mitte der Verfinsterung des Trabanten seine jovicentrische Länge vJm berechnen, und da man $vJe = VEJ$ (I, 29.) hat; so kennt man den Winkel mJe oder $EJS = VEJ - vJm$. Mithin sind die Winkel des Dreyecks SEJ, und dadurch das Verhältniß von $SE : SJ$ gegeben. Man wird finden, daß dieses Verhältniß, wie auch schon aus §. 102. erhellt, veränderlich ist, und der mittlere Abstand des Jupiters von der Sonne zu dem mittleren Abstand der Erde von der Sonne sich wie 5,20279 : 1 verhält.

§. 106. Man hat im 102ten §. gefunden, daß, wenn man die Bewegung des Jupiters um die Erde aus den zwey

kreisförmigen Bewegungen in der Bahn *MN* und in der Bahn *CC'* zuſammenſetzt, immer die von *C* an den Jupiter *m* gezogene *Cm* mit der von der Erde *E* an den gleichzeitigen Ort *s* der Sonne gezogenen *Es* parallel ſeyn muß, und ſich im Mittel *CE* : *Cm* wie 5,20279 : 1 ſich verhält; folglich iſt, weil auch *ms* : *sE* = 5,20279 : 1, *ms* : *sE* = *CE* : *Cm*. Da nun wegen der Parallelen *Cm* und *Es* die Winkel *CmE* und *mEs* gleich, und wegen *CE* > *Cm*, *ms* > *sE* die zwey übrigen Winkel der Dreyecke *CEm*, *Ems* nothwendig ſpitz ſind; ſo ſind dieſe Dreyecke gleichwinklicht (VI, 7.), und wegen der gemeinſchaftlichen Seite *mE* einander gleich (I, 26.). Folglich iſt *CmsE* ein Parallelogramm, und die Bahn *MN* der ſcheinbaren Bahn *sSS'* der Sonne um die Erde gleich und ähnlich, welches in §. 95. auch von dem Mars bewieſen worden iſt. Demnach werden auch die ſcheinbaren Bewegungen des Jupiters dieſelben ſeyn, wie unter der im 102ten §. gemachten Vorausſetzung, wenn man die Sonne um die Erde ſich bewegen, und den Jupiter um die Sonne eine Bahn beſchreiben läßt, welche der Bahn *CC'* gleich und ähnlich iſt, und in einerley Zeit mit dieſer beſchrieben wird. Nimmt man aber die Erde als beweglich an; ſo wird der Jupiter um die ruhende Sonne dieſelbe Bahn beſchreiben, welche man ihm unter der vorhergehenden Vorausſetzung um die ſich bewegende Sonne angewieſen hatte, wie dieſes §. 98. von dem Mars bewieſen worden iſt.

§. 107. Man beobachte, wenn der Jupiter ſich in der Nähe ſeiner Oppoſition mit der Sonne befindet, die Verfinſterung eines ſeiner Trabanten, und berechne mittelſt der bekannten ſynodiſchen Umlaufszeit dieſes Trabanten (§. 104.) die Zeiten der folgenden Verfinſterungen deſſelben, indem man zu der beobachteten Zeit einen, zwey, drey u. ſ. w. ſynodiſche Umläufe addirt. Man wird finden, daß die Verfinſterungen immer ſpäter und ſpäter als nach der Berechnung eintreffen, ſo wie der Jupiter von ſeiner Oppoſition abrückt, mithin ſein Abſtand von der Erde wächst. In der Nähe ſeiner Conjunktion mit der Sonne wird der

Unterschied am gröſten seyn, und beynahe auf 16 Minuten steigen. Nach der Conjunktion wird der Unterschied bey gleicher Entfernung des Jupiters von der Erde eben so groß wie vorher seyn, mit der Annäherung des Jupiters zu seiner Conjunktion nach und nach eben so wieder abnehmen, wie er vorher zugenommen hatte, und in der Conjunktion selbst wieder verschwinden. Diese Erscheinungen beobachtet man auch bey den übrigen Trabanten, die Unterschiede sind bey jedem derselben in gleichen Abständen des Jupiters von der Erde gleich groß, und den Veränderungen der Abstände proportional. Olaus Römer äusserte zuerst im Jahr 1675 die Vermuthung, daß diese Verspätigung der Finsternisse der Jupitertrabanten in der Nähe der Conjunktionen, und ihre Voreilung in der Nähe der Oppositionen ihren Grund in der nicht augenbliklichen Fortpflanzung des Lichts habe, und daß dieses eine merkliche Zeit gebrauche, um den Durchmesser der scheinbaren Bahn der Sonne um die Erde zu durchlaufen, weil der Jupiter in seiner Oppositiou der Erde um diese Distanz näher ist, als in der Conjunktion. Unter dieser Voraussetzung müssen uns die Verfinsterungen der Jupitertrabanten im ersteren Fall früher erscheinen, als im letztern, um die ganze Zeit, welche das Licht gebraucht, um den Durchmesser der Sonnenbahn zu durchlaufen. Das Gesetz der Verzögerungen dieser Finsternisse entspricht dieser Hypothese so genau, daß man sie nicht verwerfen kann. Es folgt daraus, daß das Licht eine Zeit von 8 Minuten 13,2 Sekunden gebraucht, um von der Sonne zu der Erde zu kommen, und diesen Raum mit einer gleichförmigen Geschwindigkeit durchlauft.

§. 108. Da man jetzt das Verhältniß der Abstände des Jupiters und der Erde von der Sonne kennt (§. 105.); so können die jovicentrischen Längen der Jupitertrabanten mittelst der Beobachtungen ihrer Verfinsterungen genauer bestimmt werden. Zur Zeit des Mittels der Finsterniß steht der Trabant in *m* (Fig. 35.) mit der Sonne ☉ und dem Jupiter ♃ in einer geraden Linie. Durch die Beobachtung der Längen der Sonne und des Jupiters erhält man

den

[redacted]

den Winkel SEJ an der Erde E, welcher dem Unterschied derselben gleich ist, und überdieß kennt man das Verhältniß von SJ zu SE. Folglich kann der Winkel SJE gefunden werden, welcher spitz seyn muß, da $SJ > SE$ ist. Man ziehe Jv mit der von E nach dem Punkt der Frühlingsnachtgleiche gezogenen EV parallel; so ist $eJv = JEV =$ der beobachteten Länge des Jupiters, und daher die jovicentrische Länge vJm des Trabanten $= eJv - eJm = JEV - SJE$.

Weil man so wohl den Eintritt als den Austritt des Trabanten um so viel zu spät sieht, als das Licht Zeit gebrauchte, um den Raum JE zu durchlaufen; so muß man noch das Verhältniß von $SE : EJ$ suchen, mittelst dessen man diese Zeit $= \frac{EJ}{SE}$ (8' 13",2) findet, welche von dem Augenblik des aus den Beobachtungen abgeleiteten Mittels der Finsterniß abgezogen werden muß, um den Augenblik zu finden, da der Trabant die beobachtete jovicentrische Länge hatte. Die jovicentrischen Längen der vier Trabanten für den ersten Januar 1750 und 1801 um Mitternacht nach dem Pariser Meridian sind folgende:

1. Januar 1750.	I.	0$^{\text{Z.}}$	15°	0'	46"
	II.	10	11	50	25
	III.	0	10	15	15
	IV.	11	0	11	9
1. Januar 1801.	I.	10$^{\text{Z.}}$	24°	29'	23"
	II.	1	29	33	26
	III.	6	17	5	38
	IV.	0	15	12	41

Man setze die Epoche der Länge des ersten Trabanten $= a'$, des zweyten $= a''$, des dritten $= a'''$; so ist für den ersten Januar 1801

$a' =$	10$^{\text{Z.}}$	24°	29'	23"
$2a''' =$	1	4	11	16
$a' + 2a''' =$	11	28	40	39
$3a'' =$	5	28	40	18
$a' + 2a''' - 3a'' =$	6	0	0	21

Aber nach Verfluß von t Tagen von dem ersten Januar 1801 an gerechnet ist mit Beybehaltung der §. 104. gebrauchten Benennungen

Die Länge l' des ersten Trab. $= a' + n't$
— — l'' — — — $= a'' + n''t$
— — l''' — — — $= a''' + n'''t$; folglich

$$l' + 2l''' - 3l'' = a' + n't + 2a''' + 2n'''t - 3a'' - 3n''t$$
$$= a' + 2a''' - 3a'' + (n' + 2n''' - 3n'')t$$
$$= 63.\ 0°\ 0'\ 21'' + 0'',001092.t \quad (\S\ 104.)$$

Mithin ist die jovicentrische Länge des ersten Trabanten samt der doppelten Länge des dritten weniger die dreyfache Länge des zweyten selbst nach mehreren Jahrhunderten nahe $= 180°$, und daher können wenigstens in einer sehr langen Periode die drey ersten Trabanten des Jupiters nicht zugleich verfinstert werden. Denn wenn der erste und dritte gleiche Länge haben; so beträgt ihre Entfernung von dem zweyten 60°. Haben der erste und zweyte einerley Länge; so sind sie von dem dritten um 90° entfernt. Endlich wenn der zweyte und dritte gleiche Länge haben; so steht der erste ihnen gerade gegenüber. Man kann mittelst obiger Gleichungen die Zeiten dieser Zusammenkünfte finden. Für den letzten Fall z. B. muß $l'' = l'''$, mithin

$a'' + n''t = a''' + n'''t$, $(n'' - n''')\,t = a''' - a''$, oder auch $= a''' - a''$ $+ 360°$, oder $= a''' - a'' + 2.\ 360°$, u. s. w.

mithin $t = \frac{a''' - a''}{n'' - n'''}$

oder $\frac{a''' - a''}{n'' - n'''} + \frac{360}{n'' - n'''}$ u. s. w. seyn.

Der erste Ausdruck wird die Zeit der nächsten Zusammenkunft von dem 1. Januar 1801 an gerechnet geben, der nächstfolgende die zweyte u. s. w. und $\frac{360}{n'' - n'''}$ wird die Zeit zwischen zwey zunächst aufeinander folgenden Zusammenkünften des zweyten Trabanten mit dem dritten seyn.

Da die oben angegebene jovicentrische Längen der Jupiterstrabanten diejenige sind, welche man beobachten würde, wenn das Licht augenblicklich sich fortpflanzte; so muß man, um für eine gegebene Zeit diejenige Länge zu finden,

welche ſie zu haben ſcheinen, von derſelben die Zeit abziehen, welche das Licht gebraucht, um von dem Jupiter zu der Erde zu gelangen, und die man findet, wenn man für den mittleren Abſtand der Sonne von der Erde = 1 den Abſtand des Jupiters von der Erde ſucht, und mit dieſem 8′ 13″,2 multiplicirt. *).

§. 109. Man beobachtet auf dem Jupiter mehrere dunkle nahe mit der Ekliptik parallele Streifen, welche jedoch bey gleich heiterem Himmel und gleicher Diſtanz des Jupiters ſich nicht gleich deutlich zeigen, und daher veränlich zu ſeyn ſcheinen. Ueberdiß beobachtet man auch auf ſeiner Scheibe andere ſchwarze Flecken, aus deren Bewegung man eine Umdrehung des Jupiters um eine auf der Ekliptik beynahe ſenkrecht ſtehende Axe von Abend gegen Morgen geſchloſſen hat. Die Umdrehungszeit beträgt 9 St. 55 M. 50 S. Der Jupiter iſt alſo ein kugelförmiger Körper, welcher übrigens eine ſchon durch das Augenmaaß bemerkbare Abweichung von der genauen Kugelgeſtalt zeigt. Genauen Meſſungen zufolge verhält ſich der Durchmeſſer des Aequators zu der Umdrehungsaxe ſehr nahe wie 14 : 13, und wenn ſich der Jupiter in ſeiner mittleren Diſtanz von der Erde, welche ſeiner mittleren Diſtanz von der Sonne gleich iſt, befindet; ſo erſcheint der Durchmeſſer ſeines Aequators unter einem Winkel von 38″,2, und der auf dieſem ſenkrechte Durchmeſſer oder ſeine Axe unter einem Winkel von 35″,5. Auf den letzteren kleinſten Durchmeſſer beziehen ſich die Angaben ſeines ſcheinbaren Durchmeſſers (§. 102.) in ſeiner kleinſten und gröſten Entfernung von der Erde.

An dem Jupiter bemerkt man keine Veränderung ſeiner Lichtgeſtalt. Wenn der Winkel, welchen die von ſeinem Mittelpunkt *m* (Fig. 33.) nach der Erde *E* und der Sonne *s* gezogenen geraden Linien *mE*, *ms* mit einander

*) In dem III Band der Sammlung astr. Tafeln (Berlin 1776.) beziehen ſich die Epochen auf diejenigen Längen, welche man beobachten würde, wenn ſich der Jupiter in ſeiner mittleren Diſtanz von der Erde befände, oder die wirklichen Längen ſind um ſo viel vermindert, als die Bewegung der Trabanten in 42′ 46″ beträgt, in welcher Zeit das Licht jene Diſtanz durchlauft.

einschließen, am gröſten ist; so berührt mE die Bahn MN in m. Es ist aber der gröſte Werth von Cm oder der ihr gleichen sE (§. 106.) = 1,0168532 und der kleinste Werth von CE = 4,9521290 (§. 102.); mithin der gröſte Werth des Winkels smE = 11° 50′ 57″. Der Durchmesser des Aequators des Jupiters erscheint alsdenn unter einem Winkel von 42,16 Sekunden, und die Breite seines erleuchteten Theils unter einem Winkel von 41,71 Sekunden (§. 71.), welcher kleine Unterschied unmerklich ist.

§. 110. Aus den gröſten Digressionen der Trabanten des Jupiters, von seinem Mittelpunkt und dem zu gleicher Zeit gemessenen scheinbaren Durchmesser seines Aequators ergeben sich die Abstände der Trabanten von dem Mittelpunkt des Jupiters in Halbmessern seines Aequators ausgedrückt. Da nemlich bey den gröſten Digressionen die von der Erde an die Trabanten gezogene gerade Linien ihre beynahe kreisförmige und wenig gegen die Ekliptik geneigte Bahnen berühren; so werden auch hier, wie in §. 49. n. 6. die scheinbaren Halbmesser dieser Bahnen und des Aequators des Jupiters sich verhalten wie ihre wahren Halbmesser, wenn sie bey einerley Abstand des Jupiters von der Erde sind beobachtet worden. Die gröſte Digression des vierten Jupiterstrabanten ist = 8′ 16″, wenn der Jupiter in seiner mittleren Distanz von der Erde ist. In eben dieser Distanz ist der scheinbare Halbmesser seines Aequators = 19″,1 (§. 109.); folglich ist der vierte Jupiterstrabant $\frac{496}{19,1}$ oder 25,96859 Halbmesser des Aequators des Jupiters von seinem Mittelpunkt entfernt. So ergeben sich folgende Abstände der Trabanten von seinem Mittelpunkt in Halbmessern seines Aequators ausgedrückt:

I.	5,81783
II.	9,25642
III.	14,76475
IV.	25,96859

§. 111. Wegen der geringen Neigung der Bahnen der Jupiterstrabanten und ihrer in Vergleichung mit dem

Durchmeſſer des Jupiters kleinen Abſtände von ſeinem Mittelpunkt werden die drey erſten Trabanten bey jeder Oppoſition mit der Sonne verfinſtert, der vierte geht öfters neben dem Schatten des Jupiters vorbey. Wenn die Trabanten durch die Axe des Schattenkegels gehen; ſo iſt nach den Beobachtungen die halbe Dauer der Verfinſterung

		St.	M.	S.
bey dem I.	Trab. =	1	7	52
II.	— =	1	26	2
III.	— =	1	46	50
IV.	— =	2	22	25

Sie verſchwinden bey dem Eintritt in den Schatten nach und nach, welches theils von dem Halbſchatten, theils von dem Durchmeſſer der Trabanten herrührt. Man hat die Größe ihrer Durchmeſſer durch die Zeit zu beſtimmen geſucht, welche ſie gebrauchen, um ſich in den Schatten des Jupiters einzuſenken; aber die Beobachtungen zeigen in dieſer Hinſicht große Verſchiedenheiten, welche die Unterſchiede der Stärke der Fernröhren, der Schärfe der Augen des Beobachters, des Zuſtands der Atmoſphäre, der Höhe des Jupiters über dem Horizont, des ſcheinbaren Abſtands der Trabanten von dem Jupiter, und die Veränderung der Halbkugeln, die ſie uns zukehren, hervorbringen. Die Vergleichung der Helligkeit der Trabanten iſt von den vier erſteren Urſachen unabhängig, welche ihr Licht nur verhältnißmäßig verändern, und ſie kann uns daher Aufſchluß über die Wiederkehr der Flecken geben, welche die Rotationsbewegung dieſer Körper nach und nach auf die der Erde zugekehrte Seite bringen muß; folglich über dieſe Bewegung ſelbſt. Herſchel, welcher ſich mit dieſer feinen Unterſuchung beſchäftigt hat, hat beobachtet, daß ſie ſich wechſelsweiſe an Helligkeit übertreffen, welcher Umſtand zur Beurtheilung ihres gröſten und kleinſten Glanzes ſehr tauglich iſt. Durch die Vergleichung ihres gröſten und kleinſten Glanzes mit ihren gegenſeitigen Stellungen fand er, daß ſie ſich in derſelben Zeit um ſich ſelbſt drehen, in welcher ſie einen Umlauf um den Jupiter machen, und daher demſel-

ben, wie der Mond der Erde, beständig einerley Seite zukehren.

La Place findet unter der Voraussetzung, daß die Jupiterstrabanten mit dem Jupiter gleiche Dichtigkeiten haben, folgende aus dem Mittelpunkt des Jupiters gesehene scheinbare Durchmesser der Trabanten, wenn sie sich in ihren mittleren Entfernungen von ihm befinden:

I. 30′ 21″
II. 21 38
III. 21 11
IV. 9 27

§. 112. Unter den Planeten, welche schon die Alten kannten, und mit unbewafnetem Auge sichtbar sind, ist jetzt noch der Saturn übrig. Er unterscheidet sich von den Fixsternen durch sein mattes röthlicht-gelbes Licht, und durch seine Bewegungen, welche den Bewegungen des Mars und Jupiters ähnlich sind. Er wird rückläufig, wenn er vor seiner Opposition etwa 109 Grade von der Sonne entfernt ist, und fängt wieder an, sich von Abend gegen Morgen zu bewegen, wenn er nach seiner Opposition sich der Sonne bis auf 109 Grade genähert hat. Diese retrogade Bewegung dauert ungefähr 137 Tage, während welcher Zeit er 6 ¾ Grade durchlauft. Seine scheinbare Größe verändert sich nicht beträchtlich, und daher müssen seine Abstände von der Erde zur Zeit der Opposition und Conjunktion weniger, als bey den übrigen Planeten von einander verschieden seyn. Im Augenblick der Opposition ist der scheinbare Durchmesser des Saturns am größten, und beträgt 20″,6, seine mittlere Größe ist = 17″,6.

Die mittlere synodische Umlaufszeit des Saturns ist = 378 T. 2 St. 12 M. 49,57 S. woraus, wie bey dem Mars und Jupiter, die siderische Umlaufszeit = 10758 T. 23 St. 16 M. 34 S. und die tropische oder periodische = 10746 T. 17 St. 34 M. 42 S. sich ergiebt. Die scheinbaren Bewegungen des Saturns können, wie die des Mars und Jupiters in zwey Bewegungen zerfällt werden, wenn man einen Punkt C (Fig. 33.) von Abend gegen

Morgen in der periodiſchen Umlaufszeit des Saturns eine kreisförmige Bahn CC' um die in Ruhe angenommene Erde E, den Saturn ſelbſt aber um den beweglichen Punkt C eine Bahn MN beſchreiben läßt, welche der ſcheinbaren Bahn sSS' der Sonne um die Erde ähnlich iſt, ſo daß immer die an den Ort m des Saturns gezogene Cm mit der an den gleichzeitigen Ort s der Sonne gezogenen Es parallel iſt. Im Mittel verhält ſich $CE : Cm = 9{,}5387705 : 1$. Der Abſtand des Punkts C von der Erde E iſt veränderlich. Wenn die Sonne in ihrem mittleren Abſtand von der Erde ſich befindet; ſo verhält ſich $CE : Cm = 10{,}0745470 : 1$ wenn CE am gröſten, und wie $9{,}0029940 : 1$, wenn CE am kleinſten iſt.

§. 113. Der Saturn bietet eine merkwürdige Erſcheinung dar, welche man an keinem der übrigen Himmelskörper beobachtet. Man ſieht ihn beynahe immer zwiſchen zwey kleineren Körpern, welche mit ihm zuſammenzuhängen ſcheinen, und deren Geſtalt und Größe ſehr veränderlich ſind. Zuweilen ſcheinen ſie den Planeten zu umgeben, zuweilen bilden ſie zwey Henkel an dem Saturn, zu andern Zeiten verſchwinden ſie gänzlich, und der Saturn erſcheint alsdenn rund, wie die übrigen Planeten. Huygens fand durch ſorgfältige um das Jahr 1655 angeſtellte Beobachtungen dieſer ſonderbaren Erſcheinungen, und durch ihre Vergleichung mit den Stellungen des Saturns gegen die Erde und die Sonne, daß ſie durch einen breiten und dünnen Ring hervorgebracht werden, welcher mit dem Saturn concentriſch iſt, und ihn ſo umgiebt, daß zwiſchen ihm und dem Ring ein Zwiſchenraum von etwa $\frac{1}{3}$ des Durchmeſſers des Saturns übrig bleibt. Dieſer Ring, welcher gegen die Ebene der Ekliptik um $31° 20'$ geneigt iſt, zeigt ſich dem Beobachter auf der Erde in einer ſchiefen Lage unter der Geſtalt einer Ellipſe Fig. 36., deren Breite, wenn ſie am gröſten iſt, ungefähr die Hälfte ihrer Länge beträgt. Die Ellipſe verſchmälert ſich immer mehr und mehr, ſo wie die von dem Saturn nach der Erde gezogene Geſichtslinie mit der Ebene des Rings einen kleineren und kleine-

ren Winkel macht. Der jenseits des Saturns liegende Bogen des Rings wird von dem Planeten bedeckt, und der diesseits liegende fließt mit der Scheibe des Planeten zusammen Fig. 37. Aber man beobachtet auf dieser durch stark vergrößernde Fernröhren den Schatten welchen der Ring auf den Saturn wirft, als einen dunkeln Streifen, woraus folgt, daß der Saturn und sein Ring undurchsichtige Körper sind, welche von der Sonne beleuchtet werden. Jetzt kann man nur noch diejenigen Theile des Rings unterscheiden, welche auf jeder Seite des Saturns hervorragen, ihre Breite nimmt nach und nach ab, und sie verschwinden endlich, wenn die Erde sich in der erweiterten Ebene des Rings befindet, dessen Dicke zu klein ist um bemerkt werden zu können. Der Ring verschwindet aber auch noch aus einer andern Ursache, nemlich wenn die erweiterte Ebene des Rings durch die Sonne geht, welche in diesem Fall nur seine dünne Kante beleuchtet. Er bleibt so lange unsichtbar, als seine Ebene zwischen der Erde und der Sonne durchgeht, mithin seine beleuchtete Seite von der Erde abgekehrt ist, und wird erst alsdenn wieder sichtbar, wenn die Erde und die Sonne vermöge der relativen Bewegungen der letztern und des Saturns sich wieder auf einer Seite dieser Ebene befinden. Durch sehr starke Teleskope kann man übrigens den Ring auch alsdenn noch sehen, wenn er nur seine beleuchtete Kante der Erde zukehrt. Herschel hat ihn im Jahr 1789, als er für alle übrigen Beobachter verschwunden war, beständig durch sein vierzigfüßiges Teleskop als eine sehr feine Linie gesehen, welche auf beyden Seiten des Saturns hervorragte.

§. 114. Diese Phänomene des Verschwindens und Wiedererscheinens des Rings ereignen sich alle fünfzehn Jahre, oder nach Verfluß der halben siderischen Umlaufszeit des Saturns; folglich bleibt der Ring in Beziehung auf die Fixsterne beständig in einer sich selbst parallelen Lage. Die Durchschnittspunkte seiner Ebene mit der Ekliptik, oder seine Knoten, kann man dadurch finden, daß man die Länge des Saturns zu derjenigen Zeit beobachten, da die Erde

ſich in der erweiterten Ebene des Rings befindet, mithin die nach dem Saturn gezogene Geſichtslinie mit der Knotenlinie zuſammenfällt. Da nun der Saturn, wie die übrigen Planeten, ſich bald vor, bald rückwarts bewegt, und ſeine ſcheinbare Bahn um die Erde, wie die des Mars eine Epicycloide iſt (§. 88. und 112.); ſo kann er von der Erde aus geſehen in einem Jahr dreymal einerley Länge haben, weil in der Nähe der Oppoſition eine von der Erde *E* (Fig. 32.) nach dem Saturn gezogene gerade Linie ſeiner ſcheinbaren Bahn in drey Punkten auf einerley Seite von *E* begegnen kann. Aber man wird den Uebergang des Rings in eine gerade Linie immer bey einerley Lage des Saturns gegen die Fixſterne beobachten, wenn dieſe Erſcheinung daher rührt, daß die Ebene des Rings durch die Erde geht, hingegen in einer andern Lage des Saturns gegen die Fixſterne, wenn die Ebene des Rings durch die Sonne geht. Auf dieſem Weg hat man gefunden, daß der aufſteigende Knoten des Rings im Jahr 1803 in 5 Z. 17° 19′ der Ekliptik fiel. Wegen des Zurückweichens der Aequinoktialpunkte nimmt ſeine Länge jährlich um 50″,1 zu (§. 37.) Man hat alſo an dem Ort des Saturns ein Kennzeichen, ob das Wiedererſcheinen oder Verſchwinden des Rings von dem Zuſammentreffen ſeiner Ebene mit der Erde oder mit der Sonne abhänge.

§. 115. Hienach kann man das Verhältniß der Abſtände des Saturns und der Erde von der Sonne auf eine ähnliche Art beyläufig finden, wie man in §. 106. den Abſtand des Jupiters von der Sonne mittelſt der Verfinſterungen ſeiner Trabanten beſtimmt hat. Wenn der Ring des Saturns ſich verſchmälert, und bis auf eine gerade Linie abgenommen hat, oder verſchwunden iſt, und zugleich dieſe Erſcheinung ſich an einem andern Ort des Himmels ereignet, als in dem aufſteigenden oder niederſteigenden Knoten des Rings, beobachte man die Länge des Saturns und der Sonne. In dieſem Fall geht die Ebene des Rings durch die Sonne, und die Länge eines ſeiner Knoten iſt der aus dem Mittelpunkt der Sonne geſehenen (heliocentriſchen)

Länge des Saturns gleich, mithin vermöge des vorhergehenden §. gegeben. Der Winkel, unter welchem die von dem Saturn $\mathcal{J}$ (Fig. 35.) an die Sonne S und Erde E gezogenen geraden Linien $\mathcal{J}S$, $\mathcal{J}E$ sich schneiden ist dem Unterschied der Länge eines der Knoten und der beobachteten geocentrischen Länge des Saturns gleich, wo man immer denjenigen Knoten zu nehmen hat; dessen Länge der beobachteten Länge des Saturns am nächsten kommt. Der Winkel an der Erde E ist dem Unterschied der Länge der Sonne und der geocentrischen Länge des Saturns gleich. Folglich kennt man in dem Dreyeck $SE\mathcal{J}$ zwey Winkel, und daher auch das Verhältniß von $S\mathcal{J} : SE$. Es findet sich, daß im Mittel genommen der Saturn ungefähr neun und ein halb mal so weit von uns entfernt ist als die Sonne, woraus, wie im §. 106. bey dem Jupiter gezeigt wurde, folgt, daß die Bahn MN (Fig. 33.), welche man den Saturn um den beweglichen Punkt C in §. 112. hat beschreiben lassen, der scheinbaren Bahn der Sonne um die Erde nicht allein ähnlich, sondern auch gleich, und $CmsE$ ein Parallelogramm seyn muß.

Da nun die gerade Linie ms, welche die gleichzeitigen Orte m und s des Saturns und der Sonne miteinander verbindet, der CE beständig gleich und parallel ist; so werden die scheinbaren Bewegungen des Saturns dieselben, wie in §. 112. seyn, wenn man ihn die Bahn CC' um die Sonne s beschreiben, und die letztere sich um die Erde E in der Bahn sSS' bewegen läßt. Oder man kann auch mit Beybehaltung der hier angenommenen Bewegung des Saturns um die Sonne diese als unbeweglich annehmen, und dagegen die Erde um die Sonne in einer Bahn sich bewegen lassen, welche der scheinbaren Bahn der Sonne um die Erde gleich und ähnlich ist, wie dieses bey den übrigen Planeten gezeigt worden ist.

§. 116. Um den Saturn sieht man sieben Trabanten von Abend gegen Morgen in beynahe kreisförmigen Bahnen sich bewegen. Man nennt auch hier denjenigen Trabanten den ersten, der sich bey seiner gröſten Digression am

wenigſten von dem Saturn entfernt, deſſen Bahn alſo am kleinſten iſt, den nächſtfolgenden den zweyten, u. ſ. w. Die zwey zunächſt um den Saturn ſich bewegenden Trabanten hat Herſchel im Jahr 1789 durch ſein vierzigfüßiges Teleſkop entdeckt, weswegen der ehmalige erſte Trabant nun der dritte, der zweyte der vierte u. ſ. w. iſt. Huygens entdeckte den ehmaligen vierten Trabanten im Jahr 1655 mit Fernröhren von 12 und 23 Fuß. Caſſini ſahe den ehmaligen fünften im Jahr 1671 mit einer Fernröhre von 17 Fuß, im Jahr 1672 den dritten mit Fernröhren von 35 und 70 Fuß, endlich im Jahr 1684 mit Fernröhren, wovon die gröſte 136 Fuß lang war, den ehmaligen erſten und zweyten. Pound ſahe im Jahr 1718 durch eine 123 Fuß lange Fernröhre die fünf alten Trabanten auf einmal, welche nach Wargentin's Verſicherung auch durch eine zehnfüßige achromatiſche Fernröhre ſichtbar ſeyn ſollen. Herſchel ſahe ſie durch ſein 10 füßiges Teleſkop ſchon bey ſechzigmaliger Vergrößerung am 19. Decemb. 1793. Durch eine $3\frac{1}{2}$ füßige achromatiſche Fernröhre erkennt man höchſtens drey dieſer Trabanten.

Wenn der Ring des Saturns unſichtbar iſt; ſo erſcheinen die Bahnen der ſechs erſten Trabanten als gerade Linien, hingegen als Ellipſen, wenn der Ring ſichtbar iſt, und dieſe ſind der elliptiſchen Geſtalt des Rings ähnlich. Folglich bewegen ſich dieſe Trabanten nahe in der Ebene des Rings. Der ſiebente bewegt ſich in einer weniger gegen die Ekliptik geneigten Ebene, und ſein Licht wird, wenn er auf der Oſtſeite des Saturns ſteht, ſo ſchwach, daß er ſehr ſchwer zu erkennen iſt. Herſchel hat aus dieſer periodiſchen Lichtveränderung gefolgert, daß der ſiebente Trabant dem Saturn beſtändig einerley Seite zukehre, und ſich daher während eines Umlaufs um den Saturn einmal um ſeine Axe drehe. Dieſer Trabant iſt alſo hierin dem Mond (§. 80.) und den Jupitertrabanten (§. 111.) ähnlich; mithin ſcheint die Gleichheit der Zeiten der Axendrehung und des Umlaufs ein allgemeines Geſetz der Bewegung der Trabanten zu ſeyn.

§. 117. Die Bewegungen der Saturnstrabanten sind wegen der Schwierigkeit der Beobachtungen lange nicht so genau bekannt, wie die der Jupitersstrabanten. Nur bey dem ehmaligen vierten, oder dem jetzigen sechsten Trabanten, welcher am leichtesten zu beobachten ist, hat man seine Verfinsterung durch den Schatten des Saturns beobachtet. Die Verfinsterungen seiner Trabanten ereignen sich überhaupt wegen der beträchtlichen Neigung ihrer Bahnen selten. Ihre Abstände von dem Saturn ergeben sich, wie in §. 110. die Abstände der Jupitersstrabanten, aus ihren gröſten Digressionen von dem Saturn und aus dem gleichzeitigen scheinbaren Halbmesser des letztern. Nimmt man diesen zur Einheit an, so sind die mittleren Abstände der Trabanten des Saturns von seinem Mittelpunkt, und ihre siderischen Umlaufszeiten folgende:

		Abstände.	sid. Uml. Zeiten. T.	St.	M.	S.
ehmals.	I.	3,080	0	22	37	30
	II.	3,952	1	8	53	9
I.	III.	4,893	1	21	18	26
II.	IV.	6,268	2	17	44	51
III.	V.	8,754	4	12	25	11
IV.	VI.	20,295	15	22	41	14
V.	VII.	59,154	79	7	54	37

Die aus dem Mittelpunkt des Saturns gesehene Längen der fünf älteren Trabanten am 1. Januar 1801 um Mitternacht nach dem Pariser Meridian sind:

III.	1	15°	23′
IV.	0	27	0
V.	2	8	2
VI.	1	10	33
VII.	4	28	29

welche dazu dienen können, die gegenseitige Lage der Trabanten beyläufig zu bestimmen, und sie von einander zu unterscheiden.

§. 118. Nach Herschels Beobachtungen dreht sich so *wohl der Saturn* als sein Ring um eine auf der Ebene des

letztern senkrecht stehende Axe von Abend gegen Morgen. Die Umdrehungszeit des Saturns ist 10 St. 16' 0",4, seines Rings 10 St. 32' 15". Auch beobachtete er fünf mit dem Aequator des Saturns parallel laufende veränderliche denen des Jupiters ähnliche Streifen.

Die Durchmesser des Saturns sind ungleich, und der Durchmesser seines Aequators ist größer als der auf diesem senkrechte Durchmesser oder als die Umdrehungsaxe. Aber es zeigt sich hier eine merkliche Abweichung von der abgeplatteten Gestalt des Mars und Jupiters. Bey diesen nehmen die Durchmesser von den Polen an bis sie mit dem Aequator zusammenfallen beständig, wie in einer Ellipse zu, bey dem Saturn hingegen ist nach Herschels Beobachtungen derjenige Durchmesser, welcher mit seinem Aequator einen Winkel von 43° 20' macht, der größte, und dieser Durchmesser, der Durchmesser des Aequators und die Umdrehungsaxe verhalten sich wie 36, 35 und 32.

Die Oberfläche des Rings des Saturns ist nicht zusammenhängend: ein mit ihm concentrischer schwarzer Streifen, welchen man so wohl auf der Nord- als Südseite des Rings beobachtet, theilt ihn in zwey Theile, welche zwey abgesonderte Ringe zu bilden scheinen. Mehrere schwarze Streifen, welche einige Beobachter bemerkt haben, scheinen eine größere Anzahl concentrischer nahe in einer Ebene liegender Ringe anzuzeigen. Nach Herschel sind die zwey Saturnsringe und der dazwischen liegende Raum nahe in folgenden Verhältnißen zu einander:

Innerer Durchmesser des kleinsten Rings	5900 Theile
Aeusserer — — — —	7510
Innerer Durchmesser des größten Rings	7740
Aeusserer — — — —	8300
also Breite des inneren Rings	805
— — äusseren —	280
Breite des Zwischenraums	115

Der Durchmesser des Rings verhält sich zu dem Durchmesser des Saturns nahe wie 7 : 3; mithin kommen auf den Durchmesser des Saturns 3557 der obigen Theile. Die Dicke des Rings *muß in* Vergleichung mit seiner Breite

sehr gering seyn. Wenn die Erde in seiner Ebene sich befand sahe Herschel die Saturnstrabanten auf beyden Seiten desselben hervorragen, wie Perlen, die an einen Faden gereihet sind. Der Ring erschien ihm als eine feine Linie, deren Dicke kaum den vierten Theil des scheinbaren Durchmessers eines Trabanten, den er auf eine Sekunde schätzte, ausmachte.

Uebrigens scheinen nicht alle Punkte des Rings, oder der verschiedenen Ringe in einer Ebene zu liegen. Denn man hat den östlichen Theil des Rings früher verschwinden sehen, als den westlichen, und umgekehrt. Schröter *) hat in den Jahren 1789, 1790 und 1803 den östlichen Theil früher verschwinden und später wieder erscheinen sehen, als den westlichen, wenn die Südseite des Rings gegen die Erde gekehrt war, aber das Gegentheil beobachtet, wenn das Aug gegen die nördliche Fläche des Rings sahe, und theils aus diesen Beobachtungen, theils aus der Beobachtung heller Punkte des Rings gefolgert, daß der Saturnsring in Beziehung auf die Sonne sich nicht um seine Axe drehe, sondern ihr beständig einerley Punkt seiner Oberfläche zukehre, mithin in Beziehung auf die Fixsterne während eines Umlaufs des Saturns um die Sonne eine Umdrehung um seine Axe vollende. Vielleicht lassen sich diese Beobachtungen mit Herschels Behauptung einer Axendrehung des Rings vereinigen, wenn man annimmt, daß jeder der Saturnsringe in einer Ebene liege, die Ebenen der verschiedenen Ringe aber etwas gegen einander geneigt seyen, so daß durch das Hervorragen eines Endes des inneren Rings über den äussern jene von Schröter beobachtete helle Punkte oder Knoten entstehen, welche der Axendrehung der Ringe ungeachtet ihre Lage gegen den Saturn nicht verändern werden.

Zur Bestimmung der Dicke des Rings hat Schröter am 25. Junius 1803, als er verschwunden war, die scheinbare Breite seines als eine sehr feine Linie auf der Scheibe des Saturns sich zeigenden Schattens gemessen, welche er

*) *Kronographische* Fragmente zur genauen Kenntniss des Planeten *Saturn*. Göttingen. 1808.

= 0″,158 fand. Hieraus fand er nach Abzug des Halbschattens und einer Verminderung wegen der schiefen Beleuchtung die scheinbare Dicke des Rings = 0″,126. An demselben Abend hatte er den scheinbaren Durchmesser des Aequators des Saturns gefunden = 18″,075; folglich beträgt diese Dicke kaum 25 solcher Theile, deren 3557 auf den Durchmesser des Saturns, oder 8300 auf den gröſten Durchmesser des äusseren Rings gehen. Es ergiebt sich hieraus, daß bey schon sehr kleinen Neigungen der Ringe gegen einander der eine über den anderen mit seinem Ende hervorragen und den oben erwähnten ähnliche Erscheinungen verursachen kann.

§. 119. Ausser den bisher betrachteten schon den Alten bekannten Planeten kannte man bis zu dem Jahr 1781 keinen Planeten mehr. Am 13. März dieses Jahrs entdeckte Herschel zwischen den Hörnern des Stiers und den Füßen der Zwillinge, mit einem siebenfüßigen Teleskop einen Stern, welcher sich von den benachbarten Fixsternen durch einen merklichen scheinbaren Durchmesser unterschied. Er bemerkte nach einigen Tagen eine Veränderung seiner Lage gegen die Fixsterne. Der Stern rückte mit zunehmender Geschwindigkeit gegen Morgen nahe mit der Ekliptik parallel unter einer geringen nördlichen Breite fort, bis er im May in der Abenddämmerung unsichtbar wurde. In den ersten Tagen des Augusts erschien er wieder in der Morgendämmerung, er rückte immer langsamer gegen Morgen fort, ward zu Anfang des Oktobers stillstehend, fieng hierauf an mit zunehmender Geschwindigkeit, welche am 22. December bey seiner Opposition am gröſten wurde, sich von Morgen gegen Abend zu bewegen, seine retrograde Bewegung wurde nach und nach langsamer, und er schien im März 1782 wiederum stille zu stehen.

Es können hier noch nicht die Methoden erklärt werden, welcher man sich bedient hat, um die Laufbahn dieses Sterns aus wenigen nicht sehr von einander entfernten Beobachtungen zu bestimmen. Man fand daß man seine scheinbaren Bewegungen, wie die der oberen Planeten, nahe

durch eine wenig gegen die Ekliptik geneigte mit der Sonne concentrische kreisförmige Bahn darstellen könne, welche der Stern in einem Abstand von der Sonne, der 19mal gröſser als der Abstand der Erde von der Sonne ist, in der Richtung von Abend gegen Morgen in einer Zeit von 83 Jahren durchlauft. Er gehört also zu den so genannten oberen Planeten. Gewöhnlich führt er den Namen Uranus.

§. 120. Wenn der Uranus vor seiner Opposition 103 $\frac{1}{2}$ Grade von der Sonne entfernt ist; so fängt er an, rückläufig zu werden, und er wird wieder rechtläufig, wenn er nach der Opposition nur noch 103 $\frac{1}{2}$ Grade von der Sonne absteht. Die Dauer seiner rückgängigen Bewegung ist von ungefähr 151 Tagen, und der ganze Bogen des Rückgangs beträgt 3 $\frac{1}{2}$ Grade. Seine mittlere synodische Umlaufszeit ist = 369 T. 15 St. 44 M. 40 S. und die siderische = 30688 T. 17 St. 6 M. 16 S. Der mittlere Abstand des Uranus von der Sonne verhält sich zu dem mittleren Abstand der Erde von der Sonne wie 19,1833050 : 1, der gröste wie 20,0836211 : 1, und der kleinste wie 18,2930399 : 1. Sein scheinbarer Durchmesser beträgt in seiner mittleren Entfernung von der Sonne oder von der Erde nur 3,9 Sekunden. Er gleicht ungefähr einem Fixstern der sechsten Gröſse, und ist daher noch mit dem bloſsen Auge sichtbar.

§. 121. Zu der genaueren Bestimmung der Bahn dieses Planeten hat die von Bode gemachte Bemerkung sehr viel beygetragen, daſs er zwar in früheren Zeiten von einigen Astronomen könnte beobachtet, aber seiner langsamen Bewegung und seiner geringen scheinbaren Gröſse wegen als ein Fixstern in die Verzeichniſse eingetragen worden seyn. Er fand wirklich den Stern n. 964 in Tobias Mayers Verzeichniſs nicht mehr am Himmel, und da Mayer diesen Stern am 25. Sept. 1756 auf der Göttinger Sternwarte im Meridian beobachtet hatte; so konnte man für diesen *Zeitpunkt* den scheinbaren Ort des Uranus mittelst der schon *gefundenen* Bestimmungsstücke seiner Bahn berechnen, welcher

cher mit dem beobachteten Stern ſo nahe zuſammentraf, daß kein Zweifel über die Identität dieſes Sterns mit dem neuen Planeten übrig blieb. Bode fand nachher, daß ſchon im Jahr 1690 Flamſtead in Greenwich eben dieſen Planeten beobachtet und unter n. 34. im Stier als einen Fixſtern in ſein Verzeichniß eingetragen hatte. Auch Le Monnier in Paris hatte den Uranus im Jahr 1769 beobachtet, aber ebenfalls für einen Fixſtern gehalten.

§. 122. Herſchel hat in den Jahren 1787, 90 und 94 ſechs Trabanten um den Uranus entdeckt, welche ſich in beynahe auf der Ebene der Ekliptik ſenkrechten kreisförmigen Bahnen um dieſen Planeten nach einer den Bewegungen der übrigen Himmelskörper entgegengeſetzten Richtung, nemlich von Morgen gegen Abend bewegen. Den Neigungswinkel der Bahnen gegen die Ekliptik fand er = 89° 48′ ½. Dieſe Bahnen müßen alſo als gerade beynahe auf der Ekliptik ſenkrechte Linien erſcheinen, wenn ihre erweiterte Ebene durch die Erde geht, hingegen nahe als Kreiſe, wenn die Erde 90 Grade von der Knotenlinie derſelben abſteht. Machten die Ebenen dieſer Bahnen mit der Ebene der Ekliptik genau einen rechten Winkel; ſo würde man die Bewegung der Trabanten weder rechtläufig, noch rückläufig nennen können. Bey der ſenkrechten Lage der Bahnen geſchieht alſo der Uebergang aus der einen Richtung der Bewegung in die entgegengeſetzte blos durch die Veränderung des Neigungswinkels, und wenn die Trabanten von der Erde aus geſehen in der Richtung von Abend gegen Morgen um den Planeten ihre Umläufe zu machen ſcheinen; ſo werden ſie ſich von dem Planeten aus geſehen nach derſelben Richtung bewegen, wenn der ſpitze Winkel, unter welchem der nördliche Theil der Ebene ihrer Bahnen gegen die Ebene der Ekliptik geneigt iſt, von der Erde abgekehrt iſt, aber nach der entgegengeſetzten Richtung, oder von Morgen gegen Abend, wenn eben dieſer Winkel ſeine Oefnung gegen die Erde kehrt.

Die Abſtände der ſechs Trabanten des Uranus von ſei-

nem Mittelpunkt in Halbmessern des Uranus ausgedrückt, und ihre siderischen Umlaufszeiten sind folgende:

		T.	St.	M.	S.
I.	13,120	5	21	25	20,6
II.	17,022	8	16	57	47,5
III.	19,845	10	23	3	59,0
IV.	22,752	13	10	56	29,8
V.	45,507	38	1	48	0
VI.	91,008	107	16	39	56

§. 123. In dem gegenwärtigen Jahrhundert sind noch vier neue Planeten entdeckt worden, welche die Namen Ceres, Pallas, Juno und Vesta erhalten haben. La Place *) nennt sie, weil sie nur durch Fernröhren gesehen werden können, teleskopische Planeten. Sie zeigen sich übrigens zuweilen als Sterne der fünften oder sechsten Größe. Piazzi in Palermo entdeckte die Ceres am 1. Januar 1801, Olbers in Bremen am 28. März 1802 die Pallas, Harding in Lilienthal am 1. Sept. 1804 die Juno, und wiederum Olbers am 29. März 1807 die Vesta. Diese vier Planeten kommen mit der Sonne in Opposition, und gehören daher zu den oberen Planeten. Ihre Bahnen sind von Prof. Gauß in Göttingen der kurzen seit ihrer Entdeckung verflossenen Zeit ungeachtet schon so genau bestimmt worden, daß man sie zu jeder Zeit am Himmel auffinden und von einander und den Fixsternen unterscheiden kann. Er hat seine Methoden, deren Anwendung auf diese vier neue Planeten ihre Brauchbarkeit an den Tag legt, in einem eigenen Werk ausführlich bekannt gemacht **).

Die mittleren Abstände von der Sonne und die tropischen Umlaufszeiten der vier neuen Planeten sind, wenn man den mittleren Abstand der Erde von der Sonne = 1 setzt, folgende:

*) Exposition du Système du Monde. III edit. Paris 1808.

**) *Theoria motus corporum cœlestium in sectionibus conicis solem ambientium*, auctore Carolo Friderico Gauss. Hamburgi. 1809.

	Abstände	trop. Uml. Zeiten.			
Ceres	2,76725	1681 T.	2 St.	27 M.	
Pallas	2,76895	1082	15	36	
Juno	2,66801	1581	12	6	
Vesta	2,36208	1325	19	26	

Die Bahnen der vier neuen Planeten fallen also zwischen die Bahnen des Mars und des Jupiters. Alle vier bewegen sich im Allgemeinen von Abend gegen Morgen, wie die übrigen Planeten, scheinen sich wie diese zuweilen, namentlich in ihrer Opposition, rückwarts zu bewegen, und haben ihre Stillstandspunkte. Die Pallas kann sich beträchtlich weiter als die übrigen Planeten von der Ekliptik entfernen, und man muß den Thierkreis (§. 82.) beträchtlich breiter machen, um sie zu fassen.

§. 124. Die Charaktere, womit die Sonne, die Erde, der Mond und die Planeten gewöhnlich bezeichnet werden, sind folgende:

Sonne	☉	Merkur	☿	Ceres	⚳
Erde	♁	Venus	♀	Pallas	⚴
Mond	☽	Mars	♂	Juno	⚵
				Vesta	⚶

Jupiter	♃
Saturn	♄
Uranus	♅

§. 125. Man beobachtet sehr oft Sterne, welche, wie die Planeten ihre Lage gegen die Fixsterne verändern, anfangs kaum sichtbar sind, an Größe und Geschwindigkeit der Bewegung zunehmen, hernach wieder abnehmen, sich langsamer bewegen, und ehe sie einen vollen Umlauf am Himmel gemacht haben, wieder verschwinden. Diese Sterne, welche gewöhnlich in einen Nebel gehüllt sind, der sich zuweilen in einen hellen durchsichtigen Schweif, durch welchen man sehr kleine Fixsterne noch sehen kann, ausbreitet, scheinen sich, wie die Planeten, abwechslend vor und rückwarts zu bewegen, aber nicht wie diese nur in der Nähe der Ekliptik, sondern sie durchlaufen den Himmel nach allen möglichen Richtungen, und ihre Bewegungen sind nicht, wie die Bewegungen der Planeten, im Allgemeinen von *Abend gegen Morgen gerichtet.* Man beobachtet viele, wel-

che sich nach der entgegengesetzten Richtung bewegen. Sie werden Cometen genannt, und haben mit den übrigen Sternen die tägliche Bewegung gemein, welches verbunden mit der Kleinheit ihrer Parallaxe beweißt, daß sie keine in der Atmosphäre der Erde erzeugte Meteore sind. Wenn sie sich dem unbewafneten Auge bereits entzogen haben, entdeckt man sie noch durch Fernröhren, mit deren Stärke die Zeit ihrer Sichtbarkeit wächst. Mithin muß ihre größere Entfernung von der Erde sie nach und nach unseren Augen entziehen, und ihre Bahnen müßen sich dadurch von den Bahnen der Planeten unterscheiden, daß ihre Abstände von der Sonne und der Erde sehr groß werden können, da hingegen die Planeten sich in beynahe kreisförmigen Bahnen um die Sonne oder die Erde bewegen. Die bey den sorgfältigsten Beobachtungen sich noch einschleichenden Fehler gestatten es nicht, aus dem kleinen Theil der Bahnen der Cometen, in welchem sie uns sichtbar sind, die ganze Bahn so genau zu bestimmen, daß man ihre Wiederkehr vorhersagen könnte. Aber die Bestimmung des kleinen Theils ihrer Bahnen, in welchem sie uns sichtbar sind, wird dazu dienen, sie von einander zu unterscheiden, und so ihre Umlaufszeit zu bestimmen. Man hat wirklich einen derselben schon eilfmal beobachtet, nemlich in den Jahren 1006, 1080, 1155, 1230, 1305, 1380, 1456, 1531, 1607, 1682 und 1759, welcher also eine Umlaufszeit von 75 bis 76 Jahren hat.

§. 186. Nehmen wir die in diesem Capitel gezeigten geometrischen Darstellungen der Bewegung der Planeten zusammen; so werden sie sich unter folgende Gesichtspunkte bringen lassen.

Wenn es erstlich nur darauf ankommt, die scheinbaren Bewegungen zu bestimmen, und nicht zugleich die Erscheinungen der verschiedenen Lichtgestalten des Merkurs, der Venus und des Mars, der Verfinsterungen der Jupitertrabanten und des Rings des Saturns, welche man erst seit der Erfindung der Fernröhren hat kennen gelernt, zu erklären; so bleibt die Entfernung dieser Planeten von der als

ruhend angenommenen Erde unbeſtimmt. Man wird alſo um die in Ruhe befindliche Erde zuerſt den Mond wegen ſeiner beträchtlichen Parallaxe in einer beynahe kreisförmigen Bahn ſich bewegen laſſen. Hierauf kommen der Merkur und die Venus in unbeſtimmten Entfernungen von der Erde, welche ſich um dieſe in kreisförmigen Bahnen, aber nicht unmittelbar, ſondern in Epicykeln bewegen, deren Mittelpunkte dieſe Bahnen ſo beſchreiben, daß die von der Erde durch den Mittelpunkt des Epicykels gezogene gerade Linie beſtändig durch die Sonne geht, und deren Halbmeſſer zu den Halbmeſſern der Kreiſe, in welchen ſich ihre Mittelpunkte um die Erde bewegen, ein durch die größten Elongationen dieſer Planeten von der Sonne gegebenes Verhältniß haben. (§. 83. 85.) Ptolemäus ließ auf den Mond zunächſt den Merkur, hierauf die Venus folgen. Nun wird die Bahn der Sonne um die Erde kommen, alsdenn in unbeſtimmten Entfernungen die mit der Erde nahe concentriſchen Bahnen der oberen Planeten, welche von dieſen wiederum nicht unmittelbar, ſondern durch Epicykel beſchrieben werden, deren Mittelpunkte dieſe Kreiſe beſchreiben, und es wird allein das Verhältniß des Halbmeſſers des Epicykels zu den Halbmeſſern des ſeinen Mittelpunkt fortführenden Kreiſes gegeben ſeyn. Alle dieſe Epicykel der oberen Planeten müßen ſo beſchrieben werden, daß ihre an den Ort des Planeten gezogene Halbmeſſer mit dem an den gleichzeitigen Ort der Sonne gezogenen Halbmeſſer der Sonnenbahn parallel ſind (§. 95. 102. 112.). Ptolemäus nahm die Halbmeſſer der Planetenbahnen deſto größer an, je größer die Umlaufszeiten waren, und ließ daher auf die Sonne den Mars, hierauf den Jupiter und endlich den Saturn folgen. Dieſe Hypotheſe macht das ptolemäiſche Syſtem aus (Fig. 38.). Das ſogenannte ägyptiſche Syſtem unterſcheidet ſich von dem ptolemäiſchen blos darinn, daß indemſelben die Mittelpunkte der Epicykel des Merkurs und der Venus in den Mittelpunkt der Sonne ſelbſt geſetzt werden, ſtatt ſie in unbeſtimmter Entfernung auf dem an die Sonne gezogenen Halbmeſſer ihrer Bahn um die Erde anzunehmen. Sollen aber *in dieſem* Syſtem die zugleich oben erwähnten

durch Fernröhren beobachteten Erscheinungen erklärt werden; so muß man, wie in dem ägyptischen System, die unteren Planeten ihre Epicykel um die Sonne beschreiben lassen (§. 84. 85.), und die Epicykel der oberen Planeten der Bahn der Sonne um die Erde gleich und ähnlich nehmen, wodurch das Verhältniß der Halbmesser ihrer Bahnen zu dem Halbmesser der Erdbahn bestimmt wird (§. 97. 106. 115.). Noch erhellet aus §. 89. daß man auch die Bewegungen der unteren Planeten auf eine ähnliche Art wie die der oberen darstellen kann, wie man ihre Epicykel der Sonnenbahn gleich und ähnlich nimmt, und die Mittelpunkte derselben um die ruhende Erde diejenige Bahnen beschreiben läßt, welche man vorher ihren Epicykeln angewiesen hatte. In diesem Fall werden die Bahnen der oberen und der unteren Planeten nach einerley Gesetz beschrieben werden.

§. 127. Man nehme zweytens die Sonne in Ruhe, und die Erde in Bewegung an; so wird die letztere eine der scheinbaren Bahn der Sonne um die Erde gleiche und ähnliche Bahn beschreiben (§. 87.). Um die ruhende Sonne wird sich zunächst der Merkur, in einem größeren Abstand die Venus, hierauf die Erde bewegen. Sodenn werden die Bahnen des Mars, der vier neuen Planeten, des Jupiters, des Saturns und des Uranus kommen (§. 98. 106. 115. 119. 123.), und alle diese Bahnen werden in der Richtung von Abend gegen Morgen in denjenigen Zeiten um die Sonne beschrieben werden, in welchen im ptolemäischen System die unteren Planeten ihre Epicykel durchliefen, die Mittelpunkte der Epicykel der oberen Planeten aber ihre Umläufe um die Erde vollendeten. Endlich werden der Mond um die Erde als Mittelpunkt, und die Trabanten des Jupiters, Saturns und Uranus um ihre Planeten sich in beynahe kreisförmigen Bahnen bewegen, und nur diese so genannte Nebenplaneten werden wirklich Epicykloiden beschreiben. In dem gemeinschaftlichen Mittelpunkt der Bewegungen der Hauptplaneten wird sich ein großer Körper, die Sonne, befinden, von deren Mittelpunkt aus ihre Bahnen, ganz einfach als größte nahe in einer

Ebene liegende Kreiſe der Sphäre erſcheinen werden. Dieſe Anordnung der Planetenbahnen und ihre Uebereinſtimmung mit den Erſcheinungen lehrte Nikolaus Copernicus in ſeinem um das Jahr 1530 vollendeten aber erſt im Jahr 1543 zu Nürnberg gedruckten Werk (De orbium coelestium revolutionibus libri VI.), welche daher das copernicaniſche Syſtem heißt. Man ſehe die 39ſte Figur.

§. 128. Drittens nehme man wie in dem ptolemäiſchen Syſtem die Erde als unbeweglich an, und behalte die Bewegungen der unteren Planeten um die Sonne und dieſer um die Erde bey, wie in dem ägyptiſchen Syſtem. Die oberen Planeten kann man ebenfalls um die Sonne ſich bewegen, und dieſelbe Bahnen um ſie beſchreiben laſſen, welche man in dem copernicaniſchen Syſtem angenommen hatte (§. 96. 106. 115.). Bey dieſer Unordnung wird ſich zunächſt um die Erde der Mond, und um eben dieſe in einer nahe vierhundertmal größeren Entfernung (§. 50. 63.) die Sonne bewegen, um welche die Planeten ihre Bahnen wie in dem copernicaniſchen Syſtem beſchreiben werden. Endlich werden die Jupiters- und Saturnstrabanten um ihre Hauptplaneten die in eben dieſem Syſtem angenommenen Bahnen beſchreiben, und man wird das tychoniſche Syſtem haben (Fig. 40.), welches Tycho de Brahe in ſeiner Schrift De mundi ætherei recentioribus phænomenis L. II. Uranib. 1588. aufgeſtellt hat. In dieſem Syſtem ſind alſo die Bahnen der Planeten in Beziehung auf die Fixſterne Epicykloiden (§. 88.), wie in dem ptolemäiſchen Syſtem, es iſt aber einfacher als dieſes, und es kommen hier keine Bewegungen von geometriſchen Punkten, und von Körpern um dieſe Punkte mehr vor, weswegen es, wenn von den wahren Bewegungen, und nicht blos von einer zu ihrer Berechnung dienenden geometriſchen Hypotheſe oder Conſtruktion die Rede iſt, dem ptolemäiſchen vorzuziehen ſeyn wird. Tycho hat von dem copernicaniſchen Syſtem, welches ſich durch ſeine Einfachheit empfehlen mußte, ſo viel beybehalten, als ihm einige buchſtäblich erklärte Stellen der heiligen Schrift zu erlauben ſchienen.

§. 129. Aus jeder der drey Hypotheſen über die Anordnung der Planetenbahnen ergeben ſich, wie in dieſem Capitel gezeigt worden iſt, dieſelben ſcheinbaren Bewegungen der Planeten in Beziehung auf die Fixſterne, und ſelbſt die im 120ſten §. erwähnte nur durch Fernröhren bemerkbare Erſcheinungen, welche Ptolemäus noch nicht kannte, laſſen ſich ebenfalls in ſeinem Syſtem erklären, wenn man den von ihm angenommenen Bahnen und Epicykeln die §. 126. beſtimmte Größe giebt. Nun bleiben aber noch die allen Himmelskörpern gemeinſchaftliche tägliche Bewegungen übrig, von welchen im erſten Capitel (§. 25. und 26.) gezeigt worden iſt, daß ſie ſich aus einer gleichförmigen Umdrehung der ſcheinbaren Himmelskugel von Morgen gegen Abend um eine unbewegliche durch den Mittelpunkt der Erde gehende Axe erklären laſſen. Wollte man annehmen, dieſe Umdrehung finde wirklich Statt; ſo würde man die Sonne ſamt allen Planeten und Trabanten mit Beybehaltung ihrer relativen Bewegungen in jedem der drey Syſteme täglich einen Umlauf um die Erde müſſen machen laſſen. Weit einfacher erklären ſich aber dieſe Erſcheinungen, wenn man annimmt, die Erde drehe ſich in der Richtung von Abend gegen Morgen um eine mit der Axe der Himmelskugel zuſammenfallende oder parallele Axe mit einer gleichförmigen Geſchwindigkeit während eines Sterntags. Unter dieſer Vorausſetzung werden die Sterne ihre täglichen Bewegungen mit den Beobachtungen übereinſtimmend von Morgen gegen Abend zu machen ſcheinen, und die Sonne, welche ſcheinbar oder wirklich in Beziehung auf die Fixſterne von Abend gegen Morgen fortrückt, wird mit jedem Tag, weil ſich die Erde vermöge der Vorausſetzung nach derſelben Richtung um ihre Axe dreht, ſpäter als die Fixſterne in den Meridian kommen. In dem ptolemäiſchen und tychoniſchen Syſtem wird nun die Axe der Erde unbeweglich angenommen werden müſſen, welche Veränderung Longomontan *) mit dem tychoniſchen Syſtem vorgenommen hat. In dem copernicaniſchen Syſtem hingegen wird ſich die Erde während ihrer Bewegung um die Sonne, um eine ſich

*) Astronomia Danica. Amst. 1622

ſelbſt immer nahe parallel bleibende und mit ihr zugleich fortrückende Axe umdrehen müſſen, welche Bewegungen Copernicus auch wirklich angenommen hat. Alsdenn wird aber ihre Umdrehungsaxe bey ihrer Bewegung um die Sonne nach und nach verſchiedenen Fixſternen entſprechen, und wenn die Verlängerung derſelben bey einer gewißen Lage der Erde genau auf einen Fixſtern traf; ſo wird dieſes nach einiger Zeit nicht mehr Statt finden und erſt alsdenn wieder zutreffen, wenn die Erde in denſelben Punkt ihrer Bahn zurückgekommen iſt. Vielleicht ſind aber die Fixſterne ſo weit von uns entfernt, daß dieſe Abweichungen unbemerkbar ſind, und unter dieſer Vorausſetzung wird das copernicaniſche Syſtem ebenfalls mit den Erſcheinungen übereinſtimmen, welches neben einer einfacheren Erklärung derſelben auch noch die Analogie für ſich hat. Denn es iſt in dieſem Capitel gezeigt worden, daß diejenige Planeten ſich nach derſelben Richtung um ihre Axen drehen, nach welcher ſie um die Sonne laufen, an welchen es noch möglich war, dieſe Bewegung zu bemerken, nur die Umdrehungszeit des Uranus und der vier neuen Planeten iſt noch unbekannt. Ihre Umdrehungsaxen bleiben ſich während ihrer Bewegungen um die Sonne, ſo weit die Beobachtungen reichen, nahe parallel, und ſind bey einigen gegen die Ebene ihrer Bahnen geneigt, welches auch bey der Erde wird angenommen werden müſſen, weil der Pol des Aequators von dem Pol der Ekliptik um die Schiefe der Ekliptik abſteht. Endlich wird ſich das Zurückweichen der Aequinoktialpunkte (§. 37.) ergeben, wenn man die Erdaxe nicht ſich beſtändig parallel bleiben läßt, ſondern annimmt, ſie beſchreibe die Oberfläche eines auf der Ekliptik ſenkrecht ſtehenden Kegels, deſſen Spitze in den Mittelpunkt der Erde fällt, und deſſen Seitenlinien gegen ſeine Axe um die Schiefe der Ekliptik geneigt ſind, in derſelben Zeit und nach derſelben Richtung, welche man bey der ſcheinbaren Bewegung der Aequinoktialpunkte gefunden hat. An dem Mond haben wir ein Beyſpiel einer ähnlichen Bewegung, deſſen gegen die Ekliptik und gegen ſeine Bahn geneigte Umdrehungsaxe ſich nicht parallel bleibt, ſondern in derſelben Zeit einen Umlauf von Morgen gegen Abend

macht, in welcher ſein Knoten einen Umlauf vollendet (§. 80.).

Nun fragt es ſich: welche unter den verſchiedenen Bewegungen, aus denen man ſich die ſcheinbaren Bewegungen der Himmelskörper zuſammengeſetzt denken kann, ſind die wahren, und welche ſind blos ſcheinbar? Laſſen ſich wirklich alle Erſcheinungen der täglichen Bewegung, die Abwechslungen der Jahrszeiten, des ſcheinbaren Laufs der Sonne u. ſ. w. aus der Umdrehung der Erde um ihre Axe und ihrer Bewegung um die Sonne vollſtändig erklären? Welches iſt die wahre Geſtalt der Planetenbahnen, und nach welchen Geſetzen werden ſie beſchrieben? Die theoriſche Aſtronomie beſchäftigt ſich mit der Beantwortung dieſer Fragen, welche den Gegenſtand des zweyten Buchs ausmachen wird.

Zweytes Buch.

Von den wahren Bewegungen der Himmelskörper.

Erſtes Capitel.

Von der Geſtalt und Gröſſe der Erde.

§. 130. Daß die Erde eine beynahe kugelförmige Geſtalt habe, iſt ſchon aus dem 9ten §. bekannt. Aber man wird jetzt ihre Geſtalt und Gröſſe genauer beſtimmen müſſen, ohne deren Kenntniß es nicht möglich iſt, die an verſchiedenen Punkten ihrer Oberfläche angeſtellten Beobachtungen auf einen gemeinſchaftlichen Standpunkt zu reduciren, welchen man in dem Mittelpunkt der Erde annimmt. In dieſem Punkt laufen die auf der Oberfläche der Erde ſenkrechte Richtungen der Schwere nur unter der Vorausſetzung einer genauen Kugelgeſtalt zuſammen, in anderen Fällen hingegen nicht, und man wird beſtimmen müſſen, welche Winkel die verſchiedenen Halbmeſſer der Erde mit den Richtungen der Schwere machen. Sodenn werden auch ihre Abmeſſungen in einem bekannten Längenmaas zu der Beſtimmung der Gröſſe und Entfernungen der Himmelskörper in eben dieſem Maas dienen, deren Verhältniſſe zu einander in dem erſten Buch gefunden worden ſind. Da man z. B. das Verhältniß des Abſtands des Monds von der Erde zu dem Halbmeſſer des Erdäquators kommt (§. 63.); ſo wird man ſeinen Abſtand von der Erde nach dem pariſer Fuß angeben können, wenn man die Anzahl pariſer Fuß kennt, welche auf den Halbmeſſer des Aequators der Erde gehen. Und da die unter dem Aequator Statt findende Horizontalparallaxe des Monds der ſcheinbaren Gröſſe des aus dem Mond geſehenen Halbmeſſers des Erdäquators gleich iſt, und der ſcheinbare Halbmeſſer des Monds durch Beobachtungen gefunden

wird; so kennt man das Verhältniß der wahren Halbmesser (§. 49. n. 6.), mithin den Halbmesser des Monds, wenn der Halbmesser des Erdäquators gegeben ist.

§. 131. Die Bestimmung der Größe der Erde wird sich unter der Voraussetzung einer genauen Kugelgestalt auf die Auflösung folgender zwey Aufgaben zurückführen lassen: Erstlich einen Theil des Umfangs der Erde, z. B. einen Bogen eines Meridians der Erde zu messen, und zweytens den Winkel zu finden, unter welchem die an die Endpunkte dieses Bogens gezogenen Halbmesser der Erde sich schneiden. Dieser Winkel wird sich verhalten zu 360 Gr. wie der gemessene Bogen zu dem Umfang der Erde (VI, 33.), woraus mittelst des bekannten Verhältnißes des Umfangs eines Kreises zu seinem Halbmesser der Erdhalbmesser gefunden wird. Die Auflösung der ersteren Aufgabe erfordert geometrische Operationen auf der Oberfläche der Erde, bey welchen man auf die Erhöhungen der verschiedenen Standpunkte über die erweiterte Oberfläche der See Rücksicht zu nehmen hat, um denjenigen Bogen zu finden, den man erhalten haben würde, wenn die Meßungen unmittelbar auf der erweiterten Oberfläche der See wären vorgenommen worden. Die zweyte Aufgabe kann nur durch astronomische Beobachtungen, und am einfachsten in demjenigen Fall aufgelöst werden, wenn der gemeßene Bogen ein Stück eines Meridians der Erde ist. Es seyen *a*, *b* (Fig. 41.) zwey unter einerley Meridian liegende Orte der Oberfläche der Erde, und *faz*, *fbv* die in dem Punkt *f* zusammenlaufenden Richtungen der Schwere an diesen Orten. Man beobachte in *a* und *b* die Abstände *zas*, *vbs'* eines gewißen Fixsterns von den Scheiteln *z* und *v*, wenn er durch den Meridian geht; so werden *fb*, *fa*, *bs'* und *as* in einer Ebene liegen. In dieser Ebene sey *bz'* mit *az* parallel gezogen. Da die Linien *as* und *bs'* nicht bemerkbar von der parallelen Lage abweichen (§. 25.); so wird $zas = z'bs'$, und $vbs' - zas = vbs' - z'bs' = vbz' = bfa$ seyn. Demnach ist der Winkel, unter welchem die an die Endpunkte *a*, *b* des Bogens *ab* eines Erdmeridians gezogenen Vertikallinien *faz*,

fvv sich schneiden, dem Unterschied der an diesen Punkten beobachteten Zenithdistanzen eines und desselben Fixsterns gleich, wenn, wie im Fall der Figur, beyde Zenithdistanzen auf einerley Seite der zwey Scheitelpunkte *z* und *v* liegen. Im entgegengesetzten Fall verwandelt sich die Differenz der Zenithdistanzen in ihre Summe. Nun wird sich verhalten *afb* : 180° = *ab* : halben Umfang des Erdmeridians, und, wenn der Umfang eines Kreises zu seinem Durchmesser wie π : 1 sich verhält; so wird der Halbmesser *af* oder *bf* der Erde $= \frac{180}{\pi} \cdot \frac{ab}{afb}$ seyn.

§. 132. Eben diese Meßungen dienen aber auch zugleich zu der Bestimmung der Gestalt der Erde. Wenn man an andern Orten der Erde ähnliche Untersuchungen anstellt, und immer gleich große Halbmesser herauskommen, oder wenigstens ihre Unterschiede nicht größer sind; als die Fehler, welchen man bey diesen Meßungen ausgesetzt ist; so wird die Erde sehr nahe kugelförmig seyn. Findet man hingegen größere Unterschiede, und nehmen die auf diesem Weg gefundenen Halbmesser von dem Aequator an bis zu dem Pol beständig zu; so wird die Erde unter dem Aequator nach der Richtung des Meridians stärker gekrümmt seyn, als unter den Polen, und der Durchmesser ihres Aequators wird ihre Axe übertreffen. Nehmen hingegen jene Halbmesser von dem Aequator an bis zu dem Pol beständig ab; so wird der Durchmesser des Aequators kleiner seyn, als die Erdaxe. Um dieses zu zeigen, sey *ap* ein Quadrant des Erdmeridians, *a* ein Punkt des Aequators, und es seyen die Bogen *ab*, *bd de*, *ep* desselben gemeßen; so werden vermöge der im vorhergehenden §. angezeigten Art der Meßung und Berechnung die Richtungen *af*, *bf*, *dg*, *eh*, *pk* der Schwere auf den an die Punkte *a*, *b*, *d*, *e*, *p* dieser Bogen gezogenen Tangenten senkrecht seyn. Aus dem Bogen *ab* ergebe sich der Halbmesser *af*, aus dem Bogen *bd* ein größerer Halbmesser *bg*, und *g* sey der Mittelpunkt des als kreisförmig angenommenen Bogens *bd*, welcher auf der Verlängerung von *bf* liegen wird (III. 19.), weil vermöge

der Voraussetzung ab und bd in b eine gemeinschaftliche Tangente haben. Eben so seyen ch oder he, ck oder pk die aus den Bogen de, ep gefundenen Halbmesser, $pk > he$, und h, k die Mittelpunkte der Bogen de, ep. Die Verlängerung von af schneide die dg, he, pk in den Punkten l, m, c. Nun ist (l, 20.) $fg < fl + lg$

mithin $fg + gh < fl + lh$

und um so mehr $< fl + lm + mh$

$fg + gh + hk < fl + lm + mk$

um so mehr $< fl + lm + mc + ck$

oder $fg + gh + hk < fc + ck$.

Es ist aber

$$pk = ck = \left\{\begin{matrix} ch \\ dh \end{matrix}\right\} + hk = \left\{\begin{matrix} dg \\ bg \end{matrix}\right\} + gh + hk = \left\{\begin{matrix} bf \\ af \end{matrix}\right\} + fg + gh + hk.$$

folglich ist $\left\{\begin{matrix} pk \\ pc + ck \end{matrix}\right\} < af + fc + ck$

und $pc < ac$.

Wenn aber die Halbmesser der verschiedenen Bogen des Meridians von dem Aequator an bis zu dem Pol abnehmen; so nehme man den Punkt p unter dem Aequator, folglich a als Pol an, und es wird wie vorhin folgen, daß $pc < ac$.

§. 133. Weil der einem beliebigen Bogen ab des Erdmeridians zugehörige Halbmesser $af = \frac{180}{\pi} \cdot \frac{ab}{afb}$ ist; so verhalten sich diese Halbmesser, wenn die den Endpunkten der Bogen entsprechende Richtungen der Schwere gleiche Winkel mit einander machen, wie die Längen der Bogen. Nun kann man aus der Länge ab eines Bogens und dem ihm zugehörigen Winkel afb diejenige Länge desselben finden, welche einem Winkel von 1 Grad entspricht, wenn man die Länge des gemeßenen Bogens ab mit der Anzahl der auf den Winkel afb gehenden Grade dividirt. Man nennt diese Bogen des Erdmeridians, welche einem Winkel der an ihre Endpunkte gehenden Vertikallinien von einem Grad entsprechen, oder um welche man in der Richtung des Meridians fortgehen muß, bis sich die Polhöhe oder *die geographische* Breite um einen Grad verändert, nach

der Analogie des Kreiſes Grade des Erdmeridians, und die zur Beſtimmung dieſer Grade angeſtellten Meßungen Gradmeßungen. Aus der Vergleichung der unter verſchiedenen Breiten gemeßenen Grade eines Erdmeridians wird ſich alſo leicht ergeben, ob der Durchmeſſer des Aequators der Erde größer oder kleiner iſt, als ihre Axe. Wenn nemlich dieſe Grade von dem Aequator an bis zu dem Pol wachſen; ſo wird der Durchmeſſer des Aequators größer, und wenn ſie beſtändig abnehmen kleiner ſeyn als die Erdaxe. Und wenn unter verſchiedenen geographiſchen Längen die unter gleichen nördlichen oder ſüdlichen Breiten gemeßenen Grade einander gleich gefunden werden; ſo werden alle Meridiane der Erde einander gleich und ähnlich, und die Erde wird ein Körper ſeyn, welcher durch die Umdrehung eines dieſer Meridiane um die Erdaxe beſchrieben, und durch den Aequator in zwey gleiche und ähnliche Theile getheilt wird.

Da $pk = af + fg + gh + hk$ (§. 132.); ſo wird, wenn man ſich in dem Punkt k das eine Ende eines Fadens, deſſen Länge $= pk$, befeſtigt, und dieſen auf die gebrochene Linie $fghk$ aufgewickelt denkt, ſein nach der Richtung fa ausgeſpanntes Stück mit ſeinem Ende in den Punkt a treffen. Wird nun dieſer Faden, indem man ihn beſtändig geſpannt erhält, nach und nach von der gebrochenen Linie $fghk$ abgewickelt; ſo wird ſein bewegliches Ende zuerſt den Kreisbogen ab, hernach den Kreisbogen bd, ſodenn den Kreisbogen de u. ſ. w. beſchreiben, weil von a bis b der abgewickelte Theil des Fadens $= af$, von b bis $d = fg$, von d bis $e = dh$ u. ſ. w. iſt. Man laſſe die gebrochene Linie $fghk$ in eine ſtetig krumme Linie übergehen, welche die Linien ac und pk berühre; ſo werden ſich die Halbmeſſer der Kreisbogen ſtetig ändern, und es wird nun durch das Ende des Fadens eine ſtetig krumme Linie beſchrieben werden, von welcher kein Theil mit einem Kreisbogen genau zuſammenfällt, welche aber in jedem ihrer Punkte der Krümmung desjenigen Kreiſes am nächſten kommen wird, deſſen Mittelpunkt in den von dem Faden berührten Punkt der krummen Linie fällt, von welcher der Faden abgewickelt wird, und deſſen Halbmeſſer dem abgewickelten Theil des

Fadens, oder der zwischen jenem Berührungspunkt und dem Erdmeridian liegenden geraden Linie gleich ist. Dieser Kreis heißt der Krümmungskreis (circulus curvaturæ, circulus osculator) der krummen Linie, sein Halbmesser heißt der Krümmungshalbmesser (radius curvaturæ sive osculi), welchem die nach der Regel des 132ten §. gefundenen Halbmesser desto näher kommen werden, je kleiner die Bogen des Erdmeridians sind, aus welchen man sie ableitet. Auf der andern Seite dürfen aber auch diese Bogen nicht zu klein genommen werden, damit die in der Bestimmung des Unterschieds der Polhöhen begangenen Fehler keinen zu großen Einfluß auf die Krümmungshalbmesser haben.

§. 134. Es würde sehr beschwerlich, und in manchen Gegenden unmöglich seyn, so große Stück eines Erdmeridians unmittelbar zu messen. Es ist viel einfacher und genauer, nach der von Snellius zuerst gebrauchten Methode *) die in der Nähe des zu meßenden Bogens liegende, sich auszeichnende oder durch besondere Signale in der Ferne sichtbar gemachte Punkte durch eine Reihe von Dreyecken so mit einander zu verbinden, daß jedes dieser Dreyecke mit dem nächstfolgenden eine Seite gemeinschaftlich hat. Alsdenn wird man nur eine Seite dieser Dreyecke und ihre Winkel zu messen haben, um die Seiten der übrigen Dreyecke berechnen zu können. Mißt man ferner den Winkel, welchen eine der Seiten dieser Dreyecke mit dem Meridian macht; so wird man mittelst der bekannten Seiten der Dreyecke und dieses Winkels die Länge des zu meßenden Bogens des Meridians durch Rechnung herleiten können. Es sey nemlich *AM* (Fig. 42.) ein Bogen eines Meridians der Erde, *A*, *B*, *C*, *D*, u. s. w. seyen auf diesem Meridian oder in seiner Nähe liegende Punkte, welche durch die gerade Linien *AB*, *BC*, *AC* u. s. w. mit einander verbunden seyen, und eine Reihe an einander hängender Dreyecke bilden.

*) *Eratosthenes* Batavus s. de terræ ambitus vera quantitate. Lugd. Bat. 1617.

den. Man meſſe eine Seite BC dieſer Dreyecke, und die Winkel ſo wohl des Dreyecks ABC, als aller übrigen; ſo findet man aus der Baſis BC und den Winkeln die Seiten AB, AC. Eben ſo in dem Dreyeck BCD aus der Seite BC die Seiten BD, CD. In dem anliegenden Dreyeck CDE kennt man wiederum eine Seite CD, und die Winkel, woraus ſich die Seiten DE und EC ergeben. Endlich findet man in dem Dreyeck EDF aus der nun bekannten Seite DE und den Winkeln die Seiten DF und FE. Mithin werden die geraden Linien, aus welchen die gebrochene Linie $ACEF$ zuſammengeſetzt iſt, und die Winkel ACE, CEF, welche ſie mit einander machen, durch die gemeßene Winkel der Dreyecke gegeben ſeyn. Man beobachte noch den Winkel CAM, welchen die Seite CA mit der an dem Ort A gezogenen Mittagslinie AM macht, fälle von C, E und F die Perpendickel Cc, Ee, Ff auf AM, und ziehe durch die Punkte C und E die Parallelen Cg, Eh mit AM, welche den wo nöthig verlängerten Perpendikeln Ee, Ff in g und h begegnen. Da man in dem bey c rechtwinklichten Dreyeck ACc den Winkel CAc und ſeine Hypotenuſe AC kennt: ſo kann man die Seite Ac finden. Nun macht der Winkel gCA mit dem gegebenen CAM zwey rechte Winkel, und der Winkel ACE iſt durch die Winkel der Dreyecke gegeben; folglich kennt man ihren Unterſchied gCE. Man kann alſo die Seite Cg oder die ihr gleiche ce durch die Auflöſung des bey g rechtwinklichten Dreyecks CEg finden. Endlich iſt der Winkel $CEh = 2R - gCE$, und der Winkel CEF iſt gegeben; folglich kennt man den Winkel FEh des rechtwinklichten Dreyecks FEh, deſſen Hypotenuſe ebenfalls gegeben iſt, und kann daher hE oder die ihr gleiche ef finden. Aus dieſen Stücken des zu meßenden Bogens ergiebt ſich nun der Bogen $Af = Ac + ce + ef$, und die Meßung kann auf ähnliche Art weiter fortgeſetzt werden, wobey man nichts als Winkel von Dreyecken zu meßen hat.

§. 135. Picard, welcher nach dieſer von Snellius gezeigten Methode die erſte genauere Meßung eines Bogens des durch die *pariſer* Sternwarte gezogenen Meridians zu

schen Paris und Amiens mit vollkommeneren Hülfsmitteln im Jahr 1669 unternahm, fand den zwischen seinem nördlichsten und südlichsten Standpunkt liegenden Bogen = 78850 Toisen (jede zu 6 pariser Fuß), und durch astronomische Beobachtungen ergab sich der Unterschied der Polhöhen der zwey Endpunkte des Bogens = 1° 22′ 55″. Hienach wäre in dieser Gegend ein Grad des Meridians = 57057 Toisen. In den Jahren 1683, 1700 und 1718 wurden diese Meßungen durch die beyden Cassini und Maraldi wiederholt, und durch ganz Frankreich fortgesetzt. Es ergab sich die Entfernung von der Sternwarte bis an den Parallelkreis von Collioure an der spanischen Gränze = 360614 Toisen, der Unterschied der Polhöhen = 6° 18′ 57″, und die Länge eines Grads = 57097 Toisen. Ferner fand man Dünkirchen um 125454 T. nördlicher als die pariser Sternwarte, und den Unterschied der Polhöhen = 2° 12′ 9″.5, woraus die Größe eines Grads = 56960 sich ergiebt. Hienach müßte die Erdaxe größer seyn als der Durchmesser des Aequators (§. 133.) Allein andere Gründe, von welchen in der Folge die Rede seyn wird, machten es gewiß, daß die Erde eine unter den Polen zusammengedrückte Gestalt haben müße, und da schon diesen Meßungen nach zu urtheilen ihre Gestalt nicht beträchtlich von einer Kugel verschieden seyn, mithin leicht die Fehler der Meßungen größer werden konnten, als die Unterschiede dieser nicht sehr weit von einander entfernt liegenden Grade; so war es nöthig, zwey Grade, den einen so nahe als möglich bey dem Pol, den andern unter dem Aequator zu messen. Bouguer, de la Condamine, Godin, Jussieu und Louplet begaben sich nach Peru; Maupertuis, Clairaut, Camus, le Monnier, Outhier und Celsius nach Lappland. Die letzteren vollendeten ihre Meßungen unter dem Polarkreis in den Jahren 1736 und 1737, nach welchen Maupertuis den Grad unter 66° 19′ Breite auf 57438 Toisen setzte. La Place brachte, indem er ein Mittel aus den verschiedenen Reihe von Dreyecken, und auf die Refraktion Rücksicht nahm, 57405 T. heraus. Die Gradmeßung unter dem Aequator wurde im Jahr 1741 vollendet. Nach Bouguer's Angabe ist ein

Grad des Meridians unter dem Aequator = 56753 T. mithin um 652 T. kleiner als der Grad unter dem Polarkreis. Die unter den Polen zusammengedrückte oder abgeplattete Gestalt der Erde war also erwiesen. Seit dieser Zeit sind in verschiedenen Ländern mehrere Grade gemeßen worden, und insbesondere haben Mechain und Delambre einen Bogen des pariser Meridians zwischen Dünkirchen und Barcelona 1792 und in den folgenden Jahren mit einer großen Genauigkeit gemeßen. Die Resultate dieser Meßungen sind, wenn man unter einer Toise diejenige Länge versteht, welche die zu der Gradmeßung in Peru gebrauchte eiserne Toise bey einer Temperatur von + 13 *R* hat, folgende:

beobachtete Polhöhen.				Bogen des Meridians zwischen Montjouy und	Toiſ.
Montjouy . .	41°	21′	44″,96		
Carcaſſonne . .	43	12	54,30	Carcaſſonne	105498,96
Evaux . . .	46	10	42,54	Evaux	274348,06
Pantheon in Paris	48	50	49,37	Pantheon	426639,54
Dünkirchen . .	51	2	9,20	Dünkirchen	551584,72

Auch die Gradmeßung unter dem Polarkreis iſt in den Jahren 1801, 2 und 3 durch Svanberg wiederholt worden. Dieſer fand die Größe eines Grads unter einer Breite von 66° 20′ = 57188,42 Toiſen, alſo um 216 Toiſen kleiner, als ihn Maupertuis in eben dieſer Gegend gefunden hatte, doch noch immer um 435,42 Toiſ. größer, als den Grad unter dem Aequator. Wenn man bedenkt, daß dieſen Größen der Grade des Erdmeridians zufolge ein Fehler von 1 Sekunde in der Differenz der Polhöhen an den zwey Endpunkten eines Grads beynahe einen Fehler von 16 Toiſ. in der Länge des Grads hervorbringt, und die bey der erſten lappländiſchen Gradmeßung gebrauchte läſtige Inſtrumente über hohe Berge geſchleppt werden mußten, ferner, daß dieſe Meßungen in einem ſehr kalten Clima angeſtellt wurden; ſo wird man ſich die Abweichungen der zwey Meßungen von einander einigermaßen erklären können.

Bey allen dieſen Meßungen bleibt noch immer einige Ungewißheit wegen der nicht genau bekannten Stralenbre-

chung, welche auf den Unterschied der Polhöhen Einfluß hat, und wegen der durch die Veränderung der Temperatur geänderten Länge der Meßstangen übrig, woher es kommt, daß man verschiedene Angaben der aus einerley Meßung abgeleiteten Grade bey verschiedenen Schriftstellern findet. Die folgende Tafel zeigt die unter verschiedenen Polhöhen gemeßenen Grade, unter welchen die in Frankreich und Lappland gemeßenen diejenige sind, welche sich aus den neuesten Meßungen ergeben haben.

	mittlere Breiten.			Grade.
Peru	0°	0′		56753 Toiſ.
Oſtindien, a.	12	5		56701
——— b.	13	18		50726
Cap	33	18	ſüdl.	57037
Penſylvanien	39	12		56888
Italien	43	1		56979
Frankreich	46	11	57″	57020,77
Oeſtreich	47	47		57066
England	52	2	20	57068,7
Lappland	66	20	10	57188,42

§. 136. Aus der Vergleichung dieſer Grade ergiebt ſich, daß, wie ſchon oben bemerkt worden, die Erde von der Kugelgeſtalt, aber nicht ſehr beträchtlich, abweicht. Legt man den in Frankreich gemeßenen Grad zum Grund, und nimmt fürs erſte die Erde kugelförmig an; ſo wird ihr halber Umfang = 57020,77 . 180 = 10263738,6 Toiſ. und ihr Halbmeſſer = 3266842 T.

Ferner ſieht man, daß die Grade von dem Aequator an gegen die Pole hin abnehmen, wenn die ihnen entſprechende Breiten beträchtlich von einander verſchieden ſind, dazwiſchen hinein aber einige Grade bey zunehmender Breite abnehmen, welches anzuzeigen ſcheint, daß die Erde kein regulärer Körper iſt. Der auf dem Cap gemeßene Grad iſt größer als die unter größeren Breiten in Penſylvanien, Italien und Frankreich gemeßenen Grade, und daher ſcheint die ſüdliche Hälfte der Erde der nördlichen nicht ähnlich zu ſeyn, wenn anders dieſe Abweichungen nicht von

Fehlern der Meßungen herrühren. Indeſſen kann man eine reguläre krumme Linie ſuchen, welche durch zwey auf einander ſenkrechte Durchmeſſer in vier gleiche und ähnliche Theile getheilt wird, und der Geſtalt eines Meridians der Erde wenigſtens nahe kommt. Die Ellipſe hat die erſtere dieſer Eigenſchaften, und wenn ſich dieſe um ihre kleine Axe dreht; ſo wird ein runder, unter den Polen der Umdrehungsaxe zuſammengedrückter Körper beſchrieben, welcher mit der Geſtalt der Erde einige Aehnlichkeit hat. Zwey unter verſchiedenen Breiten gemeßene Grade ſind hinreichend, unter dieſer Vorausſetzung die große und kleine Axe eines elliptiſchen Meridians der Erde, oder die Erdaxe und den Durchmeſſer des Aequators zu beſtimmen. Dividirt man den Ueberſchuß des Halbmeſſers des Aequators über die halbe Erdaxe mit dem Halbmeſſer des Aequators; ſo erhält man die ſo genannte Abplattung der Erde. Aus den gefundenen Abmeßungen eines Meridians kann man hernach die Größe der Grade unter anderen Breiten berechnen, deren Vergleichung mit den wirklich gemeßenen die Abweichung eines Erdmeridians von der elliptiſchen Geſtalt zeigen wird.

§. 137. Es ſey AMB (Fig. 43.) ein elliptiſcher Quadrant, die halbe große Axe $CA = a$, die halbe kleine Axe $CB = b$, CM ein an den Punkt M gehender Halbmeſſer der Ellipſe, MN eine Normallinie an M, und MP auf CA ſenkrecht. Die Normallinie MN wird auf der Oberfläche des durch die Umdrehung der Figur um die Axe CB beſchriebenen halben elliptiſchen Sphäroids ſenkrecht, und daher die Richtung der Schwere auf demſelben ſeyn. Die gerade Linie CA wird die Ebene des Aequators beſchreiben; folglich der Winkel ANM die geographiſche Breite des Orts M ſeyn, welche mit l bezeichnet werde, und ACM ſey $= l'$. Vermöge der Eigenſchaften der Ellipſe wird ſich verhalten

$$CP : PN = \overline{CA}^2 : \overline{CB}^2 = a^2 : b^2.$$

Aber $CP : PN = \text{Tang. } PMC : \text{Tang. } PMN$
$= \text{Cotg. } ACM : \text{Cotg. } ANM;$

folglich 1.) $\left.\begin{array}{l}\text{Cotg. } ACM : \text{Cotg. } ANM \\ \text{Cotg. } l' \quad : \text{Cotg. } l \\ \text{Tg. } l \quad : \text{Tg. } l'.\end{array}\right\} = a^2 : b^2$

Mithin ist $a^2 \operatorname{Tg.} l' = b^2 \operatorname{Tg.} l$

$$\left.\begin{matrix} a^4(1+\overline{\operatorname{Tg.} l'^2}) \\ a^4\overline{\operatorname{Sec.} l'^2} \end{matrix}\right\} = a^4 + b^4\overline{\operatorname{Tg.} l^2}$$

$$\overline{\operatorname{Sec.} l'^2} = \frac{a^4\overline{\operatorname{Cos.} l^2} + b^4\overline{\operatorname{Sin.} l^2}}{a^4\overline{\operatorname{Cos.} l^2}}$$

oder 2.) $$\overline{\operatorname{Cos.} l'^2} = \frac{a^4\overline{\operatorname{Cos.} l^2}}{a^4\overline{\operatorname{Cos.} l^2} + b^4\overline{\operatorname{Sin.} l^2}},$$

und weil $b^2 \operatorname{Cotg.} l' = a^2 \operatorname{Cotg.} l$ (n. 1.);

so ist $$\left.\begin{matrix} b^4(1+\overline{\operatorname{Cotg.} l^2}) \\ b^4\overline{\operatorname{Cosec.} l^2} \end{matrix}\right\} = b^4 + a^4\overline{\operatorname{Cotg.} l^2}$$

$$\overline{\operatorname{Cosec.} l'^2} = \frac{b^4\overline{\operatorname{Sin.} l^2} + a^4\overline{\operatorname{Cos.} l^2}}{b^4\overline{\operatorname{Sin.} l^2}};$$

also 3.) $$\overline{\operatorname{Sin.} l'^2} = \frac{b^4\overline{\operatorname{Sin.} l^2}}{b^4\overline{\operatorname{Sin.} l^2} + a^4\overline{\operatorname{Cos.} l^2}}$$

Ferner ist vermöge der Eigenschaften der Ellipse

$$\overline{PM}^2 = \overline{CB}^2 - \frac{\overline{CB}^2}{\overline{CA}^2}\overline{CP}^2$$

oder, wenn man zur Abkürzung den Halbmesser $CM = Z$ setzt,

$$Z^2\overline{\operatorname{Sin.} l'^2} = b^2 - \frac{b^2}{a^2}Z^2\overline{\operatorname{Cos.} l'^2}$$

und $$Z^2 = \frac{a^2b^2}{a^2\overline{\operatorname{Sin.} l'^2} + b^2\overline{\operatorname{Cos} l'^2}},$$

woraus man mittelst der Ausdrücke n. 2. und 3. erhält

$$4.)\ \left.\begin{matrix} Z^2 \\ \overline{CM}^2 \end{matrix}\right\} = \frac{b^4\overline{\operatorname{Sin.} l^2} + a^4\overline{\operatorname{Cos.} l^2}}{b^2\overline{\operatorname{Sin.} l^2} + a^2\overline{\operatorname{Cos.} l^2}}.$$

Sodenn verhält sich in dem Dreyeck CMN

$CM : MN = \operatorname{Sin.} CNM : \operatorname{Sin.} NCM = \operatorname{Sin.} l : \operatorname{Sin.} l'$;

daher ist $$\overline{MN}^2 = \frac{\overline{CM}^2\ \overline{\operatorname{Sin.} l'^2}}{\overline{\operatorname{Sin.} l^2}}$$

$$= \frac{b^4\overline{CM}^2}{b^4\overline{\operatorname{Sin.} l^2} + a^4\overline{\operatorname{Cos.} l^2}}, \text{ (n. 3.)}$$

$$= \frac{b^4}{b^2\overline{\operatorname{Sin.} l^2} + a^2\overline{\operatorname{Cos.} l^2}}, \text{ (n. 4.)}$$

$$= \frac{b^4}{a^2 - (a^2 - b^2)\,\overline{\text{Sin. } l}^2},$$

oder, wenn man $\frac{a^2 - b^2}{a^2} = e^2$, und den halben Parameter der großen Axe $= p$ ſetzt,

5.) $\overline{MN}^2 = \frac{p^2}{1 - e^2 \overline{\text{Sin. } l}^2}$.

Nun verhält ſich aber der Krümmungshalbmeſſer der Ellipſe an dem Punkt M zu der Normallinie $MN = \overline{MN}^2 : p^2$ (Kegelſchn. II, 36. Zuſ. 7.); folglich iſt, wenn dieſer Krümmungshalbmeſſer $= R$ geſetzt wird,

6.) $R = \left(\frac{MN}{p}\right)^2 \times MN$

$$= \frac{p}{(1 - e^2 \overline{\text{Sin. } l}^2)^{\frac{3}{2}}}$$

Es ſeyen die den Polhöhen L, l zugehörigen Grade des Meridians G und g; ſo wird ſich verhalten (§. 133.)

$$G : g = \frac{p}{(1 - e^2 \overline{\text{Sin. } L}^2)^{\frac{3}{2}}} : \frac{p}{(1 - e^2 \overline{\text{Sin. } l}^2)^{\frac{3}{2}}}$$

$$= (1 - e^2 \overline{\text{Sin. } l}^2)^{\frac{3}{2}} : (1 - e^2 \overline{\text{Sin. } L}^2)^{\frac{3}{2}}$$

$$G^{\frac{2}{3}} : g^{\frac{2}{3}} = 1 - e^2 \overline{\text{Sin. } l}^2 : 1 - e^2 \overline{\text{Sin. } L}^2 :$$

alſo wird man haben

$$G^{\frac{2}{3}} - e^2 G^{\frac{2}{3}} \overline{\text{Sin. } L}^2 = g^{\frac{2}{3}} - e^2 g^{\frac{2}{3}} \overline{\text{Sin. } l}^2,$$

oder 7.) $e^2 = \frac{G^{\frac{2}{3}} - g^{\frac{2}{3}}}{G^{\frac{2}{3}} \overline{\text{Sin. } L}^2 - g^{\frac{2}{3}} \overline{\text{Sin. } l}^2}$

$$= \frac{1 - \left(\frac{g}{G}\right)^{\frac{2}{3}}}{\left(1 - \left(\frac{\text{Sin. } l}{\text{Sin. } L}\right)^2\right) \left(\frac{g}{G}\right)^{\frac{2}{3}} \overline{\text{Sin. } L}^2}$$

Sucht man zwey Hülfswinkel durch die Formeln

$\text{Cos. } x = \left(\frac{g}{G}\right)^{\frac{1}{3}}$ und $\text{Cos. } y = \left(\frac{g}{G}\right)^{\frac{1}{3}} \frac{\text{Sin. } l}{\text{Sin. } L}$; ſo wird

$$e = \frac{\text{Sin. } x}{\text{Sin. } L \text{ Sin. } y}.$$

Liegt der kleinere Grad g unter dem Aequator; ſo iſt $l = 0$, und daher

8.) $e^2 = \frac{1 - \left(\frac{g}{G}\right)^{\frac{2}{3}}}{\text{Sin. } L^2}$

Hat man e^2 gefunden; ſo wird, weil $\frac{a^2 - b^2}{a^2} = e^2$ iſt, $\frac{b^2}{a^2} = 1 - e^2$, und man hat das Axenverhältniß $b : a = \sqrt{1-e^2} : 1$.

Endlich da der dem Grad G entſprechende Krümmungshalbmeſſer $= \frac{180}{\pi} G$ iſt; ſo hat man aus der Gleichung n. 6. weil $\frac{b}{a}$ und e gefunden worden ſind,

$$\left.\begin{matrix} p \\ \text{oder } b^2 \\ a \end{matrix}\right\} = \frac{180 G}{\pi} (1 - e^2 \text{Sin. } L^2)^{\frac{3}{2}};$$

alſo 9.) $a = \frac{180 G}{\pi} \frac{a^2}{b^2} (1 - e^2 \text{Sin. } L^2)^{\frac{3}{2}}$,

und wenn der Grad g unter dem Aequator liegt,

10.) $a = \frac{180}{\pi} g \cdot \frac{a^2}{b^2}$

Da Tg. l : Tg. $l' = a^2 : b^2$ (n. 1.); ſo verhält ſich

$$\left.\begin{matrix} \text{Tang. } l - \text{Tg. } l' : \text{Tg. } l + \text{Tg. } l' \\ \text{Sin. } (l - l') \quad : \text{Sin. } (l + l') \end{matrix}\right\} = a^2 - b^2 : a^2 + b^2.$$

Der Winkel CMN, welchen die Richtung der Schwere MN mit dem Halbmeſſer CM der Erde macht, wird alſo am gröſten, wenn $l + l' = 90°$, Tg. $l' =$ Cotg. l iſt. Für dieſe Breite wird man daher haben

$$\left.\begin{matrix} \text{Tg. } l : \text{Cotg } l \\ \text{Tang. } l^2 : 1 \end{matrix}\right\} = a^2 : b^2,$$

11.) Tg. $l : 1 = a : b$,

und den gröſten Winkel NMC wird man durch die Formel erhalten

12.) $\text{Sin. } (l - l') = \frac{a^2 - b^2}{a^2 + b^2}$.

Weil $\text{Sin. } (l - l') = \frac{a^2 - b^2}{a^2 + b^2} \text{Sin. } (l + l')$

$= \frac{a^2 - b^2}{a^2 + b^2} \text{Sin. } (2l - (l - l'))$; ſo wird

13.) $\text{Tg. } (l - l') = \frac{\frac{a^2 - b^2}{a^2 + b^2} \text{Sin. } 2l}{1 + \frac{a^2 - b^2}{a^2 + b^2} \text{Cos. } 2l}$, welcher Ausdruck in

eine Reihe aufgelöst giebt.

14.) $l - l' = \frac{a^2-b^2}{a^2+b^2}\frac{\text{Sin. } 2l}{\text{Sin. } 1''} - \frac{1}{2}\left(\frac{a^2-b^2}{a^2+b^2}\right)^2\frac{\text{Sin. } 4l}{\text{Sin. } 1''} + \frac{1}{3}\left(\frac{a^2-b^2}{a^2+b^2}\right)^3\frac{\text{Sin. } 6l}{\text{Sin. } 1''} - \&c.$

Aus n. 4. folgt

$$\left(\frac{CM}{CA}\right)^2 = \frac{1 - \frac{a^4-b^4}{a^4}\,\overline{\text{Sin. } l^2}}{1 - \frac{a^2-b^2}{a^2}\,\overline{\text{Sin. } l^2}},$$

oder, weil $\frac{a^4-b^4}{a^4} = \frac{a^2+b^2}{a^2}\cdot\frac{a^2-b^2}{a^2} = (2-e^2)\,e^2$ ist,

$\left(\frac{CM}{CA}\right)^2 = \frac{1-(2-e^2)\,e^2\overline{\text{Sin. } l^2}}{1-e^2\overline{\text{Sin. } l^2}}$, woraus man durch Entwicklung in eine Reihe erhält

15.) $\frac{CM}{CA} = 1 - \frac{1}{2}e^2(1-e^2)\overline{\text{Sin. } l^2} - \frac{5}{8}e^4(1-e^2)(1-\frac{1}{5}e^2)\overline{\text{Sin. } l^4} - \&c.$

Man setze $\frac{G-g}{3G} = D$, und $\frac{\text{Sin. } l}{\text{Sin. } L}\sqrt[3]{\frac{g}{G}} = \text{Cos. } u$; so verwandelt sich der Ausdruck n. 7. in folgenden

$e^2\overline{\text{Sin. } L^2}\ \overline{\text{Sin. } u^2} = 1 - (1-3D)^{\frac{2}{3}}$

$= 2D + D^2 + \frac{4}{3}D^3 + \&c.$: folglich ist

16.) $e^2 = 2D\ \overline{\text{Cosec. } L^2}\ \overline{\text{Cosec. } u^2} + D^2\ \overline{\text{Cosec. } L^2}\ \overline{\text{Cosec. } u^2} + \&c.$;

wodurch e^2 genauer, als durch n. 7. wird gefunden werden können, wenn man bey der Berechnung nur die gewöhnlichen Logarithmen von sieben Decimalstellen gebraucht. Sodenn hat man

17.) $\frac{b^2}{a^2} = 1 - e^2$

18.) $\frac{b}{a} = 1 - \frac{1}{2}e^2 - \frac{1}{2.4}e^4 - \frac{1.3}{2.4.6}e^6 - \&c.$

19.) $\frac{a-b}{a} = \frac{1}{2}e^2 + \frac{1}{2.4}e^4 + \frac{1.3}{2.4.6}e^6 + \&c.$

Setzt man in n. 6. die Breite $l = 0$; so erhält man den Krümmungshalbmesser des Meridians unter dem Aequator $= p$, und da die Grad den Krümmungshalbmessern proportional sind; so verhält sich ein Grad g' des Meridians unter dem Aequator zu einem Grad g unter der Breite l, wie $p : R$. folglich ist

20.) $g = g'\frac{R}{p} = \frac{g'}{(1-e^2\overline{\text{Sin. } l^2})^{\frac{1}{2}}}$. (n. 6.)

$$= g' (1 + \tfrac{3}{2} e^2 \overline{\text{Sin. } i}^2 + \frac{3 \cdot 5}{2 \cdot 4} e^4 \overline{\text{Sin. } i}^4 + \frac{3 \cdot 5 \cdot 7}{2 \cdot 4 \cdot 6} e^6 \overline{\text{Sin. } i}^6 + \&c.),$$

und umgekehrt

21.) $$g' = g \frac{p}{R} = g (1 - e^2 \overline{\text{Sin. } i}^2)^{\frac{3}{2}}$$

$$= g (1 - \tfrac{3}{2} e^2 \overline{\text{Sin. } i}^2 + \frac{3 \cdot 1}{2 \cdot 4} e^4 \overline{\text{Sin. } i}^4 + \frac{3 \cdot 1 \cdot 1}{2 \cdot 4 \cdot 6} e^6 \overline{\text{Sin. } i}^6 + \&c.)$$

§. 138. Um jetzt die Abmeßungen eines Meridians der Erde unter der Voraussetzung zu bestimmen, daß die Erde ein durch die Umdrehung einer Ellipse um ihre kleine Axe beschriebenes Sphäroid sey, nehme man zwey unter beträchtlich verschiedenen Breiten gemeßenen Grade, z. B. die in Frankreich und Lappland gemeßenen; so ist

$G = 57188{,}42$ Lg. $= 4{,}7573080$
$g = 57020{,}77$ Lg. $= 4{,}7560330$

Lg. $\frac{g}{G} = 9{,}9987250$

$\frac{1}{3}$ Lg. $\frac{g}{G} = 9{,}9995750$

$i = 46° 11' 57''$; Lg. Sin. $= 9{,}8583870$

$19{,}8579620$
$L = 66\ 20\ 10$; Lg. Sin. $= 9{,}9618555$

Lg. Cos. $\varkappa = 9{,}8961065$; $\varkappa = 38° 4' 18'',4$

$G - g = 167{,}65$
$\frac{G-g}{3} = 55{,}8833$; Lg. $= 1{,}7472822$
Lg. $G = 4{,}7573080$

Lg. $D = 6{,}9899742 - 10$
Lg. $2 = 0{,}3010300$

Lg. $2D = 7{,}2910042 - 10$

Lg. $D^2 = 3{,}9799484 - 10$

Lg. $\overline{\text{Sin. } L}^2 = 9{,}9237110$
Lg. Sin. $\varkappa^2 = 9{,}5800750$

$9{,}5037860$

$7{,}7872182$; $0{,}00612658$

$4{,}4761624$; $0{,}00000299$

$$e^2 = 0\,00612957$$

$$\tfrac{1}{2} e^2 = 0{,}003064785$$
$$\tfrac{1}{8} e^4 = 0{,}000004697$$

$$\frac{a-b}{a} = 0{,}00306948$$

$$= \frac{1}{325\,788}$$

Vergleicht man die in Lappland und Peru gemeßenen Grade mit einander; so hat man

$G = 57188.42$; $L = 66^0\ 20'\ 10''$
$g' = 56753$; $l' = 0$ und $u = 90^0$.

Hieraus findet man auf ähnliche Art wie vorhin

$$e^2 = 0{,}006058268$$
$$\frac{a-b}{a} = 0{,}00303372 = \frac{1}{329{,}628}.$$

Eben so erhält man durch die Vergleichung der Grade in Frankreich und Peru

$$\frac{a-b}{a} = 0{,}00301178 = \frac{1}{332{,}029}.$$

§. 139. Da die aus den Graden unter dem Aequator und unter dem Polarkreis abgeleitete Abplattung nahe in die Mitte zwiſchen die zwey übrige fällt, und der Unterſchied der Breiten, unter welchen dieſe Grade liegen, gröſſer iſt, als bey den übrigen; ſo behalte man dieſe Abplattung bey, und ſuche mittelſt derſelben und des franzöſiſchen Grades den Grad unter dem Aequator nach §. 137. n. 21.

Es iſt Lg. e^2 = 7,7823485 − 10
Lg. g = 4,7560330

Lg. Sin. l^2 = 9,7167740
Lg. $\frac{3}{2}$ = 0,1760913

2,4312468; 269,927

Lg. g = 4,7560330
Lg. e^4 = 5,5646970 − 10

Lg. Sin. l^4 = 9,4335480
Lg. $\frac{3}{8}$ = 9,5740313 − 10

9,3283093 − 10; 0,213

269,714

g = 57020,77

g' = 56751,06

Dieser Grad ist also nur um zwey Toisen kleiner als der gemeßene.

Unter eben dieser Voraussetzung wird nach n. 20. §. 137. ein Grad unter der Breite l

$$g = 56751{,}06 + 515{,}72 \text{ Sin. } \overline{l}^2 + 3{,}905 \text{ Sin. } \overline{l}^4 \text{ Toiſ.}$$

Ferner $\frac{b^2}{a^2} = 1 - e^2 = 0{,}99394732$, und nach n. 10. §. 137.

$$\left.\begin{array}{l} a = 3271415 \\ b = 3261490 \end{array}\right\} \text{Toiſ.}$$

Die unter dieser Voraussetzung berechneten Grade und ihre Abweichungen von den gemeßenen enthält folgende Tafel:

	berechnete Grade.	Abw. v. d. Meßungen.
Peru	56751,06	— 1,94
Ostindien. a.	56773,7	+ 11,8
——— b.	56831,8	+ 105,1
Cap	56906,9	— 130,1
Pensylvanien	56957,7	+ 61,7
Italien	56991,9	+ 12,9
Frankreich	57020,77	0
Oestreich	57035,1	— 30,9
England	57073,1	+ 4,4
Lappland	57186,4	— 2,0

Man sieht aus dieser Tafel, daß mit Ausnahme des zweyten ostindischen und des auf dem Cap gemeßenen Grads die übrigen Grade ziemlich nahe in die gefundene Ellipse passen, und und insbesondere die mit großer Genauigkeit in Frankreich, England und Lappland gemeßenen Grade eine Abweichung von vier Toisen geben, welche innerhalb der Gränzen der bey diesen Messungen möglichen Fehler liegt. Ob die beträchtlichen Abweichungen des auf dem Cap und des zweyten in Ostindien gemeßenen Grads Irregularitäten der Erde oder Fehlern in den Meßungen oder beyden zugleich zuzuschreiben seyen, wird ohne eine Wiederholung der Meßungen nicht können ausgemacht werden. Uebrigens zeigen die neuesten in Frankreich und England angestellte Meßungen offenbar, daß die Erde kein regulärer Körper ist. Die folgende Tafel enthält diejenigen Grade, welche sich aus den vier Stücken des ganzen in Frankreich gemeßenen Bogens ergeben, und die nach der Formel dieses §. berechnete Grade:

mittlere Breite	gemeßene Gr.	berechn. Gr.	Unterſch.
42° 17′ 19″,6	56946.62	56985,35	+ 38,73
44 41 48,4	56978,17	57007,15	+ 28.98
47 30 46,0	57068,72	57032,66	— 36,06
49 56 29,3	57082,81	57054,52	— 28,29

Ungeachtet die Formel, nach welcher diese Grade berechnet sind, den aus dem ganzen in Frankreich gemeßenen Bogen gefolgerten Grad genau giebt, und die dabey gebrauchte Abplattung zwischen mehreren nicht viel von einander abweichenden das Mittel hält; so zeigen sich hier doch sehr beträchtliche Unterschiede, welche nicht auf Fehler der Meßungen können geschoben werden. Man müßte die Breite von **Dünkirchen** und **Montjouy** um nahe 5 Sek. vergrößern, die von **Evaux** um eben so viel vermindern, und die des **Pantheons** um $\frac{1}{2}$ Sek., die von **Carcassone** um 1 Sek. vergrößern, wenn die gemeßenen Grade in diese Ellipse passen sollten. Auf der andern Seite können aber die beobachteten Polhöhen nicht um mehr als eine **Sekunde**, und die auf der Erde gemeßenen Bogen höchstens um einige Toisen ungewiß seyn; folglich kommen die obige Unterschiede wenigstens gröſten Theils von Unregelmäßigkeiten der Figur der Erde her.

Eben diese Meßungen zeigen ferner, wie unsicher die aus Gradmeßungen gefolgerte Abplattungen seyen, wenn man sie auch mit der gröſten Sorgfalt angestellt hat. Wir wollen annehmen, daß in Frankreich nur der Bogen von **Dünkirchen** bis zum **Pantheon** in **Paris** gemeßen worden sey, welcher übrigens schon am Himmel einem Bogen von mehr als zwey Graden entspricht; so würde man aus diesem und dem in Peru gemeßenen die Abplattung $= \frac{1}{305,755}$ gefunden haben. Ferner giebt der zwischen **Evaux** und **Carcassone** gemeßene Bogen mit dem Grad unter dem Aequator verglichen die Abplattung $= \frac{1}{291,176}$, ungeachtet die Differenz der Polhöhen an seinen Endpunkten beynahe drey Grade beträgt. Man würde also um die Abplatrung der Erde durch Gradmeßungen mit gröſterer Genauigkeit zu erhalten, unter einer Breite, welche von der mittleren Breite des durch Frankreich gehenden Bogens beträchtlich verschieden wäre, einen ungefähr eben so groſsen Bogen des Meridians meßen müssen, wobey die Unregelmäßigkeiten der Erde keinen so groſsen Einfluß auf die Bestimmung der Abplattung haben würden.

§. 140. Bey der Ungewißheit über das Axenverhältniß derjenigen Ellipse, durch deren Umdrehung um ihre kleine Axe ein Körper beschrieben wird, welcher der Gestalt der Erde am nächsten kommt, kann man dasjenige Axenverhältniß wählen, durch welches die Summe der positiven sowohl als der negativen Abweichungen der berechneten Grade von den gemeßenen am kleinsten, und die Summe der positiven der Summe der negativen gleich wird. Hr. von **Lindenau** fand unter dieser Bedingung das Axenverhältniß wie 303 : 304 *). Einige in der

*) Monatl. Corresp. August 1806. pag. 133.

Folge anzuführende von der abgeplatteten Gestalt der Erde abhängende Ungleichheiten in der Bewegung des Monds und eine periodische Veränderung in der Schiefe der Ekliptik geben sehr nahe miteinander übereinstimmend das Verhältniß 304 : 305.

Nimmt man nun den ganzen in Frankreich gemeßenen Bogen samt seiner Verlängerung bis auf die Insel Formentera im mittelländischen Meere; so hat man einen Bogen von 705188.71 Toisen. Der Unterschied der Breite seiner Endpunkte ist 12° 22′ 13″,395, und daher die Größe eines Grads = 57006,195. Ferner ist die Breite von Formentera = 38° 39′ 55″,16; also die mittlere Breite des Bogens = 44° 51′ 2″. Weil nun die Erde von der Kugelgestalt nur wenig abweicht; so übertrifft ein Grad an dem nördlichen Ende dieses Bogens den mittleren Grad sehr nahe um eben so viel, als dieser den am südlichen Endpunkt übertrifft, wovon man sich leicht durch die für g in 139 §. gegebene Formel überzeugen kann. Mithin ist der gefundene Grad sehr nahe ein Grad des Krümmungskreises unter der Breite 44° 51′ 2″. Unter der Voraussetzung des Axenverhältnisses 304 : 305 ist nun

$$1 - \frac{b}{a} = \frac{1}{305}$$

$$1 + \frac{b}{a} = 2 - \frac{1}{305} = \frac{609}{305}$$

$$\left.\begin{matrix} 1 - \left(\frac{b}{a}\right)^2 \\ e^2 \end{matrix}\right\} = \frac{609}{93025}$$

folglich hat man nach §. 137. n. 20.

den Grad unter dem Aequator = 56727,983 Toiſ.
Halbmeſſer des Aequators = 3271692
halbe Erdaxe = 3260966

Ferner findet sich unter der Breite l ein Grad des Meridians

$$g = 56727{,}083 + 557{,}065 \text{ Sin. } \overline{l}^2 + 4{,}558 \text{ Sin. } \overline{l}^4 \text{ Toiſ.}$$

nach welchem Ausdruck folgende Grade berechnet sind

	mittl. Breite.			berechnete Gr.	Abweich.
Peru	0°	0′		56728,0	— 25.0
Oſtindien a.	12	5		5675[illegible]2,4	— 9,5
—— b.	23	18		56815,2	+ 88.5
Cap	33	18	südl.	56896,3	— 140,7
Penſylvanien	39	12		56951,2	+ 63,2
Italien	43	1		56988,2	+ 9,3
Frankreich	46	11	57″	57019,4	— 1,4
Oeſtreich	47	47		57034,9	— 31,1
England	52	2	20	57076,0	+ 7,3
Lappland	66	20	10	57198,5	+ 10,1

wo der berechnete Grad größer oder kleiner ist als der gemeßene, je nachdem die Abweichung mit + oder — bezeichnet ist.

§. 141. Sucht man die Abmeßungen eines elliptischen Meridians, in welchen der lappländische und der aus dem ganzen von Dünkirchen bis Formentera gemeßenen Bogen geschlossene Grad genau passen; so findet sich

$$e^2 = 0{,}00620428$$

$$\frac{a-b}{a} = 0{,}00310695 = \frac{1}{321{,}859}$$

$$\left.\begin{matrix} a = 3271404 \\ b = 3261240 \end{matrix}\right\} \text{Toiſ.}$$

$$g = 56742{,}520 + 528{,}070\ \overline{\text{Sin. } l}^2 + 4{,}095\ \overline{\text{Sin. } l}^4.$$

Hieraus ergiebt sich folgende Tafel:

	berechn. Grade	Abweich.
Peru	56742,5	— 10,5
Oſtindien a.	56765,7	+ 3,8
——— b.	56835,2	+ 108,5
Cap	56902,1	— 134,9
Penſylvanien	50954,1	+ 66,1
Italien	56988,6	+ 9,6
Frankreich a.	57018,7	— 2,1
——— b.	57006,2	0,0
Oeſtreich	57033,4	— 32,6
England	57072,4	+ 3,7
Lappland	57188,4	0,0

Der mit a. bezeichnete franzöſiſche Grad iſt aus dem Bogen von Dünkirchen bis Mourjouy, der b. aus dem Bogen von Dünkirchen bis Formentera geſchloſſen.

§. 142. Setzt man einen Bogen des als elliptisch angenommenen Meridians $= s$; so ist vermöge der Gründe der Differentialrechnung $\frac{ds}{dl} =$ Krümmungshalbmeſſer, woraus man durch Integration die Länge eines Bogens des Meridians von dem Aequator an bis zu der Breite l erhält. Es findet sich

$$s = \frac{a\pi l}{180}\left(1 - (\tfrac{1}{2})^2 e^2 - \tfrac{1}{3}\left(\frac{1\cdot 3}{2\cdot 4}\right)^2 e^4 - \tfrac{1}{5}\left(\frac{1\cdot 3\cdot 5}{2\cdot 4\cdot 6}\right)^2 e^6 - \&c.\right)$$

$$- a\left(3\,(\tfrac{1}{2})^2 e^2 - \tfrac{1}{3}\left(\frac{1\cdot 3}{2\cdot 4}\right)^2 e^4 - \tfrac{1}{5}\left(\frac{1\cdot 3\cdot 5}{2\cdot 4\cdot 6}\right)^2 e^6 - \&.\right) \text{Sin. } l \text{ Cos. } l$$

$$- \tfrac{3}{2} a\left(5\,(\tfrac{1}{4})^2 e^4 - \tfrac{1}{5}\left(\frac{5}{4\cdot 6}\right)^2 e^6 - \tfrac{1}{7}\left(\frac{5\cdot 7}{4\cdot 6\cdot 8}\right)^2 e^8 - \&c.\right) \overline{\text{Sin. } l}^3 \text{ Cos. } l$$

$$- \frac{3\cdot 5}{2\cdot 4} a \left(7.(\tfrac{1}{6})^2 e^6 - \tfrac{1}{7}\left(\frac{7}{6\cdot 8}\right)^2 e^8 - \&c.\right) \overline{\text{Sin.}\, l^5}\, \text{Cos.}\, l$$

$$- \frac{8\cdot 5\cdot 7}{2\cdot 4\cdot 6} a \left(9.(\tfrac{1}{8})^2 e^8 - \&c.\right) \overline{\text{Sin.}\, l^7}\, \text{Cos.}\, l$$

$- \&c.$

Wird $l = 90$ Gr. genommen; so fallen alle auf das erste folgende Glieder weg, und daher drückt das erste Glied der Reihe die Länge eines Quadranten des Meridians aus. Der Halbmesser r eines Kreises, welcher mit dem Meridian einen gleichen Umfang hat, wird also seyn

$$= a(1 - \tfrac{1}{4} e^2 - \tfrac{3}{64} e^4 - \&c.)$$

Es ist aber $\frac{a+b}{2} = \frac{a}{2}\left(1 + \frac{b}{a}\right) = a\left(1 - \frac{1}{4} e^2 - \frac{1}{16} e^4 - \&c.\right)$

folglich ist $r = \frac{a+b}{2}\left(1 + \frac{1}{64} e^4 + \frac{3}{256} e^6 \&c.\right)$,

also, weil e ein sehr kleiner Bruch ist, sehr nahe = der halben Summe der halben Erdaxe und des Halbmessers des Aequators.

Ferner ist, wenn man in dem Ausdruck n. 6 §. 157. die Breite $l = 45°$ setzt, und ihn in eine Reihe entwickelt, der Krümmungshalbmesser des Meridians unter dem 45sten Grad der Breite,

$$R' = a\left(1 - \frac{1}{4} e^2 - \frac{9}{32} e^4 - \&c.\right);$$

daher $r = R' + a\left(\frac{15}{64} e^4 + \frac{45}{256} e^6 + \&c.\right)$

$$= R'\left(1 + \frac{15}{64} e^4 + \frac{15}{64} e^6 + \&c.\right)$$

Demnach ist der Halbmesser eines Kreises, welcher mit dem elliptischen Meridian einen gleichen Umfang hat, sehr nahe dem Krümmungshalbmesser unter dem 45sten Grad der Breite, und der Quadrant des Meridians nahe dem neunzigmal genommenen Grad des Meridians unter der mittleren Breite von 45° gleich.

Endlich weil der Inhalt eines zusammengedrückten elliptischen Sphäroids zu dem Inhalt einer um das Sphäroid beschriebenen Kugel sich wie die halbe Axe zu dem Halbmesser des Aequators verhält; so ist der Halbmesser r' einer Kugel, welche mit dem Sphäroid einerley Inhalt hat $= a \sqrt[3]{\frac{b}{a}}$

$= a\left(1 - \frac{a-b}{a}\right)^{\frac{1}{3}} = a\left(1 - \frac{1}{6} e^2 - \frac{5}{72} e^4 \&c.\right)$. Vergleicht man dies-

sen

sen Ausdruck mit der Formel n. 15. §. 137. für den Halbmesser des Sphäroids unter der Breite l; so findet man, wenn man die vierte und höhere Potenzen von e wegläßt, $\text{Sin.}\, l^2 = \frac{1}{3}$. Folglich ist ein abgeplattetes elliptisches wenig von der Kugelgestalt abweichendes Sphäroid sehr nahe einer Kugel gleich, deren Oberfläche, wenn sie mit dem Sphäroid concentrisch abgenommen wird, der Oberfläche des letztern unter einem Parallelkreis begegnet, dessen Quadrat des Sinus der Breite dem dritten Theil des Quadrats des Sinus totus gleich ist.

Man sieht hieraus, daß der Umfang eines Meridians der Erde, so wie die halbe Summe der halben Erdaxe und des Halbmessers des Aequators, durch die Größe eines Grads unter einer Breite von 45° genauer bestimmt wird, als der Inhalt der Erde, weil die Ausdrücke von r und $\frac{a+b}{2}$ durch R' nur noch die vierte und höhere Potenzen von e enthalten; und daher die in der Größe der Abplattung der Erde noch übrig bleibende Ungewißheit keinen beträchtlichen Einfluß auf die Bestimmung jener Größen haben kann. Der Ausdruck von r^1 hingegen durch R' wird noch die Quadrate von e enthalten, und kleine Unterschiede in der Abplattung oder Excentricität werden merklich verschiedene Werthe von r' geben.

Mittelst der im Anfang dieses §. für den Bogen eines Meridians gegebenen Formel könnte man, wenn aus einem großen gemeßenen Bogen der Krümmungshalbmesser nicht sicher sollte abgeleitet werden können, die Rechnung genauer führen. Es wird aber wegen der Irregularitäten der Erde kaum der Mühe werth seyn, die Rechnung so genau zu führen. Um zu zeigen, daß selbst bey einem Bogen von zwölf Graden der Fehler sehr klein ist, wenn man den aus ihm, wie es hier geschehen ist, durch die Division mit dem Unterschied der Breiten gefundenen Halbmesser als den Krümmungshalbmesser betrachtet, nehme man die Abplattung wie vorhin $= \frac{1}{305}$; so findet man aus obigem allgemeinen Ausdruck des Meridianbogens, wenn man den mit eben dieser Abplattung gefundenen Werth von a gebraucht, und die Potenzen der Sinus der Breite und ihre Produkte durch den Cosinus derselben durch die Sinus der vielfachen der Breite ausdrückt

$$s = 57008{,}236.l - 8045{,}146\ \text{Sin.}\, 2l + 8{,}258\ \text{Sin.}\, 4l - 0{,}010\ \text{Sin.}\, 6l$$

Setzt man zuerst $l =$ der Breite von Formentera $= 38°\ 39'\ 55'',16$, hernach $=$ der Breite von Dünkirchen $= 51°\ 2'\ 8'',555$ *); und zieht die erstere Gleichung von der letztern ab;

*) Diese neuere Angabe der Breite von Dünkirchen gründet sich auf den bey obiger Rechnung gebrauchten Unterschied der Breite von Dünkirchen und Formentera, und die Breite des letztern Orts, so wie sie von Delambre in der Connais. de temps pour l'an 1810 angegeben sind.

so erhält man den Bogen des Meridians zwischen diesen zwey Orten = 705189,07 Toiſ.
die Meßung gab 705188,71
der Unterſchied beträgt also nur 0,36

Da nun bey einerley Abplattung der Bogen s dem Halbmeſſer a des Aequators proportional iſt; ſo darf man nur den bey dieſer Rechnung gebrauchten Halbmeſſer des Aequators in dem Verhältniß des gemeßenen Bogens zu dem berechneten vermindern, um auch dieſen Unterſchied vollends verſchwinden zu machen. Nach dieſer Verbeſſerung wird ſeyn

der Halbmeſſer des Aequators = 3271690,887 Toiſ.
die halbe Erdaxe = 3260964,032

$$s = 57008{,}2069.\ l - 8045{,}142 \text{ Sin. } 2l + 8{,}258 \text{ Sin. } 4l - 0{,}010 \text{ Sin. } 6l.$$

und wenn man $l = 90°$ ſetzt; ſo erhält man die Länge eines Quadrantens des Meridians = 5130738,6 Toiſ.

Ferner findet ſich ein Grad des Meridians

$$g = 56727{,}954 + 557{,}065 \overline{\text{Sin. } l^2} + 4{,}558 \overline{\text{Sin. } l^4} + 0{,}035 \overline{\text{Sin. } l^6},$$

und nach §. 137. n. 14. der Winkel des Erdhalbmeſſers mit der Richtung der Schwere

$$l - l' = 677'',388 \text{ Sin. } 2l - 1'',112 \text{ Sin. } 4l,$$

welcher nach §. 137. n. 11. und 12. unter einer Breite von 45° 5′ 38″,7 am gröſten und = 11′ 17″,386 wird.

Endlich iſt nach §. 137. n. 15. der Exponent des Verhältniſſes des Erdhalbmeſſers zu dem Halbmeſſer des Aequators

$$\frac{CM}{CA} = 1 - 0{,}00325188 \overline{\text{Sin. } l^2} - 0{,}00002658 \overline{\text{Sin. } l^4}.$$

§. 143. Es ergiebt ſich aus den bisherigen Unterſuchungen, daß die Erde ein von der Kugelgeſtalt zwar nicht viel abweichender unter den Polen zuſammengedrückter, aber genau genommen ein irregulärer Körper iſt. Sie kommt einem elliptiſchen Sphäroid nahe, welches durch die Umdrehung einer Ellipſe um ihre kleine Axe beſchrieben wird, und deſſen Abmeßungen folgende ſind:

Verhältniß der Axen	= 304 : 305
Halbmeſſer des Aequators	= 3271691 Toiſ.
halbe Erdaxe	= 3260964
Halbmeſſer eines Kreiſes welcher mit dem Meridian einerley Umfang hat	= 3266330

Halbmeſſer einer Kugel, welche mit der Erde einerley Inhalt hat	= 3268111
Ein Grad unter den Polen	= 57289,615
Ein Grad des Meridians unter dem Aequator,	= 56727,954
und unter einer Breite von 45 Gr.	= 57007,626
Der neunzigſte Theil eines Quadranten des Meridians	= 57008,2069
Ein Grad des Umfangs des Aequators	= 57101,778
Der fünfzehnte Theil hievon, oder eine geographiſche Meile	= 3806,7852
	= 23628,322 rheinl. Fuß*)

§. 144. Auf die Meßung des durch Paris gehenden Bogens eines Meridians der Erde gründet ſich das neue franzöſiſche Maaß- und Gewichts-Syſtem, welches man wenigſtens zum Theil kennen muß, um die Angaben der franzöſiſchen Aſtronomen verſtehen und in die alten verwandeln zu können. Die Einheit des Längenmaaßes iſt der zehnmillionſte Theil eines Quadranten eines Erdmeridians, und heißt ein Mètre. Man hat im 142ten §. geſehen, daß aus der Länge eines Bogens des Erdmeridians unter einer mittleren Breite von 45 Gr. die Länge des Meridianquadrantens auch bey nicht genau bekannter Abplattung der Erde ſehr genau kann gefunden werden. Durch die im vorhergehenden §. gefundene in Toiſen ausgedrückte Größe des Erdmeridians iſt das Verhältniß der zu der Gradmeßung in Peru gebrauchten Toiſe zu dem Mètre gegeben, und es wird ſeyn

1 Mètre = 0,513073862 Toiſ.
= 443,2958168 . . . pariſ. Linien.

Man ſetzte hienach in runder Zahl ein Mètre auf 443,296 Linien der eiſernen Toiſe, wenn die letztere eine

*) Unter der Vorausſetzung, daß 1392 par. Fuß = 1440 rheinl. Fuß, oder 29 p. F. = 30 rheinl. Fuß.

Temperatur von 13 Reaum. Graden über dem Eispunkt hat. Da aber die von irgend einer Materie verfertigten Maaßstäbe mit der Temperatur ihre Länge verändern; so ist man übereingekommen, die Temperatur des schmelzenden Eises als die Normaltemperatur anzunehmen, so daß der materielle Mètre der zehnmillionste Theil des Meridianquadranten ist, wenn er diese Temperatur hat. Demnach ist ein materieller Mètre nur alsdenn = 443,296 Linien der eisernen Toise von Peru, wenn er die Temperatur 0, und zugleich die letztere die Temperatur + 13 R. oder + 16 $\frac{1}{4}$ der hunderttheiligen Scale hat *). La Place setzt in runder Zahl 1 Mètre = 0,513074 Toiſ. und bedient sich dieser Länge des Mètre in seiner Mécanique céleste.

Sodenn wurden zur Bequemlichkeit der Rechnung alle Maaße nach dem Decimalsystem eingetheilt. Der Quadrant nemlich in 100 Grade, ein Grad in 100 Minuten, eine Minute in 10 Sekunden, so daß ein Decimalgrad = 54 Minuten, eine Decimalminute = 32,4 Sek. und eine Decimalsekunde = 0,324 Sek. der alten Eintheilung ist. Ein Tag wurde eingetheilt in 10 Stunden, eine Stunde in 100 Minuten, eine Minute in 100 Sekunden. Hienach ist eine Decimalstunde = 2 St. 24 Minuten, eine Decimalminute = 1 M. 26,4 Sekunden, eine Decimalsekunde = 0,864 Sek. der alten Eintheilung. Der Raum des Thermometers zwischen dem Punkt des schmelzenden Eises und dem Punkt des unter einer Barometerhöhe von 0,76 *M.* oder 28 Z. 0,9 Lin. siedenden Wassers wurde in 100 Grade eingetheilt, und daher sind 5 Grade des hunderttheiligen Thermometers 4 Graden der achtzigtheiligen Scale gleich.

Um ein Beyspiel der Verwandlung der auf das neue

*) Svanberg findet unter der Voraussetzung, daß der ihm von dem Nationalinstitut zu der Gradmeßung in Lappland mitgetheilte eiserne Mètre nach diesem Gesetz bestimmt worden sey, den lappländischen Grad = 57196,159 Toiſ. welcher nur um 2,35 Toiſ kleiner ist, als der mit der Abplattung $\frac{1}{305}$ im 142. §. berechnete. Exposition des opérations faites en Lapponie &c. par *Svanberg*. pag. 191, 192. Die oben angegebene Länge dieses Grads ist diejenige, welche man in der Exposition du Système du Monde par Laplace, III édit. pag. 59 findet, und wegen einiger von Svanberg a. a. O. geäußerten Zweifel beybehalten worden ist.

französische Maaßsystem sich beziehenden Angaben in die älteren Maaße zu geben, nehme ich den von Svanberg in Lappland gemeßenen Grad, welchen La Place auf 100316me, 1 setzt *). Multiplicirt man diese Zahl mit 0,513074; so erhält man 51469,58269 Toiſ. für die Größe eines Decimalgrades, welche mit 0,9 dividirt die Größe eines Grades nach der alten Eintheilung = 57188,425 Toiſ. giebt, wie er §. 135. angegeben iſt.

Da ein Mètre = $\frac{1}{10000000}$ des Meridianquadranten; so iſt, wenn man die Erde als eine Kugel betrachtet, deren Halbmeſſer dem Halbmeſſer eines Kreiſes gleich iſt, welcher mit dem Meridian einerley Umfang hat, ein Mètre = 0,1 Decimalſekunde, 1000me ſind = 1 Decimalminute, u. ſ. w. wodurch ſich leicht die in dieſem Längenmaaß ausgedrückte Entfernung zweyer Orte der Erde in Decimalgrade eines größten Kreiſes, und umgekehrt, verwandeln läßt. Eine ähnliche Bequemlichkeit gewähren die geographiſchen Meilen, deren 15 einen Grad des Aequators ausmachen. Eine geographiſche Meile macht hienach 4 Sexageſimalminuten aus. Man könnte auch zu mehrerer Genauigkeit fünfzehn geographiſche Meilen auf den neunzigſten Theil des Meridianquadranten, oder auf 57008,2069 Toiſ. (§. 143.) rechnen; ſo würde eine geographiſche Meile = 3800,54713 Toiſen, 5400 geogr. Meilen würden dem Umfang des Meridians, und 1718,87 g. M. dem Halbmeſſer eines mit dem Meridian gleichen Umfang habenden Kreiſes, oder ſehr nahe der halben Summe des Halbmeſſers des Aequators und der halben Erdaxe gleich ſeyn (§. 142.)

§. 145. Wegen der abgeplatteten Geſtalt der Erde erfordert die im 48ſten §. gezeigte Methode, den Abſtand eines Himmelskörpers von dem Mittelpunkt der Erde zu finden, ſo wie die im 49 §. gelehrte Berechnung der Höhenparallaxe eine Verbeſſerung, welche übrigens nur bey der Parallaxe des Monds merklich ſeyn wird. Es ſey *aphp'* (Fig. 44.) ein elliptiſcher Meridian der Erde, in deſſen erweiterten Ebene ein Himmelskörper *s* ſtehe. Der Durchmeſſer des Ae-

*) Exposition du système du monde. pag. 59.

quators sey *ab*, die Erdaxe *pp'*, und *mn*, *m'n'* seyen die Richtungen der Schwere an den unter diesem Meridian liegenden Orten *m*, *m'*, welche den Durchmesser des Aequators in *n*, *n'* treffen, und verlängert die Scheitelpunkte *v*, *v'* dieser Orte bezeichnen. Wenn nun die zwey Orte ungleiche Polhöhen haben; so werden die Richtungen der Schwere sich in einem ausserhalb des Durchmessers *ab* des Aequators liegenden Punkt *o* schneiden, und es wird der Winkel $mom' = an'm' + \left\{\begin{smallmatrix} o\,n' \\ a\,n\,m \end{smallmatrix}\right\}$ oder der Summe der Polhöhen der zwey Orte, wenn sie, wie in der Figur auf verschiedenen Seiten des Aequators liegen, im entgegengesetzten Fall aber ihrer Differenz gleich seyn. Mittelst dieses Winkels und der beobachteten von der Stralenbrechung befreyten Abstände *vms*, *v'm's* des Himmelskörpers *s* von den Scheiteln *v*, *v'* hat man in §. 48. das Viereck *msm'o* aufgelöst, indem man *mo* = *om'* setzte, und also statt der Distanz *sc* die *so*, und selbst diese nur in dem Fall genau erhalten, wenn die zwey Orte gleiche Polhöhen hatten.

Um nun die von der abgeplatteten Gestalt der Erde herrührenden Fehler jener Methode zu vermeiden, ziehe man die Halbmesser *cm*, *cm'* der Erde, und verlängere sie nach *z* und *z'*. Mittelst der bekannten Polhöhen findet man die Winkel *acm*, *acm'* (§. 137. n. 1.) und die Halbmesser *cm*, *cm'* (137. n. 4. oder 15.). Man kennt also auch die Winkel $\left\{\begin{smallmatrix} cmn \\ vmz \end{smallmatrix}\right\}, \left\{\begin{smallmatrix} cm'n' \\ v'm'z' \end{smallmatrix}\right\}$ als die Unterschiede der Polhöhen und der vorhin gefundenen Winkel. Zieht man diese Winkel von den Scheitelabständen des Himmelskörpers ab; so hat man die Winkel *zms*, *z'm's*. Mithin kennt man in dem Viereck *cmsm'* zwey aneinander liegende Seiten *mc* und *cm'* sammt dem Winkel, welchen sie mit einander machen, weil *mcm'* = *acm* + *acm'*, und zwey seiner äusseren Winkel, wodurch die Seiten *ms*, *sm'* und die Diagonale *sc* gefunden werden können. Da man jetzt das Verhältniß von *es* : *ca* kennt; so kann man auch die Horizontalparallaxe des Himmelskörpers unter dem Aequator nach §. 48. finden.

Aus der Horizontalparallaxe unter dem Aequator findet man die Horizontalparallaxe an einem gegebenen Ort

der Erde, wenn man die erstere in dem Verhältniß des an diesen Ort gezogenen Erdhalbmessers zu dem Halbmesser des Aequators vermindert, welches nach §. 137. n. 4. oder 15. kann berechnet werden. Sodenn kann die einer beobachteten Mittagshöhe entsprechende Höhenparallaxe eben so leicht, wie unter der Voraussetzung einer Kugelgestalt der Erde, gefunden werden, wenn man zu der wegen der Refraktion verbesserten Mittagshöhe den Winkel *cmn* oder *vmz* addirt, oder ihn von dem Scheitelabstand abzieht, wodurch man den Winkel *zms* erhält. Alsdenn kennt man in dem Dreyeck *cms* das Verhältniß von *cm* : *es* mittelst der Horizontalparallaxe für diesen Ort, und den Winkel *cms* = 180° - *zms*; folglich findet sich die Höhenparallaxe *msc* wie in §. 48. und 49. Wird dieser Winkel von den Winkeln *vms* und *zms* abgezogen; so erhält man die Winkel, welche die von dem Mittelpunkt der Erde nach dem Himmelskörper gezogene gerade Linie mit der Richtung der Schwere an dem Ort *m*, und mit dem an diesen Ort gezogenen Erdhalbmesser macht.

Befindet sich ein Himmelskörper nicht im Meridian; so liegen *cm*, *mn* und *ms* nicht in einer Ebene, und es findet auch eine kleine Parallaxe des Azimuths Statt, in so fern man unter dem wahren Ort eines Himmelskörpers denjenigen versteht, an welchem er aus dem Mittelpunkt der Erde, und nicht aus dem Punkt *n*, in welchem die Richtung der Schwere die Ebene des Aequators trifft, gesehen erscheinen würde.

Man ziehe *mq* senkrecht auf *ca*; so verhält sich, wenn man die §. 137. gebrauchte Benennungen beybehält, $cn : cq = a^2 - b^2 : a^2 = e^2 : 1 = 0{,}0065466 : 1$ für die Abplattung $\frac{1}{305}$, woraus folgt, daß die Parallaxe des Azimuths nicht beträchtlich, und nur bey dem Mond merklich werden kann. In dem Meridian verschwindet diese Parallaxe, und es bleibt nur die Höhenparallaxe übrig, welche nach den §. 49. gegebenen Regeln berechnet werden kann, wenn man statt der Abstände vom Scheitel *v* die Abstände von dem Punkt *z* setzt, in welchem der verlängerte Erdhalbmesser der Himmelskugel begegnet, und unter der Horizontalparallaxe diejenige versteht, deren Sinus zu dem Sinus der Horizontalparallaxe unter dem Aequator wie der Erdhalbmesser *cm* zu dem Halbmesser *ca* des Aequators sich verhält. Der

Sinus der Horizontalparallaxe für einen gegebenen Ort der Erde wird also gefunden werden, wenn man den Sinus der Horizontalparallaxe unter dem Aequator mit der in §. 137. n. 15. gegebenen Reihe multiplicirt, welche man in dem 142. §. für die Abplattung $\frac{1}{305}$ berechnet findet. Die Berechnung der Parallaxen auſser dem Meridian, und in Beziehung auf Länge und Breite, gerade Aufſteigung und Abweichung wird weiter unten gezeigt werden.

§. 146. Aus der bekannten Gröſse der Erde ergeben ſich jetzt leicht die Gröſsen derjenigen Himmelskörper, deren ſcheinbare Halbmeſſer in dem erſten Buch angegeben ſind, und die Höhen der Mondsberge, deren Verhältniſs zu dem Halbmeſſer des Monds man beſtimmt hat. Vermöge des 63. §. iſt die Horizontalparallaxe des Monds unter dem Aequator, oder der aus dem Mittelpunkt des Monds geſehene ſcheinbare Halbmeſſer des Aequators der Erde $= 57' 1''$, wenn der aus dem Mittelpunkt der Erde geſehene Halbmeſſer des Monds $= 15' 33'',7$ iſt. Folglich verhält ſich der Halbmeſſer des Aequators der Erde zu dem Halbmeſſer des Monds $= 57' 1'' : 15' 33'',7 = 1 : 0,27293$ oder nahe $= 11 : 3$ (§. 49. n. 6.), und daher iſt, wenn man den Halbmeſſer des Aequators nach §. 143. nimmt, der Halbmeſſer des Monds $= 892949$ Toiſ.

Nach §. 81. giebt es Berge auf dem Mond, deren Höhe $\frac{1}{33\frac{1}{3}}$ ſeines Halbmeſſers beträgt, welches nach dem hier gefundenen Halbmeſſer des Monds 2042 Toiſen ausmacht. Schröter hat einige über 4000 Toiſen hoch gefunden. Der Chimboraço erhebt ſich nur 3358 Toiſ. über die Meeresfläche.

Nach §. 50. iſt die Horizontalparallaxe der Sonne in ihrer mittleren Entfernung von der Erde, oder der in dieſer Diſtanz geſehene ſcheinbare Halbmeſſer der Erde $= 8'',8$, und der ſcheinbare Halbmeſſer Sonne iſt in eben dieſer Diſtanz $= 16' 1'',38$; folglich verhält ſich nach §. 49. n. 6. der Halbmeſſer der Erde zu dem Halbmeſſer der Sonne $= 1 : 109,25$.

Der ſcheinbare Durchmeſſer des Aequators des Jupiters iſt in ſeiner mittleren Diſtanz von der Sonne $= 38'',2$

(§. 109.), und da ſich dieſe zu dem mittleren Abſtand der Sonne von der Erde = 5,20279 : 1 verhält (§. 105.); ſo iſt nach §. 49. n. 5. der in der mittleren Entfernung der Sonne von der Erde geſehene ſcheinbare Durchmeſſer des Aequators des Jupiters = 198″,75, und ſein Halbmeſſer = 99″,375. Dieſer verhält ſich alſo zu dem Halbmeſſer des Erdäquators = 11,30 : 1 (§. 49. n.). Hienach iſt folgende Tafel berechnet:

	Scheinbare Halbmeſſer in der mittl. Entfern. der Sonne von der Erde.	Halbmeſſer in Halbmeſſern des Erdäquators ausgedruckt.
Sonne	16′ 1″,38	109,25
Merkur	3,00	0,34
Venus	8,30	0,93
Erde	8,80	1,00
Mars	4,50	0,51
Jupiter	99,375	11,30
Saturn	83,94	9,54
Uranus	37,40	4,25
Mond	2,40	0,27

Nun kann man den Halbmeſſer des Aequators der Erde in irgend einem Längenmaaß ausdrücken, deſſen Verhältniß zu der Toiſe gegeben iſt, und durch Multiplikation dieſes Halbmeſſers mit den in der dritten Columne angegebenen Zahlen, die ihnen entſprechende Halbmeſſer in eben dieſem Längenmaas finden.

Die ſcheinbaren Durchmeſſer der neuen Planeten ſind noch nicht genau bekannt. Herſchel ſetzt in der mittleren Diſtanz der Sonne von der Erde den ſcheinbaren Durchmeſſer der Ceres auf 0″,14, der Pallas auf 0″,08, Schröter hingegen den erſteren auf 2″,44, den letzteren auf 3″,12. Den Durchmeſſer der Veſta, welche der hellſte unter den vier neuen Planeten iſt, fand Schröter am 26. Apr. 1807 nur von 0″,48. Wären Herſchels Meßungen richtig; ſo würde der Durchmeſſer der Ceres = 35, und der Durchmeſſer der Pallas = 15 geogr. Meilen ſeyn. Wegen dieſer geringen Größe rechnet Herſchel dieſe Wandelſterne nicht unter die Hauptplaneten, und nennt ſie Aſteroiden *).

*) Monatl. Corresp. Jul. 1802. pag. 89. u. f.

Die Größe der Nebenplaneten oder Trabanten kann ebenfalls noch nicht genau angegeben werden. Als ein Beyspiel der Berechnung nehme ich den ersten Trabanten des Jupiters. Setzt man nach La Place den aus dem Mittelpunkt des Jupiters gesehenen scheinbaren Durchmesser dieses Trabanten = 30′ 21″ (§. 111.); also den Halbmesser = 15′ 10″,5; so findet sich, weil er 5,81783 Halbmesser des Aequators des Jupiters von ihm absteht, der Halbmesser des Trabanten = 0,02568 Halbm. des Jupiters = 11,3 × 0,02568 = 0,29 Erdhalbmessern, und daher wäre dieser Trabant etwas größer als der Mond.

Auf ähnliche Art können die Abmeßungen des Rings des Saturns gefunden werden. Es verhält sich z. B. die Dicke des Rings zu dem Durchmesser des Saturns wie 25 : 3557 (§. 118.). Aber der Durchmesser des Saturns verhält sich zu dem Durchmesser der Erde wie 9,54 : 1; folglich verhält sich die Dicke des Rings zum Erddurchmesser = 238,5 : 3557 und zu dem Halbmesser der Erde = 477 : 3557 = 0,134 : 1. Die Dicke des Rings beträgt also nur 115 geogr. Meilen, oder etwa den vierten Theil des Durchmessers des Monds.

Endlich kann man die wahre Größe der Gegenstände finden, welche durch eine gegebene Fernröhre auf einem gegebenen Himmelskörper, dessen Entfernung man kennt, noch bemerkbar sind. Schröter konnte mit seinem siebenfüßigen Herschelschen Teleskop Gegenstände bemerken, deren scheinbare Größe 0″,2, und ihre Figur unterscheiden, wenn ihre scheinbare Größe 0″,7 war. Die erstere verhält sich zu dem scheinbaren Halbmesser des Monds wie 1 : 4668, die letztere wie 1 : 1334. Da nun der Halbmesser des Monds = 892949 Toiſ. iſt; ſo konnte er auf dem Mond einen Gegenstand bemerken, dessen wahre Größe = 191 Toiſen war, und seine Figur unterscheiden, wenn er 669 Toiſen im Durchmesser hatte.

Zweytes Capitel.

Von den Bewegungen der Erde, und den davon abhängenden Erſcheinungen.

§. 147. Es iſt ſchon im 129. §. im Allgemeinen bemerkt worden, daß ſich die täglichen Bewegungen der Himmelskörper aus einer Umdrehung der Erde um ihre Axe von Abend gegen Morgen erklären laſſen. Die genauere Unterſuchung der aus dieſer Umdrehung folgenden ſcheinbaren Bewegungen der Sterne wird zeigen, daß ſie vollkommen mit den im erſten Capitel des erſten Buchs gefundenen Geſetzen der täglichen Bewegungen übereinſtimmen.

Es ſey pp' (Fig. 45.) die Erdaxe, deren Verlängerungen in P und P' der Himmelskugel begegnen. Durch einen Stern S und die Axe PP' ſey eine Ebene gelegt, welche die Himmelskugel in einem gröſten Kreis PSP' und die Oberfläche der Erde in dem Erdmeridian pmp' ſchneiden wird. Dreht ſich nun die Erde um die Axe pp'; ſo würde ein in dem Punkt P ſtehender Fixſtern aus dem Mittelpunkt C der Erde geſehen beſtändig an dieſem Punkt zu ſtehen ſcheinen, und daſſelbe wird man an jedem Punkt der Oberfläche der Erde beobachten, weil die Parallaxe der Fixſterne unmerklich iſt (§. 25.). Die Punkte P und P' der Himmelskugel werden alſo ihre Pole ſeyn. Man ſetze, der Ort m der Erde befinde ſich in einem gewißen Augenblick in der Ebene des gröſten Kreiſes PSP', und die Verlängerung des an m gezogenen Halbmeſſers Cm begegne dieſem Kreis in Z; ſo wird für dieſen Augenblick der durch das Zenith Z des Orts m und die Pole P, P' der Himmelskugel gelegte gröſte Kreis PZP' der Meridian der Himmelskugel ſeyn (§. 3.), und das Complement des Bogens ZS wird die Mittagshöhe des Sterns meſſen. Man nehme den Stern S, mithin auch den Kreis PSP' als unbeweglich an, laſſe ſich aber die Erde um die unbewegliche Axe pp' nach der Richtung mvm' von Abend gegen Morgen drehen; ſo wird der verlängerte Halbmeſſer Cm der Erde nach und nach verſchiedenen Punkten V, Z' der Himmelsku-

gel begegnen, welche in einem Parallelkreis *ZVZ* liegen werden, deſſen Abſtand vom Pol *P* durch den Bogen *PZ* gemeſſen wird. Eben dieſer Bogen mißt aber den Winkel *pCm*, welchen der Halbmeſſer *Cm* des Orts *m* mit der Erdaxe *pp'* macht. Folglich iſt die Aequatorshöhe dieſes Orts = *PZ*. Man lege durch *P* und *V* einen gröſten Kreis *PVP'*, ſo wird dieſer für den Augenblick, da der verlängerte Erdhalbmeſſer in den Punkt *V* trifft, und der Ort *m* der Erde nach *v* gerückt iſt, der Meridian ſeyn, welcher mit dem durch den Ort *v* gelegten Erdmeridian in einer Ebene liegen wird. Der Meridian wird alſo in Beziehung auf die Erde ſeine Lage nicht verändern, aber in Beziehung auf die unbewegliche Himmelskugel nach und nach von Abend gegen Morgen fortrücken, und den weiter gegen Morgen liegenden Sternen, z. B. *S'*, begegnen, welche ſich daher dem Beobachter, der ſeinen Meridian für unbeweglich hält, von Morgen gegen Abend zu bewegen ſcheinen werden. Und da vermöge der Vorausſetzung die Pole *P*, *P'* und der Stern *S* unbeweglich ſind; ſo wird der Abſtand *PS* des Sterns vom Pol aus dem Mittelpunkt *C* der Erde, und wegen der unmerklichen Parallaxe der Fixſterne auch von Punkten ihrer Oberfläche aus geſehen beſtändig gleich groß erſcheinen. Mithin wird dieſer Stern einen Parallelkreis zu beſchreiben ſcheinen, der um den Bogen *PS* von dem Pol abſteht. Eben dieſes kann von jedem anderen Stern gezeigt werden; folglich werden übereinſtimmend mit den Geſetzen der täglichen Bewegungen die Sterne Parallelkreiſe zu beſchreiben ſcheinen, deren Pole die Punkte der Himmelskugel ſind, in welchen ihr die verlängerte Erdaxe begegnet. Ein Sterntag wird alſo jetzt der Umdrehungszeit der Erde um ihre Axe gleich ſeyn, welche 23 St. 56 M. 4,1 S. mittlerer Sonnenzeit ausmachen wird (§. 44.). Wegen der Gleichförmigkeit der täglichen Bewegung (§. 26.) muß, wenn dieſe Bewegung blos ſcheinbar iſt, und ihren Grund in einer Umdrehung der Erde um ihre Axe hat, die Erde ſich mit einer gleichförmigen Geſchwindigkeit um ihre Axe drehen.

Diejenigen Himmelskörper, welche in Beziehung auf die Fixſterne von Abend gegen Morgen fortrücken, müßen

zu einem ſcheinbaren täglichen Umlauf mehr als einen Sterntag gebrauchen, weil die einem Ort der Erde entſprechende Meridianebene bey der Umdrehung der Erde um ihre Axe den öſtlicher liegenden Punkten der Himmelskugel ſpäter begegnet, als denjenigen, welche nicht ſo weit gegen Oſten liegen. Es wird alſo mit den Beobachtungen übereinſtimmend ein Sonnentag, die tägliche Umlaufszeit des Monds, u. ſ. w. größer ſeyn als ein Sterntag. Man ſetze die Umdrehungszeit der Erde um ihre Axe $= t$, die Umlaufszeit eines von Abend gegen Morgen in Beziehung auf die Fixſterne fortrückenden Himmelskörpers $= T$, und die Zwiſchenzeit zwiſchen zwey zunächſt auf einander folgenden Durchgängen deſſelben durch den Meridian $= S$; ſo wird dieſer unter der Vorausſetzung einer gleichförmigen mit dem Aequator parallelen Bewegung in der Zeit S gegen Morgen fortrücken um $\frac{360.S}{T}$ Grade. Mithin wird die Erde in der Zeit S eine Umdrehung müßen gemacht, und noch $\frac{360.S}{T}$ Grade darüber müßen beſchrieben haben. Es wird ſich alſo wegen der gleichförmigen Axendrehung der Erde verhalten

$$\left.\begin{array}{l} 360 + \frac{360.S}{T} : 360 \\ T + S : T \end{array}\right\} = S : t$$

$$T : S = T - t : t$$

und man wird haben $t = \frac{ST}{T+S}$

$$S = \frac{Tt}{T-t},$$

woraus ſich dieſelben Verhältniße der mittleren Sonnenzeit und Sternzeit zu einander ergeben, welche man im 26. §. gefunden hat, wenn man $S =$ einem mittleren Sonnentag, $T =$ einem Jahr, und $t =$ einem Sterntag ſetzt.

§. 148. Die Abſtände eines Sterns von dem Scheitel eines Orts der Erde werden ſich unter der Vorausſetzung einer Axendrehung der Erde nach demſelben Geſetz verändern, welches man unter der Vorausſetzung einer Umdrehung der Himmelskugel gefunden hat. Wenn nemlich durch

die Umdrehung der Erde der Ort *m* auf die Oſtſeite der Ebene des durch den Stern *S* und die Pole *P*, *P'* der Himmelskugel gelegten gröſten Kreiſes nach *v* gekommen iſt, und der dieſem Ort entſprechende Scheitelpunkt nun in den Punkt *V* fällt; ſo wird der Stern *S* von dem Meridian *PVP'* des Orts *v* um den Stundenwinkel *SPV* gegen Abend abzuſtehen ſcheinen, und eben dieſer Winkel wird den Winkel *mpv* meßen, um welchen ſich die Erde von Abend gegen Morgen gedreht hat. Man lege durch *S* und *V* einen Bogen *SV* eines gröſten Kreiſes; ſo wird für den Augenblick, da der Beobachtungsort in *v* iſt, der Abſtand des Sterns vom Scheitel = *SV* ſeyn. Nun iſt aber der Punkt *V* beweglich, und es rückt eigentlich, wenn die Zenithdiſtanz des Sterns wächst, der Scheitelpunkt von dem Stern ab, und nähert ſich demſelben, wenn die Zenithdiſtanz abnimmt. Es kann aber auf ähnliche Art, wie in §. 3. gezeigt werden, daß unter allen von dem Stern *S* an den Parallelkreis *ZVZ'* gezogenen Bogen gröſter Kreiſe der *SZ* am kleinſten, der *SZ'* aber am gröſten iſt. Mithin wird die Höhe des Sterns *S* am gröſten oder am kleinſten, wenn der Beobachtungsort in der Ebene des gröſten Kreiſes *PSP'* liegt, und die Ebene des Erdmeridian mit der Ebene eben dieſes Kreiſes zuſammenfällt. Die Sterne werden alſo wie unter der Vorausſetzung einer täglichen Umdrehung der Himmelskugel ihre gröſte oder kleinſte Höhe über dem Horizont des Beobachtungsorts erreichen, wenn ſie durch den Meridian deſſelben gehen.

Der Abſtand *ZS* eines gegebenen Sterns *S* vom Scheitel *V* eines gegebenen Orts der Erde wird ſich nun für jede gegebene Zeit durch die Auflöſung des ſphäriſchen Dreyecks *PS* beſtimmen laſſen. In dieſem kennt man die Polardiſtanz *PS* des Sterns, die Seite *PV* = *PZ* = dem Complement der Polhöhe des Orts und den Stundenwinkel *SPV* = *mpv*, welcher durch die Umdrehungszeit der Erde um ihre Axe und die Zwiſchenzeit zwiſchen dem Durchgang des Sterns durch den Meridian und dem gegebenen Zeitpunkt, für welchen man den Scheitelabſtand ſucht, gegeben iſt. Man ſieht, daß ſich dieſe Aufgabe nach §. 6, 7. und 8. ent-

weder durch Conſtruktion oder durch Berechnung auflöſen läßt, und man einerley Reſultat erhalten wird, man mag, wie im erſten Capitel des erſten Buchs die Himmelskugel, oder wie hier die Erde ſich drehen laſſen.

In dem ſphäriſchen Dreyeck SPV iſt

$$\text{Sin. tot.}^2 \cos. SV = \text{Sin. tot. Cos. } PV \text{ Cos. } PS + \text{Sin. } PV \text{ Sin. } PS \text{ Cos. } SPV,$$

oder, wenn man wie in §. 8. die Polhöhe $= l$, die Polardiſtanz $= d$, die Höhe des Sterns $= h$, und den Stundenwinkel $= t$, mithin $SV = 90° - h$, $PV = 90° - l$, $PS = d$, $SPV = t$ ſetzt,

$$\text{Sin. tot.}^2 \text{ Sin. } h = \text{Sin. tot. Sin. } l \text{ Cos. } d + \text{Cos. } l \text{ Sin. } d \text{ Cos. } t,$$

welcher Ausdruck mit dem §. 8. gegebenen n. 2. übereinſtimmt. Folglich wird ſich die Höhe eines Sterns unter beyden Vorausſetzungen nach einerley Geſetz verändern, wenn der Stundenwinkel ſich ändert, und die Erſcheinungen der täglichen Bewegung werden ſich vollſtändig durch eine gleichförmige Umdrehung der Erde von Abend gegen Morgen um eine mit der Axe der Himmelskugel zuſammenfallende Axe erklären laſſen.

§. 149. Man hat in dem fünften Capitel des erſten Buchs geſehen, daß ſich die jährliche Bewegung der Sonne in der Ekliptik und die Bewegungen der Planeten auf eine ſehr einfache Art erklären laſſen, wenn man die Erde um die ruhende Sonne in einem Jahr und in der Richtung von Abend gegen Morgen eine Bahn beſchreiben läßt, welche der ſcheinbaren Bahn der Sonne um die Erde gleich und ähnlich iſt. Es werden alſo jetzt noch diejenigen Erſcheinungen zu unterſuchen ſeyn, welche ſich zeigen, wenn man die Erde um die Sonne laufen, und ſie zugleich um ihre ſich drehen läßt. Was nun die Lage dieſer Umdrehungsaxe betrifft, ſo wird, weil die auf ihr ſenkrechte Ebene des Aequators um die Schiefe der Ekliptik gegen die Ebene der letztern geneigt iſt, die Umdrehungsaxe der Erde mit der Ebene der Ekliptik oder der Erdbahn einen Winkel machen müſſen, welcher die Schiefe der Ekliptik zu neunzig Graden ergänzt. Es ſey $ABCD$ (Fig. 46.) die Bahn der Erde um die Sonne S, und A der Ort der Erde zur Zeit der Frühlingstagundnachtgleiche, die Aequinoktialpunkte werden fürs erſte als ruhend angenommen; ſo wird derjenige gröſte Kreis der Erde, deſſen Ebene auf dem Halbmeſſer SA der Erdbahn ſenkrecht

ist, und welcher daher die Tagseite der Erde von ihrer Nachtseite scheidet, durch die zwey Erdpole p, p' durchgehen müssen, weil um diese Zeit auf der ganzen Erde Tag und Nacht einander gleich sind. Wenn die Erde von dem Punkt A an um die Sonne einen Winkel ASB von 90 Grad beschrieben hat; so wird der Winkel PBS, welchen die Erdaxe pp' mit dem Halbmesser BS der Erdbahn macht, und welcher die Polardistanz der Sonne mißt, am kleinsten und dem Complement der Schiefe der Ekliptik gleich seyn müssen, weil um diese Zeit die Abweichung der Sonne am grösten ist (§. 32.). Vermöge eben dieses § muß die durch PB und BS gelegte Ebene, welche nun mit der Ebene des Colurus der Solstitien zusammenfällt, auf der Ebene der Ekliptik, mithin auf der Ebene der Erdbahn $ABCD$ senkrecht seyn. Folglich wird ein von A auf die durch BP' und BS gelegte Ebene gefälltes Perpendickel in die Linie BSD (XI, 38.) und wegen des rechten Winkels ASB (Voraussf.) auf die SA fallen. Es ist aber die SA auch auf der Ebene des grösten Kreises senkrecht, welcher, als die Erde in A war, ihren beleuchteten Theil von der Nachtseite trennte; folglich ist die Ebene dieses Kreises mit der durch PB und BS gelegten Ebene parallel (XI, 14.), und in diesen einander parallelen Ebenen muß die Erdaxe liegen, wenn die Erde in B und A ist. Eben so kann gezeigt werden, daß auch in C und D, wo die verlängerten AS, BS die Erdbahn treffen, die Erdaxe in Ebenen liegen muß, welche mit den vorhin genannten Ebenen parallel sind. Ueberdiß muß in D der Winkel PDS, welcher die Polardistanz der Sonne zur Zeit des Wintersolstitiums mißt, am grösten seyn, und einen rechten Winkel um die Schiefe der Ekliptik übertreffen (§. 32.). Folglich wird der Winkel PDF, welchen die Erdaxe pp' mit der Verlängerung DF von SD macht, dem Complement der Schiefe der Ekliptik, d. h. dem Winkel PBS gleich, und die Erdaxe pp', wenn die Erde in D ist mit der Erdaxe pp', wenn sie in B ist, parallel seyn. Man lasse nun auch in den übrigen Lagen der Erde ihre Axe sich beständig parallel bleiben; so wird, wenn sie aus A in E rückt die Polardistanz der Sonne nach und nach

abneh-

abnehmen. Fällt man nemlich, wenn die Erde in E zwischen A und B ist, von einem beliebigen auf der Erdaxe oder ihrer Verlängerung genommenen Punkt P'' ein Perpendickel $P''Q$ auf die Ebene ihrer Bahn, und zieht die PQ; so ist vermöge der Voraussetzung die Ebene $P'EQ$ mit der Ebene $P'BS$, und daher EQ mit BS parallel (XI, 16.). Mithin ist $QES = BSE < R$, und ein von Q auf SE gefälltes Perpendickel QR fällt zwischen E und S. Man ziehe $P''R$. Vermöge der Konstruktion und XI, 18. sind die Dreyecke $P''QE$, $P''QR$ bey Q rechtwinklicht; folglich ist (I, 47.) das Quadrat von $P''E$ = Quadr. von $P''Q$ + Quadr. von EQ = Quadr. von $P''Q$ + Quadr. von QR + Quadr. von RE = Quadr. von $P''R$ + Quadr. von RE. Daher ist der Winkel $P''RE$ ein rechter (I, 48.), und der Winkel PER spitz, aber größer als $P''EQ$, weil $P''R > P'Q$. So wie die Erde weiter gegen B hin rückt, nimmt der Winkel BSE oder der ihm gleiche Winkel QER ab, und da vermöge der Voraussetzung der Winkel PEQ sich nicht verändert; so wird QR und zugleich $P''R$ abnehmen, und sich der PQ nähern, welcher sie, wenn die Erde in B kommt, gleich werden wird. Die Polardistanz der Sonne, welche bey A 90 Grade betrug, wird also während der Bewegung der Erde von A gegen B beständig abnehmen, ihre Abweichung wird wachsen, und in B am größten werden. Von da an wird sie, wie auf ähnliche Art gezeigt werden kann, abnehmen, in C verschwinden, und in D ihren größten Werth auf der Südseite des Aequators erhalten, von welchem Punkt an sie abnehmen wird, bis sie in A wieder verschwindet.

Wenn die Erde in A ist, so sieht man die Sonne nach der Richtung AC in dem Punkt der Frühlingsnachtgleiche, und wenn sie in E steht, nach der Richtung EE'. Folglich ist der Winkel CSE' der Sonnenlänge gleich, wenn die Erde in E sich befindet. Man setze die Länge der Sonne $= \lambda$, ihre Abweichung $= \delta$, die Schiefe der Ekliptik $= \varepsilon$; so ist für den Halbmesser oder Sinus totus $P'''E$

EQ = Cos. $P'''EQ$ = Sin. ε

ER = Cos. $P'''ER$ = Sin. δ, und es verhält sich

Sin. δ : Sin. ε = ER : EQ

$= \text{Cos. } QER : \text{Sin. tot.}$, weil $QRE = R$

$= \text{Sin. } \lambda : \text{Sin. tot.}$, weil $QER = DSE' = 90^0 - \left\{\begin{matrix} CSE' \\ \lambda \end{matrix}\right\}$.

Folglich findet wirklich dieselbe Beziehung zwischen der Schiefe der Ekliptik, der Länge und Abweichung der Sonne Statt, welche man in §. 36. n. 8. aus der Betrachtung der scheinbaren Bahn der Sonne um die Erde abgeleitet hat.

§. 150. Wegen des Zurückweichens der Aequinoktialpunkte (§. 37.) tritt das Aequinoktium wieder ein, ehe die Sonne wieder nach der Richtung AS erscheint, oder ehe die Erde den Punkt A wieder erreicht hat. Da nun um diese Zeit die von der Sonne an den Mittelpunkt der Erde gezogene gerade Linie auf der Ebene senkrecht seyn muß, welche durch die Erdaxe und auf die Ebene der Erdbahn senkrecht gelegt ist; so muß die Erdaxe nach und nach von ihrer parallelen Lage um eben so viel abweichen, als die Bewegung der Aequinoktialpunkte beträgt. Man wird also auch das Zurückweichen der Aequinoktialpunkte und die dadurch verursachte Voreilung der Nachtgleichen ganz einfach darstellen können, wenn man die Durchschnittslinie der durch die Erdaxe auf die Ebene der Erdbahn senkrecht gelegten Ebene mit der Ebene der Erdbahn von Morgen gegen Abend mit derselben Geschwindigkeit sich bewegen läßt, mit welcher die Aequinoktialpunkte nach eben dieser Richtung sich zu bewegen scheinen. Unter dieser Voraussetzung wird die Erdaxe in derselben Zeit, in welcher die Aequinoktialpunkte ihren scheinbaren Umlauf in Beziehung auf die Fixsterne machen, die Oberfläche eines Kegels beschreiben, dessen Axe auf der Ebene der Erdbahn senkrecht steht, und dessen Seitenlinien gegen seine Axe um die Schiefe der Ekliptik geneigt sind.

Um endlich die Veränderung der Schiefe der Ekliptik (§. 39.) darzustellen, wird man den Winkel der Erdaxe mit der Ebene der Erdbahn um eben so viel müssen zunehmen lassen, als die Schiefe der Ekliptik abnimmt, d. i. jährlich um 0,521 Sekunden, oder man wird die Lage der Ebene der Erdbahn sich müssen um eben so viel verändern lassen.

§. 151. Da aus der Voraussetzung der Umdrehung der Erde um eine gegen die Ebene der Bahn, welche sie um

die Sonne beſchreibt, geneigte Axe ſich daſſelbe Geſetz für die Veränderung der Abweichung der Sonne ergiebt, welches man aus der ſcheinbaren Bewegung der Sonne in der Ekliptik abgeleitet hat (§. 149.); ſo iſt klar, daß auch die im 51. §. betrachteten Veränderungen der Jahrszeiten und die Verſchiedenheiten des Clima's aus dieſer Vorausſetzung eben ſo ſich ergeben werden, wie man ſie im 51. §. gefunden hat. Sie folgen aber auch unmittelbar aus der Betrachtung der 46ten Figur. Wenn die Erde in *A* iſt, und die Sonne nach der Richtung *AS* in dem Punkt der Frühlingsnachtgleiche zu ſtehen ſcheint; ſo fallen die Pole *p*, *p'* der Erde auf den Umfang des Kreiſes, welcher die Nachtſeite der Erde von der Tagſeite ſcheidet, und der Beleuchtungskreis heißen mag. Alsdenn ſind auf der ganzen Erde Tag und Nacht einander gleich, weil der Beleuchtungskreis durch die Pole der Erde geht, und daher die von allen Orten der Erde während ihrer Umdrehung beſchriebenen Parallelkreiſe halbirt, und eben dieſes findet Statt, wenn die Erde in *C* iſt, und das Herbſtäquinoktium eintritt. Die erweiterte Ebene des Erdäquators geht durch die Sonne, und unter dem Aequator geht alsdenn die Sonne im Scheitel durch den Meridian. Unter den Polen hingegen, welche auf dem Beleuchtungskreis ſelbſt liegen, erſcheint die Sonne am Horizont. Die Erde befinde ſich jetzt in *k* zwiſchen *A* und *B*. Man denke ſich durch *SE* und *EP'''* eine Ebene gelegt, welche der Ebene des Beleuchtungskreiſes in der geraden Linie *dE* begegne; ſo wird die Ebene *SEd* auf der Ebene des Beleuchtungskreiſes ſenkrecht (XI, 18.), *SEd* = *R* und *dEP'''* der Abweichung der Sonne gleich ſeyn. Weil nun die Ebene *dEP'''* auf der Ebene des Beleuchtungskreiſes ſenkrecht iſt, ſo iſt unter allen von dem Pol *p* an dem Umfang des Beleuchtungskreiſes gehenden Bogen gröſter Kreiſe der Erde der in der Ebene *P'''Ed* liegende *pd* der kleinſte. Folglich mißt die Abweichung der Sonne den kleinſten Abſtand des beleuchteten Erdpols von dem Umfang des Beleuchtungskreiſes. Der entgegengeſetzte Pol *p'* wird in die Nachtſeite fallen, und eben ſo weit von dem Beleuchtungskreis abſtehen. Demnach werden alle Parallelkreiſe

des Erdäquators, deren Abstände von den Polen nicht grösser als die Abweichung der Sonne sind, ganz auf der Tagseite, oder ganz auf der Nachtseite der Erde liegen, je nachdem der ihnen zunächst liegende Erdpol beleuchtet ist oder nicht, und daher wird an denjenigen Orten, deren Polhöhen nicht kleiner als das Complement der Abweichung der Sonne sind, die Sonne nicht unter oder nicht aufgehen, je nachdem die Abweichung der Sonne mit diesen Polhöhen einerley oder verschiedene Benennungen, nördlich und südlich hat.

Die durch SE und $P''E$ gelegte Ebene schneide die Oberfläche der Erde in dem Meridian $apab'$, welchem die SE in o begegne. Da $PES < R$; so ist der Bogen $po < 90$ Gr. Man nehme $pa = 90°$; so liegt der Ort a unter dem Aequator, die Polhöhe des Orts o ist $= ao =$ der Abweichung der Sonne, und diese geht in dem Scheitel dieses Orts, so wie aller derjenigen, deren Polhöhe der Abweichung der Sonne gleich ist, durch den Meridian. Mit der Abweichung der Sonne wächst die Polhöhe derjenigen Orte, deren Scheitel die Sonne erreichen kann, und die Polhöhe derjenigen welchen die Sonne nicht unter- oder aufgeht nimmt ab, bis sie am gröfsten und der Schiefe der Ekliptik gleich wird, wo die äussersten Parallelkreise, unter welchen diese Erscheinungen noch Statt finden, in die Wendekreise und Polarkreise übergehen, und die Erde in die verschiedenen Zonen eintheilen, wie man im 51sten §. gesehen hat.

Aus der Sonne gesehen erscheint der Meridian pop' der Erde, in dessen erweiterten Ebene die Sonne steht, als eine gerade auf die Durchschnittslinie dE dieses Meridians mit der Beleuchtungsebene fallende Linie. Da so wohl QRS (Constr.) als $P'''RS$ (Bew. §. 150.) $= R$; so ist die Ebene $P'''RQ$ auf RS senkrecht, und daher diese Ebene mit der Ebene des Beleuchtungskreises parallel (XI, 14.). Folglich ist auch die dE mit $P'''R$ parallel (XI, 16.). Man errichte in E ein Perpendickel En auf der Ebene der Erdbahn, welches in der auf eben dieser Ebene senkrechten Ebene des Beleuchtungskreises liegen, und (XI, 6.) der $P'''Q$ parallel seyn wird. Mithin wird der Winkel nED dem Winkel $RP'''Q$ gleich seyn (XI, 10.). Es ist aber, wenn man die in §. 150. gebrauchte Bewegungen beybehält, für den Halbmesser $P'''Q$.

EQ = Tg. $QP'''E$ = Tg. s
QR = Tg. $QP'''R$ = Tg. nED,
folglich verhält ſich Tg. s : Tg. nEd = EQ : QR
= Sin. tot. : Sin. QER
= Sin. tot. : Cos. λ,
weil $QER = DSE' = 90° - CSE' = 90° - \lambda$.

Demnach iſt Tang. $nEd = \frac{\text{Tg. } s \text{ Cos. } \lambda}{\text{Sin. tot.}}$.

Der Winkel nEd, welchen der nördliche Theil des durch den ſcheinbaren Mittelpunkt der Erde gehenden Meridians mit nE, oder dem durch die Erde gelegten Breitenkreiſes, von der Sonne aus geſehen zu machen ſcheint, fällt, wie im Fall der Figur, weſtlich vom Breitenkreis, wenn Cos. λ poſitiv, und öſtlich, wenn dieſer Coſinus negativ iſt.

§. 152. Die Bewegung der Erde um die Sonne und ihre Axendrehung werden ſchon dadurch ſehr wahrſcheinlich, daß unter dieſer Vorausſetzung die täglichen Bewegungen der Himmelskörper, die jährliche Bewegung der Sonne und die davon abhängende Verſchiedenheit der Jahrszeiten, und die verwickelt ſcheinende Bewegung der Planeten nicht allein vollſtändig und weit einfacher, als in dem ptolemäiſchen und tychoniſchen Syſtem, erklärt werden können, ſondern auch ganz ähnliche Bewegungen an den Planeten, in deren Claſſe die Erde zu gehören ſcheint, beobachtet werden. Gegen die Bewegung der Erde wird man aber noch die Einwendung machen können, daß, wenn ſie wirklich ſich um die Sonne bewegte, die Fixſterne ihre Lage ſo wohl unter ſich, als in Beziehung auf die Ekliptik verändern müſſen, und dieſe ſcheinbare Bewegung der Fixſterne wegen des mehr 23000 Erdhalbmeſſer betragenden Abſtands der Erde von der Sonne (§. 50.) nicht unbemerkt bleiben könne, wenn gleich, ſo lange nur von verſchiedenen Punkten der Oberfläche der Erde die Rede iſt, die Parallaxe der Fixſterne für uns verſchwindet (§ 25.). Es wird alſo, wenn anders der Halbmeſſer der Erdbahn in Vergleichung mit der Entfernung der Fixſterne nicht für uns verſchwindet, eine von der Bewegung der Erde um die Sonne abhängende Ortsveränderung der Fixſterne Statt finden müſſen, welche man die jährliche Parallaxe der Fixſterne nennt. Man

ſetze die Sonne unbeweglich in *C* (Fig. 47.) um welche die Erde die beynahe kreisförmige Bahn *ABDE* beſchreibe, in deren erweiterten Ebene ein Stern *S* ſtehe. Steht die Erde in *B* auf der geraden Linie *SC*, welche von der Sonne *C* an den Stern *S* gezogen iſt; ſo ſieht der Beobachter den Stern an derſelben Stelle des Himmels, wo er aus dem Mittelpunkt der Sonne geſehen erſcheinen würde. Bewegt ſich die Erde nach *D*; ſo wird die Geſichtslinie *DS* mit der vorigen *CS* den Winkel *CSD* machen, welcher am gröſten ſeyn wird, wenn die *SD* die Erdbahn in *D* berührt. Bey der Bewegung der Erde von *D* gegen *E* wird dieſer Winkel wieder abnehmen, in *E* auf der Verlängerung von *SC* verſchwinden, von *E* bis *A*, wo die *SA* die Erdbahn berührt, wachſen, hernach abnehmen, und in *B* verſchwinden. Die in der Ekliptik ſtehende Sterne werden alſo in derſelben eine vor- und rückwarts gehende Bewegung zu haben ſcheinen, und ſie werden ſich in der Mitte der von ihnen beſchriebenen Bogen der Ekliptik befinden, wenn ſie in Conjunktion oder Oppoſition mit der Sonne ſind, an ihren Endpunkten aber, wenn ihre ſcheinbaren Abſtände von der Sonne = 90 Gr. ſind.

Bey dem erſten Anblick ſcheint es unmöglich, dieſe ſcheinbaren Bewegungen zu beſtimmen, weil die Fixſterne ſelbſt die als unbeweglich betrachtete Punkte der Himmelskugel ſind, auf welche wir die Bewegungen beziehen, und durch dieſelbe die Lage des Aequinoktialpunkts gegeben iſt, von welchem an die Längen gerechnet werden. Aber dieſe Bewegungen müßten, wenn ſie anders merklich ſind, ſich zeigen, wenn man zwey Sterne zu verſchiedenen Jahrszeiten mit einander vergleicht. Man meße, wenn die Erde in *B* auf der geraden Linie zwiſchen *S* und *E* iſt, den Abſtand *SBs* eines zweyten ebenfalls in der Nähe der Ekliptik ſtehenden Fixſterns *s* von dem *S*, welcher ungefähr 90° betrage. Wenn die Erde nach *e* gekommen iſt, wird man durch Fernröhren den Stern *S* bey Tag und ziemlich nahe bey der Sonne beobachten können, wo der Winkel *Bse* ſehr klein ſeyn wird. Man wird alſo auch den ſcheinbaren Abſtand *Ses* der zwey Sterne, wenn die Erde in *e* iſt, beobach-

ten können. Es ſey g der Durchſchnittspunkt der geraden Linien Bs und Se; ſo wird $Sgs = Ses + Bse = SBs + BSe$ (I, 32.), und daher $Bse = SBs - Ses + BSe$ ſeyn. Der letztere dieſer Winkel iſt zwar unbekannt, aber er muß in Vergleichung mit dem Winkel Bse, welcher nahe ſeinen gröſten Werth erhält, ſehr klein ſeyn, den Fall ausgenommen, wo der Stern s ſehr viel weiter von der Sonne entfernt wäre, als der Stern S, und er ſeinen Abſtand von dem letztern nicht merklich ändern würde. Alsdenn wird man die Abſtände des Sterns S von dem s zu beobachten haben, wenn der letztere in Oppoſition und nahe in der Conjunktion mit der Sonne iſt. Findet ſich jetzt der Unterſchied der ſcheinbaren Abſtände gröſſer, als im erſten Fall, ſo wird der Stern S der Sonne näher ſeyn, als der Stern s, und man wird den letzteren gebrauchen müſſen, um die Ortsveränderung des Sterns S zu beſtimmen.

§. 153. Steht ein Stern nicht in der Ekliptik; ſo wird ſich ſo wohl ſeine Länge als ſeine Breite verändern müſſen. Es ſey $GVBAB'$ (Fig. 48.) die Ekliptik, in deren Ebene die Erde T ihre Bahn TMF um die Sonne C beſchreibe, und E ſey der Nordpol der Ekliptik, V der Punkt der Frühlingsnachtgleiche. Von der Sonne C ſey die gerade Linie CO nach einem auſſerhalb der Ebene der Ekliptik liegenden Stern O gezogen, welche der Himmelskugel in S begegne, und durch den Pol E der Ekliptik und den Punkt S ſey der gröſte Kreis $GESA$ gelegt; ſo wird VA die wahre Länge dieſes Sterns, AS ſeine wahre Breite ſeyn. Der Beobachter auf der Erde T ſieht den Stern nach der Richtung TO, und ſetzt ihn, weil er ſeinen Standpunkt beſtändig in dem Mittelpunkt C der Himmelskugel annimmt, in den Punkt s, in welchem die durch C mit der TO parallel gezogene CN ihrer Oberfläche begegnet. Man lege durch die Parallelen TO, CN eine Ebene, welche die Oberfläche der Himmelskugel in einem gröſten durch die Punkte S und s gehenden Kreis BsB' ſchneiden wird. Zieht man noch durch den Pol E der Ekliptik und den ſcheinbaren Ort s des Sterns einen gröſten Kreis $A'sE$; ſo wird VA' die

scheinbare Länge, $A's$ die scheinbare Breite des Sterns seyn.

Man ziehe durch den Ort O des Sterns die Parallele ON mit TC, welche der Cs in N begegne. Bey der Bewegung der Erde um die Sonne wird die NO um den Punkt O eine der Erdbahn gleiche und ähnliche Bahn beschreiben, welche in einer mit der Ekliptik parallelen Ebene liegen wird. Unter der Voraussetzung einer kreisförmigen Bahn der Erde wird also der Punkt N um den Punkt O einen der Ebene der Ekliptik parallelen Kreis, mithin die nach dem scheinbaren Ort des Sterns gezogene Cs die Oberfläche eines schief stehenden Kegels beschreiben, dessen Spitze in C liegt, und dessen Axe die nach dem wahren Ort des Sterns S gezogene CS ist. Wird diese Kegeloberfläche mit einer die Oberfläche der Himmelskugel in S berührenden oder auf des Kegels Axe CS senkrechten Ebene geschnitten; so wird die Durchschnittslinie ein Ellipse seyn, deren große Axe mit der Ebene der Ekliptik parallel, deren kleine Axe also auf der Ekliptik senkrecht seyn wird. Mithin wird jeder Fixstern vermöge der jährlichen Parallaxe, wenn sie merklich ist, um seinen wahren Ort als Mittelpunkt in einem Jahr eine Ellipse zu beschreiben scheinen, welche, wenn der Stern im Pol der Ekliptik steht, in einen Kreis, und, wenn er sich in der Ekliptik befindet, in eine gerade Linie übergeht. Wenn der Stern mit der Sonne in Conjunktion oder Oppoſition ist; so fällt der Kreis BSB' auf den AEG, mithin der scheinbare Ort des Sterns auf die Endpunkte der kleinen Axe dieser Ellipse, und er steht im ersten Fall am weitesten von dem Nordpol E der Ekliptik ab, im letzteren ist er ihm am nächsten. In den Quadraturen wird sich der Stern an den Endpunkten der großen Axe befinden.

§. 154. In dem Dreyeck CTO verhält sich $CO : CT$ = Sin. CTO : Sin. COT, und daher wird der Winkel COT am größten, wenn CTO, oder die scheinbare Breite des Sterns = 90 Gr. wird. Setzt man diesen größten Werth der Parallaxe = p; so verhält sich $CO : CT$ = Sin. tot. : Sin. p = Sin. CTO : Sin. COT.

In dem bey A rechtwinklichten sphärischen Dreyeck ASB verhält sich

$$\begin{aligned}\text{Sin. } ASB : \text{Sin. } AB &= \text{Sin. tot. } : \text{Sin. } BS\\ \text{nahe} &= \text{Sin. tot. } : \text{Sin. } Bs\\ &= \text{Sin. tot. } : \text{Sin. } CT\odot\\ &= \text{Sin. } p \ : \text{Sin. } CQT\\ &= \text{Sin. } p \ : \text{Sin. } Ss\end{aligned}$$

folglich ist 1.) $\text{Sin. } Ss \text{ Sin. } ASB = \text{Sin. } p \text{ Sin. } AB$

In eben diesem sphärischen Dreyeck verhält sich

$$\begin{aligned}&\text{Sin. tot. } : \text{Sin. } ABS = \text{Sin. } BS : \text{Sin. } AS\\ \text{und } &\text{Cos. } AB : \text{Cos. } ASB = \text{Sin. tot. } : \text{Sin. } ABS\end{aligned}$$

folglich $\text{Cos. } AB : \text{Cos. } ASB = \text{Sin. } BS : \text{Sin. } AS$

da nun $\text{Sin. } p \ : \text{Sin. } Ss \ = \text{Sin. tot. } : \text{Sin. } BS$

so ist 2.) $\text{Sin. } p \text{ Cos. } AB : \text{Sin. } Ss \text{ Cos. } ASB = \text{Sin. tot. } : \text{Sin. } AS$

Man ziehe den Bogen sR auf AE senkrecht; so kann man das bey R rechtwinklichte sphärische Dreyeck wegen der Kleinheit des Winkels R als ein geradlinigtes betrachten, und man wird haben

$$sR = Ss\,\frac{\text{Sin. } ASB}{\text{Sin. tot.}} = \frac{p\,\text{Sin. } AB}{\text{Sin. tot.}} \text{ (n. 1.)}$$

$$SR = Ss\,\frac{\text{Cos. } ASB}{\text{Sin. tot.}} = \frac{p\,\text{Sin. } AS\,\text{Cos. } AB}{\text{Sin. tot.}^2} \text{ (n. 2.)}$$

Sey die Länge VA des Sterns $= l$, die Länge $V\mathfrak{B}$ der Sonne $= \odot$, die Breite AS des Sterns $= b$; so hat man

$$3.)\ sR = \frac{p\,\text{Sin. } (l - \odot)}{\text{Sin. tot.}},$$

$$4.)\ SR = \frac{p\,\text{Sin. } b\,\text{Cos. } (l - \odot)}{\text{Sin. tot.}^2}.$$

Vermöge n. 3. verschwindet sR, wenn der Stern in Conjunktion und Oppositon mit der Sonne ist, und SR wird nach n. 4. im ersten Fall $= \frac{p\,\text{Sin. } b}{\text{Sin. tot.}}$, im letzteren $= -\frac{p\,\text{Sin. } b}{\text{Sin. tot.}}$. Mithin liegt der scheinbare Ort des Sterns, wenn seine Breite nördlich ist, im ersten Fall, wie in der Figur, südlich von dem wahren Ort, im letzteren nördlich, und umgekehrt bey südlicher Breite, aber jedesmal in dem durch den wahren Ort, gehenden Breitenkreis. Die Längenparallaxe verschwindet also, und die Breitenparallaxe wird am gröſten.

Ist der Ueberschuß der Länge des Sterns über die Länge der Sonne $= 90$ oder 270 Graden; so wird sR am gröſten,

nemlich $= p$, und im ersten Fall positiv, im letzteren Fall negativ, oder die wahre Länge ist im ersteren Fall größer, im letzteren kleiner als die scheinbare. Hingegen verschwindet jetzt SR, und die scheinbare Breite wird der wahren gleich.

Man ziehe zwey gerade Linien Ee, ab (Fig. 49. *a*) aufeinander senkrecht, ihr Durchschnittspunkt S sey der wahre Ort des Sterns, und SE ein Stük des durch ihn gezogenen Breitenkreises, welches dem Beobachter als eine gerade Linie erscheint. Von S an seyen Sd und $Se = p$ Sin. b, und $Sa = Sb = p$ genommen, wenn man zur Abkürzung den Sinus totus $= 1$ setzt. Ferner nehme $SR = p$ Sin. b Cos. $(l - \odot)$, und senkrecht auf de die $sR = p$ Sin. $(l - \odot)$; so wird

$$\overline{sR}^2 = p^2 \overline{\text{Sin. } (l - \odot)}^2 = p^2 - p^2 \overline{\text{Cos. } (l - \odot)}^2$$

$$\overline{sR}^2 \overline{\text{Sin. } b}^2 = p^2 \text{ Sin. } b^2 - p^2 \overline{\text{Sin. } b}^2 \overline{\text{Cos. } (l - \odot)}^2$$

$$= \overline{Se}^2 - \overline{SR}^2$$

$$= sR \times Rd \text{ (II, 5.)}$$

Daher verhält sich $\overline{sR}^2 : sR \times Rd = \overline{Sa}^2 : \overline{Se}^2$,

und der Stern scheint um seinen wahren Ort eine Ellipse zu beschreiben, deren große mit der Ekliptik parallele Axe ab die scheinbare Größe $2p$ hat, und sich zu der kleinen de, wie der Sinus totus zu dem Sinus der Breite des Sterns verhält. Demnach ist die gröste Parallaxe eines Fixsterns durch seine gröste Breitenparallaxe gegeben.

§. 155. Vor der Erfindung der Fernröhren konnte man keine solche mit den Jahrszeiten in derselben Ordnung wiederkehrende Ortsveränderungen der Fixsterne bemerken. Aber am Ende des Jahrs 1725 fiengen Molineux und Bradley ihre Beobachtungen mit vollkommeneren Werkzeugen, welche einen Winkel von $\frac{1}{2}$ Sekunde merklich machten an, und letzterer fand wirklich eine kleine scheinbare Bewegung der Fixsterne, welche zwar, wie es bey einer jährlichen Parallaxe seyn mußte, eine Periode von einem Jahr hatten, hingegen ein ganz anderes Gesetz befolgten. Die Sterne auf der Nordseite der Ekliptik hatten ihre gröste und kleinste Breite, wenn sie Abends und Morgens um 6 Uhr durch den Meridian giengen, oder 90° östlich und westlich von der Sonne abstunden, um die Zeit der Conjunktion und Opposition mit der Sonne befanden sie sich an ihrem mittleren Ort. Diese Erscheinungen waren also denenjenigen

gerade entgegengesetzt, welche sich bey einer jährlichen Parallaxe hätten zeigen müßen. Ueberdieß bemerkte er, daß die ganze Veränderung der Breite mit der Breite selbst zunahm, und ihrem Sinus proportional war, welches unter der Voraussetzung einer jährlichen Parallaxe nur alsdenn Statt finden könnte, wenn alle Fixsterne gleich weit von der Sonne entfernt wären. Die ganze Veränderung der Breite verhält sich nach Bradley's Beobachtungen zu 40 Sekunden wie der Sinus der Breite zu dem Sinus totus, welche demnach bey einem im Pol der Ekliptik stehenden Fixstern 40 Sekunden beträgt.

§. 156. Bradley fand nach mehrere Jahre fortgesetzten Beobachtungen die Ursache dieser durch eine jährliche Parallaxe unerklärbaren Erscheinungen in der von Römer entdeckten successiven Fortpflanzung des Lichts (§. 107.), verbunden mit der Bewegung der Erde um die Sonne. Das Licht durchlauft den Halbmesser der Erdbahn in einer Zeit von 8′ 13″,2, und in eben dieser Zeit durchlauft die Erde, weil sie in einem Jahr einen Umlauf um die Sonne macht, einen Bogen von 20″,25 Sekunden, dessen Länge sich also zu seinem Halbmesser wie 1 : 10180 verhält. Mithin verhält sich die Geschwindigkeit der Erde zu der Geschwindigkeit des Lichts wie 1 : 10180. Es seyen nun *ST*, *S′K* (Fig. 50.) die von einem Stern herkommende Lichtstralen, welche mit Beyseitsetzung einer Parallaxe hier als miteinander parallel angenommen werden. Das Auge des Beobachters bewege sich nach der Richtung *AN* gleichförmig mit einer Geschwindigkeit, welche sich zu der Geschwindigkeit des Lichts verhalte wie *AT* : *TQ*. Man ziehe *AQ*, und lasse sich diese Linie mit sich selbst parallel so forthewegen, daß ihr Endpunkt *A* mit der Geschwindigkeit des Auges fortrücke; so wird ein von dem Stern herkommender Lichtstral, welcher in dem Augenblick, als das Auge in *A* war; in *Q* ankam, in derselben Zeit, in welcher das Auge in *T*, und die Linie *AQ* in die Lage *TL* gekommen ist, den Weg *QT* gemacht haben, und sich also an dem Ende der parallel fortrückenden Linie *AQ* befinden. Man ziehe *QL*

mit AN, und durch einen zwischen A und T liegenden Punkt a die ab mit AQ parallel, welche der TQ in q, der LQ in b begegne; so verhält sich $Aa : Qq = AT : TQ =$ Geschwindigkeit des Auges zu der Geschwindigkeit des Lichts. Folglich sind Aa und Qq die in einerley Zeit zurückgelegten Wege des Auges und des Lichts, welches sich beständig an der mit sich selbst parallel fortrückenden geraden Linie AQ hin zu bewegen scheinen wird. Der Beobachter wird also den Stern nach der Richtung AQ, ab, TL u. s. w. zu sehen glauben, welchen er, wenn er in Ruhe wäre, nach den Richtungen TQ, KL sehen würde. Die ersteren Linien machen mit den letzteren einen Winkel $= AQT$, welchen man die Aberration des Lichts nennt. Unter der Voraussetzung der Bewegung der Erde um die Sonne verhält sich nun die Geschwindigkeit des Lichts zu der Geschwindigkeit des Auges wie $10186 : 1 = TQ : AT$; folglich ist, wenn der Winkel TAQ ein rechter ist, die Aberration $AQT = 20{,}25$ Sekunden. Ist aber der Winkel TAQ ein schiefer; so ist die Aberration in demselben Verhältniß kleiner als $20{,}25$, in welchem sein Sinus kleiner ist, als der Sinus totus.

§. 157. Es sey nun, wie im 154. §. TMF Fig. 51. die in der Ebene GVA der Ekliptik liegende als kreisförmig angenommene Bahn der Erde um die Sonne C als Mittelpunkt, E der Nordpol der Ekliptik. Die Erde befinde sich in dem Punkt T ihrer Bahn, und von ihr sey die gerade Linie TO nach dem wahren Ort eines Sterns gezogen. Man ziehe die Tangente TK an die Erdbahn, welche unter der hier gemachten Voraussetzung einer kreisförmigen Bahn auf dem Halbmesser CT senkrecht seyn, und die Richtung der Bewegung der Erde bezeichnen wird. Man nehme auf dieser Tangente von dem Berührungspunkt T an nach der Richtung der Bewegung der Erde die TK und auf der TO die TQ so, daß sich $TK : TQ$ wie die Geschwindigkeit der Erde zu der Geschwindigkeit des Lichts verhalte, vollende das Parallelogramm $TKLQ$, und ziehe die Diagonale TL; so wird der Beobachter in T ver-

möge des vorhergehenden §. den Stern nach der Richtung *TL* ſehen. Man ziehe die Halbmeſſer *CS*, *Cs* der Himmelskugel mit *TO*, *TL* beziehungsweiſe parallel; ſo wird *S* der wahre, *s* der ſcheinbare Ort des Sterns ſeyn, wenn die Aberration allein, und keine Parallaxe Statt fände. Zieht man durch den Pol *E* der Ekliptik und durch die Punkte *S*, *s* die gröſten Kreiſe *GESA*, *EsA'*; ſo wird, wenn *V* der Aequinoktialpunkt iſt, *VA* die wahre, *VA'* die ſcheinbare Länge des Sterns, *AS* ſeine wahre, *A's* ſeine ſcheinbare Breite ſeyn. Wegen der Parallelen *TQ* und *CS*, *TL* und *Cs* wird nun der Winkel *QTL* dem Winkel *sCs* gleich (XI, 10.), und die Ebene des erſteren Winkels oder des Parallelogramms *KQ* der Ebene des letztern, oder der Ebene des durch *S* und *s* gelegten gröſten Kreiſes *SsB* parallel ſeyn (XI, 15.). Demnach wird auch die Durchſchnittslinie *CB*, welche die Ebene des letztern mit der Ebene der Ekliptik macht, mit der Tangente *TK* der Erdbahn parallel ſeyn (XI, 6.). Auf der *CS* ſey $Cq = TQ$ genommen, und in der Ebene *BCS* die *ql* mit *CB* parallel gezogen; ſo werden auch *ql*, *TK*, *QL* parallel (XI, 9.), und wegen der gleichwinklichten Dreyecke *qCl*, *QTL* einander gleich ſeyn. Bey der Bewegung der Erde um die Sonne wird nun die mit der Tangente *TK* parallel gezogene *ql* ſich um den Punkt *q* in einer mit der Ekliptik parallelen Ebene herumbewegen, und unter der Vorausſetzung einer gleichförmigen Bewegung der Erde wird der Endpunkt *l* der *ql* einen mit der Ekliptik parallelen Kreis beſchreiben, welcher, wenn der Stern im Pol der Ekliptik ſteht, dem Beobachter auch als ein Kreis unter einem ſcheinbaren Durchmeſſer von $40'',5$ erſcheinen wird, weil in eben dieſem Fall *qCl* oder $QTL = 20'',25$ wird (§. 156.).

Da alle an den ſcheinbaren Ort *s* des Sterns gezogene Geſichtslinien, wie die *Cs*, durch den Umfang dieſes Kreiſes gehen; ſo wird, wie bey einer jährlichen Parallaxe jeder Fixſtern um ſeinen wahren Ort eine Ellipſe zu beſchreiben ſcheinen, deren große mit der Ekliptik parallele Axe unter einem Winkel von $40'',5$ erſcheinen, und deren kleine Axe mit der Breite des Sterns, und zwar im Ver-

hältniß des Sinus der Breite, abnehmen, und, wenn der Stern in der Ekliptik steht, verschwinden wird. Demnach müßen alle nicht in der Ekliptik stehende Sterne übereinstimmend mit Bradley's Beobachtungen wegen der Aberration des Lichts eine Veränderung in der Breite zeigen, welche am Pol der Ekliptik auf 40″,5 steigt, für andere Sterne aber im Verhältniß des Sinus ihre Breite zu dem Sinus totus kleiner als 40″,5 ist. Aber nicht allein die Größe dieser scheinbaren Bewegungen, sondern auch das Gesetz, nach welchem sie sich richten müßen, stimmt genau mit Bradley's Beobachtungen überein. Weil nemlich die *TK* die Erdbahn berührt; so ist wegen der geringen Abweichung der Erdbahn von einem mit der Sonne concentrischen Kreis der Winkel *CTK* nahe ein rechter. Man verlängere *TC* bis an die Ekliptik nach *D*; so scheint die Sonne in *D* zu stehen, wenn die Erde in *T* ist, und es ist wegen der Parallelen *CB* und *TK* der Winkel *DCB* = *CTK* nahe gleich einem rechten Winkel, oder die Länge der Sonne ist beständig um 90 Gr größer, als die Länge des Punkts *B*. Wenn nun *B* in *A* fällt; so fällt *s* auf den Breitenkreis *AE* unterhalb *S* und die scheinbare Breite des Sterns ist um *Ss* kleiner als die wahre. Die Sonne steht alsdenn 90 Grade von *A* oder dem Stern gegen Morgen ab, und der Stern geht Morgens um 6 Uhr durch den Meridian. Fällt *B* auf *G*, so fällt *s* auf den Breitenkreis *AE* oberhalb *S*, und die scheinbare Breite ist um *Ss* größer als die wahre. Die Sonne steht jetzt 90° von *G* gegen Morgen, und daher von *A* um 90° gegen Abend ab. Mithin geht der Stern, wenn seine Breite am größten ist, Abends um 6 Uhr durch den Meridian. Im Allgemeinen sieht man, daß unter übrigens gleichen Umständen die Aberration eben so von der Lage des Punkts *B* abhängt, wie die jährliche Parallaxe von der Lage des mit eben diesem Buchstaben bezeichneten Punkts in der 48sten Figur. Dieser Punkt ist in der 48sten Figur der Ort der Sonne, in der 51sten hingegen ist die Sonne dem Punkt *B* beständig um 90 Grade voraus, woher es kommt, daß die Erscheinungen der Aberration denenjenigen, welche bey einer merklichen jährlichen

Parallaxe ſich zeigen müßten, entgegengeſetzt ſind. Demnach ſtimmt auch das aus der Theorie der Aberration gefundene Geſetz, nach welchem ſie ſich verändert, mit Bradley's Beobachtungen überein.

§. 158. Nimmt man, wie im 154. §. jede der Seiten des ſphäriſchen Dreyecks ASB (Fig. 51.) kleiner als 90 Grad, und ſetzt den Winkel, deſſen Sinus zu dem Sinus totus ſich wie die Geſchwindigkeit der Erde zu der Geſchwindigkeit des Lichts verhält, und welcher nach §. 156. für die mittlere Geſchwindigkeit der Erde 20″,25 beträgt, gleich a; ſo hat man, wie im 154. §. wenn sR auf AE ſenkrecht gezogen wird,

1.) $sR = \frac{a \text{ Sin. } AB}{\text{Sin. tot.}} = \frac{a \text{ Cos. } AD}{\text{Sin. tot.}}$

2.) $SR = \frac{a \text{ Sin. } AS \text{ Cos. } AB}{\text{Sin. tot.}^2} = \frac{a \text{ Sin. } b \text{ Sin. } AD}{\text{Sin. tot.}^2}$

woraus wiederum folgt, daß wegen der Aberration jeder nicht in der Ekliptik ſtehende Fixſtern um ſeinen wahren Ort als Mittelpunkt eine Ellipſe zu beſchreiben ſcheint, deren große Axe unter dem Winkel $2a$ erſcheint, und den durch den wahren Ort des Sterns gelegten Breitenkreis ſenkrecht durchſchneidet. Die große Axe der Aberrationsellipſe verhält ſich zu der kleinen, wie der Sinus totus zu dem Sinus der Breite des Sterns. Steht der Stern in der Ekliptik; ſo geht die Ellipſe in eine gerade Linie über, und die Aberration der Breite verſchwindet.

Es iſt $\text{Cos. } AD = \text{Cos. } (VD - VA) = \text{Cos. } (VA - VD)$

$\text{Sin. } AD = \text{Sin. } (VD - VA) = -\text{Sin. } (VA - VD)$;

alſo, wenn man die Bezeichnungen des 154. §. beybehält, und den Sinus totus $= 1$ ſetzt,

3.) $sR = a \text{ Cos. } (l - \odot)$

4.) $SR = -a \text{ Sin. } b \text{ Sin. } (l - \odot)$

Man ſetze diejenigen Abſtände vom Breitenkreis und dem durch ihn in dem wahren Ort des Sterns gezogenen Perpendikel, welche wegen der jährlichen Parallaxe und der Aberration zugleich Statt finden würden, ſeyen sR' und SR' Fig. 49. b; ſo wird man haben

$sR' = a \text{ Cos. } (l - \odot) + p \text{ Sin. } (l - \odot)$

$SR' = -a \text{ Sin. } b \text{ Sin. } (l - \odot) + p \text{ Sin. } b \text{ Cos. } (l - \odot)$

Man ſetze $\frac{p}{a} = \text{Tg. } z$; ſo wird $\frac{a}{\text{Cos. } z} = a \text{ Sec. } z = \sqrt{a^2 + p^2}$,

und $sR' = \sqrt{a^2 + p^2} (\text{Cos. } (l - \odot) \text{ Cos. } z + \text{Sin. } (l - \odot) \text{ Sin. } z)$

$SR' = -\text{Sin. } b\sqrt{a^2+p^2}\,(\text{Sin.}(l-\odot)\,\text{Cos. } z - \text{Cos.}(l-\odot)\,\text{Sin. } z)$,

oder 5.) $sR' = \sqrt{a^2+p^2}\,\text{Cos.}(l-\odot-z)$

6.) $SR' = -\text{Sin. } b\sqrt{a^2+b^2}\,\text{Sin.}(l-\odot-z)$.

Hieraus folgt auf ähnliche Art, wie in §. 154. daß die scheinbare Bahn eines Sterns um seinen wahren Ort wegen der jährlichen Parallaxe und Aberration zugleich wiederum eine Ellipse ist, deren große Axe zur kleinen wie der Sinus totus zu dem Sinus der Breite des Sterns sich verhält, und auf dem durch den wahren Ort des Sterns gelegten Breitenkreis senkrecht steht. Die Veränderungen der Breite und Länge werden größer, und richten sich nach der Länge eines Punkts, der in der Ekliptik beständig um den Winkel z der Sonne voraus ist. Wegen der genauen Uebereinstimmung der Bradleyschen Beobachtungen mit der Theorie der Aberration allein, kann der Winkel z nur wenige Grade betragen, und die jährliche Parallaxe der Fixsterne muß beträchtlich kleiner als 20 Sekunden seyn.

§. 159. Durch die Bradleysche Entdeckung der Aberration wurde zwar die Bewegung der Erde um die Sonne bestätigt, aber die Entfernung der Fixsterne blieb wegen der Kleinheit ihrer jährlichen Parallaxe unbestimmt. Man konnte nur die Gränzen angeben, ausserhalb welcher die Fixsterne nothwendig sich befinden müssen, weil sie innerhalb dieser Gränzen eine Parallaxe zeigen müßten, welche nicht unbemerkt bleiben könnte. Bradley behauptete, daß die Parallaxe der von ihm zu ihrer Bestimmung beobachteten Fixsterne nicht zwey Sekunden betragen könne. Folglich müssen diese Fixsterne um mehr als 103132 Halbmesser der Erdbahn von der Erde und der Sonne entfernt seyn. Indessen leitete Maskelyne aus den von La Caille auf dem Vorgebürg der guten Hoffnung beobachteten Zenithdistanzen des Sirius, welche unter dieser Breite nur $17\frac{1}{2}$ Gr. betragen, und daher den Anomalien der Refraktion nicht unterworfen sind, eine jährliche Parallaxe desselben von 4 Sekunden her. In den neuern Zeiten haben sich Piazzi in Palermo und Calandrelli in Rom mit der Untersuchung der jährlichen Parallaxe der Fixsterne beschäftigt *). Ersterer setzt die Parallaxe des Sirius auf 4, des Procyon

auf

*) Monatl. Corresp. Nov. 1808. pag. 401. Jan. 1809. pag. 38.

auf 3, des Aldebaran auf 1,6 Sekunden. An der Wega glaubte er eine Parallaxe von 2 Sek. bemerkt zu haben, was sich aber bey fortgesetzten Beobachtungen nicht bestätigte. Letzterer setzt die Parallaxe dieses Sterns auf 4″4. Unter diesen Sternen wäre uns also die Wega am nächsten, aber sie wäre noch immer 46878 Halbmesser der Erdbahn von uns entfernt, und ein von diesem Stern ausgehender Lichtstral würde nach §. 107. eine Zeit von 267 T. 14 St. 20 M. gebrauchen, um bis zu uns zu gelangen. Jedoch scheinen nach Bessel's Untersuchungen *) die Parallaxen der Fixsterne noch viel kleiner zu seyn, und man wird in den meisten Fällen keinen merklichen Fehler begehen, wenn man die ganze Erdbahn in Vergleichung mit der Entfernung der Fixsterne als einen Punkt betrachtet.

§. 160. Die Beobachtungen, welche Bradley zur Bestimmung der Parallaxe und Aberration der Fixsterne anstellte, leiteten ihn noch auf eine andere Entdeckung. Er bemerkte, daß zwar nach Verfluß eines Jahrs die Erscheinungen der Aberration in derselben Ordnung wiederkehrten, aber nach mehreren Jahren sich beträchtliche Unterschiede zwischen den beobachteten und den nach der Theorie der Aberration berechneten scheinbaren Abweichungen der Fixsterne zeigten, und daß diese scheinbaren Bewegungen eine Periode von etwa 18 Jahren hatten. Er fand ferner, daß diese Erscheinungen von der Lage der Mondsknoten gegen die Aequinoktialpunkte abhiengen, und der Abstand der Sterne von der Ekliptik, oder ihre Breite unverändert blieb, ihre Länge und gerade Aufsteigung aber sich ebenfalls veränderten, und der gröste Unterschied der Abweichungen in 9 Jahren auf 18″ stieg. Durch eine Menge an verschiedenen Sternen angestellte Beobachtungen wurde er endlich auf folgende Hypothese geleitet, welche alle diese Erscheinungen erklärt. Wegen des Zurückweichens der Aequinoktialpunkte (§. 37.) beschreibt erstlich der Pol des Aequators um den Pol der

*) Monatl. Corresp. Febr. 1809. pag. 183.

Ekliptik einen um die Schiefe der letztern von ihm abstehenden Parallelkreis gleichförmig von Morgen gegen Abend, so daß er jährlich 50″,1 zurücklegt, oder die Erdaxe beschreibt um eine auf der Ebene der Ekliptik senkrecht stehende Linie als Axe die Oberfläche eines geraden Kegels, dessen Winkel an der Spitze die doppelte Schiefe der Ekliptik ist. Der hienach für eine gegebene Zeit, und mittelst der diesem Zeitpunkt entsprechenden Schiefe der Ekliptik bestimmte Pol des Aequators heißt der mittlere. Es sey nun *P* (Fig. 52.) der mittlere Ort des Pols des Aequators, *E* der Pol der Ekliptik, und *EPa* der durch beyde gelegte größte Kreis oder der Kolur der Solstitien. Man denke sich eine Ebene, welche die Oberfläche der Himmelskugel in dem mittleren Ort *P* des Pols berühre, und in dieser um *P* als Mittelpunkt eine Ellipse *bdae* so beschrieben, daß ihre große unter einem Winkel von 18″ erscheinende Axe *ab* in der Ebene des Kolurus der Solstitien liege, und die kleine Axe *de* zur großen wie 8 : 9 sich verhalte. Um diese Ellipse sey ein Kreis *abq* beschrieben, und von dem der Ekliptik zunächst liegenden Endpunkt *a* der großen Axe an sey der Bogen *aq* der mittleren Länge des aufsteigenden Mondsknotens, und zwar nach derselben Richtung, nach welcher dieser sich bewegt, d. h. gegen die Ordnung der Zeichen (§. 65.), genommen; so wird ein von *q* auf die große Axe *ab* der Ellipse gefälltes Perpendickel *qr* ihrem Umfang in dem wahren Ort *p* des Pols des Aequators begegnen. Diese Bewegung des wahren Pols um den mittleren nennt man die **Nutation** oder das **Schwanken der Erdaxe**. Man hat theils durch genauere Berechnung der Bradleyschen Beobachtungen, theils durch neue Beobachtungen die große Axe der Nutationsellipse genauer bestimmt, und auf 19,26 Sekunden gesetzt. Das Axenverhältniß, über welches Bradley's Beobachtungen noch einige Ungewißheit übrig ließen, ist von d'Alembert durch die Theorie genauer bestimmt worden, nach welcher sich die große Axe zur kleinen wie der Cosinus der Schiefe der Ekliptik zu dem Cosinus der doppelten Schiefe verhalten muß. Wenn also die große Axe der

Nutationsellipse = 19,36 Sekunden ist; so ist die kleine Axe = 14,34 Sekunden *).

Wegen dieser Nutation der Erdaxe ist sowohl die Schiefe der Ekliptik als die Bewegung der Aequinoktialpunkte einer kleinen von der Länge des aufsteigenden Mondsknotens abhängenden Ungleichheit unterworfen, und man nennt auch hier die mit der jährlichen Abnahme von 0,521 Sekunden für eine gegebene Zeit berechnete Schiefe der Ekliptik ihre mittlere Schiefe, und diejenige, welche wegen der Nutation wirklich Statt findet, die wahre, oder, weil man die letztere wirklich beobachtet, auch die scheinbare Schiefe. Ferner heißt der mit der jährlichen gleichförmigen Bewegung von 50″,1 berechnete Ort des Aequinoktialpunkts der mittlere, der wegen der Nutation wirklich Statt findende Ort aber der scheinbare.

§. 161. Auch für die Umdrehung der Erde um ihre Axe hat man einen deutlichen Beweiß an der Zunahme der Schwere von dem Aequator an gegen die Pole, dessen weitere Ausführung in dem dritten Buch vorkommen wird. Richer machte im Jahr 1672 auf der Insel Cayenne nahe unter dem Aequator die Beobachtung, daß seine von Paris mitgenommene und daselbst auf mittlere Zeit regulirte sehr genaue Pendeluhr in Cayenne täglich um 2 Min. 28 Sek. zurückblieb, und ein in Cayenne seine Schwingungen in einer Sekunde machendes Pendel um $1\frac{1}{4}$ Linie kürzer war, als das Sekundenpendel in Paris. Seit dieser Zeit hat man unter sehr verschiedene Breiten die Länge des einfachen Sekundenpendels bestimmt, welche zeigen, daß die Zunahme der Pendellängen vom Aequator gegen die Pole hin sehr nahe dem Quadrat des Sinus der Breite proportional ist, und unter dem Pol auf $2\frac{1}{2}$ pariser Linien steigen würde. Es verhält sich aber die halbe Länge des einfachen Sekundenpendels zu der freyen Fallhöhe in einer Sekunde wie das

*) Schon Römer hat um das Jahr 1693 die von der Nutation herrührende scheinbare Bewegungen der Fixsterne bemerkt, und gehofft, sie aus einer Schwankung (vacillatio) des Erdpols erklären zu können. Basis Astronomiæ a P. Horrebow. Cap. X. §. 157. pag. 66.

Ekliptik einen um die Schiefe der letztern von ihm abstehenden Parallelkreis gleichförmig von Morgen gegen Abend, so daß er jährlich 50″,1 zurücklegt, oder die Erdaxe beschreibt um eine auf der Ebene der Ekliptik senkrecht stehende Linie als Axe die Oberfläche eines geraden Kegels, dessen Winkel an der Spitze die doppelte Schiefe der Ekliptik ist. Der hienach für eine gegebene Zeit, und mittelst der diesem Zeitpunkt entsprechenden Schiefe der Ekliptik bestimmte Pol des Aequators heißt der mittlere. Es sey nun *P* (Fig. 52.) der mittlere Ort des Pols des Aequators, *E* der Pol der Ekliptik, und *EPa* der durch beyde gelegte gröste Kreis oder der Kolur der Solstitien. Man denke sich eine Ebene, welche die Oberfläche der Himmelskugel in dem mittleren Ort *P* des Pols berühre, und in dieser um *P* als Mittelpunkt eine Ellipse *bdae* so beschrieben, daß ihre große unter einem Winkel von 18″ erscheinende Axe *ab* in der Ebene des Kolurus der Solstitien liege, und die kleine Axe *de* zur großen wie 8 : 9 sich verhalte. Um diese Ellipse sey ein Kreis *abq* beschrieben, und von dem der Ekliptik zunächst liegenden Endpunkt *a* der großen Axe an sey der Bogen *aq* der mittleren Länge des aufsteigenden Mondsknotens, und zwar nach derselben Richtung, nach welcher dieser sich bewegt, d. h. gegen die Ordnung der Zeichen (§. 65.), genommen; so wird ein von *q* auf die große Axe *ab* der Ellipse gefälltes Perpendickel *qr* ihrem Umfang in dem wahren Ort *p* des Pols des Aequators begegnen. Diese Bewegung des wahren Pols um den mittleren nennt man die Nutation oder das Schwanken der Erdaxe. Man hat theils durch genauere Berechnung der Bradleyschen Beobachtungen, theils durch neue Beobachtungen die große Axe der Nutationsellipse genauer bestimmt, und auf 19,20 Sekunden gesetzt. Das Axenverhältniß, über welches Bradley's Beobachtungen noch einige Ungewißheit übrig ließen, ist von d'Alembert durch die Theorie genauer bestimmt worden, nach welcher sich die große Axe zur kleinen wie der Cosinus der Schiefe der Ekliptik zu dem Cosinus der doppelten Schiefe verhalten muß. Wenn also die große Axe der

Nutationsellipse = 19,36 Sekunden ist; so ist die kleine Axe = 14,34 Sekunden *).

Wegen dieser Nutation der Erdaxe ist sowohl die Schiefe der Ekliptik als die Bewegung der Aequinoktialpunkte einer kleinen von der Länge des aufsteigenden Mondsknotens abhängenden Ungleichheit unterworfen, und man nennt auch hier die mit der jährlichen Abnahme von 0,521 Sekunden für eine gegebene Zeit berechnete Schiefe der Ekliptik ihre mittlere Schiefe, und diejenige, welche wegen der Nutation wirklich Statt findet, die wahre, oder, weil man die letztere wirklich beobachtet, auch die scheinbare Schiefe. Ferner heißt der mit der jährlichen gleichförmigen Bewegung von 50″,1 berechnete Ort des Aequinoktialpunkts der mittlere, der wegen der Nutation wirklich Statt findende Ort aber der scheinbare.

§. 161. Auch für die Umdrehung der Erde um ihre Axe hat man einen deutlichen Beweiß an der Zunahme der Schwere von dem Aequator an gegen die Pole, dessen weitere Ausführung in dem dritten Buch vorkommen wird. Richer machte im Jahr 1672 auf der Insel Cayenne nahe unter dem Aequator die Beobachtung, daß seine von Paris mitgenommene und daselbst auf mittlere Zeit regulirte sehr genaue Pendeluhr in Cayenne täglich um 2 Min. 28 Sek. zurückblieb, und ein in Cayenne seine Schwingungen in einer Sekunde machendes Pendel um $1\frac{1}{4}$ Linie kürzer war, als das Sekundenpendel in Paris. Seit dieser Zeit hat man unter sehr verschiedene Breiten die Länge des einfachen Sekundenpendels bestimmt, welche zeigen, daß die Zunahme der Pendellängen vom Aequator gegen die Pole hin sehr nahe dem Quadrat des Sinus der Breite proportional ist, und unter dem Pol auf $2\frac{1}{2}$ pariser Linien steigen würde. Es verhält sich aber die halbe Länge des einfachen Sekundenpendels zu der freyen Fallhöhe in einer Sekunde wie das

*) Schon Römer hat um das Jahr 1693 die von der Nutation herrührende scheinbare Bewegungen der Fixsterne bemerkt, und gehofft, sie aus einer Schwankung (vacillatio) des Erdpols erklären zu können. Basis Astronomiæ a P. Horrebow. Cap. X. §. 157. pag. 60.

Quadrat des Durchmessers eines Kreises zu dem Quadrat seines Umfangse Folglich nimmt die freye Fallhöhe in einer Sekunde, und daher auch die Schwere der auf der Erdoberfläche befindlichen Körper von dem Aequator gegen die Pole hin zu. Aus mechanischen Gründen entsteht aber durch die Axendrehung der Erde in allen auf ihr sich befindenden Körpern ein Schwung, der sie von dem Mittelpunkt des Kreises, welchen sie beschreiben, zu entfernen strebt, und wegen der gleichen Umlaufszeiten desto kleiner ist, je kleiner der Halbmesser dieses Kreises ist. Unter dem Aequator muß daher die Schwungkraft am gröſten seyn, und zugleich wirkt sie der Richtung der Schwere gerade entgegen; folglich ist daselbst die Verminderung der Schwere am gröſten. Von dem Aequator gegen die Pole hin ist diese Verminderung aus einem doppelten Grund geringer, einmal nemlich, weil die Halbmesser der Parallelkreise des Aequators kleiner werden, sodenn weil die Schwungkraft, deren Richtung in die Ebene der Parallelkreise fällt, nun schief gegen die Richtung der Schwere wirkt. Hieraus ergiebt sich das oben angegebene mit den Beobachtungen nahe übereinstimmende Gesetz der Zunahme der Schwere vom Aequator an gegen die Pole. Es zeigen sich freylich auch hier, wie bey den Gradmeßungen kleine Irregularitäten, welche beweisen, daß die Erde weder ein gleichförmig dichter, noch ein geometrisch regulärer Körper ist.

§. 162. Gegen die Umdrehung der Erde um ihre Axe hat man unter andern auch die Einwendung gemacht, daß ein frey von einer beträchtlichen Höhe herab fallender Körper nicht an dem senkrecht unter seinem anfänglichen Ort im Augenblick des Anfangs des Falls befindlichen Punkt die Oberfläche der Erde treffen könne, wenn sie sich um ihre Axe drehe, weil während der Fallzeit jener Punkt weit gegen Osten sich bewege, so daß der Körper westlich von demselben niederfallen sollte. Allein der Körper hat mit den übrigen auf der Erde befindlichen, schon vor dem Fall die von der Axendrehung der Erde herrührende Bewegung gemein, und setzt diese während des Falls fort, so daß er

mit dem Punkt der Erdoberfläche, welchem er vor dem Anfang seines Falls entsprach, zugleich gegen Morgen fortrückt. Genau genommen hat übrigens der Körper in einer beträchtlichen Höhe eine größere Geschwindigkeit, als der senkrecht unter ihm befindliche Punkt der Erdoberfläche, und zwar in demselben Verhältniß, in welchem das von ihm auf die Erdaxe gefällte Perpendickel größer ist, als dasjenige, welche von dem correspondirenden Punkt der Erdoberfläche auf die Erdaxe gefällt wird. Daher muß der Körper vielmehr etwas weniges östlicher fallen, als wenn die Erde sich nicht um ihre Axe drehte. Guglielmini *) und Benzenberg **) haben hierüber genaue Versuche angestellt. Ersterer fand bey einer Fallhöhe von 241 par. Fuß eine Abweichung gegen Osten von 8,375 Lin., gegen Süden 5.272 Lin. letzterer bey einer Fallhöhe von 235 p. F. eine östliche Abweichung von 3,99 Lin. und eine südliche von 1,5 Lin. Nach der Theorie sollte, wenn der Widerstand der Luft bey Seite gesetzt wird, die östliche Abweichung = 4,8 Lin. bey einer Fallhöhe von 241 Fuß, und = 3,95 Lin. für die Fallhöhe von 235 Fuß, die südliche Abweichung hingegen unmerklich seyn. Wird ein Körper vertikal aufwarts geworfen; so kann gezeigt werden, daß er nun westlich von dem Punkt, an welchem der Wurf geschah, niederfallen muß. La Place findet die westliche Abweichung = 128,9$^{mèt.}$ (396,8 par. Fuß), wenn der Körper mit einer Geschwindigkeit von 500$^{mèt.}$ (1539,2 p. F.) senkrecht in die Höhe geworfen, und der Widerstand der Luft bey Seite gesetzt wird ***). Es ist sehr schwer, diese Versuche mit Genauigkeit anzustellen.

*) J. B. *Guglielmini* de diurno terræ motu experimentis physico-mathematicis confirmato opusculum. Bononiæ 1792.

**) Benzenberg Versuche über die Umdrehung der Erde. Dortmund 1804.

***) Mécanique céleste. T. IV. pag. 304. 305.

Drittes Capitel.

Von den Gesetzen der Bewegung der Planeten um die Sonne, und der Gestalt ihrer Bahnen.

§. 163. Wir haben in dem fünften Capitel des ersten Buchs gesehen, daß die Bewegungen der Planeten aus dem Mittelpunkt der Sonne betrachtet eben so einfach, als die scheinbare Bewegung der Sonne erscheinen würden, wenn man die Erde um die Sonne sich bewegen läßt. Da nun die wirkliche Bewegung der Erde um die Sonne es ist, welche den scheinbaren Lauf der Planeten so verwickelt macht; so wird man, um die Gesetze ihrer Bewegung um die Sonne zu entdecken, aus den beobachteten scheinbaren Bewegungen der Planeten diejenigen abzuleiten suchen müßen, welche man in dem Mittelpunkt der Sonne wahrgenommen haben würde. Hiezu wird aber erfordert, daß der Beobachter für jede gegebene Zeit die Lage seines Standpunkts gegen den Mittelpunkt der Sonne, das ist, den Ort der Erde anzugeben im Stande sey. Nun ist die Bahn der Erde um die Sonne der scheinbaren Bahn der Sonne um die Erde gleich und ähnlich, und man findet immer aus der scheinbaren Länge der ersteren die gleichzeitige heliocentrische Länge der Erde, wenn man 180° zu der Sonnenlänge addirt. Folglich wird es zuerst darauf ankommen, die scheinbare Bahn der Sonne um die Erde genauer zu bestimmen, und nicht allein das Gesetz ausfindig zu machen, nach welchem die beschriebenen Winkel von der Zeit abhängen, sondern auch die Figur dieser Bahn auszumitteln, weil zu gewärtigem Zweck auch die Entfernungen der Erde von der Sonne, oder wenigstens ihre Verhältniße zu einander, bekannt seyn müssen.

§. 164. Aus den im dritten Capitel des ersten Buchs über die scheinbare Bahn der Sonne angestellten Untersuchungen ist bekannt, daß alle Punkte dieser Bahn in einer durch den Mittelpunkt der Erde gelegten Ebene liegen; folglich liegen auch alle Punkte der Bahn der Erde um die Son-

ne in einer durch den Mittelpunkt der leztern gelegten Ebene. Wir kennen ferner die Umlaufszeit der Sonne, mithin auch die Umlaufszeit der Erde um die Sonne, und aus dem 40ſten §. die Veränderungen der Winkelgeſchwindigkeit der ſcheinbaren jährlichen Bewegung der Sonne, woraus folgt, daß die Erde in gleichen Zeiten ungleiche Winkel um die Sonne beſchreibt, und die Winkelgeſchwindigkeiten von demjenigen Punkt an, in welchem ſie der Sonne am nächſten iſt, beſtändig bis zu dem gerade gegenüberliegenden Punkt, in welchem ſie ihre gröſte Entfernung von der Sonne erreicht, abnehmen, von dieſem Punkt an aber wieder eben ſo wachſen, wie ſie vorher abgenommen hatten. Nehmen wir nun an, *NAn Mm* (Fig. 53.) ſey die Bahn eines Planeten um die Sonne *S*, deſſen Umlaufszeit man kennt, *P* die Sonnennähe (Perihelium) *A* die Sonnenferne (Aphelium), welche ſo beſchaffen ſey, daß *A*, *S* und *P* in einer geraden Linie (der Apſidenlinie §. 40.) liegen, und von dem Planeten mit einer vom Perihelium *P* an beſtändig bis zum Aphelium *A* abnehmenden, auf der anderen Seite aber bis zum Perihelium wieder eben ſo wachſenden Winkelgeſchwindigkeit beſchrieben werde; ſo werden ſich die Verzögerungen auf der einen Seite der Apſidenlinie gegen die Beſchleunigungen auf der anderen Seite aufheben, und die Zeit von *P* bis *A* wird der Zeit von *A* bis *P*, demnach jede der halben Umlaufszeit gleich, mithin gegeben ſeyn. Es ſeyen *M* und *N* zwey einander gegenüberliegende Orte des Planeten, *M* in der Nähe des Periheliums *P*, und vor dem Durchgang durch daſſelbe, *N* in der Nähe des Aphelíums *A*; ſo wird vermöge der Vorausſetzung die Winkelgeſchwindigkeit von *M* bis *P* größer als die Winkelgeſchwindigkeit von *N* bis *A*, und daher die Zeit, in welcher der Winkel *PSM* beſchrieben wird, kleiner als die Zeit ſeyn, welche der Planet zu der Beſchreibung des Winkels *NSA* gebraucht. Man addire zu jeder dieſer Zeiten die Zeit, welche der Planet gebraucht, um von *P* nach *N* bey ſeiner Bewegung nach der Richtung *PmN* zu kommen; ſo wird die erſte dieſer Summen kleiner als die zweyte, und daher die Zeit welche der Planet gebraucht, um von *M* an den gegen-

überliegenden Punkt N seiner Bahn zu kommen kleiner als die halbe Umlaufszeit seyn, wenn er in der Zwischenzeit durch das Perihelium gegangen ist. Man nehme nun den Punkt m nach dem Durchgang durch das Perihelium, und den ihm gegenüberliegenden Punkt n; so wird die Zeit von A bis n größer als die Zeit von P bis m, und, wenn man beyderseits die Zeit von m bis A addirt, die Zeit, welche der Planet gebraucht, um von einem Punkt seiner Bahn an den gegenüberliegenden zu kommen, größer als die halbe Umlaufszeit seyn, wenn er in der Zwischenzeit durch das Aphelium A gegangen ist.

§. 165. Hienach kann man durch eine Reihe von Beobachtungen der Sonne die Lage der Apsidenlinie ihrer scheinbaren Bahn um die Erde, mithin auch die Lage der Apsidenlinie der Erdbahn, und die Durchgangszeit der Sonne oder der Erde durch dieselbe finden. Man sucht unter den beobachteten Sonnenlängen diejenige aus, welche nahe um 180 Gr. von einander verschieden sind. Die Beobachtungen geben die tägliche Veränderung der Länge, welche man in kleinen Zwischenzeiten nahe der Zeit proportional finden wird. Man wird also die Zeit berechnen können, da die Länge der Sonne genau um 180 Gr. von einer vorgegebenen verschieden war, und dadurch die Zeit finden, welche die Sonne bey ihrem scheinbaren Umlauf gebrauchte, um 180° zurückzulegen. Ist diese Zeit größer als die halbe Umlaufszeit der Sonne; so ist sie schon durch das Perigäum, oder eigentlich die Erde durch das Perihelium gegangen. Man vergleiche auf ähnliche Art zwey frühere Beobachtungen miteinander, bis man eine Zwischenzeit findet, welche kleiner als die halbe Umlaufszeit ist; so wird der Durchgang der Sonne durch das Perigäum zwischen zwey gegebene Paare von Beobachtungen fallen, und man wird die Durchgangszeit selbst auf folgende Art finden können. Heißen die Zeiten, in welchen die gleichen Winkel PSM, ASN beschrieben werden, t und t'; so ist die halbe Umlaufszeit = Zeit durch $PmN + t'$, und die Zeit durch MPN = der Zeit durch $PmN + t$. Mithin ist $t' - t$ dem Ueber-

schuß der halben Umlaufszeit über die Zeit durch *MPN* gleich, und daher gegeben. Vermöge der Beobachtungen verändern sich aber die täglichen scheinbaren Bewegungen v, v' der Sonne um die Punkte der Erdnähe P und der Erdferne A herum nicht merklich, und man wird daher sehr nahe setzen können

1.) $v : PSM = 1$ Tag : Zeit t

2.) $\left.\begin{matrix} ASN \\ PSM \end{matrix}\right\} : v' =$ Zeit $t' : 1$ Tag :

folglich $v : v' = t' : t$

und 3.) $v - v' : \left\{\begin{matrix} v' \\ v \end{matrix}\right\} = t' - t : \left\{\begin{matrix} t \\ t' \end{matrix}\right\}$

Aus den Beobachtungen hat man $v = 1^\circ\ 1'\ 10'',3$, $v' = 0^\circ\ 57'\ 11'',4$ (§. 40.), und $t' - t$ kann ebenfalls durch die Beobachtungen gefunden werden: folglich kann man t oder t' berechnen, und dadurch die Zeit des Durchgangs durch den Punkt P der Erdnähe oder den Punkt A der Erdferne finden. Mittelst der Zeit t findet man sodenn durch die erste Proportion den Winkel PSM, oder mittelst t' und der zweyten Proportion den Winkel ASN, und dadurch die Lage der Apsidenlinie AP.

Durch die Vergleichung weit von einander entfernter Beobachtungen hat man gefunden, daß die Apsidenlinie der Erdbahn eine langsame vorwarts gehende Bewegung hat, welche in 100 Jahren $1^\circ\ 43'\ 11''$ in Beziehung auf die Aequinoktialpunkte, mithin (§. 37.) $19'\ 41''$ in Beziehung auf die Fixsterne beträgt. Bewegt sich nun die Apsidenlinie; so wird die auf diese beziehende Umlaufszeit eines Planeten, nach deren Verfluß die Ungleichheiten seiner Bewegung in derselben Ordnung wiederkehren, und welche daher die anomalistische Umlaufszeit heißt, von seiner tropischen oder siderischen Umlaufszeit verschieden seyn. Bey der Sonne oder der Erde macht der Unterschied zwischen der anomalistischen und tropischen Umlaufszeit $25'\ 7'',5$ aus, und daher ist die erstere $= 365$ Tag 6 St. 13′ 59″,1. Man muß nun, um dieser Bewegung der Apsidenlinie bey der Bestimmung ihrer Lage Rechnung zu tragen, fürs erste, statt die Zeit zu suchen, welche ein Planet gebraucht, um an den gegenüber-

liegenden Punkt seiner Bahn zu kommen, diejenige Zeit suchen, welche er gebraucht, um 180° und noch den in der Zwischenzeit von der Apsidenlinie beschriebenen Winkel zurückzulegen. Zweytens muß man statt der halben tropischen Umlaufszeit die halbe anomalistische Umlaufszeit gebrauchen, und daher durch weit von einander entfernte Beobachtungen die Bewegung der Apsidenlie, auf welche der Fehler der Berechnung so wohl als der Beobachtungen keinen großen Einfluß haben kann, vorläufig bestimmen.

Man findet z. B. unter den in Greenwich angestellten Beobachtungen folgende, wovon nach §. 40. die erste nicht weit von der Zeit der Erdnähe, die zweyte nicht weit von der Zeit der Erdferne fallen kann.

	mittl. Zeit.	Länge der Sonne
1775. d. 30. Dec.	$0^{u.}\ 2'\ 58''$	$9^{s.}\ 8°\ 43'\ 33'',8$
1776. d. 29. Jun.	$0\ 2\ 58$	$3\ 8\ 9\ 16,6$
Ueberschuß der zweyten über die erste		$= 5\ 29\ 25\ 42,8$
180 Gr. ± Beweg. der Apsidenlinie in der Zwischenzeit		$= 6\ 0\ 0\ 31,0$
	Unterschied	$= 0\ 0\ 34\ 48,2$

Die Sonne gebrauchte aber, um diesen Winkel mit ihrer täglichen scheinbaren Bewegung von $57'\ 11'',4$ in der Erdferne zu beschreiben 14 St. $36'\ 20''$; folglich kam sie am 30. Jun. um 2 Uhr 30 M. 18 S. Morgens in die Distanz 180° $0'\ 31''$ von demjenigen Ort, wo sie am 30. December des vorhergehenden Jahrs um 0 Uhr 2 M. 58 S. war. Die Zwischenzeit dieser Momente beträgt 182 Tage 14 St. 36 M. 20 S. und ist um 30 M. 39,5 S. kleiner als die halbe anomalistische Umlaufszeit. Folglich hatte die Sonne am 30 Dec. um 0 U. $2'\ 58''$ den Punkt ihrer Erdnähe noch nicht erreicht, und man findet die Zeit t, welche sie noch gebrauchte, um vollends an diesen Punkt zu kommen, durch die dritte der oben gefundenen Proportionen

$$v' - v : v' = t' - t : t$$

$238'',9 : 344'',4 = 1839'',5 : 26421''$ oder 7 St. $20'\ 21''$

In dieser Zeit hat sie mit der täglichen Bewegung 1°

1' 10",3 im Perigäo einen Winkel von 18' 42",4 beſchrieben. Die Sonne kam alſo in den Punkt der Erdnähe am 30. December 1775 um 7 Uhr 23' 19" mittlerer Zeit zu Greenwich, oder weil Greenwich 9' 20" weſtlich von der pariſer Sternwarte liegt, um 7 Uhr 32' 39" mittlerer Zeit des pariſer Meridians, und ihre Länge war in dieſem Augenblick = 9ᶻ 9° 2' 16",2 = der Länge der Erdnähe der Sonne am Ende des Jahrs 1775 *). Addirt man hiezu 180 Grade; ſo erhält man die heliocentriſche Länge des Periheliums der Erde für eben dieſen Zeitpunkt = 3ᶻ 9° 2' 16".

§. 166. Zieht man an den wahren Ort *K* (Fig. 53.) eines Planeten in ſeiner Bahn aus dem Mittelpunkt der Sonne *S* eine gerade Linie *SK*; ſo heißt dieſe der Radius vector des Planeten, und der Winkel *PSK*, welchen der Radius vector von dem Perihelium *P* an um den Mittelpunkt der Sonne beſchrieben hat, die wahre Anomalie des Planeten **), weil von dieſem Winkel die Ungleichheit der Bewegung abhängt. Der Winkel *PSk*, welchen der Planet von ſeinem Durchgang durch das Perihelium an beſchrieben haben würde, wenn er ſich beſtändig mit einer gleichförmigen Winkelgeſchwindigkeit um die Sonne bewegte, heißt die mittlere Anomalie, und der Unterſchied *KSk* der wahren und mittleren Anomalie heißt die Gleichung des Mittelpunkts (æquatio centri, prostaphæresis.). Da die mittlere Anomalie für jede gegebene Zeit mittelſt der Durchgangszeit durch das Perihelium und der Umlaufszeit des Planeten leicht gefunden werden kann, wenn man zu dieſer, zu der vom Durchgang durch das Perihelium an verfloßenen Zeit, und zu 360 Graden die vierte Proportionalzahl ſucht, und die Bewegung der Apſidenlinie in der Zwiſchenzeit davon abzieht, oder ſie dazu addirt, je nachdem ſie mit der Bewegung des Planeten einerley oder die entgegengeſetzte Richtung hat; ſo wird es jetzt noch darauf ankommen, die Gleichung des Mittelpunkts für jede gegebene mittlere Ano-

*) Nach den pag. 64. angeführten aſtronomiſchen Tafeln ſollte ſie ſeyn = 9 Z. 9° 4' 17".

**) Man rechnete ehmals die Anomalie gewöhnlich von dem Aphelium an.

malie zu finden. Weil nun in dem Perihelium und Aphelium der wahre Ort des Planeten mit seinem mittleren zusammenfällt; so muß die mittlere Anomalie bey der Bewegung von dem ersteren Punkt an anfangs kleiner als die wahre seyn, und der Unterschied zwischen beyden muß so lange wachsen, als die mittlere Winkelgeschwindigkeit kleiner als die wahre ist. Werden diese einander gleich; so wird die Gleichung des Mittelpunkts am grösten seyn. Denn so lange die wahre Winkelgeschwindigkeit größer ist als die mittlere, wird die wahre Bewegung der mittleren voreilen, und daher die Gleichung des Mittelpunkts wachsen, aber sie wird wieder abnehmen, wenn die mittlere Winkelgeschwindigkeit anfängt, der wahren vorzueilen, welches nothwendig zwischen *P* und *A* geschehen muß, weil in *A* der mittlere Ort mit dem wahren wieder zusammenfällt. Nun ist die mittlere Winkelgeschwindigkeit durch die Umlaufszeit gegeben; folglich kann man aus gegebenen heliocentrischen Längen eines Planeten diejenige heraussuchen, bey welchen die Mittelpunktsgleichung am grösten war. Es sey *K* der Ort des Planeten zu der Zeit, da seine tägliche Bewegung der mittleren täglichen Bewegung gleich, oder die Gleichung des Mittelpunkts am grösten ist. Man nehme auf der andern Seite der Apsidenlinie den Winkel *PSL* = *PSK* und *PSl* = der mittleren Anomalie *PSk*, welche der wahren *PSK* entspricht; so wird, weil vermöge der Voraussetzung die Winkelgeschwindigkeit in *L* der Winkelgeschwindigkeit in *K* wiederum gleich wird, *KSk* = *LSl* = der grösten Gleichung des Mittelpunkts, und der Ueberschuß des auf der Seite des Periheliums von dem Planeten beschriebenen Winkels *LSK* über den auf derselben Seite liegenden Winkel *lsk*, welchen er mit seiner mittleren Geschwindigkeit in derselben Zeit beschrieben haben würde, in welcher er den Bogen *LPK* seiner Bahn wirklich beschrieben hat, wird die doppelte grösste Gleichung des Mittelpunkts seyn.

§. 167. Was nun hier von der Bahn eines Planeten um die Sonne gezeigt worden ist, kann auf die scheinbare Bahn der Sonne um die Erde angewendet werden,

weil die beobachtete Länge der Sonne der um sechs Zeichen vermehrten heliocentrischen Länge der Erde gleich ist, und vermöge der Beobachtungen die Ungleichheiten der scheinbaren Bewegung der Sonne in gleichen Abständen von der Apsidenlinie dieselben sind (§. 40.). Aus der tropischen Umlaufszeit erhält man die tägliche mittlere Bewegung der Sonne = 59′ 8″,33, mittelst welcher diejenigen Sonnenlängen können ausgesucht werden, bey welchen die Mittelpunktsgleichung nahe am gröſten ist. Es wurden z. B. in Greenwich beobachtet folgende Längen der Sonne:

	mittl. Zeit.				Länge der Sonne			
1778. Sept. 30.	11 U.	49′	49″ Morg.		6 Z.	7°	22′	38″,2
Okt. 1.	11	49	30 —		6	8	21	41,6
Unterschied	23 St.	59	41		0	0	59	3,4
1779. März. 30.	0	4	30		0	9	38	21,3
— 31.	0	4	12		0	10	37	24,8
Unterschied	23 St.	59	42		0	0	59	3,5

Die Bewegung der Sonne in 24 St. mittl. Sonnenzeit betrug also vom 30. Sept. bis 1. Okt. 59′ 4″,2 und vom 30. bis 31. März 59′ 4″,3. Da diese zwey tägliche Bewegungen noch etwas kleiner als die mittlere sind, und die Sonne zwischen dem Oktober 1778 und März 1779 durch den Punkt der Erdnähe gehen muß; so wird man die zweyte Beobachtung mit der dritten verbinden müssen. Nimmt man die halbe Summe der am 30. März und am 1. Okt. beobachteten Längen; so erhält man 3 Z. 9° 0′ 16″,3, welches nahe die geocentrische Länge der Erdferne der Sonne oder die heliocentrische Länge des Periheliums der Erde ist, und folglich stehen diese zwey Sonnenörter wirklich beynahe gleich weit von der Apsidenlinie ab, wie es seyn muß. Zieht man von der am 30. März beobachteten Länge die vom 1. Oktober ab; so erhält man 6 Z. 1° 16′ 39″,7, welche die Sonne, oder vielmehr die Erde in der Zwischenzeit der zwey Beobachtungen beschrieben hat. Mit ihrer mittleren Bewegung hätte sie aber in eben dieser Zeit beschrieben 5 Z. 27° 25′ 36″,3, also 3° 51′ 3″,4 weniger, als mit der wahren Bewegung. Folglich wäre hienach die gröſte Mit-

telpunktsgleichung der Erdbahn gleich der Hälfte dieſes Unterſchieds, oder = 1° 55′ 31″,7 *).

§. 168. Hat man die Lage der Apſidenlinie und die gröſte Gleichung des Mittelpunkts einer Planetenbahn gefunden; ſo kann man leicht unterſuchen, ob ſich die Bewegung des Planeten um die Sonne durch eine gleichförmige, aber excentriſche Kreisbewegung darſtellen läßt. Es ſey *ANPM* (Fig. 54.) die gleichförmig um den Mittelpunkt *C* beſchriebene Bahn, die Sonne befinde ſich auſſerhalb des Mittelpunkts *C* in *S*, und der Durchmeſſer *ASP* gehe durch den Mittelpunkt der Sonne; ſo wird *P* das Perihelium, *A* das Aphelium ſeyn (III, 7.). Zieht man an einen beliebigen Ort *M* des Planeten die geraden Linien *CM*, *MS*; ſo wird, weil vermöge der Vorausſetzung der Planet ſich mit gleichförmiger Geſchwindigkeit in ſeiner Bahn bewegt, der Winkel *PCM* der Zeit proportional wachſen, und daher der mittleren Anomalie, der Winkel *PSM* aber der wahren Anomalie gleich ſeyn. Der Unterſchied *CMS* dieſer zwey Winkel, oder die Gleichung des Mittelpunkts wird in *P* und *A* verſchwinden, und zwiſchen *P* und *A* in den Punkten *L*, *l* am gröſten werden, wo der Radius Vektor *SL*, *Sl* auf der Apſidenlinie ſenkrecht ſteht. Denn ein um *CL* als Durchmeſſer beſchriebener Kreis geht durch *S*, weil *CSL* = *R*, und berührt die Planetenbahn in *L*. Nimmt man einen anderen Ort *N* des Planeten zwiſchen *L* und *A*; ſo ſchneidet *SN* den um *CL* beſchriebenen Kreis innerhalb der Planetenbahn in *n*. Man ziehe *CN*, *Cn*; ſo iſt *SLC* = *SnC* (III, 27.) > *SNC* (I, 16.). Eben ſo kann gezeigt werden, daß *SLC* > *SN'C*: folglich iſt die Gleichung des Mittelpunkts in dem Punkt *L* am gröſten. Da man nun die gröſte Gleichung *CLS* des Mittelpunkts kennt; ſo iſt in dem rechtwinklichten Dreyeck *CLS* das Verhältniß von *CL* : *CS* oder von *CA* : *CS* gegeben. Demnach kann man ferner für jede gegebene mittlere Anomalie *PCM* die Mittel-

*) Nach den franzöſiſchen aſtron. Tafeln iſt ſie für dieſe Zeit = 1° 55′ 32″,1, und nach von Zach's Tabul. motuum Solis (Gothæ, MDCCCIV.) = 1° 55′ 31″,8.

punktsgleichung *CMS* finden, weil man in dem Dreyeck *CMS* das Verhältniß der Seiten *CM*, *CS*, und ihren Zwischenwinkel *SCM* kennt. Endlich ist $CM = CP = \frac{1}{2}AP = \frac{AS+SP}{2}$ = der mittleren Entfernung des Planeten von der Sonne, und in dem Dreyeck *CSM* ist auch das Verhältniß von *SM* : *CM* gegeben; folglich kann man auch für jede gegebene mittlere Anomalie das Verhältniß des Radius Vektors *SM* zu der mittleren Distanz *CM* oder *CA* bestimmen. Demnach wird man unter dieser Voraussetzung für jede gegebene Zeit die wahre Länge des Planeten berechnen können, deren Vergleichung mit den Beobachtungen zeigen wird, wie weit diese Voraussetzung richtig ist.

§. 169. Nun ist die gröste Mittelpunktsgleichung der Erdbahn = 1° 55′ 32″ (§. 167.); folglich verhält sich unter der im vorhergehenden §. gemachten Voraussetzung die Excentricität *CS* zu der mittleren Distanz *CA* wie 0,033601 : 1. Hieraus findet man für die mittlere Anomalie = 45° die Gleichung des Mittelpunkts = 1° 23′ 38″, mithin die wahre Anomalie = 46° 23′ 38″. Die Beobachtungen geben 46° 22′ 55″; also 43 Sek. weniger. Bey einer mittleren Anomalie von 135° wird man den Fehler ungefähr eben so groß, in den übrigen Punkten der Bahn aber kleiner finden. Folglich giebt diese Hypothese die Länge der Erde, also auch die Länge der Sonne ziemlich nahe, und daher hat Ptolemäus, welcher so kleine Unterschiede nicht bemerken konnte, diese gleichförmige excentrische Kreisbewegung der Sonne um einen ausserhalb ihres Mittelpunkts liegenden Punkt beybehalten.

Allein es zeigen sich beträchtliche Unterschiede, wenn man die den verschiedenen Distanzen entsprechende scheinbare Halbmesser der Sonne mit den Beobachtungen vergleicht. Es verhält sich der scheinbare Halbmesser der Sonne in der Erdnähe zu ihrem scheinbaren Halbmesser in der Erdferne wie $AS : SP$ (§. 49. n. 5.) $= AC + CS : \left\{\begin{matrix} CP-CS \\ AC-CS \end{matrix}\right\}$; also in obiger Hypothese = 1,0336 : 0,9664. Mithin müßte, wenn nach §. 40. der scheinbare Sonnendurchmesser in der Erdnähe = 32′ 35″,69 ist, der scheinbare Durchmesser in der

Erdferne = 30′ 28″5 seyn, welcher vermöge der Beobachtungen 31′ 30″,93 ist. Man muß also um die Veränderungen des scheinbaren Durchmessers der Sonne mit den Beobachtungen in Uebereinstimmung zu bringen, die Excentricität vermindern. Man setze die Durchmesser der Sonne in der Erdnähe und Erdferne D und d; so wird man haben $D : d = AS : SP$ und $D+d : D-d = AS+SP : AS-SP = AP : 2CS = AC : CS$, und wenn man die §. 40. angegebene Werthe von D und d in die Proportion setzt, $AC : CS = 1 : 0{,}0168$. Demnach darf man die Excentricität nur ungefähr halb so groß nehmen, als sie aus der größten Mittelpunktsgleichung unter der im 168. §. gemachten Voraussetzung einer gleichförmigen Kreisbewegung folgt. Alsdenn wird aber die Gleichung des Mittelpunkts ebenfalls nahe auf die Hälfte ihrer vorigen Größe heruntergesetzt; folglich wird man, wenn die kreisförmige Bahn beybehalten werden soll, wenigstens annehmen müssen, daß die Bewegung im Kreise selbst ungleichförmig sey, so daß die Ungleichheiten der scheinbaren Bewegung der Sonne eine optische und eine physische Ursache zugleich haben. Eben dieses ergiebt sich auch unmittelbar aus der Vergleichung der täglichen Bewegungen der Sonne mit ihren scheinbaren Durchmessern in der Erdnähe und Erdferne. Wenn nemlich die scheinbare Sonnenbahn die Apsidenlinie rechtwinklicht durchschneidet, und die Ursache der Ungleichheiten ihrer scheinbaren Bewegung blos optisch ist; so müssen ihre tägliche Bewegungen in der Erdnähe und Erdferne umgekehrt den Distanzen, und daher direkt den scheinbaren Durchmessern der Sonne proportional seyn. Folglich müßte sich nach den im 40ten §. angegebenen täglichen Bewegungen und Durchmessern der Sonne verhalten 32′ 35″,66 zu 31′ 30″,93 wie 1° 1′ 10″,3 zu der täglichen Bewegung der Sonne in der Erdferne, und diese müßte hienach = 59′ 8″,8 seyn. Sie ist aber nur = 57′ 11″,4; mithin wird durch die größere Entfernung die tägliche scheinbare Bewegung der Sonne nur um 2′ 1″,5 vermindert, und es bleiben noch 1′ 57″,4 übrig, um welche sie noch überdiß muß vermindert werden, damit sie mit der beobachteten übereinstimme.

§. 170.

§. 170. Noch können die verſchiedenen Abſtände der Erde von der Sonne und die Excentricität der Erdbahn in der Kreishypotheſe, unabhängig von den Veränderungen des Sonnendurchmeſſers, auf folgende Art gefunden werden. Es ſey ATP (Fig. 55.) die Erdbahn um die Sonne S, AP die Apſidenlinie derſelben. Man beobachte die Oppoſition eines Planeten, z. B. des Mars, wenn er zugleich eine geringe Breite hat; ſo liegt SM nahe in der Ebene der Ekliptik, und geht durch den gleichzeitigen Ort der Erde T. Da man die Lage der Apſidenlinie ſchon kennt (§. 165.) und die Länge des Mars zur Zeit ſeiner Oppoſition durch Beobachtung gefunden wird; ſo iſt der Winkel MSP gegeben. Ferner: da man die ſideriſche Umlaufszeit des Mars kennt (§. 93.); ſo kann man die Zeiten beſtimmen, da der Mars in demſelben Punkt M ſeiner Bahn war, und für eben dieſe Zeiten die Winkel PSt, PSt', welche die an die gleichzeitigen Orte t, t' der Erde gezogene Radii Vectores St, St' mit der Apſidenlinie machen, d. i. die wahren Anomalien der Erde, vermöge des vorhergehenden wenigſtens mit einer Genauigkeit von einer Minute berechnen. Man kennt alſo die Winkel $MSt = PSt - PSM$, $MSt' = PSM - PSt'$, und durch die Beobachtungen der geocentriſchen Länge des Mars und der Länge der Sonne erhält man für eben dieſe Zeit die Winkel StM, $St'M$. Man nehme SM als gegeben an, oder ſetze dieſe Diſtanz einer beliebigen Zahl gleich; ſo kann man die Seiten St, St' der Dreyecke SMt, SMt', deren Winkel man kennt, finden. In dem Dreyeck tSt' kennt man jetzt zwey Seiten St, St' und den Zwiſchenwinkel tSt', und hieraus findet man den Winkel Stt' und die Seite tt'. Man halbire tt' in R und errichte auf ihr in dieſem Punkt ein Perpendickel RC, welches die Apſidenlinie in dem Mittelpunkt C der kreisförmig angenommenen Erdbahn ſchneiden wird (III. 1.). Zieht man durch S die Parallele SQ mit CR, und durch C die Parallele Cr mit Tt; ſo kann man in dem rechtwinklichten Dreyeck tSQ die SQ und tQ, mithin auch die $QR = tQ - tR = tQ - \frac{1}{2}tt'$, oder die ihr gleiche Cr finden. Es ſind aber auch die Winkel $ASt = 2R - PSt$ und Stt' bekannt; folglich kennt man ihre Differenz, welche dem

Winkel gleich seyn wird, unter welchem die Apsidenlinie *PA* und die Chorde *tt'*, wo nöthig verlängert, sich schneiden. Demnach kennt man in dem rechtwinklichten Dreyeck *CSr* den Winkel *SCr*, welcher dem so eben gefundenen Winkel gleich ist, und die Seite *Cr*, woraus man *CS* und *Sr*, und mittelst der oben gefundenen *SQ* die *SQ - Sr = Qr = CR* findet. Endlich hat man in dem rechtwinklichten Dreyeck *CRt* die *Ct* nach I. 47. oder die ihr gleiche *CA*; folglich, weil *CS* gefunden ist, auch das Verhältniß der Excentricität *CS* zu der mittleren Distanz *CA* der Erde von der Sonne. Zugleich hat man auch das Verhältniß des Abstands *SM* des Mars zu dem mittleren Abstand *CA* der Erde von der Sonne, so wie die Verhältniße von *St* und *St'* zu *CA* gefunden. Auf ähnliche Art kann man, wenn der Mars zum dritten, viertenmal, u. s. w. in demselben Punkt *M* seiner Bahn war, mittelst der für diesen Zeitpunkt berechneten Winkel *PSt''* u. s. w. und der beobachteten Winkel *St''M* u. s. w. das Verhältniß von *SM* : *St''*, mithin auch weil man das Verhältniß von *SM* : *CA* schon gefunden hat, das Verhältniß von *St''* : *CA* finden, und untersuchen, ob auch die übrigen Punkte der Erdbahn in den gefundenen Kreis passen.

Kepler bediente sich folgender Methode. Statt der durch die Beobachtung einer Opposition des Mars gefundenen heliocentrischen Länge desselben gebrauchte er eine aus seiner beyläufig bekannten Bahn berechnete, und bestimmte auf ähnliche Art wie vorhin drey Radios Vektores *St*, *St'*, *St''* der Erde. Durch die drey Punkte *t*, *t'*, *t''* war der Mittelpunkt *C* der als kreisförmig angenommenen Erdbahn (III. 1.); folglich auch die Excentricität *CS*, und die Apsidenlinie *AP* der Lage nach gegeben. Weil er diese schon kannte; so veränderte er die angenommene heliocentrische Länge des Mars so lange, bis die durch diese Rechnung bestimmte Lage der Apsidenlinie mit der nach §. 165. gefundenen übereinstimmte. Eine vierte Beobachtung diente zur ferneren Berichtigung.

Auch diese Berechnungen geben die Excentricität = 0,0168, oder halb so groß, als man sie unter der Voraus-

ſetzung einer gleichförmigen Kreisbewegung aus der gröſten Mittelpunktsgleichung findet.

§. 171. Es ſey nun *ALPM* (Fig. 56.) die noch immer als kreisförmig vorausgeſetzte Bahn eines Planeten um die auſſerhalb ihres Mittelpunkts *C* befindliche Sonne *S*, und *ACSP* die Apſidenlinie. Man nehme *CE* = *CS*, und laſſe den Planeten ſeinen Kreis ſo durchlaufen, daß die um den Punkt *E* beſchriebene Winkel der Zeit proportional ſeyen; ſo werden die während einer gewißen Zeit in der Nähe des Periheliums beſchriebene Bogen gröſſer ſeyn als diejenigen, welche er in eben dieſer Zeit in der Nähe des Aphelium durchlauft, und ſeine Bewegung wird aus des Kreiſes Mittelpunkt *C* geſehen ungleichförmig ſeyn. Zieht man an den wahren Ort des Planeten die *EM*, *CM*, *SM*; ſo wird ſich die Ungleichheit ſeiner Bewegung in die phyſiſche *CME* und die optiſche *CMS* zerfällen laſſen, und die ganze Gleichung des Mittelpunkts wird der Summe von beyden oder dem Winkel *SME* gleich ſeyn. In *P* und *A* wird die Gleichung des Mittelpunkts verſchwinden, und wenn die *CM* auf die Apſidenlinie *AP* ſenkrecht zu ſtehen kommt, wie in *L*, am gröſten werden. Denn es iſt das Dreyeck *SLE* gleichſchenklicht, ein um daſſelbe beſchriebener Kreis berührt die Planetenbahn in *L*, und fällt ganz innerhalb derſelben. Folglich fällt jeder von *L* verſchiedene Ort *N* des Planeten auſſerhalb des um das Dreyeck *SEL* beſchriebenen Kreiſes, und die von *E* und *S* an *N* gezogenen geraden Linien *EN*, *SN* ſchlieſſen einen Winkel *ENS* ein, welcher kleiner als der in dem Kreisabſchnitt liegende *EnS* oder *ELS* iſt. Durch die gröſte Mittelpunktsgleichung *ELS* iſt alſo wiederum das Verhältniß der Excentricität *CS* zu der mittleren Diſtanz *CL* oder *CA* gegeben, weil in dem rechtwinklichten Dreyeck *CLS* der Winkel *CLS* = der halben gröſten Gleichung des Mittelpunkts gegeben iſt. Hat man dieſe gefunden; ſo kann man leicht für jede gegebene Zeit den wahren heliocentriſchen Ort des Planeten unter dieſer Vorausſetzung berechnen. Man ſucht zuerſt die mittlere Anomalie *PEM*, indem man ſchließt: wie ſich verhält die ſide-

rische Umlaufszeit des Planeten zu der Zwischenzeit zwischen seinem nächstvorhenden Durchgang durch das Perihelium und dem vorgegebenen Zeitpunkt, so verhalten sich 360° zu einem Winkel, welchen man um die siderische Bewegung der Apsidenlinie in der Zwischenzeit zu vermindern oder zu vermehren hat, je nachdem sie mit der Bewegung des Planeten einerley oder verschiedene Richtung hat. In dem Dreyeck *CEM*, kennt man das Verhältniß von *CM* : *CE* und den Winkel *CEM*, welcher der größeren Seite *CM* gegenüber liegt, und hieraus findet sich der Winkel *CME*, oder die physische Ungleichheit. In dem Dreyeck *SCM* kennt man das Verhältniß von *CM* zu *CS* und den Zwischenwinkel *SCM* = *PEM* + *EMC*, woraus man den Winkel *SMC* oder die optische Ungleichheit erhält. Folglich hat man die Gleichung des Mittelpunkts *SME* = *SMC* + *CME* und die wahre Anomalie *PSM* = *PEM* + *SME*. Endlich kann man in dem letzteren Dreyeck *SCM* das Verhältniß von *SM* zu *MC* oder zu der mittleren Distanz *CA* des Planeten finden.

§. 172. Macht man hievon eine Anwendung auf die Erdbahn; so findet sich aus der größten Gleichung des Mittelpunkts die Excentricität *CS* = 0,010805, übereinstimmend mit derjenigen, welche aus den Sonnendurchmessern in der Erdnähe und Erdferne folgt (§. 169.). Sodenn findet sich für die mittlere Anomalie von 45 Gr. die physische Ungleichheit *CME* = 40′ 51″,00, und die optische *CMS* = 41′ 49″,35; mithin die Gleichung des Mittelpunkts = 1° 22′ 40″,35, welche nach den Beobachtungen = 1° 22′ 54″,9 seyn sollte. Der Fehler beträgt also nur noch 14″,55 bey einer mittleren Anomalie von 45 Graden. Wenn diese 135 Grade beträgt; so wird der Fehler wiederum nahe von der vorigen Größe, in den übrigen Punkten dieser Hälfte der Bahn wird er noch kleiner gefunden, und eben so verhält es sich in der andern Hälfte der Planetenbahn. Mithin ist dadurch, daß man die Kreisbewegung selbst als ungleichförmig angenommen, und die Distanzen in der Erdnähe und Erdferne mit den beobachteten Veränderungen des scheinbaren Sonnendurchmessers in Uebereinstimmung gebracht hat,

zugleich der Fehler in der Länge auf den dritten Theil seiner Größe, welche er in der Hypotheſe einer gleichförmigen Kreisbewegung hatte, heruntergebracht worden.

§ 173. Da man jetzt den ſcheinbaren Ort der Sonne in der Ekliptik und ihren Abſtand von der Erde, mithin auch den Ort der letztern in ihrer Bahn um die Sonne vermöge des vorhergehenden §. ſehr nahe für jede gegebene Zeit berechnen kann; ſo wird man den heliocentriſchen Ort eines Planeten und ſeinen Abſtand von der Sonne auf folgende Art finden können, wenn man ihn zweymal in demſelben Punkt ſeiner Bahn beobachtet hat, wozu weiter nichts, als ſeine ſideriſche Umlaufszeit als bekannt vorausgeſetzt wird, welche nach den im erſten Buch gezeigten Regeln beſtimmt werden kann. Es ſey TT' (Fig. 57.) die Bahn der Erde um die Sonne S, und die Erde ſey in T, wenn der Planet in P iſt. Man ziehe PR auf die Ebene der Erdbahn oder der Ekliptik ſenkrecht, und verbinde die Punkte S, T, P, R durch die gerade Linien ST, TP, TR, SR, SP; ſo kennt man den Winkel STR, welcher dem Unterſchied der geocentriſchen Länge des Planeten und der Länge der Sonne zur Zeit der erſten Beobachtung gleich iſt, und die geocentriſche Breite PTR des Planeten. Nach Verfluß der ſideriſchen Umlaufszeit, wo der Planet wieder in P iſt, ſey die Erde in T'. Man ziehe ST', $T'P$, $T'R$; ſo hat man wiederum aus den Beobachtungen den Winkel $ST'R$, und die geocentriſche Breite $RT'P$, welche übrigens nur bey einer der zwey Beobachtungen bekannt ſeyn darf. Ferner hat man entweder aus den Beobachtungen, oder durch Berechnung nach §. 172. die Sonnenlänge zur Zeit der erſten und zweyten Beobachtung, mithin auch ihren Unterſchied, welcher dem Winkel TST' gleich ſeyn wird, und nach eben dieſem §. kann man die Diſtanzen ST, ST' berechnen. Daher ſind in dem Viereck $STRT'$ zwey an einander liegende Seiten ST, ST' und drey Winkel gegeben, und man kann die zwey übrigen Seiten $TR, T'R$, die Diagonale SR und den Winkel TSR finden. In dem bey R rechtwinklichten Dreyeck PTR kennt man daher die Seite TR und den Winkel

PTR = der geocentrischen Breite des Planeten, woraus man das Perpendickel PR findet. Endlich sind in dem rechtwinklichten Dreyeck SPR die zwey um den rechten Winkel liegende Seiten SR, RP bekannt; folglich ist die heliocentrische Breite PSR und die Entfernung SP des Planeten von der Sonne gegeben. Der ebenfalls gefundene Winkel TSR ist der Unterschied der heliocentrischen Länge des Planeten und der Erde, und letzterer ist der um 180 Gr. vermehrten Länge der Sonne zu der Zeit, wo die Erde in T war, gleich; folglich kennt man die heliocentrische Länge und Breite des Planeten, und seinen Abstand von der Sonne.

Man sieht, daß die Auflösung der Aufgabe, die Entfernung eines Planeten zu finden, wiederum auf die Bestimmung der Entfernung eines unzugänglichen Gegenstands aus einer gegebenen Grundlinie und den an ihren Endpunkten gemeßenen Winkeln hinauslauft. Die Grundlinie ist hier die gerade Linie TT', welche die zwey Orte der Erde mit einander verbindet, und der Beobachter wird von dem einen Endpunkt der Grundlinie an den andern durch die Bewegung der Erde um die Sonne gebracht. Weil aber der Planet in der Zwischenzeit sich ebenfalls bewegt; so wartet man die Zeit ab, da er einen siderischen Umlauf gemacht hat, und wieder an den vorigen Ort zurückgekommen ist. Die Stellungen der Erde gegen den Planeten müssen so gewählt werden, daß der Winkel am Planeten nicht zu spitz ausfällt, damit kleine in der Meßung der Winkel begangene Fehler keinen zu starken Einfluß auf die berechnete Distanzen haben. Es ist klar, daß man zu diesem Ende die Zwischenzeit der Beobachtungen auch zwey oder mehreren siderischen Umläufen des Planeten gleich nehmen kann. Eben so kann man die heliocentrische Länge und Breite eines Planeten und seinen Abstand von der Sonne finden, wenn er in einem anderen Punkt seiner Bahn sich befindet.

Fällt eine der Beobachtungen in die Opposition des Planeten; so fällt der correspondirende Ort der Erde, z. B. T' in die SR, und man hat statt eines Vierecks blos Dreyeck STR aufzulösen, in welchen man ST, TR und den Zwischenwinkel kennt, woraus man SR findet, und die helio-

centrische Länge des Planeten ist unmittelbar durch die Beobachtungen gegeben.

§. 174. Wenn man nach dem vorhergehenden §. zwey mit dem Mittelpunkt der Sonne nicht in einer geraden Linie liegende Oerter eines Planeten gefunden hat; so ist die durch den Mittelpunkt der Sonne und durch die zwey letztern gelegte Ebene der Lage nach gegeben. Es seyen P, p (Fig. 58.) die zwey Planetenörter, und aus denselben die Perpendickel PR, pr auf die Ebene der Ekliptik gefällt. Aus dem Mittelpunkt S der Sonne ziehe man SP, SR, Sp, Sr. Vermöge XI, 6, und 18. liegen die Perpendickel PR, pr in einer auf der Ekliptik senkrechten Ebene, und die gemeinschaftlichen Durchschnittlinien Pp, Rr dieser Ebene mit der Ebene PSp und der Ebene RSr der Ekliptik werden sich, wenn die Perpendickel PR, pr ungleich sind, in einem Punkt N auf der Seite des kleineren Perpendickels schneiden. Man ziehe SN; so wird diese die Durchschnittslinie der Ebenen PSp und RSr seyn. Da SR, Sr und die heliocentrischen Breiten PSR, pSr, so wie der Unterschied RSr der heliocentrischen Längen gegeben sind; so kann man PR, pr, Rr und den Winkel SRr finden. Es verhält sich aber

$$PR : pr = RN : rN$$

und $PR - pr : PR = Rr : RN$;

folglich kennt man in dem Dreyeck RSN die zwey Seiten SR, RN und den Zwischenwinkel SRN, woraus man den Winkel RSN findet.

Sind aber die zwey auf die Ekliptik gefällte Perpendickel einander gleich; so begegnet die durch ihre obere Endpunkte gezogene gerade Linie der ihre Fußpunkte verbindenden Rr, mithin auch der Ebene der Ekliptik nicht, und die Rr wird der Durchschnittslinie SN der Ebene PSp und der Ebene der Ekliptik parallel, also wiederum die SN der Lage nach gegeben seyn.

Man ziehe rq auf SN senkrecht, und in der Ebene pSq die pq, welche (S. den Bew. XI, 35.) ebenfalls auf Sq senkrecht seyn wird. Daher ist pqr der Neigungswinkel der durch die zwey Punkte P, p der Planetenbahn gelegten Ebe-

ne mit der Ebene der Ekliptik. Da der Winkel rSq bekannt ist; so ist das Verhältniß von qr zu Sr gegeben. Man kennt aber auch das Verhältniß von $Sr : rp$; folglich ist in dem rechtwinklichten Dreyeck pqr das Verhältniß von $qr : rp$, und dadurch der Neigungswinkel pqr gegeben.

Um zu untersuchen, ob auch die übrigen Punkte der Planetenbahn in der gefundenen Ebene PSN liegen, sey p' ein dritter Ort des Planeten, welcher mit dem Mittelpunkt der Sonne und einem der zwey ersteren P und p nicht in einer geraden Linie liege. Man ziehe $p'r'$ auf die Ebene der Ekliptik senkrecht, und construire das Dreyeck $p'q'r'$ wie vorhin das Dreyeck pqr; so wird der Winkel $p'q'r'$ dem schon gefundenen Neigungswinkel pqr gleich und das Verhältniß von $p'r'$ zu $q'r'$ gegeben seyn. Es ist aber wegen der bekannten Winkel rSq, $r'Sr$ der Winkel $r'Sq'$, und daher das Verhältniß von $q'r' : Sr'$ gegeben. Folglich kennt man das Verhältniß von $p'r' : Sr'$, woraus man die heliocentrische Breite $Sr'p'$ findet, welche mit der nach §. 173. aus den Beobachtungen abgeleiteten übereinstimmen muß, wenn der Punkt p' der Planetenbahn mit den zwey ersteren und dem Mittelpunkt der Sonne in einer Ebene liegen soll. Man wird finden, daß die so berechnete heliocentrische Breiten der übrigen Punkte der Planetenbahn mit den aus den Beobachtungen gefundenen sehr nahe übereinstimmen, und jeder Planet sich nach diesem Gesetz um die Sonne bewegt. Demnach liegt jede Planetenbahn sehr nahe in einer durch den Mittelpunkt der Sonne gehenden Ebene.

Die Durchschnittslinie NN' der Ebene der Planetenbahn mit der Ebene der Ekliptik heißt auch hier, wie bey dem Mond die Knotenlinie, und der Punkt n in welchem sich der Planet von der Südseite der Ekliptik auf die Nordseite erhebt, der aufsteigende, der entgegengesetzte n' der niedersteigende Knoten. Die heliocentrische Länge des aufsteigenden Knotens ist der Winkel VSn, welchen die aus dem Mittelpunkt der Sonne nach dem Punkt der Frühlingsnachtgleiche und dem aufsteigenden Knoten n gezogene gerade Linien SV, Sn von Abend gegen Morgen hin einschließen.

Durch die Vergleichung weit von einander entfernter

Beobachtungen hat man gefunden, daß die Knotenlinien der Planetenbahnen sehr langsam sich in der Ekliptik rückwärts bewegen, und auch die Neigungen ihrer Bahnen kleinen Veränderungen unterworfen sind, wie man schon früher an dem Mond bemerkt hat (§. 65.), bey welchem diese Bewegungen weit beträchtlicher sind.

§. 175. Setzt man die heliocentrische Länge Υsq des aufsteigenden Knotens $= n$, den Neigungswinkel $pqr = i$, die heliocentrische Länge des Planeten $\Upsilon Sr = l$, und seine heliocentrische Breite $pSr = b$; so ist $qSr = \Upsilon Sr - \Upsilon Sq = l - n$, und es verhält sich

$$\left.\begin{array}{l} pr : Sr = \text{Tg. } b : \text{Sin. tot.} \\ Sr : rq = \text{Sin. tot.} : \text{Sin. } (l-n) \end{array}\right\}$$

folglich 1.) $\left.\begin{array}{l} pr : rq \\ \text{Tg. } i : \text{Sin. tot.} \end{array}\right\} = \text{Tg. } b : \text{Sin. } (l-n)$

Eben so findet sich für eine andere Breite B und die ihr zugehörige Länge L

2.) Tang. i : Sin. tot. $=$ Tg. B : Sin. $(L-n)$; mithin verhält sich

Tg. B : Tg. $b =$ Sin. $(L-n)$: Sin. $(l-n)$

und Tg. B - Tg. b : Tg. B + Tg. $b =$ Sin. $(L-n)$ - Sin. $(l-n)$: Sin. $(L-n)$ + Sin. $(l-n)$

oder 3.) Sin. $(B-b)$: Sin. $(B+b) =$ Tg. $\frac{1}{2}(L-l)$: Tg. $(\frac{1}{2}(L-l)-n)$

Sind B, b, L und l gegeben; so findet man durch diese Proportion die Tangente eines Winkels, welchen man um den halben Unterschied der heliocentrischen Längen vergrößern oder vermindern muß, um $L-n$ oder $l-n$ zu erhalten, wodurch die Länge n des Knotens gegeben ist. Mittelst eben dieser Winkel und der Proportion n. 2. oder 1. findet man sodenn die Neigung i der Planetenbahn gegen die Ekliptik.

Sind B und b einander gleich, und von einerley Zeichen; so wird Tg. $(\frac{1}{2}(L-l)-n)$ unendlich, und $\frac{1}{2}(L-l)-n = 90°$.

Zu der Bestimmung der Lage des Knotens ist es vortheilhaft, die Breiten klein, auf einerley Seite der Ekliptik und einander nahe gleich zu nehmen. Die Neigung der Bahn hingegen wird desto genauer gefunden, je größer die Breite ist. Man wird daher drey heliocentrische Längen und Breiten nöthig haben, um die Lage der Bahn mit Genauigkeit zu bestimmen.

Nachdem die Länge des Knotens und die Neigung der Bahn gefunden worden sind, kann man nach n. 1. die einer gegebenen heliocentrischen Länge entsprechende Breite finden, und durch ihre Vergleichung mit der nach §. 173. aus den Beobachtungen abgeleiteten untersuchen, ob auch die übrigen Punkte der Bahn in der gefundenen Ebene liegen.

§. 176. Wenn ein Planet in einem seiner Knoten sich befindet; so ist so wohl seine heliocentrische als geocentrische Breite = o. Ist er zu gleicher Zeit in Opposition oder Conjunktion mit der Sonne; so ist die Lage der Knotenlinie unmittelbar durch die Beobachtung der Länge des Planeten gegeben. Da aber diese zwey Umstände nicht leicht zusammentreffen; so kann man wenigstens eine Opposition beobachten, bey welcher die Breite des Planeten sehr klein ist, und aus der täglichen Veränderung derselben den Augenblick suchen, da die Breite = o war. Nun kennt man die Länge des Planeten in seiner Opposition, welche seiner heliocentrischen Länge gleich ist, und aus seiner Umlaufszeit seine heliocentrische mittlere Bewegung. Da nun die Zeit zwischen dem Durchgang durch den Knoten und dem Augenblick der Opposition gegeben ist; so wird man den in dieser Zwischenzeit von dem Planeten um die Sonne beschriebenen Winkel, und daher die Länge des Knotens haben, wenn die mittlere Bewegung des Planeten seiner wahren um die Zeit der Opposition gleich wäre. Diese Länge des Knoten wird aber niemals viel von der wahren abweichen können, wenn der Durchgang durch den Knoten nahe zu der Zeit der Opposition fällt, und wenn man einmal die wahre Bewegung des Planeten beynahe gefunden hat; so wird man die Ungleichförmigkeit seiner Bewegung können in Rechnung nehmen.

Diese Methode kann auch bey den unteren Planeten, wenn sie vor der Sonne vorübergehen, vortheilhaft angewendet werden, weil man alsdenn ihre Conjunktion beobachten kann, welche nahe bey den Knoten eintritt.

Um hernach die Neigung der Bahn zu finden, warte man die Zeit ab, da die scheinbare Länge der Sonne der gefundenen heliocentrischen Länge des auf- oder niedersteigenden Knotens gleich ist; so befindet sich die Erde T (Fig. 57.) in der Knotenlinie TN. Man beobachte die Breite PTR des Planeten, und den Unterschied STR der Länge des Planeten und der Sonne. Aus dem Ort des Planeten P sey ein Perpendickel PR auf die Ebene der Ekliptik gefällt, RQ auf die Knotenlinie TN senkrecht, und die PQ gezogen, welche ebenfalls auf NQ senkrecht seyn wird. Daher ist der

Winkel *PQR* die Neigung der Bahn. In dem rechtwinklichten Dreyeck *PTR* ist durch die geocentrische Breite das Verhältniß von *PR* : *RT*, und in dem rechtwinklichten Dreyeck *RTQ* durch den beobachteten Winkel *STR* dessen Nebenwinkel *RTQ* ebenfalls bekannt ist, das Verhältniß von *RT* : *RQ* gegeben. Folglich kennt man in dem rechtwinklichten Dreyeck *PRQ* das Verhältniß von *PR* : *RQ*, und daher kann der Neigungswinkel *PQR* gefunden werden. Ist der Winkel *STR* ein rechter; so ist die beobachtete Breite der Neigung der Bahn gleich. Kepler bediente sich dieser indirekten Methode.

Es verhält sich $QR : RT = \text{Sin. } STR : \text{Sin. tot.}$

$RT : PR = \text{Sin. tot.} : \text{Tg. } PTR$

folglich $QR : PR = \text{Sin. tot.} : \text{Tg. } PQR = \text{Sin. } STR : \text{Tg. } PTR$.

§. 177. Unter der Voraussetzung der Construktion des 174sten §. ist in dem bey *r* rechtwinklichten Dreyeck *pSr* durch die heliocentrische Breite das Verhältniß von *Sp* zu *Sr* gegeben. In dem bey *q* rechtwinklichten Dreyeck *Srq* ist der Winkel *qSr* = dem Unterschied der heliocentrischen Länge des Planeten und der Länge des Knoten gegeben; folglich kennt man auch das Verhältniß von *Sr* zu *Sq*. Demnach ist in dem bey *q* rechtwinklichten Dreyeck *Spq* das Verhältniß der Hypotenuse *Sp* zu der Seite *Sq*, und daher der Winkel *pSq* gegeben. Eben so findet man, wenn *P* ein anderer Ort des Planeten in seiner Bahn ist, den Winkel *ISq*. Nun können aber die Abstände *Sp*, *SP* des Planeten von der Sonne, und die heliocentrischen Längen und Breiten nach §. 173. und die Lage der Knotenlinie nach §§. 174. 175. 176. gefunden werden. Folglich sind die Radii Vectores *Sp*, *SP* u. s. w. der Größe und Lage nach gegeben. Da die Radien ungleich gefunden werden; so kann die Bahn des Planeten kein mit dem Mittelpunkt der Sonne concentrischer Kreis seyn. Man wird ferner finden, daß die um die Sonne beschriebenen Winkel nicht der zu ihrer Beschreibung gebrauchten Zeit proportional sind; mithin muß, wenn man die Bahn des Planeten als kreisförmig annimmt, die Sonne ausserhalb des Mittelpunkts derselben gesetzt werden.

Unter dieser Voraussetzung wird man die Bahn des Planeten haben, wenn man durch drey nach dem vorhin gezeigten Verfahren bestimmte Punkte der Bahn einen Kreis beschreibt. Der durch den Mittelpunkt der Sonne gezogene Durchmesser wird die Apsidenlinie, der Halbmesser des Kreises die mittlere Entfernung des Planeten von der Sonne, und der Abstand seines Mittelpunkts von der Sonne die Excentricität der Bahn seyn.

Hat man die Lage der Apsidenlinie gefunden; so suche man unter den gefundenen heliocentrischen Längen des Planeten in seiner Bahn diejenige aus, welche in der Nähe der Apsidenlinie liegen. Weil nun in kleinen Zwischenzeiten die um die Sonne beschriebenen Winkel sehr nahe der Zeit proportional sind; so wird man aus der Veränderung der Länge in einer gegebenen Zeit und aus dem Abstand des Planeten von dem Punkt des Apheliums oder Periheliums die Zeit seines Durchgangs durch einen dieser Punkte, und mittelst seiner bekannten Umlaufszeit für jeden gegebenen Zeitpunkt die mittlere Anomalie finden können (§ 166.). Die gefundenen heliocentrischen Längen des Planeten und die Lage der Apsidenlinie bestimmen die wahre Anomalie; folglich wird man die diesen Punkten der Bahn entsprechende Gleichung des Mittelpunkts haben. Berechnet man diese zuerst nach §. 168. in der Hypothese einer gleichförmigen excentrischen Kreisbewegung aus der gefundenen Excentricität; so wird die berechnete Gleichung des Mittelpunkts nur ungefähr die Hälfte der beobachteten seyn. Die Ungleichheit der Bewegung des Planeten in seiner Bahn muß also, wie bey der Bewegung der Erde um die Sonne gezeigt worden ist (§. 169.), eine optische und eine physische Ursache zugleich haben, und man wird den Punkt der Bahn, aus welchem die Winkelbewegung gleichförmig erscheint, auf dem an das Aphelium gezogene Halbmesser nahe in einem eben so großen Abstand von des Kreises Mittelpunkt nehmen müßen, als die gefundene Excentricität beträgt. Man wird also wiederum die im 170sten §. betrachtete Hypothese einer ungleichförmigen und zugleich excentrischen Kreisbewegung haben, welche schon Ptolemäus bey den Planeten, deren Bahnen,

die der Venus ausgenommen, eine gröſsere Excentricität als die Erdbahn haben, zu machen genöthigt war, um die berechneten Oerter der Planeten mit den Beobachtungen in eine genauere Uebereinſtimmung zu bringen. Nur die ſcheinbare Bahn der Sonne um die Erde ſtellte er in der Hypotheſe einer gleichförmigen excentriſchen Kreisbewegung nach §. 169 dar, weil die Beobachtungen damals noch nicht genau genug waren, um die Abweichungen der Hypotheſe von den Beobachtungen, welche wegen der kleinen Excentricität unbeträchtlich ſind, zu entdecken. Kepler zeigte zuerſt, daſs die Erdbahn hierinn keine Ausnahme mache, und die Hypotheſe des 170ſten §. auch hier müſse angewendet werden, um die Berechnungen mit den Beobachtungen in eine beſſere Uebereinſtimmung zu bringen.

§. 178. Noch ſtimmten in keiner der §. 168. und 170. betrachteten Hypotheſen über die Bewegung der Planeten die Berechnungen mit den Beobachtungen überein. Tycho und Copernikus glaubten dadurch eine gröſsere Genauigkeit zu erreichen, daſs ſie die Abſtände des Mittelpunkts der kreisförmigen Bahn von der Sonne und von dem Punkt, in welchem die Bewegung gleichförmig erſcheint, ungleich nahmen. Kepler unterſuchte alle dieſe Hypotheſen mittelſt der von Tycho angeſtellten Beobachtungen des Mars mit einer gröſseren Genauigkeit, als es vor ihm geſchehen war, und machte ſeine Entdeckungen in einem beſonderen Werk bekannt *), wodurch der Grund zu der neueren Aſtronomie gelegt wurde. Es war ein glüklicher Zufall, daſs er von Tycho eine groſse Anzahl Beobachtungen gerade des Planeten Mars erhielt, welcher zu der Beſtimmung der Erdbahn nach der §. 170. gezeigten Methode am tauglichſten iſt, und deſſen Bahn nach der Bahn des Merkurs die gröſste Excentricität hat, bey welcher die Abweichungen von der Kreishypotheſe merklich werden muſsten. Er fand, daſs durch die ungleiche Thei-

*) Astronomia nova ἀιτιολογητὸς, seu physica coelestis, tradita commentariis de motibus stellae Martis, ex observationibus *Tychonis Brahe*: jussu et sumptibus *Rudolphi* II. Romanorum imperatoris &c. plurium annorum pertinaci studio elaborata Pragae, a *S. C. M. Mathematico Joanne Keplero*. 1609.

lung der Excentricität zwar die Fehler der in den Oppositionen beobachteten Längen vermindert, die Fehler der Breiten aber vergrößert wurden, und versuchte daher die Berechnung nach der Hypothese der gleichen Theilung der Excentricität (§. 170.). Die 90° von der Apsidenlinie fallende Oppositionen zeigten einen Unterschied von nicht mehr als 2 Minuten zwischen der Rechnung und der Beobachtung, aber 45° von der Apsidenlinie stieg der Unterschied auf 8 Minuten, welcher nicht auf die Fehler der Beobachtungen geschoben werden konnte, und eben dieses war der Grund, warum Kepler seine Untersuchungen weiter fortsetzte *). Er bestimmte durch die ausserhalb der Oppositionen angestellte Beobachtungen des Mars die verschiedenen Entfernungen des Planeten von der Sonne, wobey diejenigen Fehler merklich werden mußten, welche in den Oppositionen, wo der Radius Vector nahe mit der von der Erde nach dem Planeten gezogenen geraden Linie zusammenfällt, verschwanden. Diese fanden sich auf beyden Seiten der Apsidenlinie kleiner, als nach der Berechnung in der Kreishypothese, wie man aus folgender Tafel sieht **):

	wahre Anomalie	berechnete Distanz	nach den Beobacht.
a.)	191° 10′ 28″	166605	166255
b.)	218 15 45	163883	163100
c.)	77 8 10	148539	147750

Kepler schloß hieraus, daß die Bahn des Planeten kein Kreis, sondern eine Art von Ovallinie sey ***), welche er nach seinen eigenen Ideen über die physische Ursachen dieser Abweichung des Planeten von einem Kreis zu con-

*) In dem angezeigten Werk, pag. 114. Sola igitur hæc octo minuta viam præiverunt ad totam Astronomiam reformandam.

**) Im angeführten Werk pag. 213. Kepler sagt auf eben dieser Seite: Vobiscum mihi sermo est, periti rerum Astronomicarum, qui Sophistica effugia cæteris disciplinis creberrima, in Astronomia nulli patere scitis. Vos apello. Videtis in (a) defectum a circulo parvum; in (b. c), ex utroque quidem latere, magnum admodum, quantum per observandi incertitudinem (ob quam 200 fortassis aut summum 300 particulas in dubio pono) excusare non possumus.

***) pag. 213. Itaque plane hoc est: Orbita Planetæ non est circulus, sed ingrediens ad latera utraque paulatim, iterumque ad circuli amplitudinem in perigæo exiens. cujusmodi figuram itineris *ovalem* appellitant.

ſtruiren und zu berechnen ſuchte. Nun kamen aber die Abſtände des Planeten von der Sonne auf beyden Seiten der Apſidenlinie kleiner heraus, als ſie David Fabricius, welchem Kepler dieſe neue Hypotheſe mitgetheilt hatte, durch Beobachtungen fand, und ſie mußte daher verworfen werden *). Nach vielen vergeblichen Verſuchen verfiel endlich Kepler auf die Ellipſe, deren Mittelpunkt nun an die Stelle des Mittelpunkts der vorher angenommenen kreisförmigen Bahn kam, und deren einen Brennpunkt er in den Mittelpunkt der Sonne, den anderen Brennpunkt aber in denjenigen Punkt ſetzte, um welchen er die Bewegung gleichförmig angenommen hatte, ſo daß ihre große Axe die Apſidenlinie wurde. Die Beoachtungen ſtimmten jetzt genau mit den Berechnungen überein, und die wahre Bahn des Mars mußte eine Ellipſe ſeyn, in deren einem Brennpunkt die Sonne iſt.

Kepler wandte nun dieſe bey dem Mars durch eine Menge von Beobachtungen beſtätigte Theorie auch auf die übrigen Planeten an, und fand ſie auch hier mit den Beobachtungen übereinſtimmend, woraus ſich das erſte keplerſche Geſetz ergiebt: Die Bahnen der Planeten ſind Ellipſen, in deren einem Brennpunkt die Sonne iſt.

§. 179. Nun fragt es ſich aber, nach welchem Geſetz

*) pag. 246. Dum in hunc modum de Martis motibus triumpho, eique ut plane devicto, Tabularum carceres, et æquationum eccentri compedes necto, diversis nuciatur locis, futilem victoriam, et bellum tota mole recrudescere. Nam domi quidem hostis, ut captivus, contemptus, rupit omnia æquationum vincula, carceresque tabularum effregit. Nulla enim methodus ex præscripto opinionis cap. XLV. (De causis naturalibus deflexionis planetæ a circulo) administrata Geometrice, vicariam hypothesin (die ungleiche Theilung der Excentricität) capitis XVI. (quæ veras habet æquationes ex falsa causa manantes) propinquitate numerorum potuit æmulari. Foris vero speculatores per totum eccentri circuitum dispositi, distantiæ inquam genuinæ, profligarunt meas causarum Physicarum ex cap. XLV accersitas copias, earumque jugum excusserunt, resumpta libertate. Jamque parum abfuit, quin hostis fugitivus sese cum rebellibus suis conjungeret, meque in desperationem adigeret: nisi raptim nova rationum Physicarum subsidia, fusis et palantibus veteribus, submisissem; et qua sese captivus proripuisset, omni diligentia edoctus, vestigiis ipsis nulla mora interposita inhæssissem. Ferner pag. 266. Itaque causæ physicæ cap. XLV. in famos abeunt.

Verhältniße ihrer Quadrate, Würfel u. ſ. w. mit den Verhältnißen gewißer Potenzen der Umlaufszeiten zu vergleichen, und unter dieſen verglich er auch die Quadrate der Umlaufszeiten mit den Würfeln der mittleren Entfernungen, aber ein Rechnungsfehler machte, daß er die Gleichheit der Verhältniße der Quadrate der Umlaufszeiten und der Würfel der mittleren Entfernungen dießmal nicht bemerken konnte. Am 15. May deſſelben Jahrs kam er wieder darauf, und fand eine ſo genaue Uebereinſtimmung der letzteren Verhältniße, daß er anfangs glaubte, das Geſuchte ſchon vorausgeſetzt haben *). Nach dieſem dritten keplerischen Geſetz verhalten ſich die Quadrate der ſideriſchen Umlaufszeiten der Planeten wie die Würfel ihrer mittleren Entfernungen von der Sonne, oder wie die Würfel der halben großen Axen ihrer elliptiſchen Bahnen.

Es verhält ſich z. B. die mittlere Entfernung der Erde von der Sonne zu der mittleren Entfernung des Jupiters von der Sonne nahe = 1 : 5,2, und das Verhältniß der Würfel dieſer Zahlen iſt wie 1 : 140,61. Ihre Umlaufszeiten verhalten ſich nahe wie 1 : 11,86, und die Quadrate derſelben wie 1 : 140,66. Alſo verhalten ſich hier wirklich die Quadrate der Umlaufszeiten ſehr nahe wie die Würfel der mittleren Entfernungen. Die Abweichungen werden noch geringer, wenn man die genaueren Angaben der Umlaufszeiten und Entfernungen ſtatt obiger genäherten Zahlen gebraucht, und zugleich auf eine kleine Modification dieſes Geſetzes Rückſicht nimmt, welche von dem Verhältniß der Maſſe der Planeten zu der Maſſe der Sonne abhängt, wie in dem dritten Buch wird gezeigt werden.

*) Inventis veris Orbium intervallis, per observationes Brahei, plurimi temporis labore continuo; tandem, tandem genuina proportio Temporum periodicorum ad proportionem Orbium

— sera quidem respexit inertem,
Respexit tamen et longo post tempore venit;

eaque si temporis articulos petis, 8. Mart. 1618 animo concepta, sed infœliciter ad calculos vocata, eòque pro falsâ rejecta, denique 15 Maji reversa, novo capto impetu, expugnavit mentis meæ tenebras; tanta comprobatione et laboris mei septendecennalis in observationibus Braheanis, et meditationis hujus, in unum conspirantium, ut somniare me et præsumere quæsitum inter principia primo crederem (Harmonices Mundi libr. V. Lincii Austriæ. 1619. pag. 189.)

aus *MS* und *Mr*, oder der doppelte Kreisausschnitt *PSq* dem doppelten Kreisausschnitt *MSr* gleich. Die in gleichen Zeiten beschriebenen Kreisausschnitte sind daher desto genauer einander gleich, je kleiner ihre Winkel, oder je kleiner in Vergleichung mit der Umlaufszeit des Planeten die Zeiten sind, in welchen sie beschrieben werden. Mit der Verminderung der Winkel nähern sich aber die Kreisausschnitte den ihnen entsprechenden elliptischen Ausschnitten *P m*, *MSN* der Ellipse, und es wird sich die Summe aller in gleichen Zeiten beschriebenen elliptischen Ausschnitte der ganzen Ellipse, oder ihr Flächeninhalt, zu der Summe der in den Ausschnitt *PSM* fallenden, oder zu dem Ausschnitt *PSM*, verhalten, wie sich die Summe der zur Beschreibung der erstern erforderlichen Zeiten, oder die Umlaufszeit des Planeten, zu der Summe der Zeiten, welche auf die Beschreibung der letzteren verwendet wurden, oder zu der Zeit verhält, welche der Planet gebrauchte, um den Ausschnitt *PSM* zu beschreiben. Kepler entdeckte dieses Gesetz, daß nemlich die elliptischen Sectoren, welche die Radii Vectores der Planeten um die Sonne beschreiben, den Zeiten proportional sind, in welchen sie beschrieben werden, zugleich mit dem ersten, und man nennt es gewöhnlich das zweyte keplerische Gesetz, welches sich durch seine genaue Uebereinstimmung mit den Beobachtungen bestätigt hat.

§. 180. Nachdem Kepler die wahre Gestalt der Planetenbahnen, und das Gesetz, nach welchem sie beschrieben werden, gefunden hatte; so fieng er an, auch die verschiedenen Bahnen der Planeten mit einander zu vergleichen. Ptolemäus hatte die Planetenbahnen desto größer angenommen, je größer die Umlaufszeiten waren, ihre Verhältniße zu einander aber unbestimmt gelassen. Diese Voraussetzung fand sich bestätigt, aber man konnte leicht bemerken, daß die Umlaufszeiten in einem größeren Verhältniß wachsen, als die Entfernungen von der Sonne. Jupiter z. B. steht 5,2 mal weiter von der Sonne ab, als die Erde, und gebraucht zu seinem Umlauf um die Sonne 11 $\frac{2}{3}$ mal so viel Zeit (§. 102.). Am 8. März 1618 kam Kepler auf den Einfall, statt der Verhältniße der Entfernungen selbst die

großen Axe, mithin auch ihr Mittelpunkt C, und der andere Brennpunkt F gegeben, und die Ellipse kann beschrieben werden.

Hieraus ergiebt sich folgende Construktion. Wenn zwey Radii Vectores einander gleich sind; so bestimmt die durch den Brennpunkt gezogene gerade Linie, welche ihren Zwischenwinkel halbirt, die Lage der großen Axe. Sind alle drey ungleich; so schneide man von den größeren SM', SM'' die Sm, Sm' dem kleinsten SM gleich ab, ziehe Mm, Mm', und mit diesen durch den Brennpunkt S die Parallelen SK, SK', welche den Chorden MM', MM'' beziehungsweise in K, K' begegnen werden. Durch K und K' ziehe man eine gerade Linie LH von unbestimmter Länge, und durch den Brennpunkt S eine gerade Linie GN auf LH senkrecht. Durch einen der gegebenen Punkte M der Ellipse ziehe man die MQ mit GN parallel, verlängere die SM beyderseits so, daß $Mg = Mh = MQ$, ziehe ferner Gg, Gh, und mit diesen durch M die Parallelen MP, MA, welche die GN in P und A schneiden werden. Man halbire AP in C, nehme $CF = CS$, und beschreibe mit der großen Axe AP um die Brennpunkte S und F eine Ellipse, welche durch die gegebene Punkte M, M', M'' gehen wird. Denn es verhält sich

$$\begin{aligned} GA : AS &= Mh : MS \\ &= Mg : MS \\ &= GP : PS \end{aligned}$$

$$\text{und } \left\{\begin{matrix} GA+GP \\ 2GC \end{matrix}\right\} : \left\{\begin{matrix} GA-GP \\ 2CP \end{matrix}\right\} = \left\{\begin{matrix} AS+PS \\ 2CP \end{matrix}\right\} : \left\{\begin{matrix} AS-PS \\ 2CS \end{matrix}\right\}$$

$$GC : CP = CP : CS;$$

folglich ist LH die Directrix dieser Ellipse.

Ferner folgt aus obiger Proportion

$$\left\{\begin{matrix} GA-GP : AS-PS \\ 2CP : 2CS \end{matrix}\right\} = GP : PS$$

$$= Mg : MS$$
$$= MQ : MS,$$

und daher geht die Ellipse durch M. Endlich ist

$$SM' : \left\{\begin{matrix} Sm \\ SM \end{matrix}\right\} = M'K : MK$$

$$= M'Q' : MQ$$

$$SM' : M'Q' = SM : MQ$$
$$= CS : CP.$$

Daher geht die Ellipſe auch durch den Punkt M', und eben ſo wird der Beweiß für den Punkt M'' geführt.

Demnach kann, wenn drey heliocentriſche Längen und Breiten eines Planeten ſammt ſeinen Abſtänden von der Sonne gegeben ſind, ſeine elliptiſche Bahn beynahe eben ſo leicht gefunden werden, als der excentriſche Kreis.

§. 182. Dieſe Conſtruktion kann nun auf folgende Art berechnet werden. Es ſeyen die drey Radii Vectores $SM = r$, $SM' = r'$, $SM'' = r''$, und die Winkel $MSM' = w$, $MSM'' = w'$, der geſuchte Winkel $PSM = v$; ſo iſt in dem gleichſchenklichten Dreyeck MSm die Seite $Mm = 2r \text{Sin.} \frac{1}{2} w$, und eben ſo $Mm' = 2r' \text{Sin.} \frac{1}{2} w'$, für den Halbmeſſer $= 1$. Da nun

$$M'm : Mm = SM' : SK$$
$$r' - r : 2r \text{Sin.} \tfrac{1}{2} w = r' : SK;$$

ſo iſt $SK = \frac{2rr' \text{Sin.} \frac{1}{2} w}{r' - r}$

Eben ſo $SK' = \frac{2rr'' \text{Sin.} \frac{1}{2} w'}{r'' - r}$

Wegen der Parallelen Mm und SK, Mm' und SK', iſt der Winkel $KSK' = mMm' = (90° - \frac{1}{2} w) - (90° - \frac{1}{2} w') = \frac{w' - w}{2}$ gegeben. Folglich kennt man in dem Dreyeck KSK' das Verhältniß der Seiten SK, SK', und ihren Zwiſchenwinkel. Man ſuche einen Hülfswinkel x durch die Formel

1.) $\text{Tang.} x = \frac{r''(r' - r) \text{Sin.} \frac{1}{2} w'}{r'(r'' - r) \text{Sin.} \frac{1}{2} w}$; ſo iſt, wenn die halbe Differenz der zwey übrigen Winkel dieſes Dreyecks $= y$ geſetzt wird,

2.) $\text{Tg.} y = \text{Cotg.} \frac{w' - w}{4} \text{Tg.} (x - 45°)$,

und $GKS = 90° - \frac{w' - w}{4} + y$;

oder 3.) $GSK = \frac{w' - w}{4} - y$.

Hieraus findet ſich $GSM = KSM - GSK = SMm - GSK = 90° - \frac{1}{2} w - GSK$, mithin

4.) $v = 90° + y - \frac{w + w'}{4}$.

Man ziehe MR auf AG ſenkrecht; ſo iſt $SR = SM \text{ Cos.} SPM = r \text{ Cos.} v$. Ferner iſt $GS = SK \text{ Cos.} GSK$;

folglich $MQ = GR = SK \cos. GSK - r \cos. v = Mg = Mk$.

$Sg = SK \cos. GSK + r - r \cos. v$

$= SK \cos. GSK + 2r \sin. \frac{1}{2} v^2$

$Sk = SK \cos. GSK - r - r \cos. v$

$= SK \cos. GSK - 2r \cos. \frac{1}{2} v^2$.

Aber $Sg : GS = SM : SP$

$Sk : GS = SM : SA$;

folglich ist, wenn man

5.) $q = \frac{r' - r}{r' \sin. \frac{1}{2} w \cos. \left(\frac{w' - w}{4} + v \right)}$ setzt,

6.) $SP = \frac{r}{1 + q \sin. \frac{1}{2} v^2}$

7.) $SA = \frac{r}{1 - q \cos. \frac{1}{2} v^2}$

Alsdenn ist die große Axe $= SP + SA$, der Exponent des Verhältnißes der Excentricität zu der halben großen Axe, oder $e = \frac{SA - SP}{SA + SP}$, und der halbe Parameter $= (1 + e) SA$.

In dem Dreyeck KSK' ist $\frac{\text{Cotg. } GKS}{\text{Tg. } GSK} = \frac{SK}{SK'} \text{ Cosec. } KSK' - \text{Cotg. } KSK'$; folglich kann man PSM oder v auch so finden. Man suche einen Winkel z durch die Formel

$\text{Cotg. } z = \frac{r' (r'' - r) \sin. \frac{1}{2} w}{r'' (r' - r) \sin. \frac{1}{2} w'} \text{ Cosec. } \frac{w' - w}{2} - \text{Cotg. } \frac{w' - w}{2}$; so ist

$v = z - \frac{1}{2} w$.

Sodenn hat man $q = \frac{r' - r}{r' \sin. \frac{1}{2} w \sin. z}$, und das übrige wie vorhin.

Es seyen z. B. folgende Abstände des Mars von der Sonne, und die Zwischenwinkel gegeben:

r	= 1,399200	w	= 106° 59′ 49″
r'	= 1,623448	w'	= 249 59 50
r''	= 1,483355		
$r' - r$	= 0,224248;	$\frac{1}{2} w$	= 53 29 50
$r'' - r$	= 0,084155;	$\frac{1}{2} w'$	= 124 59 55
Lg. r''	= 0,1712452		71 30 50
			178 29 45
Lg. $(r' - r)$	= 9,3507286;	$\frac{w' - w}{4}$	= 35 45 2,5
Lg. Sin. $\frac{1}{2} w'$	= 9,9133719;	$\frac{w' + w}{4}$	= 89 14 52,5

	9,4353457		
Lg. r' =	0,2104384		
Lg. $(r''-r)$ =	8,9250799		
Lg. Sin. $\frac{1}{2}w$ =	9,9051631		
	9 0406814		
Lg. Tg. x =	0,3946643;	x =	68 2 57
			45
	9,6288872 =	Lg. Tg.	23 2 57
Lg. Cotg. $\frac{w'-w}{4}$ =	0,1427185		90
Lg. Tg. y =	9,7716057;	y =	30 35 2,9
Lg. r' =	0,2104384		120 35 2,9
Lg. Sin. $\frac{1}{2}w$ =	9,9051631	v =	31 20 30,4
	9,9982319 =	Lg. Cos.	5 9 59,6
	0,1138334		
Lg. $(r'-r)$ =	9,3507286		
Lg. q =	9,2368952	$\frac{1}{2}v$ =	15 40 5,2
2 Lg. Sin. $\frac{1}{2}v$ =	8,8629353		
2 Lg. Cos. $\frac{1}{2}v$ =	9,9671102		
	8,0998305;		0,0125843
	9,2040054;		0,1599578
	0,0054311 =	Lg.	1,0125843
	9,9243011 =	Lg.	0,8400428
Lg. v =	0,1458798.		
Lg. SP =	0,1404487;	SP =	1,381811
Lg. SA =	0,2215787;	SA =	1,665631
		AP =	3,047442
		CA =	1,523721
		e =	0,093134.

Um die hier gegebene Regeln auf alle Fälle anwenden zu können, rechne man immer die Winkel w, w' von dem kleinsten Radius Vector r an nach der Richtung der Bewegung des Planeten und wähle unter den zwey Winkeln y, $y+180°$, welche der gefundenen Tangente derselben entsprechen, denjenigen, bey welchem die zwey Winkel $v+w$, $v+w'$ zwischen v und $360-v$ fallen. Eben dieses ist bey der anderen Auflösungsart mittelst des Hülfswinkels z, welcher auch $= 180°+z$ seyn kann, zu beobachten. Kommt z kleiner als $\frac{1}{2}w$ heraus; so addirt man 360 Gr. zu z, und zieht von der Summe den Winkel $\frac{1}{2}w$ ab.

Es seyen z. B. r, r', r'' wie vorhin, aber $w = 169° 40' 0''$; $w' = 312° 40' 10''$. Hier findet sich $x = 44° 27' 31'',26$; also wird $x - 45°$, und dadurch Tg. y negativ. Die zwey Werthe von y sind daher $179° 14' 53'',17$ und $359° 14' 53'',17$. Man wird finden, daß in gegenwärtigem Fall der zweyte dieser Werthe gebraucht werden muß, welcher $v = 328° 39' 50'',67$ giebt.

Eben dieſer Werth findet ſich nach der zweyten Auflöſungsart ſo:

$$\begin{aligned}
\text{Lg. } r' &= 0{,}2104384\\
\text{Lg. } (r''-r) &= 8{,}9250799\\
\text{Lg. Sin. } \tfrac{1}{2}w &= 9\ 9982318\\
&\overline{9{,}1337501}\\
\text{Lg. } r'' &= 0{,}1712452\\
\text{Lg. } (r'-r) &= 9{,}3507286\\
\text{Lg. Sin. } \tfrac{1}{2}w' &= 9{,}6035696\\
\text{Lg. Sin. } \frac{w'-w}{2} &= 9{,}9769601\\
&\overline{9{,}1025035}\\
&0{,}0312466; \quad 1{,}0745995\\
\text{Cotg. } \frac{w'-w}{2} &= 0{,}3345683\\
\text{Cotg. } z &= \overline{9{,}7400312}\\
z &= 53^{\circ}\ 29'\ 50'',66\\
&\quad 360\\
&\overline{413\ 29\ 50{,}66}\\
\tfrac{1}{2}w &= \quad 84\ 50\ 0\\
v &= 328\ 39\ 50{,}66
\end{aligned}$$

Findet ſich $q\ \overline{\text{Cos. } \tfrac{1}{2}v}^2 = 1$ oder > 1 ſo liegen die drey gegebene Punkte im erſten Fall auf einer Parabel, im zweyten auf einer Hyperbel, und der Punkt S iſt der Brennpunkt der Parabel, oder einer der Brennpunkte der Hyperbel.

§. 183. Mittelſt des zweyten keplerischen Geſetzes (§. 179.) wird die Gleichung des Mittelpunkts auf folgende Art gefunden. Es ſey AP (Fig. 61.) die große, BD die kleine Axe der elliptiſchen Bahn, und die Sonne in einem der Brennpunkte S. Der Planet befinde ſich in M, und es ſey der Radius Vector SM gezogen; ſo iſt PSM die wahre Anomalie, und es verhält ſich die Umlaufszeit T des Planeten zu der Zeit t, welche er gebrauchte, um den elliptiſchen Bogen PM zu durchlaufen, wie ſich die Fläche der Ellipſe zu dem Flächeninhalt des Sectors PSM verhält. Aus dem Mittelpunkt C der Ellipſe ſey mit einem Halbmeſſer, welcher der halben großen Axe CP der Ellipſe gleich ſey, ein Kreis beſchrieben, und aus dem Ort M des Planeten ein Perpendickel MQ auf die große Axe AP gefällt, welches über M hinaus verlängert dem Kreis in m begegne. Man ziehe Sm, Cm. und Sr auf Cm ſenkrecht.

Nun verhält sich so wohl die Fläche der Ellipse zu der Fläche des um ihre große Axe als Durchmesser beschriebenen Kreises, als die Fläche PMQ zu der correspondirenden Fläche PmQ des Kreises wie die kleine Axe BD zu der großen AP (Kegelschn. II, 37.), und das Dreyeck SQM verhält sich zu dem Dreyeck $SQm = MQ : mQ$ (VI, 1.), oder ebenfalls wie $BD : AP$ (Kegelschn. II, 7. Zus. 2.). Folglich verhält sich der elliptische Ausschnitt PSM zu dem correspondirenden Ausschnitt PSm des Kreises wie $BD : AP$ oder wie der Inhalt der Ellipse zu der Fläche des um sie beschriebenen Kreises, und verwechselt die Fläche der Ellipse: Sector PSM, oder $T : t$, wie die Kreisfläche zu dem Sector PSm. Man nehme den Winkel PCn so, daß $T : t = 360° : PCn$; so wird sich auch verhalten die Kreisfläche zu dem Sector PCn wie $T : t$, d. i. wie die Kreisfläche zu dem Sector PSm. Mithin muß der Sector PSm dem Sector PCn, und, wenn man jeden derselben von dem Sector PCm hinwegnimmt, das Dreyeck CSn dem Sector mCn gleich seyn. Daher muß $Cn \times Sr = Cm \times mn$, und das Perpendickel Sr dem Kreisbogen mn gleich seyn. Ist die Excentricität CS klein; so ist der Bogen mn wenig von dem Perpendickel Sr verschieden, und daher die Sn nahe mit der Cm parallel.

Es sey nun der wahre Ort M des Planeten gegeben, und man soll die Zeit finden, welche er gebrauchte, um den elliptischen Bogen PM zu beschreiben. Von dem Punkt M fälle man zu dem Ende des Perpendickel MQ auf AP, verlängere es über M hinaus bis an den Kreis nach m, ziehe den Halbmesser Cm, und durch S die Sn, so daß der Bogen mn dem Perpendickel Sr gleich werde, oder, wenn man die Aufgabe nur durch Näherung auflösen will, die Sn mit Cm parallel, welche dem Kreis in n begegne. Alsdenn wird sich verhalten der Umfang des Kreises zu dem Kreisbogen Pn, oder 360° zu dem Winkel PCn wie die Umlaufszeit des Planeten zu der gesuchten Zeit.

Umgekehrt, wenn die von dem Durchgang durch das Perihelium an verflossene Zeit gegeben ist, und der wahre Ort des Planeten gesucht wird, bestimme man den Bogen Pn oder den Winkel PCn durch die Proportion $T : t = 360° :$

PCn, ziehe sodenn den Halbmesser *Cm* so, daß der Bogen *nm* dem Perpendickel *Sr* gleich werde, oder, wenn man sich mit einer Näherung begnügen will, die *Cm* mit der *Sn* parallel. Von *n* fälle man ein Perpendickel *nQ* auf die große Axe *AP*; so wird dieses der Ellipse in dem gesuchten Punkt *M* begegnen. Der Beweiß ergiebt sich in beyden Fällen leicht aus der vorausgeschikten Analyse.

Die Bestimmung von *M* durch *m*, und umgekehrt, hat keine Schwierigkeit. Aber der Bogen *mn* kann aus dem Bogen *Pm* nur mittelst der trigonometrischen Linien, und des Verhältnißes des Kreisumfangs zu seinem Durchmesser, und aus dem Bogen *Pn* der *mn* selbst mittelst dieser nicht direkt, und ohne unendliche Reihen zu gebrauchen, gefunden werden. Die auf den zweyten Fall sich beziehende Aufgabe, aus dem Winkel *PCn* den Winkel *PCm* zu finden, heißt das keplerische Problem, welches, wie man sieht, darauf hinauslauft, die Fläche des Halbkreises *AbP* durch eine aus dem gegebenen Punkt *S* seines Durchmessers gezogene gerade Linie *Sm* in einem gegebenen Verhältniß zu theilen, nemlich so, daß die Fläche *AbP* zu der Fläche *SmP* sich wie $\frac{1}{2}T : t$ verhalte *).

§. 184. Die vierte geometrische Proportionalzahl zu der siderischen, oder wenn die Apsidenlinie sich bewegt, zu der anomalistischen Umlaufszeit *T*, zu der von dem nächstvorhergehenden Durchgang durch das Perihelium an bis zu einem gewißen Zeitpunkt verfloßenen Zeit *t* und zu 360 Graden heißt auch hier die mittlere Anomalie für diesen Zeitpunkt welche also der Zeit proportional wächst. Denkt man sich den Flächeninhalt der Ellipse in 360 gleiche Theile getheilt; so drückt diese Zahl den Inhalt des elliptischen Sectors *SMP*; welcher in der Zeit *t* beschrieben wurde, in eben diesen Theilen aus. Und eben so drükt die mittlere Anomalie den Inhalt des Sectors *SmP* in solchen Theilen

*) *Kepler* de motibus stellæ Martis, pag. 300. — adhortor Geometras, ut mihi solvant hoc problema: — Aream semisectoli ex quocunque puncto diametri in data ratione secare. Mihi sufficit credere, solvi a priori non posse, propter arcus et sinus ἑτερογένειαν.

aus, deren 360 auf den Flächeninhalt des um die Ellipse beschriebenen Kreises gehen. In so fern nun das Verhältniß der mittleren Anomalie zu 360 Gr. dem Verhältniß des Sectors SMP zu dem Flächeninhalt der Ellipse, oder des Sectors SmP zu der Fläche des um die Ellipse beschriebenen Kreises gleich ist, kann man sagen, der Sector SMP sey die mittlere Anomalie, wenn das andere Glied des Verhältnißes die Fläche der Ellipse ist, oder sie sey der Fläche SmP gleich, wenn man die Fläche des Kreises $AbPd$ als zweytes Glied des Verhältnißes betrachtet. Versteht man aber unter der mittleren Anomalie einen Winkel; so wird sie dem Winkel PCn gleich seyn, welcher sich zu 360 Gr. wie $t : T$ verhält. Zieht man durch S die Parallele Sn mit Cn; so wird auch die mittlere Anomalie dem Winkel gleich seyn, welchen der Planet von dem Perihelio an in der Zeit t beschrieben haben würde, wenn er sich mit einer gleichförmigen Winkelgeschwindigkeit um die Sonne bewegte.

Der um die große Axe der Ellipse als Durchmesser beschriebene Kreis $AbPd$ heißt der excentrische Kreis. Der Winkel PCm, welchen der an den Durchschnittspunkt m des excentrischen Kreises und des auf der Seite des Planeten verlängerten von seinem wahren Ort M auf die große Axe AP gefällten Perpendickels QMm gezogene Halbmesser Cm mit der großen Axe einschließt, heißt die excentrische Anomalie (Anomalia eccentri).

Endlich heißt der Winkel PSM, welchen der Radius Vector des Planeten mit der Apsidenlinie macht, die wahre Anomalie (Anomalia vera, coæquata). Diese drey Anomalien werden von dem Perihelium an nach der Richtung der Bewegung des Planeten bis auf 360° in einem fort gezählt. Der Unterschied zwischen der mittleren und wahren Anomalie heißt wie bey der excentrischen Kreisbewegung die Gleichung des Mittelpunkts.

§. 185.) Es seyen die halbe große Axe CP (Fig 61.) der Ellipse $= a$, ihr halber Parameter $= p$, die halbe kleine Axe $CB = b$, $CS : CA = e : 1$, oder $CS = ae$, die wahre Anomalie $PSM = v$, die excentrische Anomalie $PCm = u$, die mittlere Anomalie $PCn = m$, der Radius Vector $SM = r$, und das

Verhältniß des Umfangs eines Kreiſes zu ſeinem Durchmeſſer $= \pi : 1$; ſo ergeben ſich aus der im 183ſten S. gezeigten Conſtruction folgende Ausdrücke.

Weil $mn = Sr = CS \text{ Sin. } PCm$ (ſ. d. Halbm. 1.)
$= ae \text{ Sin. } u$

und $180° : \text{W. } mCn = \pi : \left\{ \frac{mn}{ae \text{ Sin. } u} \right\}$

$= \pi : e \text{ Sin. } u$;

ſo iſt der Winkel $mCn = \frac{180}{\pi} e \text{ Sin. } u$ Gr.

$= \frac{180 \cdot 60}{\pi} e \text{ Sin. } u$ Secunden,

$= 206264{,}806\, e \text{ Sin. } u$ Sec.
$= e' \text{ Sin. } u$ zur Abkürzung.

Aber $PCn = PCm - mCn$; folglich

1.) $u = u - e' \text{ Sin. } u$

ferner iſt $mQ = Cm \text{ Sin. } PCm = a \text{ Sin. } u$

$MQ = \frac{b}{a} mQ = b \text{ Sin. } u$

$SQ = CQ - CS = a \text{ Cos. } u - ae$

$SM^2 = MQ^2 + SQ^2 = b^2 \text{ Sin. } u^2 + a (\text{Cos. } u - e)^2$

$= b^2 \text{ Sin. } u^2 + a^2 \text{Cos. } u^2 - 2a^2 e \text{ Cos. } u + a^2 e^2$

$= b \quad + (a^2 - b^2) \text{ Cos. } u^2 - 2a^2 e \text{ Cos. } u + a^2 e^2$

$= a^2 - 2a^2 e \text{ Cos. } u + a^2 e^2 \text{ Cos. } u^2$, weil $a^2 - b^2 = a^2 e^2$

$= a^2 (1 - e \text{ Cos. } u)^2$, und daher

2.) $r = a (1 - e \text{ Cos. } u)$

Sodann 3.) $\text{Sin. } v = \frac{MQ}{SM} = \frac{b \text{ Sin. } u}{a(1 - e \text{Cos. } u)} = \frac{\text{Sin. } u \sqrt{1 - e^2}}{1 - e \text{ Cos. } u}$

4.) $\text{Cos. } v = \frac{SQ}{SM} = \frac{a \text{ Cos. } u - ae}{a(1 - e \text{ Cos. } u)} = \frac{\text{Cos. } u - e}{1 - e \text{Cos. } u}$,

und hieraus folgt umgekehrt

5.) $\text{Cos. } u = \frac{\text{Cos. } v + e}{1 + e \text{Cos. } v}$.

Daher $1 - \text{Cos. } u = \frac{1 + e \text{ Cos. } v - \text{Cos. } v - e}{1 + e \text{ Cos. } v}$

$= \frac{(1 - e)(1 - \text{Cos. } v)}{1 + e \text{Cos. } v}$

oder 6.) $\text{Sin. } \frac{1}{2} u^2 = \frac{(1 - e) \text{ Sin. } \frac{1}{2} v^2}{1 + e \text{ Cos. } v}$.

Eben ſo $1 + \text{Cos.}\, u = \frac{(1+e)(1+\text{Cos.}\, v)}{1+e\,\text{Cos.}\, v}$;

alſo 7.) $\overline{\text{Cos.}\,\frac{1}{2}u}^2 = \frac{(1+e)\,\overline{\text{Cos.}\,\frac{1}{2}v}^2}{1+e\,\text{Cos.}\, v}$, und mittelſt n. 6.

$$\overline{\text{Tang.}\,\tfrac{1}{2}u}^2 = \frac{1-e}{1+e}\,\overline{\text{Tg.}\,\tfrac{1}{2}v}^2$$

oder 8.) $\text{Tang.}\,\frac{1}{2}u = \text{Tg.}\,\frac{1}{2}v\,\sqrt{\frac{1-e}{1+e}}$

Aus n. 5. folgt $1 - e\,\text{Cos.}\, u = \frac{1-e^2}{1+e\,\text{Cos.}\, v}$; daher iſt vermöge n. 2.

9.) $r = \frac{a(1-e^2)}{1+e\,\text{Cos.}\, v} = \frac{p}{1+e\,\text{Cos.}\, v}$, weil $p = \frac{b^2}{a} = a(1-e^2)$.

Durch die Verbindung dieſes Ausdruks mit n. 6. und 7. erhält man

$$\overline{\text{Sin.}\,\tfrac{1}{2}u}^2 = \frac{(1-e)\,r\,\overline{\text{Sin.}\,\frac{1}{2}v}^2}{p} = \frac{r\,\overline{\text{Sin.}\,\frac{1}{2}v}^2}{a(1+e)}$$

$$\overline{\text{Cos.}\,\tfrac{1}{2}u}^2 = \frac{(1-e)\,r\,\overline{\text{Cos.}\,\frac{1}{2}v}^2}{p} = \frac{r\,\overline{\text{Cos.}\,\frac{1}{2}v}^2}{a(1-e)},$$

daher 10.) $\text{Sin.}\,\frac{1}{2}u = \text{Sin.}\,\frac{1}{2}v\,\sqrt{\frac{r}{a(1+e)}} = \text{Sin.}\,\frac{1}{2}v\,\sqrt{\frac{r(1-e)}{p}}$

11.) $\text{Cos.}\,\frac{1}{2}u = \text{Cos.}\,\frac{1}{2}v\,\sqrt{\frac{r}{a(1-e)}} = \text{Cos.}\,\frac{1}{2}v\,\sqrt{\frac{r(1+e)}{p}}$

12.) $\text{Sin.}\, u = \frac{r\,\text{Sin.}\, v}{a\sqrt{1+e}^2}$, weil $2\,\text{Sin.}\,\frac{1}{2}u\,\text{Cos.}\,\frac{1}{2}u = \text{Sin.}\, u$.

$$= \frac{r\,\text{Sin.}\, v\sqrt{1-e}^2}{p}$$

Multiplicirt man die Gleichung n. 10. mit $2\,\text{Cos.}\,\frac{1}{2}v$, die n. 11. mit $2\,\text{Sin.}\,\frac{1}{2}v$, und zieht von dem zweyten Produkt das erſte ab; ſo erhält man

13.) $2\,\text{Sin.}\,\frac{v-u}{2} = \text{Sin.}\, v\left(\sqrt{1+e}-\sqrt{1-e}\right)\sqrt{\frac{r}{p}}$

$$= \text{Sin.}\, u\left(\sqrt{1+e}-\sqrt{1-e}\right)\sqrt{\frac{a}{r}}\ \text{(n. 12.)}$$

Mehrere dieſer Ausdrücke werden einfacher, wenn man $e = \text{Sin.}\, k$ ſetzt *). Alsdenn werden $\text{Cos.}\, k = \sqrt{1-e^2}$; $1 - \text{Cos.}\, k = 1 - \sqrt{1-e^2}$; $4\,\overline{\text{Sin.}\,\frac{1}{2}k}^2 = 2 - 2\sqrt{1-e^2} = \left(\sqrt{1+e}-\sqrt{1-e}\right)^2$;

*) Theoria motus corporum coelestium auctore C. F. Gauſs. Hamburgi 1809. §. 8. pag. 8.

$2\,\mathrm{Sin.}\,\frac{1}{2}k = \ldots \sqrt{1-e}$. Ferner $\frac{1-e}{1+e} = \frac{1-\mathrm{Sin.}\,k}{1+\mathrm{Sin.}\,k} = \mathrm{Tg.}(45^\circ - \frac{1}{2}k)^2$.

Mithin $= \frac{r\,\mathrm{Sin.}\,v}{a\,\mathrm{Cos.}\,k} = \frac{r\,\mathrm{Sin.}\,v\,\mathrm{Cos.}\,k}{p}$

$\frac{v-u}{2} = \mathrm{Sin.}\,v\,\mathrm{Sin.}\,\frac{1}{2}k\sqrt{\frac{r}{p}}$,

$= \mathrm{Sin.}\,u\,\mathrm{Sin.}\,\frac{1}{2}k\sqrt{\frac{a}{r}}$.

$\mathrm{Tg.}\,\frac{1}{2}u = \mathrm{Tg.}\,\frac{1}{2}v\,\mathrm{Tg.}\,(\ldots - \frac{1}{2}k)$

Beyspiel. In §. 182. ... gefunden $e = 0{,}093134$. ... sucht die mittlere Anoma... die wahre $v = 31^\circ\,20'\,10''$.

$1+e = 1{,}093134$ Lg. $= 0{,}0386734$
$1-e = 0{,}906866$ Lg. $= 9{,}9595431$

Lg. $\frac{1-e}{1+e} = 9{,}9188697$

$\frac{1}{2}$ Lg. $\frac{1-e}{1+e} = 9{,}9594348.5$
Lg. Tg. $\frac{1}{2}v = 9{,}4479109$
Lg. Tg. $\frac{1}{2}u = 9{,}4073457.5$

$\frac{1}{2}u = 14^\circ\,19'\,51'',67$
$u = 28\;\;39'\;\;43{,}34$ Lg. Sin. $= 9{,}6809174$
Lg. $e = 8{,}9691083$
Lg. $206264{,}8 = 5{,}3144251$
Lg. $e\,\mathrm{Sin.}\,u = 3{,}9644508$
$e\,\mathrm{Sin.}\,u = \;\;2\;\;33\;\;34{,}05$
$m = 26\;\;6\;\;9{,}29$
$v = 31\;\;20\;\;10.00$
$v-m = \;\;5\;\;14\;\;0{,}71$,

Berechnung von u nach n. 19. In §. 182. hat man gefunden $a = 1{,}52372$, und für die vorige wahre Anomalie ist $r = 1{,}399200$.

Lg. e / Lg. Sin. k $\Big\} = 8{,}9691082$; $k = 5^\circ\,20'\,38'',15$

Lg. Cos. $k = 9{,}9981033$
2 Lg. Cos. $k = 9{,}9962166$
Lg. $a = 0{,}1820052$
Lg. $p = 0{,}1791218$
Lg. $r = 0{,}1458798$

Lg. $\frac{r}{p} = 9{,}9667580$

$\frac{1}{2}$ Lg. $\frac{r}{p} = 9{,}9833790$
Lg. Sin. $v = 9{,}7160514$

Lg. Sin. $\frac{1}{2}k$ = 8,6685507

Lg. Sin. $\frac{v-u}{2}$ = 8,3679811; $\frac{v-u}{2}$ = 1° 20′ 13″,33

$v-u$ = 2 40 26,66

Lg. Sin. v = 9,7160514 v = 31 20 10,00

Lg. Cos. k = 9,9981083 u = 28 39 43,34

Lg. r = 0,1458798

Lg. p = 0,1791218

Lg. Sin. u = 9,6809177

Lg. e' = 4,2835334

3,9644511; e' Sin. u = 2 33 34,06

m = 26 6 9,28

In der §. 182. gefundenen Ellipse macht der Radius Vector r' mit dem r einen Winkel von 160° 59′ 40″, und da die dem letzteren zugehörige wahre Anomalie = 31° 20′ 10″ ist; so ist die dem ersteren entsprechende = 138° 19′ 50″. Man sucht diesen Radius Vector aus v und p nach n. 9.

Lg. e = 8,9691083

Lg. Cos. v = 9,8733164; negativ.

8,8424247; e Cos. v = −0,0695704

Lg. (1 + e Cos. v) = 9,9686835 0,9304286

Lg. p = 0,1791218

Lg. r' = 0,2104383; r' = 1,623448, wie man ihn im 182ten §. angenommen hat.

§. 186. Um aus der mittleren Anomalie die excentrische und wahre Anomalie zu finden, hat man aus der transcendenten Gleichung $m = u - e'$ Sin. u (§. 185. n. 1.) den Winkel u durch m und e' zu bestimmen, worin eigentlich die Schwierigkeit der Auflösung des keplerischen Problems liegt. Die direkte Auflösung kann nur durch Näherung mittelst unendlicher Reihen geschehen, welche aber, bey einer beträchtlichen Excentricität so langsam convergiren, daß die indirekte Auflösung bequemer ist. Es ist $u = m + e'$ Sin. u; folglich ist u zwischen den Gränzen $m \pm e'$ enthalten, wo das obere Zeichen für den ersten und zweyten, das untere für den dritten und vierten Quadranten gilt. Setzt man zuerst in dem zweyten Glied der Gleichung $u = m$; so erhält man einen ersten genäherten Werth von u. Diesen setzt man in die Gleichung, und findet dadurch einen genaueren Werth von u. Man setzt dieses Verfahren so lange fort, bis zwey zunächst aufeinander folgende Werthe von u um weniger als um 1″ oder 0″,1 von einander verschieden sind, je nachdem man u innerhalb jener oder dieser Gränze genau bestimmen will.

Diese indirekte Auflösung kann noch beträchtlich abgekürzt

werden *). Es sey u' ein genäherter Werth von u, und x die ihm noch beyzufügende in Sekunden ausgedrükte Verbesserung, so daß der Werth $u' + x$ von u der Gleichung Gränze leiste. Man berechne e' Sin. u' durch Logarithmen, und bemerke zugleich aus den Tafeln die Veränderung des Lg. Sin. u' für eine Sekunde Veränderung von u', und die Veränderung des Lg. e' Sin. u' für eine Einheit oder eine Sekunde Veränderung in der Zahl e' Sin. u'. Es seyen diese Veränderungen ohne Rücksicht auf ihre Zeichen beziehungsweise f und g. Wenn nun u' schon so nahe zu dem wahren Werth von u fällt, daß die Veränderungen des Logarithmen des Sinus von u' bis $u' + x$, und die Veränderungen des Logarithmen der Zahl von e' Sin. u' bis e' Sin. $(u' + x)$ als gleichförmig können angenommen werden; so wird man setzen können e' Sin. $(u' + x) = e'$ Sin. $u \pm \frac{fx}{g}$, wo das obere Zeichen im ersten und vierten, das untere im zweyten und dritten Quadranten gilt. Da nun vermöge der Voraussetzung $u' + x = m + e'$ Sin. $(u' + x)$; so wird seyn $u' + x = m + e'$ Sin. $u' \pm \frac{fx}{g}$, und $\frac{g \mp f}{g} x = m + e'$ Sin. $u' - u'$, $\frac{fx}{g} = \frac{f}{f \mp g} (m + e'$ Sin. $n' - u')$. Folglich der wahre Werth von u oder $u + x = m + e'$ Sin. $u' \pm \frac{f}{g \mp f} (m' + e'$ Sin. $u' - u')$. Wenn aber der angenommene Werth von u noch zu sehr von dem wahren verschieden war, als daß die obige Voraussetzung für hinreichend genau dürfte erhalten werden; so wird wenigstens durch diese Methode ein viel näherer Werth gefunden werden, mit welchem dieselbe Operation zu wiederholen seyn wird, u. s. w. Die erste Berechnung darf nicht scharf geführt werden, und man kann dabey immer solche Werthe von u wählen, deren Lg. Sin. aus den Tafeln ohne Interpolation können genommen werden.

Sey z. B. $m = 26° 6' 9'',28$, $e = 0{,}093134$; also $e' = 19210{,}26$ Sekunden.

Weil Sin. $m = 0{,}44$; so wird man als einen ersten genäherten Werth von u annehmen können $m + 0{,}44\ e'$ oder $28° 30' = u'$. Demnach

Lg. Sin. u'	$= 9{,}6786626$;	Veränd. für $1'' = 38{,}8 = f$
Lg e'	$= 4{,}2835334$	
Lg. e' Sin. n'	$= 3{,}9621963$;	Veränd. für $1'' = 480 = g$
e' Sin. u'	$= 9166'' = 2° 32' 46''$	
	$= 26\ \ 6\ \ 9$	
$m + e'$ Sin. u'	$= 28\ \ 38\ \ 55$	
u'	$= 28\ \ 30$	

*) Gauss Theoria mot. corp. c. 3. 11. 2.

$m + e'$

$m + e' \text{Sin.}\, u' - u' = 8' 55'' = 535,$

daher $x = \frac{38,8}{441,2} \cdot 535 = 47''$, und der verbeſſerte Werth von u $= 28° 38' 55'' + 47'' = 28° 39' 42''$, mit welchem man jetzt die Rechnung genauer wiederholt.

Lg. Sin. $u' = 9,6809123$; $f = 38,5$

Lg. $e' = 4,2835334$

Lg. $e' \text{Sin.}\, u' = 3,9644457$; $g = 471$

$e' \text{Sin.}\, u' = 9213,95 = 2° 33' 33'',95$

$m = 26 \quad 6 \quad 9,28$

$m + e' \text{Sin.}\, u' = 28 \quad 39 \quad 43,23$

$u' = 28 \quad 39 \quad 42,00$

$m + e' \text{Sin.}\, u' - u' = 0 \quad 0 \quad 1,23$

daher $x = \frac{38,5}{432,5} \cdot 1,23 = 0'',11$, und der neue verbeſſerte Werth von u iſt $28° 39' 43'',23 + 0'',11$ oder $28° 39' 43'',34$, genau derjenige, aus welchem man in dem 185. §. die oben angegebene mittlere Anomalie abgeleitet hat.

Hätte man als einen erſten genäherten Werth von u die gegebene mittlere Anomalie ſelbſt angenommen; ſo würde man die Verbeſſerung $x = 12' 52''$, und den verbeſſerten Werth von u $= 28° 39' 50''$ (in runder Zahl) gefunden haben. Mittelſt dieſes wird man finden $u' = 28° 39' 43'',88$, um $6'',12$ größer, als der verbeſſerte Werth, und die neue Verbeſſerung $x = -0'',54$; folglich wie vorhin $u = 28° 39' 43'',34$. Die gewöhnliche Methode würde eine viermalige Wiederholung der erſten genäherten Berechnung erfordern, um dieſe Genauigkeit zu erreichen.

§. 187. Die gröſte Gleichung des Mittelpunkts fällt, wie im 106. §. gezeigt worden iſt, in diejenige Punkte der Bahn, in welchen zwiſchen dem Perihelium und Aphelium die mittlere Winkelbewegung der wahren, oder zwiſchen dem Aphelium und Perihelium die wahre der mittleren anfangt vorzueilen. Um dieſe Punkte der elliptiſchen Bahn zu beſtimmen, ſey AP (Fig. 62.) die große, BD die kleine Axe der Ellipſe, welche der Planet um die in einem ihrer Brennpunkte S befindliche Sonne nach der Richtung $PMAM'$ beſchreibt. Ferner ſey der Winkel MSm, welchen der Planet von einem zwiſchen dem Perihelium P und dem Aphelium A liegenden Punkt M an während der Zeit t beſchrieben hat, genau demjenigen Winkel gleich, welchen er in

derselben Zeit t um die Sonne beschrieben haben würde, wenn er sich beständig mit einer gleichförmigen Winkelgeschwindigkeit um die Sonne bewegte; so wird, wenn des Planeten Umlaufszeit T heißt, sich verhalten $t : T =$ Wink. MSm : 4 rechten Winkeln. Weil nun die Radii Vectores von dem Perihelium an bis zu dem Aphelium beständig wachsen; so wird ein aus S als Mittelpunkt mit dem Halbmesser SM beschriebener Kreis dem größeren Radius Vector in r, ein mit dem Halbmesser Sm beschriebener der Verlängerung des kleineren in q begegnen, und der Kreissector rMS kleiner, der Kreissector mqS größer als der correspondirende Sector der Ellipse seyn. Es verhält sich aber

Sect. rMS: Kreisfläche = Wink. MSm : 4 recht. W.
= t : T (Vorauss.)
= Sect. mMS : Fläche d. Ell. (II. kepl. Gesetz.),

und verwechselt

Sect. rMS: Sect. mMS = Kreisfl. : Fläche d. Ell.
= Quadr. v. SM : Recht. $AC \asymp CB$ (Kegelsch. II, 38.)

Aber Sect. mqS : Sect. rMS = Quadr. v. Sm : Quadr. v. SM

Folglich Sect. mqS : Sect. mMS = Quadr. v. SM : Rechteck $AC \asymp CB$.

Demnach ist das Quadrat von SM kleiner, und das Quadrat von Sm größer als das Rechteck aus der halben großen und der halben kleinen Axe der Ellipse, oder es ist der kleinere Radius Vector kleiner, der größere hingegen größer als die mittlere geometrische Proportionallinie zwischen der halben großen und der halben kleinen Axe.

Da nun der Planet den Winkel MSm mit seiner beständig abnehmenden Winkelgeschwindigkeit in derselben Zeit beschrieben hat, in welcher er eben diesen Winkel mit seiner mittleren Winkelgeschwindigkeit gleichförmig beschrieben haben würde (Vorauss.); so wird die wahre Bewegung von M an zuerst der mittleren voreilen, und zwischen M und m wiederum gegen die mittlere zurückbleiben müssen, damit der mit einer abnehmenden Winkelgeschwindigkeit sich bewegende Radius Vector am Ende der Zeit t wieder auf

den ſich gleichförmig fortbewegenden Radius zu liegen kommt. Die gröſte Mittelpunktsgleichung wird alſo an einem zwiſchen M und m liegenden Punkt der Bahn eintreffen, wo der Radius Vector gröſſer als SM aber kleiner als Sm iſt. Zwiſchen eben dieſe Gränzen fällt aber auch vermöge des bewieſenen die mittlere geometriſche Proportionallinie zwiſchen der halben groſſen und der halben kleinen Axe der Ellipſe, und dieſe Gränzen werden deſto enger, je kleiner man die Zeit t annimmt. Folglich wird die Gleichung des Mittelpunkts am gröſten ſeyn, wenn der Radius Vector die mittlere geometriſche Proportionallinie zwiſchen der halben groſſen und der halben kleinen Axe der Ellipſe iſt.

Man beſchreibe alſo aus dem Mittelpunkt der Sonne S als Mittelpunkt mit einem Halbmeſſer, welcher der mittleren geometriſchen Proportionallinie zwiſchen CA und CB gleich ſey einen Kreis, welcher, weil ſein Halbmeſſer $< \left\{\begin{smallmatrix} CA \\ SB \end{smallmatrix}\right\}$ aber $> CB$ und um ſo mehr gröſſer als der auf AP ſenkrechte Radius Vector GS iſt, die Ellipſe zwiſchen B und G ſchneiden wird. Es geſchehe in M; ſo wird in dieſem Punkt die Gleichung des Mittelpunkts am gröſten ſeyn. Denn nimmt man auf beyden Seiten von M die Winkel MSn, MSn' der mittleren Bewegung während einer beliebigen Zeit t gleich; ſo verhält ſich $\left\{\begin{smallmatrix} MSn \\ MSn' \end{smallmatrix}\right\}$: 4 recht. W. $= t : T$, und, wenn die geraden Linien Sn, Sn' dem Kreis und der Ellipſe in r, r' und m, m' begegnen; ſo wird der Sector $MmS >$ Sect. MrS, aber der Sector $Mm'S <$ Sect. $Mr'S$ ſeyn. Es ſey z die Zeit, in welcher der Bogen Mm von dem Planeten mit ſeiner veränderlichen Geſchwindigkeit wirklich beſchrieben wird, und die Fläche des mit dem Halbmeſſer SM beſchriebenen Kreiſes, welche der Fläche der Ellipſe gleich ſeyn wird (Kegelſchn. II, 38.) heiſſe A; ſo wird ſeyn

$z : T =$ Sect. MmS : Fläche d. Ell. (II, kepl. Geſ.)

$> $ Sect. MrS : $\left\{\begin{smallmatrix} \text{Fl. d. Ell.} \\ A \end{smallmatrix}\right\}$

$>$ Bogen Mr : Umfang d. Kreiſes

$>$ Wink. MSr : 4 recht. W.

$$\gtrless \quad t \quad : T \text{ (Constr.)},$$

und daher $z \gtrless t$.

Eben so ist, wenn z' die Zeit ist, in welcher der Planet den Bogen $m'M$ wirklich beschreibt,

$$z' : T = \text{Sect. } Mm'S : \text{Fläche d. Ellipse}$$
$$\gtrless \text{Sect. } Mr'S : \left\{\begin{matrix}\text{Fläche d. Ell.}\\ A\end{matrix}\right.$$
$$\gtrless \left\{\begin{matrix}\text{Bogen } Mr'\\ \text{Bogen } Mr\end{matrix}\right\} : \text{Uml. d. Kreises}$$
$$\gtrless \quad t \quad : \quad T,$$

mithin $z' \gtrless t$.

Demnach ist zwischen dem Perihelium und dem Punkt M die Zeit, welche der Planet gebraucht, den Winkel $m'SM$ zu beschreiben, beständig kleiner als die Zeit, welche er zur Beschreibung eben dieses Winkels mit seiner mittleren Winkelgeschwindigkeit gebrauchen würde, die wahre Bewegung eilt der mittleren vor, und die Gleichung des Mittelpunkts wächst bis zu dem Punkt M. Zwischen diesem Punkt und dem Aphelium hingegen ist die Zeit, in welcher der Planet den Winkel MSm beschreibt, größer als die Zeit, in welcher der Planet eben diesen Winkel mit seiner mittleren Winkelgeschwindigkeit beschreiben würde, die mittlere Bewegung eilt der wahren vor, und die Gleichung des Mittelpunkts nimmt von dem Punkt M an wieder ab. Folglich ist sie in dem Punkt M, wo der Radius Vector der mittleren geometrischen Proportionallinie zwischen der halben großen und der halben kleinen Axe der Ellipse gleich ist, am größten.

§. 188. Behält man die im 185. §. gebrauchte Benennungen bey; so ist die halbe kleine Axe der Ellipse $= a \operatorname{Cos.} k$, wenn $\operatorname{Sin.} k = e$. Daher ist die mittlere geometrische Proportionalgröße zwischen der halben großen und kleinen Axe $= a \sqrt{\operatorname{Cos.} k}$ Soll nun der Radius Vector dieser Größe gleich werden; so muß seyn $a \sqrt{\operatorname{Cos.} k} = a (1 - e \operatorname{Cos.} u)$ (§. 185. n. 2.)

$$e \operatorname{Cos.} u = 1 - \sqrt{\operatorname{Cos.} k}$$
$$\operatorname{Sin.} k (1 + \sqrt{\operatorname{Cos.} k}) \operatorname{Cos.} u = 1 - \operatorname{Cos.} k$$
$$\operatorname{Cos.} u = \frac{\operatorname{Tg.} \frac{1}{2} k}{1 + \sqrt{\operatorname{Cos.} k}}.$$

Ferner (§. 185. n. 9.) $a\sqrt{\text{Cos. } k} = \frac{a(1-e^2)}{1+e\text{ Cos. } v}$

$$1+e\text{ Cos. } v = \frac{1-e^2}{\sqrt{\text{Cos. } k}} = \frac{\overline{\text{Cos. } k}^2}{\sqrt{\text{Cos. } k}}$$

$$\text{Cos. } u = -\frac{1-\overline{\text{Cos. } k}^{\frac{3}{2}}}{\text{Sin. } k}.$$

Nach eben dieſem §. iſt $\text{Sin. } \frac{v-u}{2} = \text{Sin. } u \text{ Sin. } \frac{1}{2}k\sqrt{\frac{a}{r}}$; alſo hier

$$\text{Sin. } \frac{v-u}{2} = \frac{\text{Sin. } u \text{ Sin. } \frac{1}{2}k}{\sqrt[4]{\text{Cos. } k}}.$$

Die Gleichung des Mittelpunkts iſt $= v - m = v - u + e' \text{ Sin. } u$ (§. 185. n. 1.); folglich iſt die gröſte Gleichung des Mittelpunkts

$$= 2\left(\text{Bogen deſſen Sin.} = \frac{\text{Sin. } u \text{ Sin. } \frac{1}{2}k}{\sqrt[4]{\text{Cos. } k}}\right) + e' \text{ Sin. } u.$$

Wenn die Excentricität e klein iſt; ſo iſt Cos. u ebenfalls klein, und daher Sin. u nahe $= 1$. Ferner iſt der Sin. $\frac{1}{2}k$ nahe ſeinem Bogen, als der ihm entſprechende in Sekunden ausgedrükte Winkel nahe $= \frac{1}{2}e'$ und Cos. k nahe $= 1$. Folglich die gröſte Gleichung des Mittelpunkts beynahe $= 2e'$.

Hienach kann aus der gröſten Gleichung des Mittelpunkts G die Excentricität auf folgende Art gefunden werden. Man wird zuerſt, wenn G in Sekunden ausgedrükt wird, haben ae' nahe $= G$, und e nahe $= \frac{\frac{1}{2}G}{206264,8}$, weil $e' = 206264,8\ e$. Mittelſt dieſes genäherten Werths von e, welcher E heiße, berechne man nach obigem Ausdruk die gröſte Mittelpunktsgleichung. Wenn nun dieſe von der vorgegebenen nur wenig verſchieden und $= G+D$, die wahre Excentricität aber $= E - x$ iſt; ſo wird ſich nahe verhalten

$$G + D : G = E : E - x$$
$$G + D : D = E : x.$$

Findet ſich aber ein beträchtlicher Unterſchied; ſo wird man wenigſtens einen genaueren Werth von e erhalten, mit welchem die Rechnung zu wiederholen iſt.

Es iſt z. B. die gröſte Mittelpunktsgleichung der Erdbahn $= 1° 55' 32''$ (§. 167.).

$\frac{1}{2}G = 3466$; Lg. $= 3,5398286$
Lg. $206264,8 = 5,3144251$
Lg. $E = 8,2254035 =$ Lg. Sin. K.
$E = 0,01680364$

$K = 0^{\circ}\,57'\,46'',163$

$\frac{1}{2}K = 0\ 28\ 53,081$

Lg. Cos. K = 9,9999387 1,

$\frac{1}{2}$ Lg. Cos. K = 9,9999693; 0,999929

0,3010147 = Lg. 1,999929

Lg. Tg. $\frac{1}{2}K$ = 7,8244039

Lg. Cos. U = 7,6233892; $U = 89^{\circ}\,45'\,33'',406$

Lg. Sin. U = 9,9999961

Lg. Sin. $\frac{1}{2}K$ = 7,9243886

7,9243847

$\frac{1}{4}$ Lg. Cos. K = 9,9999847

Lg. Sin. $\frac{V-U}{2}$ = 7,9244000; $0\ 28\ 53,126$

Lg. E' = 3,5398286 $V-U = 0\ 57\ 46,252$

Lg. E' Sin. U = 3,5398247; E' Sin. $U = 0\ 57\ 45,970$

$G+D = 1\ 55\ 32,222$

$D = 0,222$

6932 : 0,222 = 0,01680364 : 0,0000054. Mithin ist die verbesserte Excentricität = 0,01680310.

Die gröste Mittelpunktsgleichung für die Bahn der Juno ist = 29° 30′ 16″,96 *). Hieraus findet sich der erste genäherte Werth von e = 0,2574772, mittelst dessen man die gröste Mittelpunktsgleichung 29° 44′ 13″,56 findet, welche um 13′ 56″,6 zu groß ist. Die Verbesserung findet sich = 0,0020121 und der verbesserte Werth von e = 0,2554651. Aus diesem ergiebt sich die gröste Mittelpunktsgleichung = 29° 30′ 2″,41, welche jetzt um 14″,55 zu klein ist. Die als subtractiv vorausgesetzte Verbesserung wird also negativ, oder man muß die bey dieser Berechnung angenommene Excentricität vergrößern. Man wird x = - 0,00003467 finden, und daher ist der neue verbesserte Werth von e = 0,25549977. Der genaue Werth ist 0,2554996.

Durch die Entwikklung der in diesem §. gegebenen Ausdrücke in Reihen findet man, wenn die Hälfte der in Sekunden ausgedrükten gröstey Gleichung des Mittelpunkts mit 206264,806 dividirt, und der Quotient = E gesetzt wird, die Excentricität

$$e = E - \frac{11}{96}E^3 + \frac{587}{30720}E^5 - \frac{40583}{20643840}E^7 - \text{&c.}\ **).$$

§. 189. Damit man nun im Stande sey, den heliocentrischen Ort eines Planeten für einen gegebenen Zeitpunkt angeben zu können, werden folgende sieben Bestim-

*) Gauss Theor. mot. corp. c. pag. 16.

**) Camerer in Astr. Jahrbuch für 1790. S. 242.

mungsſtücke oder Elemente der Planetenbahn gegeben ſeyn müßen.

1.) Die Lage der Durchſchnittslinie NN' (Fig. 58.) der Ebene der Bahn mit der Ebene der Ekliptik, oder die Lage der Knotenlinie, welche durch den Winkel VSN oder durch die Länge des aufſteigenden Knotens beſtimmt wird.

2.) Der Neigungswinkel der Ebene der Bahn gegen die Ebene der Ekliptik. Dieſe zwey Stücke beſtimmen die Lage der Ebene der Planetenbahn.

3.) Die Dauer der ſideriſchen Umlaufszeit.

4.) Die halbe große Axe der elliptiſchen Bahn, oder die mittlere Entfernung des Planeten von der Sonne.

5.) Die Excentricität, oder der Exponent des Verhältnißes des halben Abſtands der Brennpunkte der Ellipſe zu ihrer halben großen Axe.

6.) Die mittlere Länge des Planeten für einen gegebenen Zeitpunkt, welcher die Epoche heißt. Mit eben dieſem Namen bezeichnet man auch öfters die mittlere Länge ſelbſt. Dieſe wird in der Ebene der Bahn von einem Punkt an gerechnet, welcher von dem aufſteigenden Knoten um eben ſo viel rükwarts abſteht, als die Länge des letzteren beträgt. Iſt P der mittlere Ort des Planeten; ſo wird ſeine mittlere Länge auch der Summe der Winkel VSN und NSP gleich ſeyn. Aber man wird dieſe Summe nicht dem Winkel VSP gleich ſetzen dürfen, weil der eine Winkel in der Ebene der Ekliptik, der andere in der Ebene der Bahn liegt.

7.) Die Länge des Periheliums für dieſelbe Epoche. Dieſe wird ebenfalls von einem Punkt an gerechnet, welcher von dem aufſteigenden Knoten um die Länge des letztern rükwarts abſteht. Wenn p' das Perihelium iſt; ſo iſt hienach die Länge deſſelben auch der Summe der Winkel VSN und NSp' gleich.

Iſt die Zeit des Durchgangs des Planeten durch das Perihelium gegeben; ſo kennt man eben daher die mittlere ſo wohl als die wahre Länge des Planeten für dieſen Augenblick, weil in der Apſidenlinie die mittlere Länge der wah-

ren gleich ist. Folglich kann dieses Element die Stelle des sechsten vertreten.

Von diesen Elementen bestimmen das dritte und vierte einander gegenseitig vermöge des dritten keplerischen Gesetzes, wenn man den mittleren Abstand eines andern Planeten von der Sonne und seine Umlaufszeit kennt. Allein die genauere Berechnung erfordert, wie man in dem dritten Buch sehen wird, daß man die Verhältniße der Massen der Planeten zu der Masse der Sonne kenne, und folglich werden auch in diesem Fall sieben Stücke zu der Bestimmung einer Planetenbahn erfordert.

Wenn die Elemente einer Planetenbahn sich verändern; so muß noch das Gesetz bekannt seyn, nach welchem diese Veränderungen von der Zeit abhängen, um die Elemente der Bahn für eine jede gegebene Zeit aus den für eine gewiße Epoche geltenden ableiten zu können.

§. 190. Mittelst dieser Elemente kann sodenn der heliocentrische Ort eines Planeten für einen gegebenen Zeitpunkt auf folgende Art gefunden werden.

1.) Man sucht die mittlere Länge des Planeten für den gegebenen in mittlerer Sonnenzeit ausgedrükten Zeitpunkt, indem man zugleich auf den Mittagsunterschied des Orts, für welchen die Epochen gelten, und desjenigen, für welchen man den Ort des Planeten sucht, Rücksicht nimmt. Man berechnet nemlich die mittlere siderische Bewegung während der zwischen dem vorgegebenen Zeitpunkt und der Epoche verfloßenen Zeit t aus der siderischen Umlaufszeit T durch die Proportion $T : t = 360 :$ der gesuchten mittleren Bewegung, welche $= \frac{360}{T} t$ seyn wird. Sind t und T in Tagen ausgedrückt; so ist $\frac{360}{T}$ die in Graden ausgedrückte mittlere tägliche siderische Bewegung, und, wenn man diese mit n bezeichnet, die mittlere Bewegung in t Tagen $= nt$. Daher ist die gesuchte mittlere Länge = der Länge für die Epoche $\pm nt$, je nachdem der Zeitpunkt, für welchen man die Länge sucht, nach oder vor der gege-

benen Epoche fällt, wenn man die Aequinoktialpunkte als ruhend betrachtet.

2.) Von der wo nöthig um 360 Gr. vergrößerten mittleren Länge zieht man die Länge des Periheliums ab; so hat man die mittlere Anomalie des Planeten, aus welcher man mittelst der Excentricität die excentrische Anomalie nach §. 186. und den Radius Vector nach §. 185. n. 2. findet. Hieraus ergiebt sich ferner die wahre Anomalie nach §. 185. n. 8. oder 13, und, wenn man zu ihr die Länge des Periheliums addirt, die wahre Länge des Planeten in seiner Bahn, d. i. wenn *p* (Fig. 58.) der wahre Ort des Planeten ist, die Summe der Winkel *VSN* und *NSp*.

3.) Von der wo nöthig um 360 Gr. vergrößerten Länge des Planeten in seiner Bahn zieht man die Länge *VSN* des aufsteigenden Knotens ab; so erhält man den Winkel *NSp*, welchen der Radius Vector mit der Knotenlinie von dem aufsteigenden Knoten an nach der Richtung der Bewegung des Planeten gerechnet einschließt, oder das Argument der Breite.

4.) Unter der Voraussetzung der im 174sten §. gezeigten Construktion ist in dem bey *r* rechtwinklichten Dreyeck *pqr*, in welchem der Winkel *pqr* dem gegebene Neigungswinkel der Bahn gleich ist, das Verhältniß der Hypotenuse *pq* zu der Seite *pr* gegeben, und in den zwey bey *q* rechtwinklichten Dreyecken *Sqp*, *Sqr*, welche die Seite *Sq* gemeinschaftlich haben, ist durch den in n. 3. gefundenen Winkel *pSq* der Winkel *rSq* gegeben. Folglich hat man den Winkel *VSr* = der Länge *VSN* des aufsteigenden Knotens + *rSq*, oder die wahre heliocentrische Länge des Planeten von dem für die Epoche geltenden Aequinoktialpunkt an gerechnet, zu welcher man daher noch die retrograde Bewegung dieses Punkts in der Zwischenzeit wird addiren müssen, wenn die Länge wie gewöhnlich auf denjenigen Punkt der Ekliptik sich beziehen soll, in welchem sich der Punkt der Frühlingsnachtgleiche in dem vorgegebenen Augenblick befindet.

5.) In dem bey *q* rechtwinklichten Dreyeck *Spq* ist durch das

Argument der Breite das Verhältniß von $Sp : pq$, und in dem rechtwinklichten Dreyeck pqr durch die Neigung der Bahn das Verhältniß von $pq : pr$; folglich in dem bey r rechtwinklichten Dreyeck Spr das Verhältniß von $Sp : pr$, und dadurch der Winkel pSr oder die heliocentrische Breite gegeben.

6.) In dem letzteren Dreyeck ist auch das Verhältniß von $Sp : Sr$, und, weil man in n. 2. den Radius Vector Sp schon gefunden hat, die Sr selbst gegeben. Dieser auf die Ebene der Ekliptik projicirte Radius Vector Sr heißt die abgekürzte Distanz (distantia curtata.).

Gebraucht man bey der Berechnung der mittleren Länge in n. 1. statt der siderischen Umlaufszeit die auf die Aequinoktialpunkte sich beziehende tropische Umlaufszeit, oder statt der täglichen siderischen Bewegung, die tägliche tropische Bewegung; so erhält man in n. 4. sogleich die von demjenigen Punkt der Ekliptik an gerechnete Länge, in welchem sich der Aequinoktialpunkt in dem vorgegebenen Augenblick befinden würde, wenn er sich mit einer gleichförmigen Geschwindigkeit rükwarts bewegte, welchen man den mittleren Aequinoktialpunkt nennt. Alsdenn muß aber auch statt der siderischen Bewegung des Knotens und des Periheliums die tropische Bewegung derselben gebraucht werden. Wegen der Nutation (§. 160.) erfordert dieser Punkt noch eine kleine Reduktion auf denjenigen, welchen man durch die Beobachtung finden würde.

Die astronomischen Tafeln enthalten neben den Epochen der Länge für den Anfang der Jahre noch die mittlere tägliche tropische Bewegungen der Planeten, ihrer Sonnennähen und aufsteigenden Knoten für alle Tage des Jahrs, sodenn eben diese Bewegungen für Stunden, Minuten und Sekunden, mittelst deren man die mittleren Längen der Planeten, ihrer Sonnennähen und Knoten durch bloße Addition finden kann. Ferner geben sie für alle Grade der mittleren Anomalie und so kleine Unterabtheilungen derselben die Gleichung des Mittelpunkt und den Radius Vector, daß die in der Tafel nicht unmittelbar vorkommende Größen durch Proportionaltheile gefunden werden können. Diejeni-

gen Größen, von welchen die in einer Tafel vorkommende abhängen, heißen ihre Argumente. Z. B. das Argument der Mittelpunktsgleichung und des Radius Vector ist die mittlere Anomalie. Auch die heliocentrische Breite kann aus einer Tafel entweder unmittelbar genommen, oder durch Proportionaltheile leicht gefunden werden, deren Argument das Argument der Breite ist.

Die so genannten Sonnentafeln sind eigentlich Tafeln für die Bewegung der Erde um die Sonne, welche aber statt der Länge der Erde die Länge des ihr gegenüberliegenden Punkts der Ekliptik, oder die scheinbare Länge der Sonne angeben.

In den bey q rechtwinklichten Dreyecken Spq, Srq verhält sich

$$\text{Tang. } pSq : \text{Tang. } rSq = pq : qr$$
$$= \text{Sin. tot.} : \text{Cos. } pqr;$$

also verhält sich 1.) der Sinus totus zu dem Cosinus der Neigung der Bahn, wie die Tangente des Arguments der Breite zu der Tangente eines Winkels, welcher um die Länge des aufsteigenden Knotens vermehrt, die heliocentrische auf die Ebene der Ekliptik reducirte Länge des Planeten giebt, und zwar muß immer derjenige Winkel genommen werden, welcher mit dem Argument der Breite in denselben Quadranten fällt.

Ferner verhält sich

$$\begin{aligned} \text{Sin. } pSq : \text{Sin. tot.} &= pq : Sp \\ \text{Sin. tot.} : \text{Sin. } pSr &= Sp : pr \\ \hline \text{Sin. } pSq : \text{Sin. } pSr &= pq : pr \\ &= \text{Sin. tot.} : \text{Sin. } pqr, \end{aligned}$$

oder es verhält sich 2.) der Sinus totus zu dem Sinus der Neigung, wie der Sinus des Arguments der Breite zu dem Sinus der heliocentrischen Breite.

§. 191. Die folgende Tafel enthält die Elemente der elliptischen Bewegung der sieben älteren Planeten, welche aus der Exposition du Système du Monde par *Laplace*, III. Edit. 1808. pag. 116-119. genommen, und in die gewöhnliche Eintheilungen des Tages und des Kreises übersetzt sind, samt den daraus abgeleiteten mittleren siderischen Bewegungen. Nur die Excentricität der Erdbahn, welche a. a. O. pag 117. wahrscheinlich durch einen Drukfehler = 0,01685318 für das Jahr 1801 gesetzt ist, ist nach den Tables astronomiques publiées par le Bureau des Longit. de France, I. P. angegeben.

Siderische Umlaufszeiten.

	Tage.	T.	St.	M.	S.
Merkur.	87,96925804	87	23	15	43,89
Venus.	224,70082309	224	16	49	11,19
Erde.	365,25638350	365	6	9	11,53
Mars.	686,9790186	686	23	30	39,05
Jupiter.	4332,5963076	4332	14	18	41,0
Saturn.	10758,9698400	10758	23	16	34
Uranus.	30688,7126872	30688	17	6	16

halbe große Axen der Bahnen, oder mittlere Entfernungen.

Merkur.	—	0,3870981
Venus.	—	0,7233323
Erde.	—	1,0000000
Mars.	—	1,5236935
Jupiter.	—	5,2027911
Saturn.	—	9,5387705
Uranus.	—	19,1833050

Exponenten der Verhältniße der Excentricitäten zu den halben großen Axen für den 1. Jan. 1801, und Veränderungen derselben in 100 Jahren. (Das Zeichen — zeigt eine Verminderung.)

	Excentric.	Secular-Veränd.
Merkur.	0,20551494	0,000003867
Venus.	0,00685298	— 0,000062711
Erde.	0,01679435	— 0,000041632
Mars.	0,09313400	0,000090176
Jupiter.	0,04817840	0,000159350
Saturn.	0,05616830	— 0,000312402
Uranus.	0,04667030	— 0,000025072

Mittlere Längen für die Mitternacht zwischen dem 31. December 1800 und dem 1. Januar 1801 mittlerer Zeit zu Paris, und mittlere siderische Bewegungen in einem Tag.

	L.				mittl. sid. Bew. in 1 T.
Merkur.	5	13°	56'	27"	14732",419357
Venus.	0	10	44	35	5767,669103
Erde.	3	10	9	13	3548,192608
Mars.	2	4	7	2	1886,518850
Jupiter.	3	22	12	36	299,127800

	Z.	mittl. sid. Bew. in 1 T.
Saturn.	4 15° 20′ 31″	120″,457629
Uranus.	5 27 47 17	42,230510

Mittlere siderische Bewegungen in einem gemeinen Jahr von 365 Tagen.

Merkur.	4 Umläufe	1Z.	23°	42′	13″,06543
Venus.	1 Umlauf	7	14	46	39,22268
Erde.		11	29	44	50,30196
Mars.		6	11	16	19,38022
Jupiter.		1	0	19	41,64685
Saturn.		0	12	12	47,03467
Uranus.		0	4	16	54,13629

Mittlere Längen der Perihelien für dieselbe Epoche, und mittlere siderische Secularbewegungen derselben.

	Länge des Perih.				sid. Secularbew.
Merkur.	2Z.	14°	21′	47″	583″,556
Venus.	4	8	37	1	— 267,828
Erde.	3	9	30	5	1179,814
Mars.	11	2	24	24	1582,432
Jupiter.	0	11	8	35	663,860
Saturn.	2	29	8	58	1937,066
Uranus.	5	17	21	42	239,335

Längen der aufsteigenden Knoten und Neigungen der Bahnen für den 1. Jan. 1801, siderische Secularbewegungen der Knoten in der Ekliptik, und Veränderungen der Neigungen in 100 Jahren.

	Länge des ☊.			sid. Bew. in 100 J.	Neigung			Veränd. in 100 J.
Merkur.	1Z.	15°	57′ 31″	— 782″,269	7°	0′	9″,1	+18″,283
Venus.	2	14	52 39	—1869,801	3	23	32,7	— 4,552
Erde.	—	—	—	— —	0	0	0	0
Mars.	1	18	1 28	—2328,463	1	51	3,5	— 0,152
Jupiter.	3	8	25 34	—1577,569	1	18	51,5	— 22,009
Saturn.	3	21	55 46	—2200,401	2	29	38,1	—15,513
Uranus.	2	12	51 14	—3597,958	0	46	26,0	+ 3,133

Aus den hier angegebenen siderischen Bewegungen erhält man die tropischen, wenn man die denselben entsprechende mittlere Bewegung der Aequinoktialpunkte, welche

in $365\frac{1}{4}$ Tagen 50″,1, mithin in 365 Tagen 50,06571, in 1 Tag 0,137106, in 100 julianischen Jahren 1° 23′ 30″ beträgt, dazu addirt. Die tropischen Bewegungen der Perihelien und Knoten werden alsdenn alle direkt.

§. 192. Die Elemente der vier neuen Planeten sind von Prof. Gauß berechnet, und folgen hier unverändert, um sie leichter mit den noch zu erwartenden verbesserten Elementen vergleichen zu können. Die Epochen gelten für den Göttinger Meridian, und den mittleren Mittag des 31. Decembers des nächstvorhergehenden Jahrs, oder für den ersten Januar, wenn das Jahr ein Schaltjahr ist.

Ceres *).

Mittlere Länge 1809.	143°	2′	33″,4
Länge des Periheliums 1809.	146	42	10,7
Jährl. Bew. des Perih.	+	2	1,32
Tägl. mittl. trop. Beweg. ☽			770″,9230
Excentricität 1806.			0,0785028
Jährliche Abnahme			0,00000583
Logarithme der halben großen Axe			0,4420486
Länge des ☊ 1806.	80°	53′	41″,3
Jährliche Bewegung			+ 1″,48
Neigung der Bahn 1806	10	37	31,2
Jährliche Abnahme			0,44

Pallas **).

Mittlere Länge 1807.	174°	14′	10″,0
— — 1808.	252	32	28,5
Länge des Periheliums 1803.	121	3	11,4
Tägl. mittl. trop. Beweg. ☽			770″,2143
Excentricität			0,2450198
Log. d. halb. großen Axe			0,4423149
Länge ☊ 1803.	172°	28′	50″,9
Neigung der Bahn	34	37	41,0

*) Monatl. Corresp. May. 1809. pag. 506.

**) Mon. Corresp. Febr. 1808. pag. 184.

Juno *).

Mittlere Länge 1809.	13°	3′	55″,8
— — 1810.	95	37	44,1
Länge des Periheliums 1805.	53	10	53,9
Tägl. mittl. trop. Bew. ☿			814″,324
Excentricität		0,2554521	
Log. d. halb. gr. Axe		0,4261883	
Länge ☊ 1805.	171°	4′	11″,3
Neigung der Bahn	13	4	11,0

Vesta **).

Mittlere Länge 1807.	168°	16′	35″,5
— — 1809.	6	46	4,2
— — 1811.	204	59	15,3
Länge des Perih. 1807.	249	52	23,8
Tägl. mittl. trop. Beweg. ♉			977″,5221
Excentricität		0,0887809	
Log. d. halb. gr. Axe		0,3732940	
Länge ☊	103°	13′	11″,2
Neigung der Bahn	7	8	18,8

Wo noch keine Bewegung des Periheliums und des aufsteigenden Knotens angegeben ist, werden diese Punkte als siderisch ruhend vorausgesetzt, so daß man bey der Berechnung ihrer Längen für eine gegebene Zeit nur das Zurückweichen der Aequinoktialpunkte in der von der Epoche ihrer Länge an gerechneten Zeit zu den angegebenen Längen zu addiren hat.

§. 193. **Erstes Beyspiel.** Man verlangt die heliocentrische Länge der Erde am 30. März 1810 Abends um 8 Uhr mittlerer Zeit zu Tübingen.

Da die im 191. §. angegebenen Epochen für den Pariser Meridian gelten, und Tübingen 26′ 53″,6 in Zeit östlich von Paris liegt; so ist es in obigem Augenblick erst 7 U. 33′ 6″,4 zu Paris. Von dem ersten Januar 1801 um Mitternacht bis zu dem 30. März 1810 um Mitternacht sind verflossen 9 Jahre (worunter 2 Schaltjahre) und 88 Tage, und hiezu kommen noch

*) Mon. Corresp. Sept. 1808. pag. 270.
**) M. C. April. 1809. pag. 409.

12 St. + 7 St. 33′ 6″,4 bis zu dem vorgegebenen Zeitpunkt. Folglich muß man zu der Epoche der Länge der Erde addiren ihre Bewegung in 9 × 365 T. + 2 T. + 88$^{T.}$ 19$^{St.}$ 33′ 6″,4 oder in 9 × 365 T. + 90,814657 T.

Um das Zurückweichen des Aequinoktialpunkts mit in Rechnung zu bringen, addire man seine Bewegungen zu den angegebenen siderischen Bewegungen der Erde und ihres Periheliums; so erhält man

die mittlere tropische Bewegung der Erde	=	359° 45′ 40″,36767 in 365 Tagen
	=	3548″,329774 in 1 Tag.
die mittlere tropische Bew. d. Periheliums	=	6189″,814 in 100 jul. Jahren.

Demnach ist, wenn man die ganze Umläufe wegwirft,

die mittl. trop. Bew. der Erde	in 9 × 365 T.	=	357° 51′	3″,309
	in 90,814657 T.	=	89 30	40,351
mittl. Bew. in der ganzen Zwischenzeit		=	447 21	43,66
			360	
			87 21	43.66
Länge für die Epoche		=	100 9	13,00
Gesuchte mittlere Länge der Erde		=	187 30	56.66

Die tropische Bewegung des Periheliums findet sich in der ganzen von der Epoche an verfloßenen Zeit auf ähnliche Art

		=	0° 9′	32″,12
Länge des Perih. 1801.		=	99 30	5,00
Länge des Perih. 30. März 1810.		=	99 39	37,12
Länge d. ☉ - L. d. Perih. oder mittl. Anomalie		=	87 51	19,54

Die Excentricität hat von der Epoche an abgenommen um 0,00000385, und daher ist sie für den gegebenen Zeitpunkt = 0,01679050. Mittelst dieser und der mittleren Anomalie erhält man nach §. 186. die excentrische Anomalie = 88° 49′ 2″,09, den Radius Vector der Erde nach §. 185. n. 2. = 0,99965342 für a = 1, und die wahre Anomalie nach §. 185. n. 8. oder 13.

		=	89° 46′	45″,46
Aber Länge des Perih.		=	99 39	37,12
mithin die Länge der Erde		=	189 26	22,58

Zweytes Beyspiel. Man verlangt für denselben Zeitpunkt den heliocentrischen Ort der Ceres. Da Tübingen 3′ 27″,4 in Zeit westlich von Göttingen liegt; so ist es an letzterem Ort 8 U. 3′ 27″,4, oder 0,335734 St. nach Mittag, wenn es in Tübingen 8 Uhr ist. Von dem Mittag des 31. Decembers 1808 (dem *Augenblick* der Epoche) bis zu dem Mittag des 31. Decembers

1809

1809 sind verflossen 365 Tage, und von da an bis zu dem 30. März Abends 8 U. 3′ 27″,4 noch 89,335734 Tage. Die mittlere tropische Bewegung der Ceres in 365 Tagen ist

	=	78°	9′	46″,895
in 89,335734 T.	=	19	7	50,972
		97	17	37,867
m. Länge der Ceres 1809.	=	343	2	33,4
		440	20	11,27
Länge Perih. 30. März 1810	=	146	44	41,68
mittlere Anomalie	=	293	35	29,59

Die Excentricität findet sich für den gegebenen Zeitpunkt = 0,0784780, die Länge des aufsteigenden Knotens = 80° 53′ 47″,6, und die Neigung der Bahn = 10° 37′ 29″,3.

Aus diesen Stücken ergiebt sich nach §. 186. die excentrische Anomalie = 280° 20′ 56″,63; nach §. 185. n. 2. der Logarithme des Radius Vector = 0,4306069, und nach §. 185. n. 13. $v - u = -(4° 18′ 11″06)$, mithin die wahre Anomalie

	=	285°	2′	45″,58
Da nun die Länge des Perihel.	=	146	44	41,68
so ist die wahre Länge der Ceres in der Bahn	=	431 / 71	47	27,25
ferner ist die Länge ☊	=	80	53	47,6;
folglich das Argument der Breite	=	350	53	39,7

Berechnung der Reduktion auf die Ebene der Ekliptik und der heliocentrischen Breite nach §. 190.

Lg. Tg. d. Arg. der Breite	=	9,2048657 neg.		
Lg. Cos. der Neigung	=	9,9924895	359°	59′ 60″,00
		9,1973552;	8	57 7,46
			351	2 52,54
Länge des Knotens	=		80	53 47,6
Wahre helioc. Länge der Ceres in der Ekliptik	=	431 / 71	56	40,14
Lg. Sin. d. Arg. der Breite	=	9,1993581 neg.		
Lg. Sin. der Neigung	=	9,2657109		
		8,4650690 neg.		
Heliocentrische Breite der Ceres	=		1°	40′ 19″,4 südlich.
Lg. des Rad. Vect.	=	0,4306069		
Lg. Cos. der Breite	=	9,9998150		
Lg. d. abgekürzten Distanz	=	0,4304219		

§. 194. Um endlich noch zu zeigen, wie aus dem heliocentrischen Ort eines Planeten und dem gleichzeitigen

Ort der Erde in ihrer Bahn sein geocentrischer Ort gefunden werden kann, sey die Sonne in S (Fig. 63.), die Erde in T, der Planet in P, aus welchem das Perpendickel PR auf die Ebene der Erdbahn oder der Ekliptik gefällt sey. Man verbinde die Mittelpunkte der Sonne, des Planeten, und der Erde durch die geraden Linien ST, SP, PT, und ziehe aus dem Mittelpunkt S der Sonne und dem Mittelpunkt T der Erde an den Fußpunkt R des Perpendickels die geraden Linien SR, TR. Die Linie SV gehe aus dem Mittelpunkt der Sonne an den Punkt der Frühlingsnachtgleiche, und mit ihr sey durch den Mittelpunkt T der Erde die Parallele TV' gezogen; so wird $V'TR$ die geocentrische Länge, und RTP die geocentrische Breite des Planeten seyn. In dem Dreyeck RST kennt man den Radius Vector ST der Erde, die abgekürzte Distanz SR des Planeten, und den Zwischenwinkel RST, welcher dem Unterschied der heliocentrischen Länge des Planeten und der Länge der Erde gleich ist, und der Commutationswinkel heißt. Man kann also den Winkel STR finden, welcher der abgekürzten Distanz SR gegenüber liegt, und der Elongationswinkel genannt wird. Man kennt aber auch den Winkel $V'TS$, welcher der Länge der Sonne oder der um 180 Grade vermehrten Länge der Erde gleich ist; folglich hat man auch den Winkel $V'TR = V'TS - STR$ (im Fall der Figur) oder die geocentrische Länge des Planeten. Weil nun die Winkel STR, RST des Dreyecks STR gegeben sind; so ist in den zwey bey R rechtwinklichten Dreyecken, welche die Seite PR gemeinschaftlich haben, das Verhältniß der Seiten ST und TR, mithin, weil die heliocentrische Breite PSR gegeben ist, der Winkel PTR oder die geocentrische Breite des Planeten gegeben, welche nördlich oder südlich ist, je nachdem die heliocentrische Breite nördlich oder südlich ist. Endlich findet man durch die Auflösung des Dreyecks RST die Seite TR, und daraus ferner die Hypotenuse TP des rechtwinklichten Dreyecks PTR, oder den Abstand des Planeten von der Erde.

Rechnet man immer den Commutationswinkel TSR von dem Ort der Erde T an, nach der Richtung ihrer Be-

wegung, welches geſchiehet, wenn man von der wo nöthig um 360 Grade vergrößerten heliocentriſchen Länge des Planeten die Länge der Erde abzieht; ſo muß man den Elongationswinkel STP von der Länge der Sonne abziehen, wenn der Commutationswinkel kleiner iſt als 180°, hingegen ihn zu der Länge der Sonne addiren, wenn der Commutationswinkel größer als 180° iſt, um die geocentriſche Länge des Planeten zu erhalten, wie man leicht findet, wenn man die Figur für dieſen Fall entwirft.

§. 195. Sey die heliocentriſche Länge des Planeten $= l$, ſeine heliocentriſche Breite $= b$ ſein Radius Vector $= r$, die Länge der Erde $= E$, ihr Radius Vector $= R$; ſo iſt der Commutationswinkel $= l - E$, welcher, wie in dem Fall der Figur kleiner als 180° ſey. Sucht man einen Hülfswinkel x durch die Formel

$$\text{Tang. } x = \frac{r \text{ Cos. } b}{R}$$

ſo iſt die Tangente der halben Summe y der zwey übrigen Winkel des Dreyecks STR

$= \text{Cotang. } \frac{l-E}{2} \text{ Tg. } (x - 45°)$ für den Halbmeſſer 1, wenn $r \text{ Cos. } b > R$, und der Elongationswinkel $= 90° - \frac{1}{2}(l-E) + y$, welcher in gegenwärtigem Fall von der Länge der Sonne abgezogen werden muß, um die geocentriſche Länge des Planeten zu erhalten. Wendet man dieſe Formel auf den Fall an, wo $r \text{ Cos. } b < R$; ſo wird $x < 45°$ und daher y negativ. Der Elongationswinkel wird $= 90° - \frac{1}{2}(l-E) - y$ oder dem kleineren der zwey übrigen Winkel des Dreyecks STR gleich, wie es für den Fall ſeyn muß, wo $SR < ST$.

Wenn der Commutationswinkel größer als 180 Gr. wird; ſo werden y und $90° - \frac{1}{2}(l-E)$, mithin auch der Elongationswinkel negativ, welcher nun zu der Länge der Sonne addirt werden muß, um die geocentriſche Länge des Planeten zu erhalten, und man findet leicht, wenn man die Figur für dieſen Fall entwirft, daß die Formel allgemein iſt.

Da die aſtronomiſchen Tafeln ſtatt der Längen der Erde die Länge der Sonne geben; ſo ſetze man die Länge der letzteren $= \odot$; alsdenn iſt

$E = 180° + \odot$

$l - E = l - \odot - 180$; $\frac{l-E}{2} = \frac{l-\odot}{2} - 90$, und die Regel zur Berechnung der geocentriſchen Länge verwandelt ſich in die folgende:

e die Winkel x und z durch die Formeln

$= \frac{r \text{Cos. } b}{R}$

$= \text{Tg.} \frac{l - \odot}{2} \text{ Tg. } (x - 45°)$; so ist die geocentrische

L neten $= \odot + \frac{l - \odot}{2} + z$. Wenn $l < \odot$; so ad-

zu l um abziehen zu können. Man nimmt im-

Tafeln entspr[illegible] angenten von x und z in

[illegible] enselben mit den Tangenten

ley Zeichen. Der Wi[illegible] $\frac{l - \odot}{2} + z$ ist alsdenn die Elonga-

tion des Planeten von der [illegible] nd zwar von dieser an nach

der Ordnung der Zeichen vo[illegible]° in einem fort gezählt.

Zu der Berechnung der geoc[illegible]rischen Breite hat man die

Proportion

$$\left.\begin{matrix} SR : TR \\ \text{oder Tg. } PTR : \text{Tg. } PSR \end{matrix}\right\} = \text{Sin. } STR : \text{Sin. } RST$$

$$\text{Tang } PTR : \text{Tg. } b = \text{Sin.} \left(\frac{l - \odot}{2} + z\right) : \text{Sin. } (l - \odot);$$

daher ist 3.) Tang. der geoc. Breite $= \frac{\text{Tang. } b \text{ Sin.} \left(\frac{l - \odot}{2} + z\right)}{\text{Sin. } (l - \odot)}$

Endlich da $SR : TR = \text{Sin.} \left(\frac{l - \odot}{2} + z\right) : \text{Sin. } (l - \odot)$

$$TR : PT = \text{Cos. } PTR : 1$$

so ist 4.) $\left.\begin{matrix} SR \\ r \text{Cos. } b \end{matrix}\right\} : PT = \text{Sin.} \left(\frac{l - \odot}{2} + z\right) \text{Cos. } PTR : \text{Sin. } (l - \odot)$

woraus sich der Abstand des Planeten von der Erde ergiebt.

Noch ist zu bemerken, daß wegen der Aberration (§. 156.) die scheinbare Länge der Sonne um 20″,25 kleiner ist, als die wahre. Die astronomischen Tafeln geben die scheinbare wegen der Aberration verminderte Länge der Sonne, und daher muß man zu der aus den Tafeln gefundenen Länge der Sonne 180° 0′ 20″,25 addiren, um die wahre Länge der Sonne zu erhalten. Eben so muß man zu der mittelst der Elemente §. 191. gefundenen Länge der Erde 180° 0′ 20″,25 addiren, um die wahre Länge der Sonne zu erhalten. Gebraucht man bey der Berechnung des geocentrischen Orts eines Planeten die Länge der Sonne, so vergrößert man die aus den Tafeln gefundene um 20″,25.

Beyspiel. Man verlangt den geocentrischen Ort der Ceres am 30. März 1810 Ab. um 8 Uhr mittlerer Zeit nach dem Meridian von Tübingen.

Für dieſe Zeit iſt nach §. 193. Beyſp. 1. und 2.

Die heliocentr. Länge der Ceres = 71° 56′ 40″,14
Länge der Erde = 189 26 22,58
180 0 20,25
Länge der Sonne = 9 26 42,83
$l - \odot$ = 62 29 57,31
$\frac{l-\odot}{2}$ = 31 14 58,65

Lg. r Cos. b = 0,4304219 (2 Beyſp.)
Lg. R = 9,9998495 (1 Beyſp.)
Lg. Tg. x = 0,4305724; x = 69° 38′ 34″,21
45
9,6615670 = Lg. Tg. 24 38 34,21
Lg. Tg. $\frac{l-\odot}{2}$ = 9,7830498; $\frac{l-\odot}{2}$ = 31 14 58,65
Lg. Tg. z = 9,4446168; z = 15 33 19,50
Elongationswink. = 46 48 18,15
$\odot$ = 9 26 42,83
Geoc. Länge der Ceres = 56 15 0,98
Lg. Tg. b = 8,4652514 neg.
Lg. Sin. Elong. = 9,8627447
18,3279961
Lg. Sin. $(l-\odot)$ = 9,9479260
Lg. Tg. geoc. Br. = 8,3800701; geoc. Breite der Ceres = − 1° 22′ 07″,8
Lg. r Cos. b = 0,4304219
Lg. Sin. $(l-\odot)$ = 9,9479260
C. Lg Cos. geoc. B. = 0,0001250
C. Lg. Sin. Elong. 0,1372553
0,5157282; Abſtand der Ceres von der Erde = 327890

§. 196. Daß die Elemente der Bahnen des Uranus und der vier neuen Planeten nicht nach der bisher gezeigten Methode haben gefunden werden können, erhellet aus der langen Reihe von Beobachtungen, welche dieſe Methode erfordert. Unter der Vorausſetzung der keplerischen Geſetze iſt eine kleine Anzahl von Beobachtungen zu der Beſtimmung der elliptiſchen Bahn eines Planeten hinreichend, und wenn man eine größere Anzahl von Beobachtungen hat, als zu der Beſtimmung der elliptiſchen Elemente erfordert werden; ſo wird man für die Zeiten der übrigen Beobachtun-

gen nach §. 190. und 194. die geocentrischen Oerter des Planeten berechnen, und durch die Vergleichung derselben mit den beobachteten die Richtigkeit dieser Voraussetzung prüfen können.

Um hievon einen Begriff zu geben, sey a und b die halben Axen der elliptischen Bahn, welche durch die als Einheit angenommene mittlere Entfernung der Erde von der Sonne ausgedrückt seyen. Die siderische Umlaufszeit des Planeten sey $= T'$, die Zeit, in welcher er einen Sector von dem Flächeninhalt A beschreibt sey $= t$, und die siderische Umlaufszeit der Erde $= T$. Vermöge II, 38. Kegelsch. wird, wenn der halbe Umfang eines Kreises zu seinem Halbmesser sich wie $\pi : 1$ verhält, der Flächeninhalt der Ellipse $= ab\pi$, und nach dem zweyten keplerischen Gesetz (§. 179.)

$T' : t = ab\pi : A$ seyn.

Aber $T : T' = 1 : a\sqrt{a}$ (III, kepl. Gesetz. §. 180.)

folglich $T : t = b\pi : A\sqrt{a}$

$= \pi\sqrt{\frac{b^2}{a}} : A$

$= \pi\sqrt{p} : A$, wenn der halbe Parameter der Ellipse $= p$ ist.

Daher ist $t = \frac{T}{\pi} \cdot \frac{A}{\sqrt{p}}$. (Vergl. §. 204. n. 9. u. 10.)

Demnach ist, weil T und π bekannt sind, durch den Inhalt des Sectors und den halben Parameter der Ellipse die Zeit gegeben, in welcher derselbe von dem Planeten beschrieben wird.

Nun wird durch jede geocentrische Länge und Breite eines Planeten die gerade Linie der Lage nach bestimmt, auf welcher sein wahrer Ort liegen muß, weil man für den Augenblick der Beobachtung den Ort der Erde mittelst der bekannten Elemente ihrer Bahn berechnen kann, von welchem jene gerade Linie ausgeht. Wäre die Ebene der Planetenbahn der Lage nach gegeben; so würde jede ausserhalb der Knotenlinie beobachtete geocentrische Länge und Breite des Planeten seinen wahren Ort bestimmen *). Dieser muß nem-

*) Apollonius ebene Oerter, übersetzt von Camerer, zweyter Anhang, 10 Aufgabe, S. 421. u. f.

lich in den Punkt fallen, in welchem die nach dem Planeten gezogene Geſichtslinie der Ebene ſeiner Bahn begegnet. Man nehme eine Länge des aufſteigenden Knotens und eine Neigung der Bahn nach Belieben an, wodurch die Lage der Ebene der Bahn beſtimmt iſt; ſo wird jede auſſerhalb der Knotenlinie beobachtete geocentriſche Länge und Breite einen in der angenommenen Ebene liegenden Radius Vector der Lage und der Größe nach beſtimmen, und durch drey ſolche geocentriſche Längen und Breiten werden drey Radii Vectores der Größe und der Lage nach gegeben ſeyn. Mithin wird (§. 181. und 182.) die Ellipſe gegeben ſeyn, welche den Mittelpunkt der Sonne zu einem ihrer Brennpunkte hat, und durch die drey in der angenommenen Ebene liegende Oerter des Planeten geht. Man berechne den Inhalt der von der erſten zur zweyten, und von der erſten zur dritten Beobachtung beſchriebenen Sectoren; ſo hat man, weil die Ellipſe, und daher auch ihr halber Parameter gegeben iſt, vermöge des oben bewieſenen die Zeiten, in welchen ſie beſchrieben wurden. Dieſe Zeiten ſind aber auch durch die Beobachtungen gegeben; folglich wird die Planetenbahn durch drey geocentriſche Längen und Breiten, welche auſſerhalb der Knotenlinie beobachtet worden ſind, beſtimmt. Die Länge des Knotens und die Neigung der Bahn müßen nemlich ſo gewählt werden, daß die Zwiſchenzeiten zwiſchen der erſten und zweyten und zwiſchen der erſten und dritten Beobachtung mit den beobachteten übereinſtimmen. Hat man einmal eine Neigung der Bahn und eine Länge des Knotens gefunden, bey welchen die berechneten Zwiſchenzeiten nahe mit den beobachteten zutreffen; ſo kann man die Bahn unter zwey Hypotheſen, das einemal mit einer etwas geänderten Neigung, das anderemal mit einer etwas geänderten Länge des Knotens berechnen, die Unterſchiede der anfangs und der unter jeder dieſer Hypotheſen berechneten Zwiſchenzeiten den Unterſchieden der Neigungen und der Längen des Knotens proportional ſetzen, und durch Interpolation finden, um wie viel die angenommenen Elemente der Bahn geändert werden müßen, damit die Unterſchiede zwiſchen den beobachteten und berechneten Zwiſchenzeiten verſchwinden.

§. 197. Um aus der gegebenen Lage der Ebene der Bahn und einer auſſerhalb der Knotenlinie beobachteten geocentriſchen Länge und Breite eines Planeten die Lage und Gröſſe ſeines Radius Vector zu finden, ſey NN' (Fig. 64) die Knotenlinie, S die Sonne, T die Erde, P der wahre Ort des Planeten. Man ziehe ST, SP, PT, fälle aus dem Ort P des Planeten das Perpendickel PR auf die Ebene der Ekliptik, und von R die Perpendickel RH, RJ auf ST, NN'. Zieht man die geraden Linien PJ, PH; ſo werden auch dieſe auf den geraden Linien NN', ST beziehungsweiſe ſenkrecht (Bew. XI, 35.), und die Winkel PJR, PHR die Neigungswinkel der Ebene der Bahn und der Ebene SPT gegen die Ebene NST der Ekliptik ſeyn. Man kennt nun den Radius Vector ST der Erde, die geocentriſche Breite PTR des Planeten $= b$, den Winkel $STR =$ dem Ueberſchuß der geocentriſchen Länge l des Planeten über die Länge $\odot$ der Sonne $= l - \odot$, den Winkel $NST =$ dem Ueberſchuß der Länge der Erde über die Länge Ω des aufſteigenden Knotens, und den Neigungswinkel $PJR = i$. Alle dieſe Winkel werden, wie in der Figur, ſpitz angenommen. Noch ziehe man SR, und ſetze die Winkel $RSJ = a$, $RST = b$, $NSP = x$, $TSP = y$.

Da Sin. tot. : Cotg. PHR = PR : RH
Sin. RTS : Sin. tot. = RH : TR
ſo iſt Sin. RTS : Cotg. PHR = PR : TR
= Sin. tot. : Cotg. PTR;

Daher 1.) Cotang. $H = \frac{\text{Sin. } (l - \odot) \text{ Cotg. } b}{\text{Sin. tot.}}$, für Sin. tot. = 1.

Ferner Sin. NSP : Sin. TSP = PJ : PH
oder 2.) Sin. x : Sin. y = Sin. H : Sin. i.
Sodann Cos. NSP : Cos. TSP = SJ : SH,
oder 3.) Cos. x : Cos. y = Cos. a : Cos. b.
Endlich Tg. H : Tg. J = RJ : RH
oder 4.) Tg. H : Tg. i = Sin. a : Sin. b.

Aus der letzten Proportion folgt

5.) Sin. $(H+i)$: Sin. $(H-i)$ = Tg. $\frac{a+b}{2}$: Tg. $\frac{a-b}{2}$

Aus n. 3. erhält man

Cotg. $\frac{x+y}{2}$: Tang. $\frac{x-y}{2}$ = Cotg. $\frac{a+b}{2}$: Tg. $\frac{a-b}{2}$,

oder Tg. $\frac{a+b}{2}$: Tg. $\frac{x+y}{2}$ = Tg. $\frac{x-y}{2}$: Tg. $\frac{a-b}{2}$;

folglich auch Tg. $\frac{a+b}{2}$: Tg. $\frac{x+y}{2}$ Tg. $\frac{x-y}{2}$ = Tg. $\frac{a+b}{2}$: Tg. $\frac{a-b}{2}$

$$= \text{Sin.}(H+i) : \text{Sin.}(H-i), \text{ n. 5.}$$

$$= \text{Sin.}\frac{H+i}{2}\,\text{Cos.}\frac{H+i}{2} : \text{Sin.}\frac{H-i}{2}\,\text{Cos.}\frac{H-i}{2}$$

Aber aus n. 2. folgt

$$\text{Tg.}\frac{x+y}{2} : \text{Tg.}\frac{x-y}{2} = \text{Tg.}\frac{H+i}{2} : \text{Tg.}\frac{H-i}{2}$$

$$\text{Tg.}^2\frac{a+b}{2} : \text{Tg.}^2\frac{x-y}{2} = \text{Sin.}^2\frac{H+i}{2} : \text{Sin.}^2\frac{H-i}{2},$$

also ist

und 6.) $\text{Tg.}\frac{a+b}{2} : \text{Tg.}\frac{x-y}{2} = \text{Sin.}\frac{H+i}{2} : \text{Sin.}\frac{H-i}{2}$

Weil nun $\text{Tg.}\frac{x-y}{2} : \text{Tg.}\frac{x+y}{2} = \text{Tg.}\frac{H-i}{2} : \text{Tg.}\frac{H+i}{2}$

$$= \text{Cotg.}\frac{H+i}{2} : \text{Cotg.}\frac{H-i}{2}$$

so ist 7.) $\text{Tg.}\frac{a+b}{2} : \text{Tg.}\frac{x+y}{2} = \text{Cos.}\frac{H+i}{2} : \text{Cos.}\frac{H-i}{2}$

Durch die Proportionen n. 6. und 7. erhält man die halbe Differenz und die halbe Summe der Winkel NSP und TSP; folglich diese Winkel selbst. Um den Radius Vector des Planeten zu finden, suche man noch den Winkel STP.

Es verhält sich

$$\text{Sin. tot.} : \text{Cos. } STP = PT : TH$$
$$\text{Cos. } PTR : \text{Sin. tot.} = TR : PT$$

folglich $\text{Cos. } PTR : \text{Cos. } STP = TR : TH$

$$= \text{Sin. tot.} : \text{Cos. } STR$$

Demnach hat man 8.) $\text{Cos. } STP = \frac{\text{Cos. } b\,\text{Cos.}(i-\odot)}{\text{Sin. tot.}}$.

Man kennt also in dem Dreyeck STP die Seite ST, und die ihr anliegende Winkel, woraus man die Seite SP, oder den Radius Vector des Planeten erhält.

Weil $a+b = NST = 180° + \odot - \Omega$; so ist $\frac{a+b}{2} = 90° - \frac{\Omega}{2} - \frac{\odot}{2}$, und daher werden die zu der Auflösung der Aufgabe erforderliche Formeln folgende seyn:

I. $\text{Cotg. } H = \frac{\text{Sin.}(i-\odot)\,\text{Cotg. } b}{\text{Sin. tot.}}$

II. $\text{Cos. } T = \frac{\text{Cos.}(i-\odot)\,\text{Cos. } b}{\text{Sin. tot.}}$

III. $\text{Tg.}\frac{x-y}{a} = \frac{\text{Sin.}\frac{1}{2}(H-i)}{\text{Sin.}\frac{1}{2}(H+i)}\,\text{Cotg.}\frac{\Omega-\odot}{2}$

IV [illegible] $\frac{\text{[illegible]}y}{\text{[illegible]}} = \frac{\text{Cos.}\,\frac{1}{2}(H-i)}{\text{Cos.}\,\frac{1}{2}(H+i)}\ \text{Cotg.}\ \frac{\Omega - \odot}{2}$

[illegible] t das Argument der Breite des Planeten oder der Winke[illegible]

[illegible] $\frac{\text{[illegible]}y}{\text{[illegible]}} + \frac{x-y}{2}$,

TS [illegible] $= \frac{x+y}{2} - \frac{x-y}{2}$, und der Radius Vector des Planeten.

$$V.SP = \frac{ST\ \text{Sin.}\ T}{\text{Sin.}\,(T+y)}\ ^{*)}.$$

§. 198. Die Aufgabe, aus drey der Größe und Lage nach gegebenen Radiis vectoribus die Ellipse zu finden, ist schon oben §. 182. aufgelöst worden. Man kann aber auch ihren halben Parameter p unmittelbar durch die gegebenen Größen ausdrücken. Es ist, wenn man die in dem 182. und 185sten §. gebrauchte Benennungen beybehält, vermöge der Gleichung n. 9. §. 185. der Radius Vector.

$$r = \frac{p}{1 + e\,\text{Cos.}\,v},\ \text{und daher}$$

1.) $e\,\text{Cos.}\,v = \frac{p}{r} - 1$, und eben so

2.) $e\,\text{Cos.}\,(v+w) = \frac{p}{r'} - 1$

3.) $e\,\text{Cos.}\,(v+w') = \frac{p}{r''} - 1$.

Dividirt man die zweyte Gleichung mit der ersten; so erhält man

$$\left.\begin{array}{l} \frac{\text{Cos.}\,(v+w)}{\text{Cos.}\,v} \\ \frac{\text{Cos.}\,v\,\text{Cos.}\,w - \text{Sin.}\,v\,\text{Sin.}\,w}{\text{Cos.}\,v} \\ 4.)\ \text{Cos.}\,w - \text{Tg.}\,v\,\text{Sin.}\,w \end{array}\right\} = \frac{\frac{p}{r'} - 1}{\frac{p}{r} - 1}$$

und eben so durch die Division der dritten Gleichung mit der ersten.

$$5.)\ \text{Cos.}\,w' - \text{Tg.}\,v\,\text{Sin.}\,w' = \frac{\frac{p}{r''} - 1}{\frac{p}{r} - 1}.$$

*) Olbers zeigte zuerst diese Auflösungsart in seiner Abhandlung über die leichteste und bequemste Methode, die Bahn eines Cometen aus einigen Beobachtungen zu berechnen (Weimar, 1797.) mittelst der sphärischen Trigonometrie. Andere Auflösungsarten findet man in der Theoria mot. corp. cœl. auctore Gauss, §. 74.

Man multiplicire die Gleichung n. 4. mit Sin. w', die n. 5. mit Sin. w; und ziehe von dem erſteren Produkt das zweyte ab; ſo erhält man nach der Multiplication mit $\frac{p}{r} - 1$ die Gleichung

$$\left(\frac{p}{r} - 1\right) \text{Sin.}(w'-w) = \left(\frac{p}{r'} - 1\right) \text{Sin.}\, w' - \left(\frac{p}{r''} - 1\right) \text{Sin.}\, w,$$

und aus dieſer

6.) $$p = \frac{\text{Sin.}\, w - \text{Sin.}\, w' + \text{Sin.}(w'-w)}{\frac{\text{Sin.}\, w}{r''} - \frac{\text{Sin.}\, w'}{r'} + \frac{\text{Sin.}(w'-w)}{r}}$$ *).

Hat man den halben Parameter gefunden; ſo erhält man aus n. 4.

7.) $$\text{Tang.}\, v = \text{Cotang.}\, w - \frac{r\,(p-r')}{r'\,(p-r)}\,\text{Cosec.}\, w,$$

und aus einer der drey erſten Gleichungen, z. B. aus der erſten,

8.) $$e = \frac{p-r}{r\,\text{Cos.}\, v}$$

In Beziehung auf das §. 182. gegebene Beyſpiel iſt

$w = 106^\circ\ 59'\ 40''$; Sin. $w = 0\,9363331.4$
$w' = 249\ 59\ 50$; Sin. $w' = -0,9396760.2$
$w'-w = 143\ \ 0\ 10$; Sin. $(w'-w) = 0,6017762.8$
Sin. w − Sin. w' + Sin. $(w'-w)$ = $2,4977854.4$

Lg. Sin. w	= 9,9806092	
Lg. r''	= 0,1712452	
	9,8093640;	0,6447093
Lg. Sin. w'	= 9,9729782 neg.	
Lg. r'	= 0,2104384	
	9,7625398;	0,5788150
Lg. Sin. $(w'-w)$	= 9,7794351	
Lg. r	= 0,1458798	
	9,6335553;	0,4300860
		1,6536103

$$p = \frac{2,4977854}{1,6536103} = 1,510504.$$

$r' = 1,623448$; Lg. = 0,2104384
$r = 1,399200$; Lg. = 0,1458798
$p - r = 0,111304$; Lg. = 9,0465108
$p - r' = -0,112944$; Lg. = 9,0528632
Lg. Sin. w = 9,9806092
Lg. $r\,(p-r')$ = 9,1987430
Lg. $r'\,(p-r)$ Sin. w = 9,2375584
9,9611846

*) Olbers a. a. O. pag. 104

$\frac{r(p-r')}{r'(p-r)}$ Cosec. $w = -0{,}9145019$

Cotang. $w = -0{,}3056247$

Tang. $v = +0{,}6088772$

$v = 31^{\circ}\ 20'\ 10'',6$, nahe wie in §. 182.

Lg. $r = 0{,}1458798$

Lg. Cos. $v = 9{,}9315238$

$0{,}0774036$

Lg. $(p-r) = 9{,}0465108$

Lg. $e = 8{,}9691072$

$e = 0{,}0931377$.

Unter den zwey Winkeln, welche der Tangente von v entsprechen, wählt man denjenigen, durch welchen e positiv wird, oder man bestimmt v nach der im 182sten §. gegebenen Regel.

§. 199. Wenn die Bahn eines Planeten mit der Ekliptik zusammenfällt; so kann die im 196sten §. angezeigte Methode nicht angewendet werden. In diesem Fall bleiben weil die Lage der Ebene der Planetenbahn gegeben ist, noch vier Elemente der Bahn zu bestimmen übrig, wozu vier geocentrische Längen erfordert werden. Eben dieser Methode wird man sich wegen der beschränkten Genauigkeit der Beobachtungen nicht bedienen können, wenn die Neigung der Planetenbahn gegen die Ekliptik sehr klein ist. Dieser Fall trat bey der Bahn des Uranus ein, welche nur um $46'\ 26''$ gegen die Ekliptik geneigt ist (§ 191.). Unter der Voraussetzung, daß der Planet um die Sonne als Mittelpunkt einen Kreis beschreibe, kann seine Bahn leicht aus zwey geocentrischen Längen gefunden werden, und man hat auf diesem Weg eine die ersten genäherten Bestimmungen der Entfernung des Uranus und seiner Umlaufszeit erhalten *). Es seyen P, Q (Fig. 65.) zwey Oerter des Planeten in seiner kreisförmigen Bahn, deren Mittelpunkt in den Mittelpunkt S der Sonne falle, E, E' die correspondirende Oerter der Erde, und die Punkte P, S, E und Q, S, E' seyen durch gerade Linien mit einander verbunden. Durch die zwey beobachtete Längen des Planeten sind die Winkel $PES = E, QE'S = E'$ gegeben, und den Winkel

*) Klügel in Astr. Jahrb. für 1785. pag. 193, und in Jahrb. für 1786 pag. 238.

$ESE' = S$ kann man ebenfalls durch die Beobachtung der Sonne finden, oder man kann ihn mittelst der bekannten Elemente der Erdbahn berechnen. Er ist nemlich dem Unterschied der Längen der Sonne zur Zeit der ersten und zweyten Beobachtung gleich. Endlich kennt man die Abstände $SE = R$, $SE' = R'$ der Erde von der Sonne. Da vermöge der Voraussetzung die Planetenbahn kreisförmig und mit der Sonne concentrisch ist; so wachsen die Sectoren, welche der Planet um die Sonne beschreibt, den Winkeln proportional, und da die ersteren den Zeiten proportional sind (II. kepl. Gesetz.), so bewegt sich der Planet mit einer gleichförmigen Winkelgeschwindigkeit um die Sonne. Heißt nun die siderische Umlaufszeit der Erde T, des Planeten T' sein Abstand von der Sonne x, und die Zwischenzeit der Beobachtungen t; so verhält sich

$$T' : t = 360 : \text{Wink. } PSQ$$

Aber $T : T' = 1 : x\sqrt{x}$ (III. kepl. Gesetz.)

folglich $T : t = 360° : PSQ\, x\sqrt{x}$,

und daher 1.) $PSQ = \frac{360t}{T x\sqrt{x}}$ Gr. $= \frac{2\pi t}{T x\sqrt{x}}$ in Theilen des Halbmessers. Betrachtet man die Entfernung SP oder x als gegeben; so kennt man in dem Dreyeck PES zwey Seiten PS, SE und den Gegenwinkel E der ersteren; folglich kann man den Winkel EPS oder P finden, welcher nothwendig spitz ist, wenn $SP > SE$. Eben so findet sich der Winkel SQE' oder Q. Und nun ist

2.) der Wink. $PSQ = PSE' - QSE'$

$= PSE + S - QSE'$

$= 180° - (P+E) + S - (180° - (Q+E'))$

$= S - P - E + Q + E'$

Die Entfernung x ist also so zu bestimmen, daß der Winkel PSQ aus den Gleichungen n. 1. und 2. gleich groß herauskommt.

Es ist Sin. $P = \frac{R \text{ Sin. } E}{x}$ und Sin. $Q = \frac{R' \text{ Sin. } E'}{x}$. Wenn nun x in Vergleichung mit R sehr groß ist; so hat man nahe

$P = \frac{R \text{ Sin } E}{x}$; $Q = \frac{R' \text{ Sin. } E'}{x}$ in Theilen des Halbmessers,

und daher vermöge der Gleichung n. 2, wenn S, E und E' in eben ſolchen Theilen ausgedrückt werden

$$PSQ = S + E' - E + \frac{R' \text{Sin. } E' - R \text{Sin. } E}{x}$$

Aber $PSQ = \frac{2mt}{Tx\sqrt{x}}$ aus n. 1.; folglich

$$S + E' - E + \frac{R' \text{Sin. } E' - R \text{Sin. } E}{x} = \frac{2mt}{Tx\sqrt{x}},$$ und wenn man $\sqrt{x} = y$ ſetzt, die Gleichung y^3 multiplicirt und ſie mit dem Coefficienten von y^3 dividirt,

$$y^3 + \frac{R' \text{Sin. } E' - R \text{Sin. } E}{S + E' - E} y = \frac{2mt}{T(S + E' - E)}.$$

Durch die Auflöſung dieſer Gleichung erhält man y, und $x = y^2$, welcher genäherte Werth von x noch ſo zu verbeſſern iſt, daß, wenn man die Winkel P und Q nach den genauen Formeln berechnet, die Gleichungen n. 1. und 2. einerley Werth von PSQ geben, wie man leicht durch einige Verſuche und durch Interpolation findet. Hat man x gefunden; ſo erhält man durch das dritte keplerische Geſetz die ſideriſche Umlaufszeit des Planeten. Ferner ſind die Winkel P und Q die Unterſchiede der geocentriſchen und heliocentriſchen Länge des Planeten; folglich iſt auch ſeine heliocentriſche Länge zur Zeit der erſten oder zweyten Beobachtung gegeben, und dadurch die ganze Bahn ſammt der Epoche der Länge beſtimmt. Klügel fand nach dieſer Methode den Abſtand des Uranus von der Sonne = 18,974 *), welcher von ſeinem mittleren Abſtand 19,183 (§. 191.) nicht ſehr verſchieden iſt. Die Bahn wird am ſicherſten durch zwey Beobachtungen beſtimmt, wovon die eine vor, die andere nach der Oppoſition in der Nähe der Quadratur angeſtellt iſt.

§. 200. Soll die Bahn als eine Ellipſe betrachtet werden; ſo werden auſſer der mittleren Diſtanz noch zwey Elemente, nemlich die Lage der Apſidenlinie und die Excentricität, und daher zu ihrer Beſtimmung zwey geocentriſche Längen mehr als in der Kreishypotheſe erfordert. Nimmt man die mittlere Diſtanz, die Excentricität und die Länge des Periheliums als gegeben an; ſo iſt dadurch, wenn die Bahn in der Ebene der Ekliptik liegt, die elliptiſche Bahn der Größe und der Lage nach gegeben. Jede geocentriſche Länge beſtimmt einen Ort eines oberen Planeten in

*) Aſtr. Jahrbuch für 1786. pag. 240.

dieſer Ellipſe, welcher dahin fällt, wo die nach dem Planeten gezogene Geſichtslinie die Ellipſe ſchneidet. Gehört der Planet zu den unteren; ſo kann die Ellipſe von der Geſichtslinie in zwey Punkten auf einerley Seite der Erde geſchnitten werden, und man muß anderswoher wiſſen, welcher von den zwey Durchſchnittspunkten genommen werden muß. Durch vier geocentriſche Längen werden vier von der Sonne ausgehende Radii Vectores der Lage nach beſtimmt. Man kennt alſo, weil die Länge des Periheliums gegeben iſt, die wahren Anomalien für die vier Beobachtungszeiten, woraus man mittelſt der Excentricität die mittleren Anomalien (§. 185.) und die Zwiſchenzeiten der Beobachtungen findet. Es ſind aber drey von einander independente Zwiſchenzeiten, z. B. zwiſchen jeder der Beobachtungen und der nächſtfolgenden gegeben; folglich werden die drey angenommene Elemente der Bahn ſo zu beſtimmen ſeyn, daß die drey Zwiſchenzeiten mit den beobachteten übereinſtimmend heraus kommen, und die Bahn des Planeten wird durch vier geocentriſche Längen gegeben ſeyn.

Iſt aber die Bahn gegen die Ebene der Ekliptik geneigt; ſo werden, weil jetzt zwey neue Elemente, nemlich die Länge des Knotens und die Neigung hinzukommen, auſſer den vier geocentriſchen Längen zwey geocentriſche Breiten des Planeten zu der Beſtimmung ſeiner Bahn erfordert. Man würde bey der Anwendung der hier angezeigten indirekten Methoden eine große Anzahl vergeblicher Verſuche machen müßen, um die Elemente der Bahn zu finden, wenn man kein Mittel hätte, ſie durch einige wenige Beobachtungen direkt näherungsweiſe zu beſtimmen. Prof. Gauß löste zuerſt die Aufgabe auf aus einigen wenigen keinen groſſen Zeitraum umfaſſenden und alſo keine Auswahl zur Anwendung ſpecieller Methoden verſtattenden Beobachtungen die Bahn eines Planeten zu beſtimmen, und machte ſeine Methoden in dem §. 123. angeführten Werk bekannt. In dieſem lehrt er zuerſt die Elemente der Bahn aus Beobachtungen, welche weder zu nahe bey einander liegen, noch zu weit von einander entfernt ſeyn dürfen, weil im erſten Fall die unvermeidlichen Fehler der Beobachtungen einen zu groſ-

sen Einfluß auf die Elemente haben, im zweyten aber die Kunstgriffe einer Approximation nicht anwendbar seyn würden, bestimmen. Aus der Anwendung seiner Methode auf die Bahnen der Juno und Ceres ergiebt sich übrigens, daß eine heliocentrische Bewegung der ersten von nicht mehr als 7° 35′ schon zu einer sehr nahen Bestimmung der Elemente hinreichend, und eine heliocentrische Bewegung der letztern von 62° 55′ nicht zu groß war, um auch hier noch die Approximationen gebrauchen zu können. Sodenn zeigt er, wie durch eine größere Anzahl von Beobachtungen die Elemente der Bahn auf die bequemste Art immer mehr können berichtiget werden.

Viertes Capitel.

Von den Bahnen der Cometen.

§. 201. Da die Planetenbahnen Ellipsen sind, in deren einem Brennpunkt sich die Sonne befindet; so ist es natürlich, auch die Bahnen der Cometen als Ellipsen anzunehmen, in deren einem Brennpunkt die Sonne ist. Da aber diese Himmelskörper nur alsdenn für uns sichtbar sind, wenn sie den in der Nähe der Sonne liegenden Theil ihrer Bahnen beschreiben; so müssen ihre Bahnen sehr ablang, oder ihre Excentricitäten in Vergleichung mit den Excentricitäten der Planetenbahnen sehr beträchtlich seyn. Vergrößert man die Excentricität einer Ellipse, ohne den Abstand eines ihrer Scheitel von dem ihm zunächst gelegenen Brennpunkt zu verändern; so wird die große Axe und zugleich die Umlaufszeit (III. kepl. Gesetz.) wachsen, und der um den unbeweglich angenommenen Brennpunkt liegende Theil der Ellipse wird sich bey der Vergrößerung ihrer Excentricität immer mehr einer Parabel nähern, welche mit der Ellipse einerley Brennpunkt und Scheitel hat. Wenn nun die Bahn eines Cometen sehr ablang ist; so wird man den in die Nähe der Sonne und der Erde fallenden Theil derselben, welchen er während seiner Sichtbarkeit beschreibt, ohne einen beträchtlichen Fehler als eine Parabel betrachten kön-

lich in den Punkt fallen, in welchem die nach dem Planeten gezogene Gesichtslinie der Ebene seiner Bahn begegnet. Man nehme eine Länge des aufsteigenden Knotens und eine Neigung der Bahn nach Belieben an, wodurch die Lage der Ebene der Bahn bestimmt ist; so wird jede ausserhalb der Knotenlinie beobachtete geocentrische Länge und Breite einen in der angenommenen Ebene liegenden Radius Vector der Lage und der Größe nach bestimmen, und durch drey solche geocentrische Längen und Breiten werden drey Radii Vectores der Größe und der Lage nach gegeben seyn. Mithin wird (§. 181. und 182.) die Ellipse gegeben seyn, welche den Mittelpunkt der Sonne zu einem ihrer Brennpunkte hat, und durch die drey in der angenommenen Ebene liegende Oerter des Planeten geht. Man berechne den Inhalt der von der ersten zur zweyten, und von der ersten zur dritten Beobachtung beschriebenen Sectoren; so hat man, weil die Ellipse, und daher auch ihr halber Parameter gegeben ist, vermöge des oben bewiesenen die Zeiten, in welchen sie beschrieben wurden. Diese Zeiten sind aber auch durch die Beobachtungen gegeben; folglich wird die Planetenbahn durch drey geocentrische Längen und Breiten, welche ausserhalb der Knotenlinie beobachtet worden sind, bestimmt. Die Länge des Knotens und die Neigung der Bahn müßen nemlich so gewählt werden, daß die Zwischenzeiten zwischen der ersten und zweyten und zwischen der ersten und dritten Beobachtung mit den beobachteten übereinstimmen. Hat man einmal eine Neigung der Bahn und eine Länge des Knotens gefunden, bey welchen die berechneten Zwischenzeiten nahe mit den beobachteten zutreffen; so kann man die Bahn unter zwey Hypotheſen, das einemal mit einer etwas geänderten Neigung, das anderemal mit einer etwas geänderten Länge des Knotens berechnen, die Unterschiede der anfangs und der unter jeder dieser Hypotheſen berechneten Zwischenzeiten den Unterschieden der Neigungen und der Längen des Knotens proportional setzen, und durch Interpolation finden, um wie viel die angenommenen Elemente der Bahn geändert werden müßen, damit die Unterschiede zwischen den beobachteten und berechneten Zwischenzeiten verschwinden.

Sonne gleich ist) kennt. Zu diesen vier Stücken muß noch die Zeit des Durchgangs durch das Perihelium hinzukommen, um den Ort des Cometen für jede gegebene Zeit berechnen zu können. Diese fünf Stücke heißen die parabolischen Elemente der Cometenbahn, bey welchen man noch zu bemerken hat, ob der Comet von der Sonne aus gesehen sich mit den Planeten nach einer, oder nach der entgegengesetzten Richtung bewege, oder, wie man sich gewöhnlich ausdrückt, ob der Comet rechtläufig oder rückläufig sey.

Es sey nun AMM' (Fig. 66.) eine Parabel, deren Brennpunkt F, Scheitel A, und deren Axe die gerade Linie APP' sey. Verlängert man die Axe über den Scheitel hinaus nach G so, daß $AG = AF$, und zieht durch G eine gerade Linie HH' auf GP senkrecht; so heißt diese die Directrix der Parabel. Zieht man durch beliebige Punkte M, M' der Parabel die Parallelen $MQ, M'Q'$ mit der Axe AP bis an die Directrix; so messen diese die Abstände jener Punkte der Parabel von der Directrix, welche beständig den Abständen FM, FM eben dieser Punkte von dem Brennpunkt F gleich sind. (Kegelsch. I, 1.). Man ziehe $MP, M'P$ auf die Axe senkrecht, und verlängere durch den Endpunkt des kleineren Perpendickels gehende Parallele QM bis an das größere Perpendickel nach R; so ist $FM' - FM = M'Q' - MQ = RQ - QM = MR$. Sind zwey Punkte M, M' der Parabel und ihr Brennpunkt gegeben; so ist die MR, und weil der Winkel MRM' ein rechter ist, der Punkt R gegeben, welcher gefunden wird, wenn man um die Chorde MM' als Durchmesser einen Kreis beschreibt, und in denselben von dem Endpunkt des größeren Radius Vector an eine Chorde $M'R$ trägt, welche seinem Ueberschuß über den kleineren Radius Vector gleich ist. Mithin ist auch die MR, und daher die Axe AP der Lage nach gegeben. Nimmt man nun auf der über M hinaus verlängerten RM die $MQ = MF$, zieht durch Q die Parallele HH' mit $M'R$, welche der verlängerten AP in G begegnet, und halbirt GF in A; so ist A der Scheitel der Parabel, welche also durch zwey der Größe und Lage nach gegebene Radius Vectores gegeben ist. Da man aber von dem Punkt M' an zwey Chorden $M'R$,

$M'R'$ in den über MM' als Durchmesser beschriebenen Kreis tragen kann; so können durch die zwey gegebene Punkte M, M' zwey Parabeln beschrieben werden, welche den gemeinschaftlichen Brennpunkt F haben, wie man in der Figur siehet, in welcher die auf die zwey Parabeln sich beziehende Axen und Scheitel mit denselben Buchstaben, aber in Beziehung auf die andere Parabel mit einem beygefügten Strich bezeichnet sind. Um also die Parabel ganz zu bestimmen, muß man wissen, ob der auf der Seite des Perihelium's liegende Winkel, welchen die Radii Vectores mit einander machen, kleiner oder größer als 180 Gr. werden soll. Im ersten Fall wird der Scheitel der gesuchten Parabel in A, im zweyten in A seyn. Eben diese Figur zeigt, daß die Construktion der Parabel dieselbe bleibt, wenn, wie es bey der zweyten dieser Parabeln der Fall ist, die gegebenen Punkte auf entgegengesetzte Seiten der Axe Ap' fallen. Wenn die zwey Radii Vectores einander gleich sind; so fällt die ihren Zwischenwinkel halbirende gerade Linie mit der Axe zusammen, und die fernere Construktion bleibt wie vorhin.

§. 203. Ist die Parabel gegeben; so findet man leicht den Inhalt des Sectors, welchen zwey der Lage nach gegebene Radii Vectores FM, FM abschneiden. Es ist nemlich die Fläche $AMP = \frac{2}{3}\ AP \times PM$ (Kegelsch. I, 36.) und der Inhalt des Dreyecks $FPM = \frac{1}{2}\ FP \times PM$; folglich Sect. $AFM = (\frac{2}{3}\ AP + \frac{1}{2}\ FP)\ PM = (\frac{1}{2}\ AF + \frac{1}{6}\ AP)\ PM$. Eben so findet sich der Sect. $AFM' =$ Fläche $AM'P'$ - Dreyeck $FP'M' = (\frac{1}{2}\ AF + \frac{1}{6}\ AP')\ P'M'$. Folglich ist der Inhalt des Sectors $MFM' =$ dem Unterschied der gefundenen zwey Sectoren gegeben, wenn sie wie hier auf einerley Seite der Axe AP' liegen. Fallen sie auf verschiedene Seiten; so nimmt man ihre Summe. Demnach kennt man auch die Zeit, in welcher dieser Sector ist beschrieben worden (§. 201.). Hieraus erhellt die Möglichkeit, die Bahn eines Cometen durch einige wenige Beobachtungen unter der Voraussetzung einer Parabel zu bestimmen. Nimmt man die Länge des Knotens und die Neigung der Bahn als gegeben an; so ist durch jede ausserhalb der Knotenlinie beobachtete

geocentrische Länge und Breite des Cometen sein Radius Vector für die Zeit der Beobachtung der Größe und Lage nach gegeben (§. 196.). Durch zwey Längen und Breiten des Cometen sind zwey Radii Vectores gegeben, und durch diese ist die Parabel bestimmt. Man wird den Flächeninhalt des zwischen denselben liegenden Sectors und daraus ferner die Zeit, in welcher er beschrieben wurde, berechnen, welche mit der beobachteten übereinstimmen muß. Da man aber zwey der gesuchten Elemente der Bahn als gegeben angenommen hat; so wird zu ihrer Bestimmung noch eine Beobachtung erfordert, welche übrigens nicht mehr vollständig seyn darf. Kennt man z. B. nur noch eine Länge; so ist die Lage einer auf der Ebene der Ekliptik senkrechten Ebene gegeben, in welcher der wahre Ort des Cometen liegen muß. Dieser Ort muß aber auch auf der gefundenen Parabel liegen; folglich ist er mittelst des Durchschnitts der Parabel und jener Ebene gegeben. Ist aber statt der Länge eine Breite gegeben; so muß der wahre Ort des Cometen auf der Oberfläche eines auf der Ekliptik senkrecht stehenden geraden Kegels liegen, dessen Seitenlinie gegen seine Axe um das Complement der beobachteten geocentrischen Breite geneigt ist, und daher ist der Ort des Cometen in seiner Bahn mittelst des Durchschnitts dieser Kegeloberfläche und der Parabel gegeben. Alsdenn ist noch ein Radius Vector der Größe und Lage nach, mithin der von der zweyten Beobachtung an beschriebene Sector und die Zeit, in welcher er beschrieben wurde, gegeben, welche der zwischen der zweyten und dritten Beobachtung verfloßenen Zeit gleich seyn muß, wenn die angenommene Länge des Knotens und die Neigung der Bahn richtig sind. Findet sich ein Unterschied; so muß man diese Stücke so lange verändern, bis die beobachteten Zwischenzeiten mit den berechneten übereinstimmen. Da zur Bestimmung einer Cometenbahn nur fünf Elemente erfordert werden, so sind dazu fünf von einander independente durch die Beobachtungen gefundene Stücke, z. B. drey Längen und zwey Breiten, oder zwey Längen und drey Breiten, hinreichend. Diese Rechnungen lassen sich aber noch beträchtlich abkürzen. Man hat nemlich nicht nöthig, die Parabel

zu bestimmen, um die Zeit zu finden, in welcher ein Sector derselben beschrieben wird, denn diese ist, wie hernach gezeigt werden soll, durch zwey Radios Vectores und die ihre Endpunkte verbindende Chorde der Parabel unmittelbar gegeben. Hat man nun die Länge des Knotens und die Neigung der Bahn so bestimmt; daß die berechneten Zwischenzeiten mit den beobachteten übereinstimmen; so berechnet man, wenn drey vollständige Beobachtungen gegeben sind, die durch den ersten und dritten Ort des Cometen gehende Parabel. Der erste und zweyte Ort giebt eine zweyte, und der zweyte und dritte eine dritte Parabel. Die zwey letzteren müssen mit der ersten einerley Länge und Abstand des Perihelii haben, wenn die drey Oerter des Cometen in einer Parabel liegen sollen, oder die Unterschiede dürfen wenigstens nicht größer seyn, als die von den Beobachtungsfehlern herrührenden Abweichungen. Oder man berechnet mittelst der ersten Parabel die geocentrische Länge und Breite des Cometen für die Zeit der mittleren Beobachtung, welche mit den beobachteten übereinstimmen müssen, und so dient eine größere Anzahl von Beobachtungen, als zu der Bestimmung der paraboliſchen Elemente erfordert werden, zur Prüfung der Hypothese einer paraboliſchen Bahn. Endlich kann man durch drey nicht zu weit von einander entfernte Beobachtungen der Länge und Breite eines Cometen seine paraboliſche Bahn näherungsweise bestimmen, wodurch das vorhin gezeigte Verfahren abgekürzt wird, weil man aus diesen vorläufig gefundenen Elementen die Länge des Knotens und die Neigung der Bahn schon nahe kennt, und dadurch eine Menge vergeblicher Versuche erspart wird.

§. 204. Die Bahn eines Cometen kann durch drey nicht zu weit von einander liegende geocentrische Oerter desselben mittelst einer geometrischen Construktion bestimmt werden. Als Vorbereitung auf dieselbe werden folgende Sätze vorausgeschikt. Es sey *anqm* (Fig. 67.) eine Parabel, deren Scheitel *a*, Axe *ah*, und Brennpunkt *f* seyen. Man ziehe eine Chorde *mn*, halbire sie in *g*, ziehe durch *g* die Parallele *gw* mit der Axe *ah*, welche der Parabel in *q* begegne, und durch *q* die Parallele *qt* mit *mn*;

ſo berührt dieſe die Parabel in dem Punkt q (Kegelſch. I, 12. Zuſ. 5.), und ſchneidet die verlängerte Axe in t ſo, daß, wenn man das Perpendickel qr auf die Axe fällt, $ra = at$ (K. I, 1. Zuſ. 8.). Man ziehe fq; ſo iſt $fq = ar + af$ (K. I, 1. Zuſ. 3.) $= at + af = ft$.

Die fq begegne der Chorde mn in e; ſo ſind wegen der Parallelen mn und tq die Dreyecke gqe und fqt gleichwinklicht, und daher iſt

1.) $gf = qe$.

Man halbire den Winkel qft durch die fs; ſo halbirt dieſe die qt in s und ſchneidet ſie ſenkrecht. Weil nun auch $ra = at$; ſo iſt die durch a und s gezogene as mit qr parallel, und daher auf der Axe ſenkrecht. Folglich verhält ſich $\left.\begin{matrix} ft \\ fq \end{matrix}\right\} : fs = fs : af$, $\overline{fq}^2 : \overline{fs}^2 = fq : af$, oder

2.) $fq : fs = \sqrt{fq} : \sqrt{af}$.

Man ziehe $m'n'$ durch e ſenkrecht auf fq, und nehme auf beyden Seiten von e die em', $en' = gm$ oder gn; ſo iſt das Quadrat von $m'e$ oder $n'e$ = Quadr. von $gm = 4fq \times qg$ (Kegelſch. I, 14.) $= 4fq \times qe$ (n. 1.). Daher liegen die Punkte $m'qn'$ auf einer Parabel, deren Scheitel q, Brennpunkt f und Parameter $= 4fq$ iſt. Mithin iſt (K. I, 1. Zuſ. 3.)

3.) $\left.\begin{matrix} fm \\ fn \end{matrix}\right\} = fq + qe = fe + 2eq$.

Man ziehe durch m, g, n die Parallelen mh, gi, nk mit qr, und an den Punkt g', in welchem die verlängerte gi der Parabel begegnet, den Radius Vector fg'. Alsdenn iſt (Kegelſch. I, 1. Zuſ. 3.)

$$fm = ak + af = ai + ik + af$$
$$= ai + ik + af, \text{ (weil } ng = gm)$$
und $fn = ak + af$: folglich iſt

4.) $fm + fn = \left\{\begin{matrix} 2ai + 2af \\ 2fg' \text{ (weil } ai + af = fg') \end{matrix}\right.$

Ferner $fm' = fq + qe = fq + qg = fq + ri$
$fg' = ai + af = ar + ri + af = fq + ri$ (weil $ar + af = fq$)

Alſo iſt $fm' = fg'$, und daher

5.) $2fm' = 2fg' = fm + fn$ (n. 4.)

Es begegne die wo nöthig verlängerte Chorde mn der fs in v; ſo ſind sv und qe die Höhen der paraboliſchen Abſchnitte nmq, $n'm'q$. Alſo verhält ſich (Kegelſch. I, 36. Zuſ.)

Abſchn. $n'm'q$: Abſchn. $nmq = qe : sv$
$= fe : fv$
$=$ Dreyeck $m'fn'$: Dreyeck mfn.

Folglich verhält ſich auch die Summe der Vorderglieder zu der Summe der Hinterglieder wie $fe : fv$, das iſt

Sector $m'n'f$: Sect. $mnf = fe : fv$
$= fq : fs$
$= \sqrt{fq} : \sqrt{af}$ (n. 2.)

Also ist 6.) $\frac{\text{Sector } mnf}{\sqrt{af}} = \frac{\text{Sector } m'n'f}{\sqrt{fq}}$.

Vermöge I, 36. Kegelschn. ist
d. Abschnitt $nmq = \frac{4}{3} m'e \times eq = \frac{2}{3} m'e\,(fm' - fe)$ (n. 3.)
Da nun das Dreyeck $m'fn' = m'e \times fe$
so ist der Sector $m'fn' = \frac{1}{3}(2fm' + fe)\, m'e$
$= \frac{1}{3}(2fm' + fe)\sqrt{2fq\,(fm' - fe)}$, weil $\overline{me}^2 = 2fq \times qe$
$= 2fq\,(fm' - fe)$ (n. 3.)

$$\frac{3\,\text{Sector } m'fn'}{\sqrt{fq}} = (2fm' + fe)\sqrt{2(fm' - fe)}$$
$$= fm'\sqrt{2\,(fm' - fe)} + \sqrt{2(fm' + fe)(fm' + fe)(fm' - fe)}$$
$$= fm'\sqrt{2\,(fm' - fe)} + m'e\sqrt{2\,(fm' + fe)}$$

Aber $2\,(fm' \pm fe) = 2fm' \pm 2\sqrt{(fm' + m'e)\,(fm' - m'e)}$,
$= fm' + m'e + fm' - m'e \pm 2\sqrt{(fm' + m'e)\,(fm' - m'e)}$
$= \left(\sqrt{fm' + m'e} \pm \sqrt{fm' - m'e}\right)^2$
$\sqrt{2\,(fm' \pm fe)} = \sqrt{fm' + m'e} \pm \sqrt{fm' - m'e}$.

Folglich $\frac{3\,\text{Sector } m'fn'}{\sqrt{fq}} = fm'\sqrt{fm' + m'e} - fm'\sqrt{fm' - m'e}$
$+ m'e\sqrt{fm' + m'e} + m'e\sqrt{fm' - m'e}$.
$= (fm' + m'e)\sqrt{fm' + m'e} - (fm' - m'e)\sqrt{fm' - m'e}$.

Daher ist vermöge der Gleichung n. 6.

$$\frac{3\,\text{Sector } mnf}{\sqrt{af}} = (fm' + m'e)^{\frac{3}{2}} - (fm' - m'e)^{\frac{3}{2}}$$
$$= \left(\frac{fm + fn + mn}{2}\right)^{\frac{3}{2}} - \left(\frac{fm + fn - mn}{2}\right)^{\frac{3}{2}} \text{(n. 5.)},$$

und, weil der halbe Parameter der Parabel $anm = 2af$ ist, vermöge §. 196. die Zeit, in welcher der paraboliſche Sector mfn beſchrieben wird,

$$7.)\ t = \frac{T}{3\pi\sqrt{2}}\left(\left(\frac{fm + fn + mn}{2}\right)^{\frac{3}{2}} - \left(\frac{fm + fn - mn}{2}\right)^{\frac{3}{2}}\right)$$

Eben ſo kann gezeigt werden, daß, wenn der Winkel, welchen die Radii Vectores auf der Seite des Periheliums mit einander machen, größer als 180° iſt,

$$8.)\ t = \frac{T}{3\pi\sqrt{2}}\left(\left(\frac{fm + fn + mn}{2}\right)^{\frac{3}{2}} + \left(\frac{fm + fn - mn}{2}\right)^{\frac{3}{2}}\right)$$

Alſo kann die Zeit, in welcher ein Sector der Parabel beſchrieben wird, unmittelbar aus den zwey Radiis vectoribus und der ihre Endpunkte verbindenden Chorde der Parabel gefunden werden *).

In Beziehung auf den Faktor $\frac{T}{\pi}$ iſt noch zu bemerken, daß er wegen der Maſſe der Erde und des Cometen eine kleine Modification leidet. Es iſt nemlich, wie in der phyſiſchen Aſtronomie gezeigt wird, wenn die ſideriſche Umlaufszeit der Erde $= T$, die eines Planeten $= T'$, die mittlere Entfernung der Erde von der Sonne $= 1$, des Planeten $= a'$, und die Maſſe der Sonne $= 1$ geſetzt wird, ſtatt der aus dem dritten keplerſchen Geſetz ſich ergebenden in §. 169. gebrauchten Proportion zu ſetzen $T : T' = \sqrt{1+\mu} : a'^{\frac{3}{2}}\sqrt{1+\mu'}$. Alsdenn wird ſich der im 169. §. gegebene Ausdruck der Zeit durch den Inhalt A des elliptiſchen Sectors und den halben Parameter p der Ellipſe in folgenden verwandeln.

$$9.)\ t = \frac{T}{\pi}\sqrt{1+\mu} \times \sqrt{\frac{A}{p(1+\mu')}},$$

welcher auch für paraboliſche Bahnen gilt. Bey einer erſten Annäherung ſetzt man $\mu = 0$, und man kann überhaupt, wenn es um die Beſtimmung der Bahn eines Cometen zu thun iſt, immer ſeine Maſſe vernachläßigen; folglich hat man nur die Zahl $\frac{T}{\pi}$ mit $\sqrt{1+\mu}$ zu multipliciren, um die Maſſe der Erde in Rechnung zu nehmen, welche übrigens hier keinen ſehr merklichen Einfluß hat. Es iſt nach Laplace **) die Maſſe der Erde $= \frac{1}{337082}$ der Maſſe der Sonne, und daher

	Lg. $(1+\mu)$	$= 0{,}0000012884$
	$\frac{1}{2}$ Lg. $(1+\mu)$	$= 0{,}0000006442$
	Lg. T	$= 2{,}5625978148$ nach §. 191.
		$2{,}5625984590$
	Lg. π	$= 0{,}4971498727$
10.)	Lg. $\frac{T}{\pi}\sqrt{1+\mu}$	$= 2{,}0654485863$
	Lg. 3	$= 0{,}4771212547$
	Lg. $\sqrt{2}$	$= 0{,}1505149978$
		$0{,}6276362525$
11.	Lg. $\frac{T}{3\pi}\sqrt{\frac{1+\mu}{2}}$	$= 1{,}4378123338$

*) Der Erfinder dieſes merkwürdigen Satzes iſt Lambert. S. J. H. *Lamberti* Insigniores orbitæ cometarum proprietates. *Augustae Vindelic.* MDCCLXI. Probl. XV. §. 83.

**) *Exposition* du Syst. du monde, III edit. pag. 208.

§. 205. 1.) Man ziehe drey Radios Vectores *fn*, *fq*, *fm* (Fig. 68.) einer Parabel, und die Chorden *mq*, *qn*, *mn*; so verhält sich sowohl das Dreyeck *fme* zu dem Dreyeck *fne*, als das Dreyeck *mqe* zu dem Dreyeck *nqe*, wie *me* zu *en*. Folglich verhält sich auch das Dreyeck *fmq* zu dem Dreyeck *fnq* wie *me* zu *en*. Wenn nun die paraboliſchen Abſchnitte, welche durch die Chorden *mq*, *nq* gebildet werden, klein ſind; ſo wird ſich auch nahe verhalten *me* : *en* = Sector *mfq* : Sector *nfq*, oder die Chorde *mn* wird von dem mittleren Radius Vector *fq* in dem Punkt *e* nahe im Verhältniß der Zeiten geſchnitten, welche der Comet gebrauchte, um die Sectoren *mfq*, *nfq* zu beſchreiben *).

2.) Aus den Punkten *m*, *f*, *n*, *e*, *q* ſeyen die Perpendickel *mm'*, *ff'* u. ſ. w. auf eine beliebige Ebene gefällt; ſo liegen auch *m'e'n'*, *f'e'q'* in einer geraden Linie. Und da die Perpendickel einander parallel ſind (XI. 6.); ſo verhält ſich *me* : *en* = *m'e'* : *e'n'*. Folglich wird auch die orthographiſche Projection *m'n'* der Chorde *mn* von der Projection *f'q'* des mittleren Radius Vector *fq* in demſelben Verhältniß, wie die Chorde ſelbſt von dem mittleren Radius Vector, und daher ebenfalls nahe im Verhältniß der Zeiten geſchnitten.

3.) Es ſey *DEFG* (Fig. 69.) eine der Lage nach gegebene auf der Ebene *RED* der Ekliptik ſenkrechte Ebene, *BP* eine nach dem Ort eines Himmelskörpers von der in *B* befindlichen Erde gezogene Geſichtslinie, auf welcher von *B* an die *BP* von beliebiger Größe abgeſchnitten ſey. Man fälle von *P* das Perpendickel *PR* auf die Ebene der Ekliptik, und das Perpendickel *Pp* auf die Ebene *DF*. Durch *R* und *B* ſeyen die *Rr* und *CBb* auf die Durchſchnittslinie *DE* der Ebenen *DF* und der Ekliptik ſenkrecht gezogen; ſo wird die gerade Linie *bp* die auf die Ebene *DF* orthographiſch projicirte Geſichtslinie ſeyn. Da die Ebene *DF* der Lage nach gegeben iſt; ſo iſt die *Cb* der Lage nach gegeben. Ferner ſind durch die geocentriſche Länge und Breite des Himmelskörpers die Winkel *CBR* und *PBR* gegeben, denn der erſtere iſt dem Unterſchied der Länge des Himmelskörpers und der Länge des Punkts der Ekliptik gleich, auf welchen die Linie *BC* hintrifft. Man kennt alſo, wenn *Bc* mit *DE* parallel gezogen wird, in dem bey *c* rechtwinklichten Dreyeck *BcR* das Verhältniß von $\left\{\frac{Bc}{r}\right\}$ zu *BR*, und in dem rechtw. Dreyeck *BRP* das Verhältniß von *BR* : $\left\{\frac{RP}{rp}\right\}$; folglich iſt in dem bey *r* rechtwink-

*) Den Fall betreffend, in welchem der mittlere Radius Vector die Chorde des ganzen Bogens genau im Verhältniß der Zeiten ſchneidet, ſ. Newtoni princip. L. III. lemma VIII. corol. Lambert's Beyträge zum Gebrauche der Mathematik, III Th. S. 261. u. f. §. 74. 75.

lichten Dreyeck brp das Verhältniß von $br : rp$, und dadurch die Projection bp der Gesichtslinie der Lage nach gegeben, deren Winkel mit der DE so gefunden wird:

Es verhält sich $Bc : BR = \text{Sin. } BRc : \text{Sin. tot.}$

$BR : RP = \text{Sin. tot.} : \text{Tg. } PBR$

$Bc : RP = \text{Sin. } BRc : \text{Tg. } PBR$

oder $\left.\begin{matrix} br : rp \\ \text{Sin. tot.} : \text{Tg. } \nu p \end{matrix}\right\} = \text{Sin. } RBC : \text{Tg. } PBR,$

4.) Es sey CP' eine von einem beliebigen Punkt C der auf DE senkrechten Cb nach dem wahren Ort P' des Himmelskörpers gezogene Gerade Linie; so liegt diese, weil Pp und Cb einander parallel sind, in der durch die zwey letzteren gelegten Ebene, und ihre Projection auf die Ebene DF fällt mit der Projection bp der Gesichtslinie BP zusammen.

5.) Wenn (Fig. 70.) drey sich in D, E schneidende in einer Ebene liegende gerade Linien AD, BD, CE der Lage nach gegeben sind; so kann man durch jeden auf einer derselben AD gegebenen von D verschiedenen Punkt a eine gerade Linie abc so ziehen, daß das Verhältniß der Segmente ab, bc einem gegebenen Verhältniß $t' : t''$ gleich wird. Denn zieht man von a an einen beliebigen Punkt e der BD eine gerade Linie ae, verlängert sie nach f so, daß $ae : ef = t' : t''$, und zieht durch f eine Parallele fg mit BD; so wird diese, weil BD und CE nicht parallel sind (Voraussf.) der CE in c begegnen. Man ziehe ac; so verhält sich $ab : bc = ae : ef = t' : t''$. Das Verhältniß der Abstände Da und Ec kann auf folgende Art gefunden werden:

Es verhält sich $ab : aD = \text{Sin. } ADB : \text{Sin. } abD$

$cE : bc = \left\{\begin{matrix} \text{Sin. } cbE \\ \text{Sin. } abD \end{matrix}\right\} : \text{Sin. } BEC$

und $bc : ab = t'' : t'$

folglich $cE : aD = t''\text{Sin. } ADB : t'\text{Sin. } BEC$

6.) Es sey eine zweyte Linie AC so gezogen, daß $AB : BC = t' : t''$; so wird sich verhalten

$CE : AD = t''\text{Sin. } ADB : t'\text{Sin. } BEC$

$= cE \;.\; aD$ (n. 5.)

also auch $\left.\begin{matrix} CE - cE \\ Cc \end{matrix}\right\} : \left\{\begin{matrix} AD - aD \\ Aa \end{matrix}\right\} = t'\text{Sin. } ADB : t''\text{Sin. } BEC$

oder, wenn man Winkel FAD, FBE, FCE mit b', b'', b''' bezeichnet,

$Cc : Aa = t''\text{Sin. } (b'' - b') : t'\text{Sin. } (b''' - b'').$

§. 206. Mittelst dieser Sätze wird sich nun die Cometenbahn, wenn drey nicht zu weit von einander entfernte geocentrische Längen und Breiten des Cometen gegeben sind, auf folgende Art construiren lassen. An einen nach Belieben angenom-

menen Punkt S (Fig. 71.), welcher den Mittelpunkt der Sonne vorstelle, und an eine beliebige von diesem Punkt ausgehende gerade Linie SA lege man die Winkel ASB, ASC gleich dem Unterschied der Längen der Sonne zur Zeit der ersten und zweyten, und der ersten und dritten Beobachtung, und nehme die SA, SB, SC den Abständen der Erde von der Sonne zur Zeit der ersten, zweyten, und dritten Beobachtung gleich. Man mache die Winkel SAa', SBb', SCc' den Längenunterschieden der Sonne und des Cometen für jede der drey Beobachtungszeiten gleich, ziehe GE auf den mittleren Radius Vector SB der Erde senkrecht, und fälle von den zwey übrigen Oertern A, C der Erde die Perpendickel AE, CF auf die FE. Man denke sich die nach dem Cometen gezogenen Gesichtslinien auf eine Ebene projicirt, welche auf den mittleren Radius Vector SA der Erde, mithin auch auf der Ebene der Ekliptik senkrecht sey; so wird GE ihre Durchschnittslinie mit der Ebene der Ekliptik seyn, und man wird nach §. 203. n. 3. die Winkel bestimmen können, welche die Projectionen der nach dem Cometen gezogenen Gesichtslinien auf die erwähnte Ebene mit der Durchschnittslinie GE machen. Diesen Winkeln mache man die Winkel GEa, GBd, GFc gleich, indem man sich die auf der Ekliptik senkrechte Projectionsebene auf die Ebene der Ekliptik niedergelegt denkt. Die Projection Bd der mittleren Gesichtslinie wird, weil SB auf GE senkrecht ist, zugleich die Projection des mittleren Radius Vector des Cometen (§. 205. n. 4.) seyn, und daher durch die Projection des Punkts gehen, in welchem der mittlere Radius Vector die Chorde des ganzen von dem Cometen zwischen der ersten und dritten Beobachtung durchlaufenen Bogens schneidet.

Man nehme jetzt die abgekürzte Distanz des Cometen von der Erde zur Zeit der ersten Beobachtung als gegeben an, und gleich Aa'; so wird, wenn man durch a' eine Parallele $a'a$ mit SB zieht, welche der GE in e, der Ea in a begegnet, der Punkt a die Projection des ersten Cometenorts auf die den mittleren Radius Vector der Erde senkrecht schneidende Ebene seyn. Es sey c die Projection des Orts des Cometen zur Zeit der dritten Beobachtung. Man ziehe die gerade Linie ac, welche von der Bd in d geschnitten werde; so wird diese die Projection der Chorde des von dem Cometen zwischen der ersten und dritten Beobachtung durchlaufenen Bogens, und d die Projection des Punkts seyn, in welchem der Radius Vector jene Chorde schneidet. Unter der Voraussetzung §. 205. n. 1. wird also das Verhältniß von $ad : dc$, dem gegebenen Verhältniß der Zwischenzeiten t' und t'' zwischen der ersten und zweyten, und der zweyten und dritten Beobachtung gleich, und, weil der Punkt a (Vorauss.) gegeben ist, der Punkt c gegeben seyn (§. 205. n. 5.)

Man ziehe durch c die Parallele cc' mit SB, welche der Projection Gc' der dritten nach dem Cometen gezogenen Gesichtslinie auf die Ebene der Ekliptik in c' begegne; so wird Sc' die abgekürzte Distanz des Cometen von der Sonne zur Zeit der dritten Beobachtung, $a'c'$ die Projection der Chorde des ganzen von dem Cometen beschriebenen Bogens auf die Ebene der Ekliptik, und ihr Durchschnittspunkt d' mit einer durch d mit SB gezogenen Parallele die Projection desjenigen Punkts derselben seyn, in welchem sie von dem mittleren Radius Vector geschnitten wird. Da nun $ad : dc = a'd' : d'c'$; so wird (§. 205. n. 5.) die Zeit zwischen der ersten und zweyten, und zwischen der zweyten und dritten Beobachtung nahe den in diesen Zeiten beschriebenen Sectoren proportional seyn. Nun sind aber ae und cg die aus dem ersten und dritten Ort des Cometen auf die Ebene der Ekliptik gefällten Perpendickel (§. 205. n. 3.); folglich sind die Radii Vectores des Cometen zur Zeit der ersten und dritten Beobachtung als Hypotenusen rechtwinklichter Dreyecke, deren um den rechten Winkel liegende Seiten beziehungsweise Sa' und ae, Sc' und gc sind, und die Chorde des ganzen beschriebenen Bogens als Hypotenuse eines rechtwinklichten Dreyecks, dessen um den rechten Winkel liegende Seiten $a'c'$ und $ae - cg$ sind, gegeben. Mithin ist auch die zwischen der ersten und dritten Beobachtung verfloßene Zeit gegeben (§. 204. n. 7. oder 8.). Die abgekürzte Distanz Aa' muß also so bestimmt werden, daß die mittelst derselben gefundene Zwischenzeit der ersten und dritten Beobachtung der beobachteten gleich wird, wie man leicht durch einige Versuche findet. Hat man diese Bedingung erfüllt; so wird die Bahn des Cometen gegeben seyn. Denn man kennt die abgekürzte Distanzen Sa', Sc' des Cometen von der Sonne, und die von ihm auf die Ebene der Ekliptik gefällten Perpendickel ae, cg, mithin die heliocentrischen Breiten desselben zur Zeit der ersten und dritten Beobachtung, und den Unterschied $a'Sc'$ seiner heliocentrischen Längen, so wie die Radios Vectores selbst. Und weil die Sa' der Lage nach gegeben ist; so kennt man den Winkel ASa', mithin mittelst der bekannten Länge der Erde zur Zeit der ersten Beobachtung die heliocentrische Länge des Cometen für die Zeit dieser Beobachtung. Folglich ist (§. 174. und 175.) die Ebene seiner Bahn der Lage nach gegeben. Da nun zwey Radii Vectores der Größe und Lage nach gegeben sind; so ist die durch ihre Endpunkte gehende Parabel gegeben, welche den Mittelpunkt der Sonne zum Brennpunkt hat (§. 202.). Hieraus ergiebt sich der Inhalt des zwischen dem Perihelium und dem ersten Radius Vector liegenden Sectors der Parabel, und die Zeit zwischen dem Durchgang durch das Perihelium und dem Augenblick der ersten Beobachtung, also die Zeit des Periheliums selbst, wodurch vollends die ganze Bahn bestimmt ist.

Zieht man noch an den Punkt d', in welchem die durch d mit SB parallel gezogene dd' der $a'c'$ begegnet, die Sd', welche die der Lage nach gegebene Bb' in b' ſchneide, und durch b' die die Parallele $b'k$ mit dd'; ſo iſt auch die abgekürzte Diſtanz Sb' des Cometen von der Sonne, und das von ihm auf die Ekliptik gefällte Perpendickel kh zur Zeit der zweyten Beobachtung, und daher der mittlere Radius Vector der Größe und Lage gegeben. Demnach ſind drey Punkte und der Brennpunkt gegeben, wodurch die Ellipſe gegeben iſt, auf deren Umfang die drey Punkte liegen (§. 181. 182. 198.), welche aber auf dieſem Weg nicht ſicher gefunden wird, theils weil die Vorausſetzung §. 205. n. 1. nur eine Näherung iſt, theils weil kleine Beobachtungsfehler einen ſehr großen Einfluß auf die Beſtimmung der ſehr ablangen Bahnen der Cometen haben. Uebrigens ergiebt ſich hieraus, daß durch drey geocentriſche Längen und Breiten eines Cometen ſeine paraboliſche Bahn mehr als beſtimmt wird.

Dieſe Conſtruktion lehrt Lambert in der oben angeführten Schrift: Insigniorss orbitæ cometarum proprietates. Probl. XXXI. pag. 83. ſq. und ausführlicher in ſeinen Beyträgen zum Gebrauche der Mathematik. III. Th. S. 270. §. 82. u. f.

§. 207. Berechnung der lambertiſchen Conſtruktion unter der von Olbers gemachten Vorausſetzung, daß auch die Chorde $A'C'$ des von der Erde zwiſchen der erſten und dritten Beobachtung beſchriebenen Bogens von dem mittleren Radius Vector SB der Erde in C im Verhältniß der zwiſchen der erſten und zweyten, und der zweyten und dritten Beobachtung verfloßenen Zeiten geſchnitten werde *).

Es ſeyen A', A'', A''' die drey Längen der Sonne zur Zeit der erſten, zweyten und dritten Beobachtung. R', R'', R''' die correſpondirende Abſtände der Erde von der Sonne, α', α'', α''' die drey geocentriſchen Längen des Cometen, β', β'', β''' ſeine geocentriſche Breiten, t', t'' die Zeiten zwiſchen der erſten und zweyten, und der zweyten und dritten Beobachtung, die ganze Zwiſchenzeit zwiſchen der erſten und dritten, oder $t' + t''$ ſey $= T$. Die drey abgekürzten Diſtanzen des Cometen von der Erde Aa', Bb', Cc' ſeyen ϱ', ϱ'', ϱ'''.

Die Winkel, welche die Projectionen der nach dem Cometen gezogenen Geſichtslinien auf die Ekliptik mit dem mittleren Radius Vector der Erde machen, werden nun nach der Ordnung der Beobachtungen ſeyn $A'' - \alpha'$, $A'' - \alpha''$, $A'' - \alpha'''$, und daher, wenn man $GEa = b'$, $GBd = b''$, $GFc = b'''$ ſetzt, vermöge §. 205. n. 3.

*) Olbers Abhandlung über die leichteste und bequemste Methode die Bahn eines Cometen aus einigen Beobachtungen zu berechnen. §. 33. 38. u. f.

$$\text{Tang. } b' = \frac{\text{Tg. } \beta'}{\text{Sin. } (A'' - \alpha')}$$

$$\text{Tg. } b'' = \frac{\text{Tg. } \beta''}{\text{Sin. } (A'' - \alpha'')}$$

$$\text{Tg. } b''' = \frac{\text{Tg. } \beta'''}{\text{Sin. } (A'' - \alpha''')}$$

Vermöge der Voraussetzung ist so wohl $ad : dc$ als $AD : DC = s' : s''$, und wegen der Parallelen AE, DB, CF, auch $EB : BF = s' : s''$; folglich (§. 205. n. 6.)

$$cF : aE = s'' \text{Sin.} (b'' - b') : s' \text{Sin.} (b''' - b').$$

Nun verhält sich aber in dem rechtwinklichten Dreyeck aEe

$$aE : Ee = 1 : \text{Cos. } b',$$

und wegen der Parallelen AE, $a'e$

$$\begin{aligned} Ee : Aa' &= \text{Sin. } ea'A : 1 \\ &= \text{Sin. } (A'' - \alpha') : 1 \\ \text{also } aE : Aa' &= \text{Sin. } (A'' - \alpha') : \text{Cos. } b'. \end{aligned}$$

$$\text{Eben so } Cc' : eF = \text{Cos. } b''' : \text{Sin. } (A'' - \alpha''')$$

$$\text{da nun } cF : aE = s'' \text{Sin.} (b'' - b') : s' \text{Sin.} (b''' - b'')$$

$$\text{so ist } \left.\begin{matrix} Cc' : Aa' \\ \varrho''' : \varrho' \end{matrix}\right\} = \frac{\text{Sin. } (A'' - \alpha') \text{ Sin. } (b' - b') \text{ Cos. } b''' s'' :}{\text{Sin.} (A'' - \alpha'') \text{ Sin.} (b''' - b'') \text{ Cos. } b' s'}$$

$$= M : 1 \text{ zur Abkürzung.}$$

Es ist aber $$\frac{\text{Sin.} (b'' - b')}{\text{Cos. } b' \text{ Cos. } b''} = \text{Tg. } b'' - \text{Tg. } b'$$

$$\frac{\text{Sin.} (b''' - b'')}{\text{Cos. } b'' \text{ Cos.} b'''} = \text{Tg. } b''' - \text{Tg. } b''$$

folglich $$M = \frac{\text{Sin.} (A'' - \alpha') (\text{Tg. } b'' - \text{Tg. } b') s''}{\text{Sin.} (A'' - \alpha''') (\text{Tg. } b''' - \text{Tg. } b'') s'}$$

und, wenn man die vorhin gefundene Ausdrücke der Tangenten von b', b'', b''' substituirt,

$$1.) \quad M = \frac{(\text{Tg. } \beta'' \text{Sin. } (A'' - \alpha') - \text{Tg. } \beta' \text{Sin.} (A'' - \alpha'')) s''}{(\text{Tg. } \beta''' \text{Sin.} (A'' - \alpha'') - \text{Tg. } \beta'' \text{Sin.} (A'' - \alpha''')) s'}.$$

Ferner ist in dem Dreyeck SAa'

$$\overline{Sa'}^2 = R'^2 + \varrho'^2 - 2 R' \varrho' \text{ Cos. } (A' - \alpha'),$$

und das aus dem ersten Cometenort auf die Ekliptik gefällte Perpendickel ist $= \varrho' \text{ Tg. } \beta'$; folglich ist das Quadrat des demselben entsprechenden Radius Vector des Cometen

$$\begin{aligned} 2.) \quad s'^2 &= R'^2 + \varrho'^2 + \varrho'^2 \text{ Tg.} \overline{\beta'}^2 - 2 R' \varrho' \text{ Cos. } (A' - \alpha') \\ &= R'^2 + \varrho'^2 \text{ Sec.} \overline{\beta'}^2 - 2 R' \varrho' \text{ Cos.} (A' - \alpha') \end{aligned}$$

Eben ſo findet ſich das Quadrat des Radius Vector des Cometen zur Zeit der dritten Beobachtung

3.) $r'''^2 = R'''^2 + \varrho'''^2 \overline{\text{Sec. }\beta'''}^2 - 2R'''\varrho'''\text{Cos.}(A''' - a''')$

$= R'''^2 + M^2\varrho'^2 \overline{\text{Sec. }\beta'''} - 2MR'''\varrho'\text{Cos.}(A''' - a''')$

Man ziehe $a'k$ und $c'l$ auf SB ſenkrecht; ſo iſt

$a'c'^2 = (Sk - Sl)^2 + (c'l - a'k)^2$, und die Differenz der aus dem erſten und dritten Ort des Cometen auf die Ekliptik gefällten Perpendickel iſt $= \varrho'\text{Tg. }\beta' - \varrho'''\text{Tg. }\beta' = \varrho'\text{Tg. }\beta' - M\varrho'\text{Tg. }\beta'''$; folglich iſt, wenn man das Quadrat der letztern zu dem Quadrat von $a'c'$ addirt, das Quadrat der Chorde k'' des ganzen von dem Cometen zwiſchen der erſten und dritten Beobachtung beſchriebenen Bogens

$$\begin{aligned} k''^2 &= \overline{Sk}^2 - 2Sk \times Sl + \overline{Sl}^2 \\ &\quad + \overline{a'k}^2 - 2a'k \times c'l + \overline{c'l}^2 \\ &\quad + \varrho'^2\text{Tg.}\beta'^2 \qquad + \varrho'''^2\text{Tg.}\beta'''^2 - 2\varrho'\varrho'''\text{Tg.}\beta'\text{Tg.}\beta''' \\ &= r'^2 - 2Sk \times Sl - 2a'k \times c'l + r'''^2 - 2M\varrho'^2\text{Tg.}\beta'\text{Tg.}\beta'''. \end{aligned}$$

Aber $Sk = R'\text{Cos.}(A'' - A') - \varrho'\text{Cos.}(A'' - a')$

$Sl = R'''\text{Cos.}(A''' - A'') - \varrho'''\text{Cos.}(A'' - a''')$

$a'k = \varrho'\text{Sin.}(A'' - a') - R'\text{Sin.}(A'' - A')$

$c'l = \varrho'''\text{Sin.}(A'' - a''') + R'''\text{Sin.}(A''' - A'')$;

folglich iſt, wenn man dieſe Werthe in dem obigen Ausdruck des Quadrats von k'' ſubſtituirt, und die gehörigen Reduktionen macht,

4.) $k''^2 = r'^2 + r'''^2 - 2R'R'''\text{Cos.}(A''' - A')$

$+ 2R'''\varrho'\text{Cos.}(A''' - a') + 2MR'\varrho'\text{Cos.}(A' - a''')$

$- 2M\varrho'^2\text{Cos.}(a''' - a') - 2M\varrho'^2\text{Tg.}\beta'\text{Tg.}\beta'''$

$= F + G\varrho' + H\varrho'^2$ zur Abkürzung, wo F, G und H gegebene Zahlen ſind.

Endlich iſt, wenn man die conſtante Zahl $\frac{T}{3\pi}\sqrt{\frac{1+\mu}{2}} = K$ ſetzt.

5.) $t' + t'' \Big\} = K\left(\left(\frac{r' + r''' + k''}{2}\right)^{\frac{3}{2}} - \left(\frac{r' + r''' - k''}{2}\right)^{\frac{3}{2}}\right)$ (§. 204. n. 7.)

Mittelſt dieſer Ausdrücke kann nun die abgekürzte Diſtanz ϱ' des Cometen von der Erde zur Zeit der erſten Beobachtung und daraus ferner r', r''', k'' auf folgende Art durch einige wenige Verſuche gefunden werden. Man ſucht zuerſt den Werth von M nach n. 1. und berechnet ſodenn die Coefficienten von ϱ' und die Quadrate von R', R''' in den Formeln n. 2. und 3., und die Zahlen F, G, H in der Formel n. 4. Man wird alſo nur noch eine unbekannte Größe, nemlich ϱ' in den Gleichungen ha-

den, welche so zu bestimmen ist, daß die mittelst derselben durch die Formeln n. 2. 3. und 4. gefundenen Werthe von r', r''', k'' in die Formel n. 5. gesetzt die Zeit zwischen der ersten und dritten Beobachtung eben so groß geben, als man sie wirklich beobachtet hat. Zu dem Ende nimmt man einen Werth von ϱ' nach Belieben an, und sucht mittelst desselben die Zeit, welche zwischen der ersten und dritten Beobachtung hätte verfließen müssen, und deren Vergleichung mit der beobachteten zeigen wird, ob der angenommene Werth von ϱ' vermehrt oder vermindert werden müsse, um eine der beobachteten Zwischenzeit näher kommende zu erhalten. Hat man einmal durch eine gröbere Berechnung einen nahen Werth von ϱ' gefunden; so berechnet man für zwey wenig unter sich und von dem vorhergehenden verschiedene Werthe von ϱ' die Zwischenzeit genauer, und sucht sodann den genauen Werth von ϱ' und die ihm entsprechende Werthe von r', r''', k'' durch Interpolation. Aus ϱ' findet sich $\varrho''' = M\varrho'$.

Wenn in dem Ausdruck von M (§. 207. n. 1.) die Coefficienten von t'' und t' im Zähler und Nenner zugleich verschwinden, oder zugleich sehr klein werden; so kann im ersten Fall die Cometenbahn auf diesem Weg gar nicht, im zweyten nicht sicher gefunden werden. Die Projectionen der nach dem Cometen gezogenen Gesichtslinien auf die den mittleren Radius Vector der Erde senkrecht schneidende Ebene sind alsdenn genau oder nahe einander parallel, und das Verhältniß von $\varrho' : \varrho'''$ bleibt unbestimmt, oder wird nicht sicher gefunden. In diesem Fall muß man, wenn diese Methode beybehalten werden soll, eine andere mittlere Beobachtung wählen *).

§. 208. Hat man ϱ', ϱ''', r', r''' und k'' gefunden; so ergeben sich die Elemente der Bahn auf folgende Art. Es ist, wenn (Fig. 63.) die Sonne, die Erde und der Comet in S, T, P sind, unter der Voraussetzung der Construktion im 194sten §.

$$SP : PR = \text{Sin. tot.} : \text{Sin. } PSR$$
$$PR : RT = \text{Tg. } PTR : \text{Sin. tot.}$$

also $SP : RT = \text{Tg. } PTR : \text{Sin. } PSR$,

und, wenn man die heliocentrische Breiten des Cometen zur Zeit der ersten und dritten Beobachtung $= \lambda'$ und λ''' setzt,

1.) $\text{Sin. } \lambda' = \dfrac{\varrho' \text{Tg. } \beta'}{r'}$

2.) $\text{Sin. } \lambda''' = \dfrac{\varrho''' \text{Tg. } \beta'''}{r'''}$

Ferner ist in dem Dreyeck ASa' (Fig. 71.)

$Sa' : Aa' = \text{Sin. } SAa' : \text{Sin. } ASa'$

oder

*) *Olbers* in Astr. Jahrb. für 1809. pag. 193.

oder $r' \text{Cos.}\,\lambda' : \varrho' = \text{Sin.}\,(A' - a') : \text{Sin.}\,ASa'$

Heißen nun die Unterſchiede ASa', CSc' der heliocentriſchen Längen des Cometen und der Erde zur Zeit der erſten und dritten Beobachtung s', s'''; ſo hat man

$$3.)\ \text{Sin.}\,s' = \frac{\varrho' \text{Sin.}\,(A' - a')}{r\ \text{Cos.}\,\lambda'}$$

$$4.)\ \text{Sin.}\,s''' = \frac{\varrho''' \text{Sin.}\,(A''' - a''')}{r'''\ \text{Cos.}\,\lambda'''},$$

wo die Winkel s', s''' ſo zu beſtimmen ſind, daß in den Dreyecken ASa', CSc', deren Seiten man kennt, immer der größeren Seite der größere Winkel gegenüberliegt. Addirt man dieſe Winkel zu den correſpondirenden Längen der Erde, oder zieht ſie davon ab, je nachdem ihre Sinus poſitiv oder negativ ſind; ſo erhält man die heliocentriſchen Längen C', C''' des Cometen für die erſte und dritte Beobachtung. Die auf die Ekliptik reducirte Bewegung des Cometen wird nun direkt oder retrograd ſeyn, je nachdem C''' größer oder kleiner iſt als C', weil man hier weiß, daß der Comet in der Zwiſchenzeit nicht den Winkel $360° - (C''' - C')$ kann um die Sonne beſchrieben haben.

Aus den zwey gefundenen heliocentriſchen Längen und Breiten erhält man nach §. 175. n. 3.

$$5.)\ \text{Tg.}\,(\tfrac{1}{2}(C''' + C') - \Omega) = \frac{\text{Sin.}\,(\lambda''' + \lambda')}{\text{Sin.}\,(\lambda''' - \lambda')}\ \text{Tg.}\,\tfrac{1}{2}(C''' - C'),$$

woraus ſich die Länge des aufſteigenden Knotens ergiebt. Man ziehe von dem Winkel $\frac{1}{2}(C''' + C') - \Omega$ den Winkel $\frac{1}{2}(C''' - C')$ ab; ſo erhält man $C' - \Omega$, und ſodann die Neigung i der Cometenbahn mittelſt des Ausdrucks.

$$6.)\ \text{Tg.}\,i = \frac{\text{Tg.}\,\lambda'}{\text{Sin.}\,(C' - \Omega)}\ (\text{§. 175. n. 1.})$$

Der Winkel $\frac{1}{2}(C''' + C') - \Omega$ muß ſo beſtimmt werden, daß die nach n. 6. gefundene Tangente der Neigung poſitiv oder negativ wird, je nachdem die auf die Ekliptik reducirte Bewegung des Cometen direkt oder retrograd iſt, und man hat nicht nöthig die direkte und retrograde Bewegung zu unterſcheiden, wenn man im letzteren Fall die Neigung nicht wie gewöhnlich durch den ſpitzen Winkel, ſondern durch ſeinen Nebenwinkel mißt, ſo daß die Neigung der Bahn größer als 90° wird *).

Nun iſt unter der Vorausſetzung der §. 174. und 177. gezeigten Conſtruktion

$$\left.\begin{array}{l} Sp : Sq = \text{Sin. tot.} : \text{Cos.}\,pSq \\ Sq : Sr = \text{Cos.}\,qSr : \text{Sin. tot.} \end{array}\right\}$$

$$\text{folglich } Sp : Sr \text{ oder } \text{Sin. tot.} \text{Cos.}\,pSr = \text{Cos.}\,qSr : \text{Cos.}\,pSq.$$

*) Gauſs Theor. mot. corp. coel. §. 50. 110.

Daher ist, wenn die heliocentrische Entfernungen des Cometen von dem aufsteigenden Knoten in der Ebene seiner Bahn, oder die Argumente der Breite, u' und u''' heißen,

7.) $\text{Cos. } u' = \text{Cos. } \lambda' \text{ Cos. } (C' - \Omega)$
$\text{Cos. } u''' = \text{Cos. } \lambda''' \text{ Cos. } (C''' - \Omega)$

oder auch 8.) $\text{Tg. } u' = \frac{\text{Tg. } (C' - \Omega)}{\text{Cos. } i}$ (§. 190. n. 1.)

$$\text{Tg. } u''' = \frac{\text{Tg. } (C''' - \Omega)}{\text{Cos. } i},$$

wo die Winkel u', u''' im ersten oder zweyten Halbzirkel zu nehmen sind, je nachdem die correspondirende Breiten nördlich oder südlich sind.

Man kennt also jetzt den Winkel $u''' - u'$ oder w'', welchen der erste Radius Vector des Cometen mit dem dritten macht. Die dem ersten Radius Vector r' entsprechende wahre Anomalie heiße v, und der Abstand des Periheliums des Cometen von der Sonne heiße D. Da (Fig. 66.) $FM = MQ = GP = 2AF - FM \text{ Cos. } AFM$; so ist $r' (1 + \text{Cos. } v) = 2D$

oder 9.) $r' \overline{\text{Cos. } \frac{1}{2} v}^2 = D.$

Eben so ist 10.) $r''' \overline{\text{Cos. } \frac{1}{2} (v + w'')}^2 = D$, und daher

$\text{Cos. } \frac{1}{2} v : \text{Cos. } \frac{1}{2} (v + w'') = \pm \sqrt{\frac{r'''}{r'}} : 1$, wo das untere Zeichen für den Fall gilt, in welchem w'' größer ist, als 180°. In Beziehung auf das obere Zeichen, ist, wenn man

11.) $\text{Tang. } x = \sqrt{\frac{r'''}{r'}}$ macht,

$\text{Cotg. } \frac{1}{4} w'' : \text{Tg. } (\frac{1}{4} w'' + \frac{1}{2} v) = \text{Sin. tot.} : \text{Tg. } (x - 45°)$, und daher

12.) $\text{Tg. } (\frac{1}{4} w'' + \frac{1}{2} v) = \text{Cotang. } \frac{1}{4} w'' \text{ Tg. } (x - 45°)$

Wenn $w'' > 180°$ ist; so hat man

$\text{Tg. } (\frac{1}{4} w'' + \frac{1}{2} v) = - \text{Cotg. } \frac{1}{4} w'' \text{ Tg. } (x + 45°)$

Mittelst der wahren Anomalie v erhält man die Länge des Periheliums $= \Omega + u' - v$. Endlich ist (Fig. 66.) $AP = GP - GA = MQ - GA = FM - AF = \frac{D}{\text{Cos. } \frac{1}{2} u^2} - D$ (n. 9.) $= D \overline{\text{Tg. } \frac{1}{2} v}^2$, und $PM = 4D \times AP = 4D^2 \overline{\text{Tg. } \frac{1}{2} v}^2$; mithin $PM = 2D \text{ Tg. } \frac{1}{2} v$. Da nun der Sector $AFM = \frac{2}{3} AP \times PM + \frac{1}{2} FP \times PM = (\frac{2}{3} AP + \frac{1}{2} AF - \frac{1}{2} AP) PM = (\frac{1}{6} AP + \frac{1}{2} AF) PM$; so wird, wenn man obige Werthe von AP und PM substituirt, der Sector $AFM = D^2 (\frac{1}{3} \overline{\text{Tg. } \frac{1}{2} v}^2 + 1) \text{ Tg. } \frac{1}{2} v$

$$\frac{\text{Sector } AFM}{\sqrt{\text{halb. Param.}}} = \frac{D^{\frac{3}{2}}\left(\text{Tg.}\frac{1}{2}v^3 + 3\,\text{Tg.}\frac{1}{2}v\right)}{3\sqrt{2}}.$$

Folglich ist, wenn man die constante Zahl $\frac{1}{3\pi\sqrt{2}}\sqrt{1+\mu} = K$, und die Zeit, in welcher die wahre Anomalie v beschrieben wird, gleich t setzt,

13.) $t = D^{\frac{3}{2}} K\left(\text{Tg.}\frac{1}{2}v^3 + 3\,\text{Tg.}\frac{1}{2}v\right)$

Hieraus ergiebt sich also die zwischen der ersten Beobachtung und dem Durchgang des Cometen durch das Perihelium verflossene Zeit. Aus der Vergleichung der Länge des Periheliums mit der heliocentrischen Länge des Cometen zur Zeit der ersten Beobachtung findet sich aber, ob der Comet schon durch das Perihelium gegangen ist, oder sich demselben nähert; folglich ist die Zeit des Periheliums gegeben, und die ganze Bahn bestimmt.

§. 209. Anwendung dieser Methode auf den im Jahr 1807 erschienenen Cometen.

mittl. Zeit zu Tübingen. U. M.	beob. geoc. Länge des Cometen.	beob. geoc. Br.
Oct. 6 7 27	224° 18′ 15″	24° 36′ 4″ nördlich.
15 6 55	231 47 39	34 27 26
26 6 34	242 8 12	44 44 20

$t' = 8{,}977778$ T.
$t'' = 10{,}985417$

Für diese drey Beobachtungen finden sich folgende, wegen der Aberration um 20″,25 vergrößerte (§. 195.) Längen der Sonne, und Logarithmen von R:

$A' = 192° 34′ 48″$	Lg. $R' = 9{,}995149$	$R'^2 = 0{,}997768$
$A'' = 201\ 28\ 9$	Lg. $R'' = 9{,}9983754$	
$A''' = 212\ 24\ 15$	Lg. $R''' = 9{,}9970808$	$R'''^2 = 0{,}986646$

Hienach Lg. Tg. $\beta'' = 9{,}8364394$
Lg. Tg. $\beta' = 9{,}6607319$

$A''-a' = 337° 9′ 54″$	Lg. Sin. $= 9{,}5889197$	neg.
$A''-a' = 329\ 40\ 30$	Lg. Sin. $= 9{,}7032091$	neg.
	$9{,}4253591$;	$- 0{,}2662925$
	$9{,}3639410$;	$- 0{,}2311751$
		$- 0{,}0351174$

Lg. Tg. $\beta''' = 9{,}9960416$
Lg. Tg. $\beta'' = 9{,}8364394$
Lg. Sin. $(A''-a'') = 9{,}7032091$ neg.
$A''-a''' = 319\ 19\ 57$ Lg. Sin. $= 9{,}8140265$ neg.

9,6992507; — 0,5003233
9,6504659; — 0,4471631
— 0,0531602

$$M = \frac{351174}{531602} \cdot \frac{t''}{t'}; \text{ Lg. } M = 9{,}9075834.$$

Ferner erhält man nach §. 207. n. 2, 3. 4. folgende drey Gleichungen:

1.) $r'^2 = 0{,}997768 - 1{,}699280\ \varrho' + 1{,}209635\ \varrho'^2$
2.) $r'''^2 = 0{,}986646 - 1{,}394406\ \varrho' + 1{,}291960\ \varrho'^2$
3.) $k''^2 = 0{,}117629 - 0{,}102241\ \varrho' + 0{,}232147\ \varrho'^2$

Setzt man nun $\varrho' = 1$; so werden $r'^2 = 0{,}5081$; $r' = 0{,}71$
$r'''^2 = 0{,}8872$; $r''' = 0{,}94$
$k''^2 = 0{,}2475$; $k'' = 0{,}50$,

und daher nach §. 207. n. 5. $\left.\begin{matrix} t'+t'' \\ T \end{matrix}\right\} = 18{,}596$. Es ist aber $T = 19{,}96319$; folglich giebt diese Voraussetzung die ganze Zwischenzeit um 1,367 Tage zu klein. Man setze $\varrho' = 1{,}1$; so werden $r' = 0{,}77$; $r''' = 1{,}01$; $k'' = 0{,}53$ und $T = 20{,}507$, mithin um 0,544 Tage zu gros. Folglich fällt ϱ' zwischen 1 und 1,1. Da nun der Unterschied der unter diesen Voraussetzungen gefundenen Zeiten $= 1{,}91$ T. und der Unterschied der zwey Werthe von ϱ' gleich 0,1 ist; so wird, wenn man die Unterschiede der Zeiten den Unterschieden der Werthe von ϱ' proportional setzt, sich verhalten $1{,}9 : 0{,}544 = 0{,}1$ zu der Zahl, welche von 1,1 hinweggenommen werden muß, um einen genaueren Werth von ϱ' zu erhalten. Man wird diese Verminderung $= 0{,}03$ finden, und ϱ' wird daher nicht sehr von $1{,}1 - 0{,}03$ oder von 1,07 verschieden seyn. Setzt man hienach $\varrho' = 1{,}07$; so erhält man aus obigen Gleichungen, wenn man jetzt die Rechnung genauer führt,

$r' = 0{,}751299$; $k'' = 0{,}523465$
$r''' = 0{,}988550$
$r' + r''' = 1{,}737849$
$\frac{r' + r'''}{2} = 0{,}869924.5$
$\frac{1}{2} k'' = 0{,}261732.5$

Summe $s = 1{,}131657$; Lg. $s = 0{,}0537148$; Lg. $d = 9{,}7840407$
Differenz $d = 0{,}608192$; $\frac{1}{2}$ Lg. $s = 0{,}0268574$; $\frac{1}{2}$ Lg. $d = 9{,}8920203.5$
Lg. $K = 1{,}4378123$; Lg. $K = 1{,}4378123$
$1{,}5183845$ $1{,}1138733.5$
$32{,}99017$ $12{,}99790$
$12{,}99790$

berechnete Zeit $T = 19.99227$ T.
beobachtete Zeit $= 19.96319$
Unterschied $= 0{,}02908$

Der angenommene Werth 1,07 von ϱ' ist also noch um etwas zu groß. Man setze daher $\varrho' = 1{,}065$; so werden $r' = 0{,}748350$; $r''' = 0{,}985079$; $k'' = 0{,}521583$, und $T = 19{,}88358$, um 0,07961 T. zu klein.

Folglich fällt ϱ' zwischen 1,07 und 1,065. Der Unterschied der Werthe von ϱ' ist 0,05, und der Unterschied der correspondirenden Zeiten ist 0,10869 T. Daher wird sich nahe verhalten

$$\left.\begin{array}{l} 0{,}10869 : 0{,}02908 \\ 10869 : 2908 \end{array}\right\} = 0{,}005$$

zu der Zahl, um welche man den Werth 1,07 von ϱ' noch vermindern muß. Man findet 0,001338, und daher ist der verbesserte Werth von $\varrho' = 1{,}068662$. Nun werden auch die Veränderungen von ϱ' nahe den correspondirenden Veränderungen von r', r''', k'' proportional seyn; mithin wird sich nahe verhalten 0,005 : 0,001338 oder 1 : 0,2676, wie die Unterschiede 0,002949; 0,003471; 0,001882 der unter den zwey Voraussetzungen gefundenen Werthe von r', r''', k'', zu den Verbesserungen derjenigen Werthe derselben, welche man mit $\varrho' = 1{,}07$ gefunden hat, und um welche die letztern müssen vermindert werden. Multiplicirt man jene Unterschiede mit 0,2676; so erhält man die Verbesserungen 0,000789; 0,000929; 0,000504, und die verbesserten Werthe $r' = 0{,}750510$; $r''' = 0{,}987621$; $k'' = 0{,}522961$.

Zur Versicherung der Rechnung kann man mit dem verbesserten Werth von ϱ' die Werthe von r', r''', k'' unmittelbar aus den Gleichungen n. 1, 2, 3. suchen, und mittelst dieser die Zeit T berechnen. Man wird finden

Lg. $r' = 9.8753552$; $r' = 0{,}750508$
Lg. $r''' = 9{,}7945889$; $r''' = 0\,987618$
Lg. $k'' = 9{,}7184700$; $k'' = 0{,}522962$, nahe wie durch die Interpolation. T findet sich $= 19{,}96316$, nur um 0,00003 T. oder 2,6 Sek. zu klein.

§. 210. Berechnung der Elemente der Bahn nach §. 208.

		Lg. M	$= 9{,}9075834$
			$0{,}0288403$
Lg. ϱ'	$= 0{,}0288403$	Lg. ϱ'''	$= 9{,}9364237$
Lg. Tg. β'	$= 9{,}6607319$	Lg. Tg. β'''	$= 9{,}9960416$
	$9{,}6895722$		$9{,}9324653$
Lg. r'	$= 9{,}8753552$	Lg. r'''	$= 9{,}9945889$
Lg. Sin. λ'	$= 9{,}8142170$	Lg. Sin. λ'''	$= 9{,}9378764$
λ'	$= 40^\circ\,41',21''$	λ'''	$= 60^\circ\,4'\,45''$
Lg. ϱ'	$= 0{,}0288403$	Lg. ϱ'''	$= 9{,}9364237$
Lg. Sin. $(A'-u')$	$= 9{,}7208458$ neg.	Lg. Sin. $(A'''-u''')$	$= 9{,}6954390$ neg.
	$9{,}7496861$		$9{,}6318627$

Lg. r'	= 9,8753552	Lg. r'''	= 9,9945889
Lg. Cos. λ'	= 9,8798168	Lg. Cos. λ'''	= 9,6979290
	9,7551720		9,6925179
Si	= 9,9945141 neg.	Lg. Sin. ε'''	= 9,9393448 neg.
	- 80° 54′ 44″	ε'''	= - 60° 25′ 5″
	= 372 34 48;	$A'''+180$	= 392 24 15
	= 291 40 4;	C'''	= 331 59 10
	= 60 4 [illegible]		291 40 4
λ'	= [illegible] 21		623 39 14
	6		40 19 6
	= 19 23 24	$\frac{C'''+C'}{2}$	= 311 49 37
	$-\lambda'$) = 9,9922842	$\frac{C'''-C'}{2}$	= 20 9 33
	$\frac{r'''-C'}{2}$ = 9,5648073.3		
	9,5570915.3		
Lg. Sin. $(\lambda'''-\lambda')$	= 9,5211335.2		
	0,0359580.1;	$\frac{C'''+C'}{2}-\Omega$	= 47 22 9
Lg. Tg. λ'	= 9 9344009	Ω	= 264 27 28
Lg. Sin. $(C'-\Omega)$	= 9,6601567	$C'-\Omega$	= 27 12 36
Lg. Tg. i	= 9,2742442;	i	= 61 59 44
Lg. Tg. $(C'-\Omega)$	= 9,7110906	$C'''-\Omega$	= 67 31 42
Lg. Tg. $(C'''-\Omega)$	= 0,3833834		
Lg. Cos. i	= 9,6716727		
Lg. Tg. u'	= 0,0394179	u'	= 47 35 48
Lg. Tg. u'''	= 0,7117197	u'''	= 79 0 32
Lg. r'''	= 9,9945889.5	w''	= 31 24 44
Lg. r'	= 9,8753552	$\frac{1}{4}w''$	= 7 51 11
	0,1192337.5		
Lg. Tg. x	= 0,0596168.7;	x	= 48 55 13,01
Lg. Tg. $(x-45°)$	= 8,8358730	$x-45$	= 3 55 13,01
Lg. Cotg. $\frac{1}{4}w''$	= 0,8603524		
Lg. Tg. $(\frac{1}{4}w''+\frac{1}{2}v)$	= 9,6962254;	$\frac{1}{4}w''+\frac{1}{2}v$	= 26 25 14
2 Lg. Cos. $\frac{1}{2}v$	= 9,9535701	$\frac{1}{2}v$	= 18 34 3
Lg. r'	= 9,8753652	v	= 37 8 6
Lg. D	= 9,8289253.	$\Omega+u'$	= 312 [illegible] 16
		Länge des Perih.	274 55 10
		Abst.	= 0,674412

$\frac{1}{2}$ Lg. D	= 9,9144626	
Lg. K	= 1,4378123	
	1,1812002	
Lg. Tg. $\frac{1}{2}v$	= 9,5262175	
3 Lg. Tg. $\frac{1}{2}v$	= 8,5786525	
Lg. 3	= 0,4771213	
	1,1845390;	15,29463
	9,7598527;	0,57524
	t =	15,86987
Zeit der ersten Beob.	Oct. 6. od. Sept.	36,31042
Zeit des Periheliums		20,44055

oder 1807. Sept. 20. Ab. um 10 U. 34′ 24″ mittl. Zeit zu Tübingen.

§. 211. Die gefundenen Elemente kann man nun dadurch prüfen, daß man für die drey Beobachtungszeiten die geocentrische Länge und Breite des Cometen berechnet, und diese mit den beobachteten vergleicht. Dabey wird es aber hauptsächlich auf die zweyte Beobachtung ankommen. Denn die Uebereinstimmung der zwey übrigen mit den Beobachtungen zeigt nur, daß in den Berechnungen des 210. §. kein Fehler begangen worden ist, die mittlere Beobachtung hingegen wird nur alsdenn mit den Berechnungen übereinstimmen können, wenn die Chorden der in der ganzen Zwischenzeit der Beobachtungen von der Erde und dem Cometen beschriebenen Bogen von den mittleren Radiis vectoribus sehr nahe im Verhältniß der Zeiten geschnitten werden.

Um nun für eine gegebene Zeit den heliocentrischen Ort eines Cometen zu finden, suche man zuerst die Zwischenzeit t zwischen dem gegebenen Zeitpunkt und der Zeit des Periheliums. Mittelst dieser erhält man aus der cubischen Gleichung §. 208. n. 13., welche nur eine mögliche Wurzel hat, die wahre Anomalie v auf folgende Art. Man bestimme die Hülfswinkel m, n so, daß

$$\text{Tg. } m = \frac{2KD^{\frac{3}{2}}}{t}; \quad \text{Tang. } n = \sqrt[3]{\text{Tg. } \tfrac{1}{2}m}; \text{ so ist}$$

$$\text{Tang. } \tfrac{1}{2}v = 2 \text{ Cotg. } 2n.$$

Es ist z. B. die Zeit der zweyten Beobachtung §. 209. Oct. 15,28819 oder Sept. 45,28819

Zeit des Perih. 20,44055 Sept.

t	= 24,84764	T.
Lg. 2	= 0,3010300	
Lg. K	= 1,4378123	
Lg. $D^{\frac{3}{2}}$	= 9,7433879	
	1,4822302	

Lg. t	= 1,3952851				
Lg. Tg. m	= 0,0869451;	m	= 50°	41′	50″,4
Lg. Tg. $\frac{1}{2}m$	= 9,6753377;	$\frac{1}{2}m$	= 25	20	55,2
Lg. Tg. n	= 9,8918459;	n	= 37	56	17,95
Lg. Cotg. $2n$	= 9,4007385;	$2n$	= 75	52	35,9
Lg. 2	= 0,3010300				
Lg. Tg. $\frac{1}{2}v$	= 9,7017685;	$\frac{1}{2}v$	= 26	42	46,9
wahre Anomalie für die zweyte Beobachtung			= 53	25	33,8

Die fernere Berechnung des heliocentrischen Orts des Cometen geschieht, wie in dem 190. §. bey den Planeten gezeigt worden ist

Es ist die Länge des Perih.	=	274	55	10
wahre Anomalie	=	53	25	34
Länge in der Bahn	=	328	20	44
Länge ☊	=	264	27	28
Argument der Breite	=	63	53	16

Hieraus findet sich die heliocentrische Länge des Cometen = 308° 13′ 37″, und seine heliocentrische Breite = 52° 26′ 51″.

Den Logarithmen des Radius Vector erhält man mittelst der Gleichung n. 9. §. 208. = 9,9269605, und alsdenn nach den §. 195. gegebenen Regeln

die geocentrische Länge = 231° 39′ 45″; geoc. Breite = 34° 20′ 26″
Aber nach den Beob. α'' = 231 47 39; β'' = 34 27 26
Unterschiede 44 7 0.

Diese beträchtliche Unterschiede rühren daher, daß die Coefficienten von t' und t'' in dem Ausdruck von M (§. 207. n. 1.) ziemlich klein sind, wo eine geringe Abweichung des Verhältnisses der Segmente der Chorden von dem Verhältniß der Zeiten einen beträchtlichen Einfluß auf die Elemente der Bahn hat.

§. 212. Zur bequemeren Auflösung der Aufgaben, aus der gegebenen Zeit die wahre Anomalie eines Cometen, und aus der wahren Anomalie die Zeit zu finden, in welcher sie der Comet beschrieben hat, hat man Tafeln berechnet. Die bequemste ist die Barkerische *). Diese enthält für die wahren Anomalien von 5 zu 5 Minuten die Zahlen $N = 25\,(\mathrm{Tg.}\frac{1}{2}v^3 + 3\,\mathrm{Tg.}\frac{1}{2}v)$ bis zu einer Anomalie von 45°, und von da an die Logarithmen derselben. Diese Zahlen N drücken also den Inhalt der parabolischen Sectoren einer Parabel aus, für welche der Abstand des Perihelii = 1 ist, wenn man den Inhalt des einer Anomalie von 90 Gr. entsprechenden Sectors = 100 setzt, und

*) Sie ist Olbers Abhandlung angehängt.

heißen die mittlere Bewegung. Vermöge der Gleichung n. 13 wird für einen Cometen, deſſen Abſtand von der Sonne im Perihelium $= D$ iſt, ſeyn $t = \frac{KD^{\frac{3}{2}}N}{25}$, und $\frac{25}{K} \cdot \frac{t}{D^{\frac{3}{2}}} = N$.

Die conſtante Zahl $\frac{25}{K}$ heiße B; ſo iſt aus §. 204. n. 11. der Lg. $B = 9{,}9601276749$. Die Zahl $\frac{B}{D^{\frac{3}{2}}}$ heißt die mittlere tägliche Bewegung des Cometen, deren Logarithme gefunden wird, wenn man von dem conſtanten Lg. B die Summe des Logarithmen des kleinſten Abſtands D und der Hälfte eben dieſes Logarithmen abzieht. Setzt man die mittlere tägliche Bewegung $= B'$; ſo iſt $B't = N$. Iſt nun ν gegeben; ſo findet man mittelſt der Tafel den correſpondirenden Werth von N oder Lg. N, und $t = \frac{N}{B'}$. Iſt aber t gegeben, ſo hat man $N = B't$, und findet mittelſt der Tafel die zu der gefundenen Zahl N oder ihrem Logarithmen gehörige wahre Anomalie ν.

Es iſt z. B. für die §. 210. gefundene Elemente

Lg. D	$=$	9,8289253
$\frac{1}{2}$ Lg. D	$=$	9,9144626
Lg. B	$=$	9,7433879
		9,9601277
Lg. B'	$=$	0,2167398. Sey $t = 24{,}84764$ Tagen; ſo iſt
Lg. t	$=$	1,3952852
Lg. N	$=$	1,6120250, hiezu gehört in der Tafel $\nu = 53°$ 25′ 33″,8, wie man in dem 211ten §. gefunden hat.

§. 213. Wenn man die Cometenbahn ſchon beyläufig kennt; ſo kann man leicht unterſuchen, wie weit die Vorausſetzung richtig iſt, daß ſo wohl die Chorde der Cometenbahn als die Chorde der Erdbahn von den mittleren Radiis vectoribus im Verhältniß der Zwiſchenzeiten geſchnitten werde, und alſo eben dadurch die Genauigkeit der Elemente prüfen. In Beziehung auf die Erde hätte man wegen der bekannten Elemente ihrer Bahn die Unterſuchung gleich anfangs anſtellen können. Es iſt nemlich (Fig. 71.)

$$AD : DC = EB : BF = AS \text{ Sin. } ASB : CS \text{ Sin. } BSC$$
$$= R' \text{ Sin.}(A'' - A') : R''' \text{ Sin.}(A''' - A'').$$

In Beziehung auf die Cometenbahn findet ſich eben ſo, wenn w, w' die in den Zwiſchenzeiten t', t'' von dem Cometen um die Sonne beſchriebene Winkel, und r', r''' wie vorhin die Radii Vectores deſſelben für die erſte und dritte Beobachtung ſind, das Verhältniß der Segmente der Chorde oder ihrer Projectionen

$\Big\} = r' \mathrm{Sin.}\, w : r''' \mathrm{Sin.}\, w'.$

s Verhältniß berechnen zu können, muß man die
lie des Cometen für die mittlere Beobachtung nach
bekannten Elementen berechnen (§. 211. oder 212.).
bt sich der Winkel w gleich der Differenz oder Sum-
n Anomalien zur Zeit der zweyten und ersten Be-
e nachdem die zwey Cometenörter auf einerley, oder
enen Seiten des Periheliums liegen, und $w' = w'' -$
w'' [illegible] ist, welchen der Comet zwi-
ersten u[illegible]ung um die Sonne beschrie-

an findet man für die §. [illegible] angeführte Beobachtungen

$$= \frac{R''' \mathrm{Sin.}\,(A''' - A'')}{R' \mathrm{Sin.}\,(A'' - A')} = 1{,}220753$$

$$\text{Aber } \frac{t''}{t'} = 1{,}223623$$

$$\text{Unterschied} = 0{,}002870$$

Für den Cometen hat man in dem 211. §. gefunden die wahre Anomalie zur Zeit der zweyten Beob. $= 53^\circ\ 25'\ 34''$

— — — ersten — $= 37\ \ 8\ \ 6$ (§. 210.)

also ist $w = 16\ 17\ 28$

da nun $w'' = 31\ 24\ 44$ (§. 210.)

so ist $w' = 15\ \ 7\ 16.$

Mittelst dieser Winkel, und der §. 209. gefundenen Werthe von r' und r''' erhält man

$$\left.\begin{matrix} \frac{dc}{ad} \\ \frac{d'c'}{a'd'} \end{matrix}\right\} = \frac{r''' \mathrm{Sin.}\, w'}{r' \mathrm{Sin.}\, w} = 1{,}223717$$

$$\frac{t''}{t'} = 1{,}223623$$

$$\text{Unterschied} = 0{,}000094$$

Demnach weicht das Verhältniß der Segmente der Chorde der Erdbahn in gegenwärtigem Fall beträchtlich von dem Verhältniß der Zeiten ab, bey dem Cometen hingegen ist die Abweichung sehr klein. Aus dem ersteren Unterschied ergiebt es sich schon, daß die gefundenen Elemente der Cometenbahn nicht genau seyn können. Da man aber jetzt die Verhältnisse der Segmente der Chorden sehr nahe kennt; so kann man nach der bequemen von Olbers gezeigten Methode *) die gefundenen Elemente leicht verbessern.

*) In der angeführten Abhandl. Abschn. IV. §. 54. u. f.

Es ist in Beziehung auf die 70. Figur, wenn man statt des Verhältnißes von $t'' : t'$ das Verhältniß der Segmente der Chorde der Cometenbahn $= p'' : p'$ setzt,

$eE : aD = p'' \text{Sin.} ADB : p' \text{Sin.} BEC$ (§. 205. n. 5.)

also $eE = \frac{p''}{p'} \frac{\text{Sin.} ADB}{\text{Sin.} BEC} aD$. Eben so ist, wenn das Verhältniß der Segmente der Chorde der Erdbahn dem Verhältniß von $P'' : P'$ gleich ist,

$$CE = \frac{P''}{P'} \frac{\text{Sin.} ADB}{\text{Sin.} BEC} AD$$

folglich $Ce = \left(\frac{P''}{P'} AD - \frac{p''}{p'} (AD - Aa)\right) \frac{\text{Sin.} ADB}{\text{Sin.} BEC}$

$$= \left(\left(\frac{P''}{P'} - \frac{p''}{p'}\right) \frac{AD}{Aa} + \frac{p''}{p'}\right) Aa \frac{\text{Sin.} ADB}{\text{Sin.} BEC}$$

Man setze $\frac{p''}{p'} = \frac{t''}{t'} + p$; $\frac{P''}{P'} = \frac{t''}{t'} + q$, $AD = f$; so ist

$f = \frac{AB \text{Sin.} ABD}{\text{Sin.} ADB} = \frac{AB \text{Sin.} b''}{\text{Sin.} (b'' - b')}$, oder in Beziehung auf die 71ste Figur $= \frac{BE \text{Sin.} b''}{\text{Sin.} (b'' - b')} = \frac{R' \text{Sin.} (A'' - A') \text{Sin.} b''}{\text{Sin.} (b'' - b')}$, und in Beziehung auf eben diese Figur

$$eF = \left(\frac{t''}{t'} + p + (q - p) \frac{f}{aE}\right) aE \frac{\text{Sin.} (b'' - b')}{\text{Sin.} (b''' - b'')}$$

$$= \left(1 + p \frac{t'}{t''} + (q - p) \frac{t'}{t''} \cdot \frac{f}{aE}\right) \frac{t'' \text{Sin.} (b'' - b')}{t' \text{Sin.} (b''' - b'')} aE$$

Es ist aber $aE = \frac{Aa' \text{Sin.} (A'' - a')}{\text{Cos.} b'}$ (§. 207.)

folglich $\frac{f}{aE} = \frac{R' \text{Sin.} (A'' - A') \text{Sin.} b'' \text{Cos.} b'}{Aa' \text{Sin.} (A'' - a') \text{Sin.} (b'' - b')}$

$$= \frac{R' \text{Sin.} (A'' - A')}{\varrho' \text{Sin.} (A'' - a')} \frac{\text{Tg.} b''}{\text{Tg.} b'' - \text{Tg.} b'}$$

$$= \frac{R' \text{Sin.} (A'' - A')}{\varrho' \text{Sin.} (A'' - a')} \times \frac{\text{Tg.} \beta'' \text{Sin.} (A'' - a')}{\text{Tg.} \beta'' \text{Sin.} (A'' - a') - \text{Tg.} \beta' \text{Sin.} (A'' - a'')}$$

$$= \frac{R'}{\varrho'} \cdot \frac{\text{Tg.} \beta'' \text{Sin.} (A'' - A')}{\text{Tg.} \beta'' \text{Sin.} (A'' - a') - \text{Tg.} \beta' \text{Sin.} (A'' - a'')}.$$

Man berechne also

1.) $p = \frac{r''' \text{Sin.} w'}{r' \text{Sin.} w} - \frac{t''}{t'}$

2.) $q = \frac{R''' \text{Sin.} (A''' - A'')}{R' \text{Sin.} (A'' - A')} - \frac{t''}{t'}$

3.) $g = \frac{R' \text{Sin.}(A''-A')(q-p)\,\text{Tg.}\,\beta''\varepsilon'}{(\text{Tg.}\beta''\,\text{Sin.}(A''-\alpha')-\text{Tg.}\beta\,\text{Sin.}(A''-\alpha''))\varepsilon''}$, wo der Nenner dem schon gefundenen Zähler in dem Ausdruck von M (§. 207. n. 1.) gleich ist; so ist

$$\varepsilon F = \left(1 + \frac{\varepsilon'}{\varepsilon''}p + \frac{g}{\varrho'}\right)\frac{\varepsilon''\text{Sin.}(b''-b')}{\varepsilon\,\text{Sin.}(b'''-b'')}\,\varepsilon E, \text{ und daher}$$

4.) $\varrho''' = \left(1 + \frac{\varepsilon'}{\varepsilon''}p + \frac{g}{\varrho'}\right) M\varrho'$

Nun kann aber der vorhin gefundene genäherte Werth von ϱ', welcher mit (ϱ) bezeichnet werde, nur sehr wenig von seinem wahren Werth verschieden seyn, und daher wird, weil $q-p$, mithin auch g sehr klein sind (den Fall ausgenommen, wo der Nenner in dem Ausdruck von g sehr klein wäre, und, wie schon oben bemerkt wurde, schon die erste Approximation unsicher würde), ohne merklichen Fehler seyn

5.) $\varrho''' = \left(1 + \frac{\varepsilon'}{\varepsilon''}p + \frac{g}{(\varrho)}\right) M\varrho'$.

Die Gleichung n. 2. §. 207. wird also unverändert bleiben, und um die Gleichungen n. 3. und 4. eben dieses §. zu verbessern, wird man nur diejenigen Coefficienten, welche M und M^2 enthalten, mit $1 + \frac{\varepsilon'}{\varepsilon''}p + \frac{g}{(\varrho)}$ und mit dem Quadrat dieser Zahl beziehungsweise zu multipliciren haben, welches sehr leicht geschehen kann, da man aus der vorhergehenden Rechnung die Logarithmen dieser Coefficienten hat.

Nach §. 213. ist $p = 0{,}000094$

$q = -\,0{,}002870$

$q-p = -\,0{,}002964$. Lg. $= 7{,}4718782$

Lg. $R'\text{Sin.}(A''-A') = 9{,}1885097$ (§. 213.)

Lg. Tg. $\beta'' = 9{,}8364394$

Lg. $\varepsilon' = 0{,}9531689$

$7{,}4499962$

Lg. $0{,}0351175 = 8{,}5455236$ neg. (§. 209.)

Lg. $\varepsilon'' = 1{,}0408165$

Lg. $(\varrho) = 0{,}0288403$

$9{,}6151804$

$7{,}8348158$; $\frac{g}{(\varrho)} = +0{,}0068362$

$\frac{\varepsilon'}{\varepsilon''}p = 0{,}0000768$

$0{,}0069130$

$\varepsilon''' = (1{,}006913)\,M\varrho'$; Lg. $1{,}006913 = 0{,}0029919$; demnach

darf man, um die verbeſſerten Coefficienten in den Gleichungen für r''' und k'' zu erhalten, zu den Logarithmen der Coefficienten welche M enthalten, nur 0,0029919, und zu denjenigen, welche M^2 enthalten, 0,0059838 addiren, und die den ſo verbeſſerten Logarithmen entſprechende Zahlen aufſuchen. Die fernere Berechnung geſchieht ſodenn nach §. 209. und 210.

Will man mit Lambert vorausſetzen, daß allein die Chorde des von dem Cometen in der Zwiſchenzeit der erſten und dritten Beobachtung beſchriebenen Bogens von dem mittleren Radius Vector in Verhältniß der Zeiten geſchnitten werde; ſo ſetze man in den Gleichungen n. 3. und 4. die Zahl $p = o$. Es ſey g' der Werth von g unter dieſer Vorausſetzung; ſo wird man haben

$$\varrho''' = \left(1 + \frac{\varepsilon'}{\varrho'}\right) M\varrho' = M\varrho' + Mg'.$$

Multiplicirt man nun die Coefficienten der Gleichungen n. 3. und 4. des 207. §. welche M enthalten, mit $1 + \frac{\varepsilon'}{\varrho'}$, und diejenige, welche das Quadrat von M enthalten, mit dem Quadrat von $1 + \frac{\varepsilon'}{\varrho'}$; ſo wird man genau die in Formeln gebrachte lambertiſche Conſtruktion haben. Die Gleichungen n. 3. und 4. werden ihre vorige Form beybehalten, und die fernere Berechnung der Cometenbahn wird von der oben gezeigten nicht verſchieden ſeyn. Eben dieſes ergiebt ſich auch aus der Betrachtung der 71ſten Figur. Iſt nemlich das Verhältniß von $ad : dc$ oder von t' zu t'' dem Verhältniß von $AD : DC$ oder von $EB : BF$ nicht gleich; ſo ſey durch den gegebenen Punkt E die gerade Linie $EB'F'$ ſo gezogen, daß $EB' : B'F'$ wie $t' : t''$. Alsdenn wird ſich nach §. 295. n. 6. verhalten $aE : cF' = t' \text{Sin.}(b''' - b'') : t'' \text{Sin.}(b'' - b') = 1 : N$ zur Abkürzung, und es wird $cF' = N.aE$, $cF = N.aE + FF'$ ſeyn. Und da die Verhältniße von $aE : Aa'$ und von $cF : Cc'$ gegeben ſind; ſo wird man die nach der von Olbers gemachten Vorausſetzung gefundene abgekürzte Diſtanz des Cometen von der Erde in der dritten Beobachtung um eine gegebene Größe zu vermehren oder zu vermindern haben, je nachdem F zwiſchen c und F oder auf die Verlängerung von cF fällt, um genau bey Lamberts Conſtruktion zu bleiben. Indeſſen wird die Rechnung beträchtlich abgekürzt werden, wenn man bey der bequemen von Olbers gezeigten Auflöſungsart bleibt, und die Verbeſſerungen wegen der Erde und des Cometen zugleich nach ſeiner Methode nachholt. Da es, wie ſchon oben bemerkt wurde, einige Fälle giebt, wo die bisher gezeigte Methode nicht ſicher angewendet werden kann, oder auch die Berechnung ſich noch mehr abkürzen läßt; ſo be-

trachtet dieſe Olbers beſonders, worüber man ſeine Abhandlung nachſehen kann.

§. 214. Nachdem man die Länge des Knotens und die Neigung der Bahn beyläufig gefunden hat; ſo kann die Cometenbahn nach der §. 203. im allgemeinen angezeigten Newtoniſchen Methode *). noch genauer beſtimmt werden. Es werden dazu drey geocentriſche Längen und Breiten des Cometen erfordert, um zugleich die elliptiſche Bahn beſtimmen zu können, wenn ſich die Beobachtungen nicht durch eine Parabel ſollten darſtell n laſſen. Je weiter die Beobachtungen von einander entfernt ſind, deſto genauer werden die Elemente der Bahn beſtimmt. Nur darf die Neigung der Bahn nicht ſehr klein, und die Erde nicht zu nahe bey der Knotenlinie zur Zeit der drey Beobachtungen ſeyn. Es ſeyen Ω und i die beyläufig bekannte Länge des Knotens und die Neigung der Bahn. Man berechne nach §. 197. für jede der drey Beobachtungen, und unter folgenden drey Hypotheſen:

1ſte Hyp. 2te Hyp. 3te Hyp.

Ω $\Omega + p$ Ω

i i $i + q$, wo p und q von 10, 15, 20 oder mehreren Minuten genommen werden dürfen,

die Argumente der Breite des Cometen u' u'' u'''

und die Radios Vectores r' r'' r''', und aus dieſen die Chorden k', k'' der zwiſchen der erſten und zweyten, und der erſten und dritten Beobachtung von dem Cometen beſchriebenen Bogen mittelſt der bekannten trigonometriſchen Gleichungen

$$k'^2 = (r''-r')^2 + 4r'r''\overline{\text{Sin.}\tfrac{1}{2}(u''-u')}^2$$

$$k''^2 = (r'''-r')^2 + 4r'r'''\overline{\text{Sin.}\tfrac{1}{2}(u'''-u')}^2$$

Oder: man ſuche die Hülfswinkel z, z' durch

$$\text{Cos. } z' = \frac{2\text{Sin.}\frac{1}{2}(u''-u')\sqrt{r'r''}}{r''+r'}$$

$$\text{Cos. } z'' = \frac{2\text{Sin.}\frac{1}{2}(u'''-u')\sqrt{r'r'''}}{r'''+r'}; \text{ ſo iſt } k' = (r''+r')\text{Sin. } z'$$

$k'' = (r'''+r')\text{Sin. } z''$.

Aus k', k'', r', r'', r''' erhält man unmittelbar nach §. 207. n. 5. die Zeiten, welche zwiſchen der erſten und zweyten, und der erſten und dritten Beobachtung hätten verſtreichen ſollen. Dieſe ſeyen:

*) Philosoph. nat. princ. mathem. L. III. prop. XLII. probl. XXII. Ihre Anwendung auf die Parabel wird durch das Lambertiſche Theorem (§. 204. n. 8.) ſehr vereinfacht. Vergl. die Abhandl. von *Olbers* §. 68. u. f.

1ste Hyp.	2te Hyp.	3te Hyp.
τ'	$\tau'+l$	$\tau'+m$
und τ''	$\tau''+o$	$\tau''+s$,

die beobachteten Zwischenzeiten aber seyen t' und t''. Die wahre Länge des Knotens sey $\Omega+x$, die wahre Neigung der Bahn $i+y$. Wenn nun x und y klein sind; so werden die Veränderungen der berechneten Zwischenzeiten nahe den correspondirenden Veränderungen von Ω und i proportional seyn, und man wird setzen können $p : x = l$ zu der Veränderung des von der Verbesserung x abhängenden Theils der ersten Zwischenzeit, und $q : m = y$ zu dem von der Verbesserung y abhängenden Theil der Verbesserung der Zwischenzeit. Daher wird seyn müssen

$$\frac{lx}{p} + \frac{my}{q} + \tau' = t'$$

eben so $\frac{ox}{p} + \frac{sy}{q} + \tau'' = t''$;

mithin $x = \frac{(t''-\tau'')mp-(t'-\tau')sp}{mo-ls}$

$$y = \frac{(t'-\tau')oq-(t''-\tau'')lq}{mo-ls}$$

Hat man x und y gefunden; so ergeben sich die verbesserten Werthe von r', r'', r''', u', u'', u''' durch Interpolation. Denn wenn die Werthe irgend einer dieser Größen in den drey Hypothesen sind B, $B+f$, $B+g$; so wird man für die von den Veränderungen der Länge des Knotens und der Neigung abhängende Verbesserungen derselben nahe die Proportionen haben

$p : f = x$: dem ersten Theil der Verbess.

$q : g = y$: dem zweyten — —

und es wird daher der verbesserte Werth von B nahe $= B + \frac{fx}{p} + \frac{gy}{q}$ seyn. Finden sich x und y beträchtlich größer als p und q; so muß man um eine größere Genauigkeit zu erreichen, die Rechnung nach drey neuen der Wahrheit näher kommenden Hypothesen wiederholen.

Eben diese Methode ist auch auf die Ellipse anwendbar. Denn durch r', r'', r''' und u', u'', u''' ist für jede der drey Hypothesen die Ellipse gegeben, welche der Comet hätte beschreiben müssen (§. 182. und 198.). Hieraus findet sich nach dem angeführten §. die wahre Anomalie für jede der drey Beobachtungen, und nach §. 185. die mittlere Anomalie, mithin auch die Zwischenzeit zwischen der ersten und zweyten, und zwischen der ersten und dritten Beobachtung, mittelst welcher man wie vorhin die zwey Gleichungen zur Bestimmung von x und y erhält.

piel mögen die §. 209. angeführten Beobachtungen
gleich vortheilhaft ist, weiter von einander ent-
btungen zu wählen. Die Länge des Knotens sey
$= \Omega$, die Neigung der Bahn $62° 16' 19'' = i$,
aus denselben Beobachtungen nach den §. 213. ge-
sser ngen ergeben haben. Man suche nach §. 197.
, $\mathfrak{B}$, $\mathfrak{C}$, $\mathfrak{D}$ mittelst der Gleichungen

$$\mathfrak{A} = \text{Sin.}\,(\alpha - A)\,\text{Cotg.}\,\beta$$
$$\mathfrak{B} = \text{Cos.}\,(\alpha - A)\,\text{Cos.}\,\beta$$

ng. $\frac{\Omega - A}{2}$

4.) $\text{Tg.}\,\mathfrak{D} = \frac{\text{Sin.}\frac{1}{2}(\mathfrak{A} - i)}{\text{Sin.}\frac{1}{2}(\mathfrak{A} + i)}\,\text{Cotg.}\,\frac{\Omega - A}{2}$

elchen α die geocentrische Länge des Cometen, β seine geo-
rische Breite, und A die Länge der Sonne bezeichnen; so ist
Argument u der Breite $= \mathfrak{C} + \mathfrak{D}$, und der Radius Vector
des Cometen

$$r = \frac{R\,\text{Sin.}\,\mathfrak{B}}{\text{Sin.}\,(\mathfrak{B} + \mathfrak{C} - \mathfrak{D})},$$ wenn der Radius Vector der Erde $= R$ ist.

Die auf die erste, zweyte und dritte Beobachtung sich bezie-
hende Größen unterscheide man von einander durch einen, zwey
oder drey Striche.

Erste Hypothese $\Omega = 264° 55' 6''$; $i = 62° 16' 19''$

α'	$= 224°$	$18'$	$15''$
A'	$= 192$	34	48
$\alpha' - A'$	$= 31$	43	27
β'	$= 24$	36	4
Ω	$= 264$	55	6
$\Omega - A'$	$= 72$	20	18
$\frac{\Omega - A'}{2}$	$= 36$	10	9

Lg. Sin. $= 9{,}7208458$; Lg. Cos. $= 9{,}9297200$
Lg. Cotg. $= 0{,}3392681$; Lg. Cos. $= 9{,}9586728$
$0{,}0601139$ $\quad 9\ 8883928$

$\mathfrak{A}' = 41° 2' 50'',0 \quad \mathfrak{B}' = 39° 20' 29'',9$

$i = 62\ 16\ 19{,}0$

$\mathfrak{A}' - i = -\ 21\ 13\ 29\ 0$
$\mathfrak{A}' + i = 103\ 19\ 9{,}0$

$\frac{\mathfrak{A}' - i}{2} = -\ 10\ 36\ 44{,}5$

$\frac{\mathfrak{A}' + i}{2} = 51\ 39\ 34{,}5$

$\text{Lg. Cotg.}\,\frac{\Omega - A'}{2} = 0{,}1360450 \qquad 0{,}1360450$

$\text{Lg. Sin.}\,\frac{\mathfrak{A}' - i}{2} = 9{,}2652033 \quad \text{neg. Lg. Cos.} = 9{,}9925074$

$9{,}4012483 \qquad 0{,}1285524$

Lg.

[redacted]

$$\text{Lg. Sin.}\ \frac{\mathfrak{A}'+i}{2} = 9{,}8945038 \qquad \text{Lg. Cos.} = 9{,}7926248$$

$$\text{Lg. Tg. } \mathfrak{D}' = 9{,}5067445; \quad \text{Lg. Tg. } \mathfrak{C}' = 0{,}3359279$$

$$\mathfrak{D}' = -\ 17^\circ\ 48'\ 20'',97$$

$$\mathfrak{C}' = 65\ \ 13\ \ 54{,}03$$

$$u' = 47\ \ 25\ \ 33{,}06$$

$$\mathfrak{C}' - \mathfrak{D}' = 83\ \ 2\ \ 15{,}0 \qquad \text{Lg. } \mathfrak{K}' = 9{,}9995149$$

$$\mathfrak{B}' = 39\ \ 20\ \ 29{,}9 \qquad \text{Lg. Sin. } \mathfrak{B}' = 9{,}8020522$$

$$122\ \ 22\ \ 44{,}9 \qquad 9{,}8015651$$

$$\text{Lg. Sin.} = 9{,}9266115$$

$$\text{Lg. } r' = 9{,}8749536$$

$$r' = 0{,}749814$$

Eben so finden sich $u'' = 63^\circ\ 38'\ 10'',84$; $r'' = 0{,}8499846$

$u''' = 78\ \ 36\ \ 32{,}9$; $r''' = 9{,}9911930$;

und hieraus $k' = 0{,}246309$; $k'' = 0{,}522522$

$r' = 9{,}04957$ T. $r'' = 19{,}96323$

aber $t' = 8{,}97777$ $t'' = 19{,}96319$

also $t' - r' = -\ 0{,}07180$ $t'' - r'' = -\ 0{,}000044$

Zweyte Hypothese $\Omega + p = 265^\circ\ 15'\ 6''$; $p = 20'$; $i = 62^\circ\ 16'\ 19''$.

Man findet wie vorhin $u' = 47^\circ\ 23'\ 38'',9$; $r' = 0{,}7478775$

$u'' = 63\ \ 34\ \ 39{,}9$; $r'' = 0{,}8483256$

$u''' = 78\ \ 30\ \ 34{,}45$; $r''' = 0{,}9901080$

$k' = 0{,}2457026$; $k'' = 0{,}521291$

$r' + l = 9{,}01387$; $r'' + o = 19{,}89901$

und da $r' = 9{,}04957$; $r'' = 19{,}96323$

so ist $l = -\ 0{,}03570$, und $o = 0{,}06422$

Für die dritte Hypothese $\Omega = 264^\circ\ 55'\ 6''$; $i + y = 62^\circ\ 36'\ 19''$; $q = 20'$ finden sich

$u' = 47^\circ\ 16'\ 27'',81$; $r' = 0{,}752223$

$u'' = 63\ \ 24\ \ 58{,}97$; $r'' = 0{,}853810$

$u''' = 78\ \ 17\ \ 53{,}1$; $r''' = 0{,}997342$

$k' = 0{,}2469022$; $k'' = 0{,}5241330$

$r' + m = 9{,}08575$; $r'' + s = 20{,}074237$

$r' = 9{,}04957$ $r'' = 19{,}96323$

$m = 0{,}03618$ $s = 0{,}111007$

Daher ist $x = 1^\circ\ 37'\ 14''$; $y = 0^\circ\ 56'\ 15'',6$

und weil $\Omega = 264\ \ 55\ \ 6$ $i = 62\ \ 16\ \ 19$

so ist $\Omega + x = 266\ \ 32\ \ 20$; $i + y = 63\ \ 12\ \ 35$

Weil hier x und y beträchtlich größer geworden sind als p und q; so muß man mittelst der verbesserten Werthe von Ω und i die Rechnung wiederholen. Man wird jetzt $x = +\ 2'\ 1''$ und $y = -\ 1'\ 3''$ finden; und daher wird die Länge des Ω sehr nahe $= 266^\circ\ 34'\ 21''$ und die Neigung der Bahn $i = 63^\circ\ 11'\ 32''$ seyn. Ferner findet man durch Interpolation

Lg. t	= 1,3952851				
Lg. Tg. m	= 0,0869451;	m	= 50°	41′	50″,4
Lg. Tg. $\frac{1}{2}m$	= 9,6753377;	$\frac{1}{2}m$	= 25	20	55,2
Lg. Tg. n	= 9,8918459;	n	= 37	56	17,95
Lg. Cotg. $2n$	= 9,4007385;	$2n$	= 75	52	35,9
Lg. 2	= 0,3010300				
Lg. Tg. $\frac{1}{2}v$	= 9,7017685;	$\frac{1}{2}v$	= 26	42	46,9
wahre Anomalie für die zweyte Beobachtung			= 53	25	33,8

Die fernere Berechnung des heliocentrischen Orts des Cometen geschieht, wie in dem 190. §. bey den Planeten gezeigt worden ist

Es ist die Länge des Perih.	=	274	55 10
wahre Anomalie	=	53	25 34
Länge in der Bahn	=	328	20 44
Länge ☊	=	264	27 28
Argument der Breite	=	63	53 16

Hieraus findet sich die heliocentrische Länge des Cometen = 308° 13′ 37″, und seine heliocentrische Breite = 52° 26′ 51″.

Den Logarithmen des Radius Vector erhält man mittelst der Gleichung n. 9. §. 208. = 9,9269605, und alsdenn nach den §. 195. gegebenen Regeln

die geocentrische Länge = 231° 39′ 45″; geoc. Breite = 34° 20′ 26″

Aber nach den Beob.	α'' = 231 47 39;	β'' = 34 27 26
Unterschiede	44	7 0.

Diese beträchtliche Unterschiede rühren daher, daß die Coefficienten von t' und t'' in dem Ausdruck von M (§. 207. n. 1.) ziemlich klein sind, wo eine geringe Abweichung des Verhältnisses der Segmente der Chorden von dem Verhältniß der Zeiten einen beträchtlichen Einfluß auf die Elemente der Bahn hat.

§. 212. Zur bequemeren Auflösung der Aufgaben, aus der gegebenen Zeit die wahre Anomalie eines Cometen, und aus der wahren Anomalie die Zeit zu finden, in welcher sie der Comet beschrieben hat, hat man Tafeln berechnet. Die bequemste ist die Barkerische *). Diese enthält für die wahren Anomalien von 5 zu 5 Minuten die Zahlen $N = 25\,(\mathrm{Tg.}\frac{1}{2}v^3 + 3\,\mathrm{Tg.}\frac{1}{2}v)$ bis zu einer Anomalie von 45°, und von da an die Logarithmen derselben. Diese Zahlen N drücken also den Inhalt der paraboliſchen Sectoren einer Parabel aus, für welche der Abstand des Perihelii = 1 ist, wenn man den Inhalt des einer Anomalie von 90 Gr. entsprechenden Sectors = 100 setzt, und

*) Sie ist Olbers Abhandlung angehängt.

dert sehr genaue Beobachtungen, und eine vorläufige Reduktion derselben wegen der Parallaxe, Aberration und Nutation. Die erstere ergiebt sich mittelst der aus den beyläufig gefundenen Elementen berechneten Entfernungen des Cometen von der Erde, wodurch das Verhältniß seiner Horizontalparallaxe zu der Horizontalparallaxe der Sonne gegeben ist (§. 49. n. 1.). Sodann kann man die Aberration in Rechnung bringen, wenn man die Zeit t berechnet, welche das Licht gebrauchte, um von dem Cometen zu der Erde zu gelangen. Ist nemlich ε die Zeit der Beobachtung; so wird der beobachtete Ort dem von der Aberration befreyten Ort entsprechen, welchen man zu der Zeit $\varepsilon - t$ beobachtet haben würde, wenn die Erde in dem der Zeit $\varepsilon - t$ zugehörigen Punkt ihrer Bahn gewesen wäre, und das Licht sich augenblicklich fortpflanzte. Die Zeit t findet sich, wenn man 8′ 13″,2 oder 493″,2 mit dem Abstand des Cometen von der Erde multiplicirt. Man sucht aus den astronomischen Tafeln die Länge der Sonne für die Zeit $\varepsilon - t$, und addirt zu derselben 180° 0′ 20″,25; so hat man den correspondirenden Ort der Erde. Aus den beobachteten von der Refraktion und Parallaxe befreyten geraden Aufsteigungen und Abweichungen sucht man mittelst der scheinbaren Schiefe der Ekliptik die Längen und Breiten, und leitet aus diesen diejenige her, welche man bey einer für eine gewiße Epoche geltenden mittleren Schiefe der Ekliptik gefunden haben würde. Bey der Berechnung des Orts der Sonne aus den Tafeln läßt man daher die Nutation weg. Endlich vermindert oder vermehrt man die nach oder vor der angenommenen Epoche beobachteten und reducirten Oerter und die berechneten Längen der Sonne um die mittlere Bewegung der Aequinoktialpunkte in der zwischen der Epoche und der Zeit der Beobachtung verfloßenen Zeit. Die aus den so reducirten Beobachtungen gefundene Elemente beziehen sich alsdenn auf eine unveränderliche Ebene, nemlich auf die mittlere Ebene der Ekliptik für die angenommene Epoche, und die Längen sind von dem mittleren für eben diese Epoche geltenden Aequinoktialpunkt an gerechnet.

§. 216. Weil das in der Nähe der Sonne liegende Stück einer Cometenbahn in den meisten Fällen nicht merklich von einer Parabel abweicht; so sind die paraboliſchen Elemente der Cometenbahnen hinreichend, um einen Cometen, welcher schon einmal beobachtet worden ist, wieder zu erkennen. Wenn die Länge und der Abstand des Perihe-liums, die Länge des Knotens und die Neigung der Bahn sammt der Richtung der Bewegung nahe dieselben sind; so ist es sehr wahrscheinlich, daß der erschienene Comet derselbe

ſey, welchen man vorher ſchon beobachtet hat. Wegen der großen Umlaufszeit und des Mangels älterer genauen Beobachtungen der Cometen findet ſich unter 98 bis jetzt beobachteten und berechneten Cometen nur einer, deſſen Umlaufszeit man mit Gewißheit kennt, nemlich der im 185ſten §. angeführte, welcher im Jahr 1456 zum erſtenmal aſtronomiſch beobachtet wurde. Seine früheren Erſcheinungen ſind zweifelhaft. Halley fand nemlich, daß unter 24 von ihm berechneten Cometen drey ſehr nahe einerley Elemente hatten, die von den Jahren 1531, 1607, und 1682, woraus er ſchloß, daß dieß ein und derſelbe Comet ſeyn könne. Er ſagte daher die Wiederkunft dieſes Cometen auf das Ende des Jahrs 1758 oder auf den Anfang des Jahrs 1759 voraus. Er erſchien auch wirklich im Jahr 1759, und Clairaut hatte im Jahr 1758 noch vor ſeiner Wiedererſcheinung gezeigt, daß wegen der Einwirkung des Jupiters, welcher ſchon Halley die Irregularitäten in den zwiſchen ſeinen Wiedererſcheinungen verfloßenen Perioden *) zugeſchrieben hatte, der Comet dießmal um ungefähr 618 Tage ſpäter durch das Perihelium gehen würde, als es vermöge der zwiſchen 1607 und 1682 verfloßenen Periode hätte geſchehen ſollen. Er ſetzte die Durchgangszeit durch das Perihelium auf die Mitte des Aprils 1758, und bemerkte zugleich, daß die kleinen in ſeinen Approximationen vernachläßigten Größen dieſen Zeitpunkt um einen Monat früher herbeyführen oder weiter würden hinausſchieben können. Der Comet gieng durch das Perihelium am 12. März 1759, welcher Zeitpunkt innerhalb der von Clairaut feſtgeſetzten Gränzen liegt. Die elliptiſchen Elemente dieſes ſogenannten Halley'ſchen Cometen ſind nach Klinkenberg **) folgende:

Zeit des Periheliums 1759 März 12. um 13 U. 7 M. 35 S. mittlerer Zeit zu Paris:

*) Die zwiſchen den Durchgängen durch das Perihelium in den Jahren 1456, 1531, 1607, 1682 verfloßene Perioden ſind nemlich 75 Jahre 77 T.; 76 J. 53 T.; 74 J. 323 T.

**) S. Olbers Abhandlung, welcher von Zach ein genaues Verzeichniß der Elemente aller ſeit dem Jahr 837. nach C. G. bis zum Mai 1797 berechneten Cometenbahnen, 89 an der Zahl, beygefügt hat.

Länge des Ω	= 53° 15′ 35″,4
Neigung der Bahn	17 40 5
Länge des Perih.	303 19 18
Abstand des Perih.	0,5829726
Halbe große Axe	18,018467
Halbe kleine Axe	4,546272
Die Bewegung	rückläufig.

§. 217. Ob die Cometen ein eigenes Licht haben, oder nur, wie die Planeten, von der Sonne beleuchtet werden, scheint noch nicht durch die Beobachtungen entschieden zu seyn. Wenn man sie durch stark vergrößernde Teleskope in solchen Stellungen gegen die Sonne und die Erde beobachtet, wo sie uns nur einen Theil derjenigen Hälfte ihrer Oberfläche zukehren, welche von den Sonnenstralen getroffen werden kann; so bemerkt man keine Phasen, und allein der Comet vom Jahr 1744 scheint Veränderungen in seinen Lichtgestalten gezeigt zu haben. Allein die Beobachtungen sind zweifelhaft. Herschel *) beobachtete den im Jahr 1807 erschienenen Cometen vom 4. bis zum 19. Okt. durch seine Teleskope, welche ihm denselben beständig als eine scharf begränzte ganz beleuchtete Scheibe zeigten, ungeachtet am 4. Okt. der Bogen des von der Sonne beleuchteten Theils nur 119° 45′ 9″, und am 19. Okt. 124° 22′ 40″ betrug, woraus er glaubt folgern zu können, daß das Licht des Cometen nicht von dem Sonnenlicht allein herrühren könne, weil er sonst die Abweichung seiner Lichtgestalt von einer ganz beleuchteten Scheibe hätte bemerken müssen. Vielleicht ist aber der sogenannte Kern der Cometen nur der dichteste Theil des sie umgebenden Nebels, durch welchen man schon Fixsterne beobachtet hat, und welcher daher von dem Sonnenlicht ganz durchdrungen wird. Der Comet selbst kann so klein seyn, daß es nicht möglich ist, seine Phasen zu bemerken, welche noch überdiß durch das von dem beleuchteten Nebel auf den Cometen zurückgeworfene Licht undeutlich gemacht werden müssen.

Herschel hat auch Beobachtungen zur Bestimmung der wahren Größe des Cometen vom Jahr 1807 angestellt. Er schätzte seinen scheinbaren Durchmesser am 19. Okt. etwas

*) Philosoph. Transact. 1808. P. II.

kleiner, als den des dritten Jupitersmondes, und ſetzt ihn hienach auf eine Sekunde. Der Abſtand des Cometen von der Erde zur Zeit der Beobachtung war 1,169192, (die mittl. Diſtanz der Erde von der Sonne = 1 geſetzt). Demnach wäre ſein wahrer Durchmeſſer = 0,0664 des Erddurchmeſſers = 114 geogr. Meilen.

Fünftes Capitel.

Von der Bahn des Monds um die Erde, und den Bahnen der übrigen Nebenplaneten um ihre Hauptplaneten.

§. 218. Es iſt in dem vierten Capitel des erſten Buchs gezeigt worden, daß man die Bewegung des Monds um die Erde als eine Bewegung in einer durch den Mittelpunkt der Erde gelegten Ebene betrachten kann, welche theils durch die Veränderung der Länge des aufſteigenden Knotens, theils durch die beſtändige Veränderung der Neigung der Mondsbahn mit jedem Augenblick in eine andere Lage gegen die Ekliptik gebracht wird. Seine Bewegungen in dieſer veränderlichen Ebene zeigen neben der von ſeiner Lage gegen die Apſidenlinie abhängenden Ungleichheit eine große Anzahl kleinerer Ungleichheiten von verſchiedenen Perioden, unter welchen die im 69ſten §. bemerkten, nemlich die Evection, Variation und die jährliche Gleichung die beträchtlichſten ſind. Man findet, daß die von der Lage des Monds gegen die Apſidenlinie abhängende Ungleichheit ſehr nahe daſſelbe Geſetz befolgt, welches man in den elliptiſchen Bewegungen der Planeten um die Sonne beobachtet, und ſich durch eine Bewegung des Monds in einer Ellipſe darſtellen läßt, welche den Mittelpunkt der Erde zu einem ihrer Brennpunkte hat. Der Radius Vector des Monds ſchneidet den Zeiten proportionale Flächenräume ab, die Excentricität iſt = 0,0550268, und daher die gröſte Gleichung des Mittelpunkts des Monds = 6° 18′ 28″,1 (§. 188.). Die große Axe der Ellipſe, oder die Apſidenlinie der Mondsbahn hat *eine vorwärts* gehende Bewegung, ſo daß ſie in 3231 T.

darf man, um die verbesserten Coefficienten in den Gleichungen für r''' und k'' zu erhalten, zu den Logarithmen der Coefficienten welche M enthalten, nur 0,0029919, und zu denjenigen, welche M^2 enthalten, 0,0059838 addiren, und die den so verbesserten Logarithmen entsprechende Zahlen aufsuchen. Die fernere Berechnung geschieht sodenn nach §. 209. und 210.

Will man mit Lambert voraussetzen, daß allein die Chorde des von dem Cometen in der Zwischenzeit der ersten und dritten Beobachtung beschriebenen Bogens von dem mittleren Radius Vector in Verhältniß der Zeiten geschnitten werde; so setze man in den Gleichungen n. 3. und 4. die Zahl $p = o$. Es sey g' der Werth von g unter dieser Voraussetzung; so wird man haben

$$\varrho''' = \left(1 + \frac{g'}{\varrho'}\right) M\varrho' = M\varrho' + Mg'.$$

Multiplicirt man nun die Coefficienten der Gleichungen n. 3. und 4. des 207. §. welche M enthalten, mit $1 + \frac{g'}{\varrho'}$, und diejenige, welche das Quadrat von M enthalten, mit dem Quadrat von $1 + \frac{g'}{\varrho'}$; so wird man genau die in Formeln gebrachte lambertische Construktion haben. Die Gleichungen n. 3. und 4. werden ihre vorige Form beybehalten, und die fernere Berechnung der Cometenbahn wird von der oben gezeigten nicht verschieden seyn. Eben dieses ergiebt sich auch aus der Betrachtung der 71sten Figur. Ist nemlich das Verhältniß von $ad : dc$ oder von t' zu t'' dem Verhältniß von $AD : DC$ oder von $EB : BF$ nicht gleich; so sey durch den gegebenen Punkt E die gerade Linie $EB'F'$ so gezogen, daß $EB' : B'F'$ wie $t' : t''$. Alsdenn wird sich nach §. 295. n. 6. verhalten $aE : cF' = t'\text{Sin.}(b''' - b'') : t''\text{ Sin.}(b'' - b') = 1 : N$ zur Abkürzung, und es wird $cF' = N.aE$, $cF = N.aE + FF'$ seyn. Und da die Verhältniße von $aE : Aa'$ und von $cF : Cc'$ gegeben sind; so wird man die nach der von Olbers gemachten Voraussetzung gefundene abgekürzte Distanz des Cometen von der Erde in der dritten Beobachtung um eine gegebene Größe zu vermehren oder zu vermindern haben, je nachdem F zwischen c und F oder auf die Verlängerung von cF fällt, um genau bey Lamberts Construktion zu bleiben. Indessen wird die Rechnung beträchtlich abgekürzt werden, wenn man bey der bequemen von Olbers gezeigten Auflösungsart bleibt, und die Verbesserungen wegen der Erde und des Cometen zugleich nach seiner Methode nachholt. Da es, wie schon oben bemerkt wurde, einige Fälle giebt, wo die bisher gezeigte Methode nicht sicher angewendet werden kann, oder auch die Berechnung sich noch mehr abkürzen läßt; so be-

und 2. die Länge des Monds in der Ekliptik und seine Breite ergiebt.

Diese Correktionen sind übrigens zu einer genaueren Bestimmung des geocentrischen Orts des Monds noch nicht hinreichend, und der Fehler kann sich zuweilen auf 8 bis 10 Minuten belaufen.

§. 220. Die Bahnen der vier Trabanten des Jupiters liegen in Ebenen, welche nur wenig gegen die Ebene der Ekliptik geneigt sind (§. 103). Ihre Neigungen gegen die Ebene der Bahn des Jupiters um die Sonne können also ebenfalls nicht beträchtlich seyn, da diese nur um 1° 18′ 51″,5 (§. 191.) gegen die Ekliptik geneigt ist. Die Verschiedenheiten, welche man in der Dauer ihrer Verfinsterungen beobachtet, zeigen, daß sie nicht immer durch die Axe des Schattens gehen, welchen der Jupiter auf sie wirft, und da der vierte Trabant öfters unverfinstert vorüber geht; so muß seine jovicentrische Breite zuweilen größer seyn, als der aus dem Mittelpunkt des Jupiters gesehene scheinbare Halbmesser des Durchschnitts des Schattenkegels mit einer durch den Mittelpunkt dieses Trabanten auf die Axe des Kegels senkrecht gelegten Ebene. Wenn die Dauer der Verfinsterungen am größten ist (S. §. 111.); so muß die Axe des Schattenkegels in der Ebene der Bahn des Trabanten liegen, und folglich in die Durchschnittslinie dieser Ebene mit der Ebene der Bahn des Jupiters fallen. Zur Zeit des Mittels der Verfinsterung ist der Trabant in Opposition, und daher seine jovicentrische Länge der heliocentrischen Länge des Jupiters gleich, welche man für diesen Zeitpunkt berechnen kann. Mithin wäre hiedurch die Lage der Durchschnittslinie, in welcher die Ebene der Bahn des Trabanten die Ebene der Jupitersbahn durchschneidet, oder die Knotenlinie gegeben. Diese Beobachtungen können bey dem dritten und vierten Trabanten angestellt werden, von dem ersten und zweyten aber kann man, wenn sie in der Nähe ihrer Knoten sind, niemals die Eintritte und Austritte zugleich beobachten, und man ist daher genöthigt, die einige Tage vor der Opposition des Jupiters beobachteten Eintritte dieser Trabanten in den Schatten mit den einige Tage nach denselben beobachteten Austritten zu vergleichen, indem man

von den Zeiten der Austritte die zwischen diesen und den Eintritten verflossene synodische Umlaufszeiten abzieht. Die Dauer der Verfinsterungen findet sich bey allen vier Trabanten am gröſten, wenn die heliocentrische Länge des Jupiters ungefähr 10 Z. 14 Gr. oder 4 Z. 14 Gr. ist; folglich können die jovicentrischen Längen der Knoten der Jupitertrabanten nicht sehr von einander verschieden seyn. Man bemerkt, daß, wenn die Trabanten in ihrer Opposition nördlich von dem Mittelpunkt des Jupiters sich befinden, und die Dauer ihrer Verfinsterungen abnimmt, die heliocentrische Länge des Jupiters von 10 Z. 14 Gr. in 1 Z. 14 Gr. übergeht; folglich fällt der aufsteigende Knoten der Bahnen der Jupitertrabanten in den Punkt der Ekliptik, dessen Länge ungefähr 10 Z. 14 Gr. ist.

§. 221. Die Neigungen der Bahnen des ersten und zweyten Trabanten des Jupiters ergeben sich aus der gröſten Dauer ihrer Verfinsterungen auf folgende Art. Es sey *AFB* (Fig. 72.) der hier als kreisförmig angenommene Durchschnitt des Schattenkegels des Jupiters mit einer auf seiner Axe senkrechten und die Bahn des Trabanten berührenden Ebene, und *C* der Mittelpunkt des Schattens. Der Weg *mn* des Trabanten durch den Schatten kann ohne merklichen Fehler als eine Chorde des Kreises *AFB* betrachtet werden, welche durch das auf sie aus dem Mittelpunkt *C* gefällte Perpendickel *CR* in *R* halbirt wird. Man ziehe den Halbmesser *Cm* an den Punkt des Eintritts *m*; so verhält sich *Cm* zu *mR* wie die halbe gröſte Dauer der Verfinsterung zu der beobachteten halben kleinsten Dauer. In dem bey *R* rechtwinklichten Dreyeck *CmR*, welches man als ein geradlinigtes betrachten kann, ist also das Verhältniß von *Cm* zu *mR*, mithin auch das Verhältniß von *Cm* : *CR* gegeben. Sucht man nun zu der synodischen Umlaufszeit des Trabanten zu der halben gröſten Dauer seiner Verfinsterung und zu 360° die vierte geometrische Proportionalzahl; so erhält man die scheinbare aus dem Mittelpunkt des Jupiters gesehene Gröſse des Halbmessers *CA* oder *Cm* des Schattens, und weil das Verhältniß von *Cm* : *CR* gefun-

den worden ist, die scheinbare Größe von CR. Diese Linie steht aber, wenn die Dauer der Verfinsterung am kleinsten ist, so wohl auf AB, als auf mn senkrecht; folglich mißt die scheinbare Größe von CR die größte jovicentrische Breite des Trabanten, oder die Neigung seiner Bahn gegen die Bahn des Jupiters. Wegen der unter den Polen zusammengedrückten Gestalt des Jupiters (§. 109.) sind aber diese Neigungen zu groß. Unter der Voraussetzung, daß der Jupiter ein elliptisches Sphäroid sey, wird der Durchschnitt des Schattenkegels mit einer auf seiner Axe senkrechten und die Bahn des Trabanten berührenden Ebene sehr nahe eine Ellipse seyn, deren kleine Axe sich zu ihrer großen Axe wie die Umdrehungsaxe des Jupiters sich zu dem Durchmesser seines Aequators, d. i. wie 13 : 14 (§. 109.) verhält. Und weil die Umdrehungsaxe des Jupiters nahe auf der Ekliptik senkrecht ist; so werden die während der Verfinsterung von den Trabanten beschriebene Chorden des elliptischen Umfangs des Schattens nahe mit der großen Axe des elliptischen Schnitts parallel seyn. Es sey also $adbe$ (Fig. 73.) der elliptische Durchschnitt des Schattens, mn die von dem Trabanten beschriebene mit der großen Axe ab parallele Chorde. Man ziehe nq auf die große Axe ab senkrecht, und verlängere sie über n hinaus, bis sie dem um die große Axe als Durchmesser beschriebenen Kreis in n' begegnet. Man ziehe den Halbmesser Cf auf mn senkrecht, welcher der mn in r begegne, und durch n' die Parallele $n'r'$ mit mn. Unter der Voraussetzung, daß der Umfang des Schattens ein Kreis sey, hat man Cr' statt Cr gefunden. Es verhält sich aber $Cr' : Cr = nq : nq = Ca : Cd$ (Kegelschn. II, 7. Zus. 2.) = 14 : 13. Folglich muß man die unter der Voraussetzung eines kreisförmigen Umfangs des Schattens gefundene Neigungen der Bahnen in dem Verhältniß von 13 : 14 vermindern.

Die Neigungen der Bahnen des dritten und vierten Trabanten können nicht unmittelbar wie die der zwey vorhergehenden gefunden werden, weil sie, wenn sie ihre größte Breite haben, unverfinstert vorüber gehen. Beobachtet man aber die Dauer einer Verfinsterung, und bestimmt

daraus wie vorhin die scheinbare Größe des Perpendickels CR (Fig. 72.); so kennt man, wenn die Bahn $mnrN$ des Trabanten die Ebene CAN der Bahn des Jupiters in N schneidet, in dem bey R rechtwinklichten sphärischen Dreyeck CRN die Seite CR, und die Hypotenuse CN, welche dem Unterschied der schon beyläufig bekannten Länge des Knotens und der heliocentrischen Länge des Jupiters zur Zeit des Mittels der Verfinsterung gleich ist, woraus man den Neigungswinkel N findet.

Es verhält sich nemlich Sin. CN: Sin. CR = Sin. tot. : Sin. N. Will man die Länge des Knotens noch nicht als bekannt voraussetzen; so sey zu einer anderen Zeit der Jupitertrabant bey dem Mittel der Verfinsterung in r. Man bestimme wie vorhin die jovicentrische scheinbare Größe des Perpendickels cr auf die Bahn des Trabanten; so verhält sich in dem sphärischen Dreyeck cNr wiederum Sin. cN : Sin. cr = Sin. tot. : Sin. N und daher

$$\text{Sin. } CN : \text{Sin. } cN = \text{Sin. } CR : \text{Sin. } cr,$$

mithin $\text{Tg.} \frac{CN+cN}{2} : \text{Tg.} \frac{CN-cN}{2} = \text{Tg.} \frac{CR+cr}{2} : \text{Tg.} \frac{CR-cr}{2}$.

Es ist aber der Bogen $CN - cN$ dem Unterschied der heliocentrischen Längen des Jupiters zur Zeit des Mittels der zwey Verfinsterungen gleich, und daher gegeben; folglich erhält man durch diese Proportion mittelst der Tafel der Tangenten die halbe Summe der zwey unbekannten Bogen CN, cN, deren Unterschied Cc man kennt, und hieraus diese Bogen selbst. Hat man diese gefunden; so ergiebt sich aus der ersten oder zweyten Proportion die Neigung der Bahn. Man wird hiedurch die Lage der Knoten genauer als durch die Beobachtungen der größten Dauer der Verfinsterungen bestimmen können, weil die Trabanten schon merklich von ihren Knoten entfernt seyn können, ohne daß man einen Unterschied in der Dauer ihrer Verfinsterungen bemerkt. Zu der Bestimmung der Länge des Knotens muß man diejenige Beobachtungen wählen, bey welchen sich die Dauer der Verfinsterungen nicht zu langsam verändert.

§. 222. Die Neigung der Bahn des ersten Jupitertrabanten gegen die Bahn des Jupiters ist beynahe unveränderlich, und = 3° 5′ 24″, die Neigungen der übrigen aber sind kleinen periodischen Veränderungen unterworfen, welche ungefähr auf 30′ steigen. Die Länge des aufsteigen-

den Knotens des ersten Trabanten ist = 314° 27′ 54″ in der Bahn des Jupiters gerechnet. Die aufsteigenden Knoten der übrigen schwanken um diesen Punkt hin und her, von welchem sie sich zuweilen um 8 bis 9 Graden entfernen. Die Vergleichung weit von einander entfernter Beobachtungen zeigt, daß diese mittlere Knotenlinie gegen die Fixsterne ihre Lage nicht merklich verändert, und man hat daher, um die Länge des mittleren aufsteigenden den vier Bahnen gemeinschaftlichen Knotens zu finden, zu der für irgend einen Zeitpunkt bestimmten Länge desselben nur die Bewegung der Aequinoktialpunkte zu addiren, oder sie davon abzuziehen, je nachdem der vorgegebene Zeitpunkt nach oder vor die Epoche fällt, für welche man die mittlere Länge des aufsteigenden Knotens bestimmt hat. Die mittleren Neigungen der Bahnen der Jupiterstrabanten gegen die Ebene der Bahn des Jupiters sind folgende:

I. 3° 5′ 24″	III. 3° 0′ 28″
II. 3 4 45	IV. 2 40 58

und die mittlere Länge ihres aufsteigenden Knotens in der Bahn des Jupiters ist für den 1. Jan. 1801 = 314° 27′ 54″.

§. 223. Aus den Neigungen der Bahnen der Trabanten des Jupiters gegen seine Bahn und der Länge ihres aufsteigenden Knotens ergeben sich ihre Neigungen gegen die Ekliptik und die Länge ihres Knotens in derselben durch die Auflösung eines sphärischen Dreyecks. Es sey BAR (Fig. 74.) ein Bogen eines größten in der Ebene der Bahn des Jupiters liegenden Kreises, BCE ein Bogen der Ekliptik, und der Bogen CAM liege in der Ebene der Bahn eines Trabanten. In dem Dreyeck ABC kennt man den Ueberschuß AB der Länge n des aufsteigenden Knotens A des Trabanten in Beziehung auf die Bahn des Jupiters über die Länge N des aufsteigenden Knotens B des Jupiters, die Neigung $ABC = J$ der Jupitersbahn gegen die Ekliptik, und die Neigung $BAC = i$ der Bahn des Trabanten gegen die Bahn des Jupiters. Es sey $BA < 90°$, und von B auf die Verlängerung von A des Perpendickel BD gefällt; so verhält sich Cotg. BAC : Sin. tot. = Cos. AB : Cotg. ABD, woraus man $CBD = ABD - ABC$ findet. Sodenn hat man

Sin. ABD : Sin. CBD = Cos. A ; Cos. BCD oder Cos. ACE, und Cos. CBD ; Cos. ABD = Tg. AB : Tg. BC.

Man suche also einen Hülfswinkel durch die Formel

1.) Tg. $z = \text{Tg. } i \text{ Cos. } (s - N)$; ſo iſt

2.) Cos. $ACE = \frac{\text{Cos. } i \text{ Cos. } (J + z)}{\text{Cos. } z}$, und 3.) Tg. $BC = \frac{\text{Tg. } (s - N) \text{ Sin. } z}{\text{Sin. } (J + z)}$.

Man nehme immer den Winkel z ſpitz und mit demſelben Zeichen, welches ſeine Tangente hat, und beſtimme den Bogen BC ſo, daß ſein Sinus mit dem Zähler, und ſein Coſinus mit dem Nenner in dem Ausdruck ſeiner Tangente einerley Zeichen erhält. Aus n. 2. erhält man die Neigung der Trabantenbahn gegen die Ekliptik, und der aus der Gleichung n. 3. gefundene Bogen BC zu der Länge N des aufſteigenden Knotens des Jupiters addirt giebt die Länge des auf die Ekliptik ſich beziehenden aufſteigenden Knotens des Trabanten.

In dem Dreyeck ABC findet man ferner die Seite AC mittelſt der Proportion Sin. A : Sin. B = Sin. BC : Sin. AC, und daher, wenn man zu dem auf die Bahn des Jupiters ſich beziehenden Argument AM der Breite des Trabanten den Bogen AC addirt, das Argument der Breite CM deſſelben in Beziehung auf die Ekliptik, woraus ſich ſeine jovicentriſche Breite ME über der Ekliptik ergiebt. Eben dieſe kann auch dadurch gefunden werden, daß man zuerſt die jovicentriſche Breite MR über die Bahn des Jupiters, und den Bogen AR ſucht. Addirt man zu dieſem den Bogen AB; ſo ergeben ſich aus BR und RM die Bogen BE und EM nach denſelben Regeln, nach welchen man aus der geraden Aufſteigung und Abweichung eines Sterns ſeine Länge und Breite berechnet (§. 36.)

Weil die Winkel A und B klein ſind; ſo kann die Breite ME näherungsweiſe kürzer berechnet werden. Wenn nemlich der Bogen ME von dem Bogen AR in r geſchnitten wird; ſo iſt nahe $MR = Mr$, und daher beynahe $ME = MR + rE$. Aber Sin. AM : Sin. MR = Sin. tot. : Sin. A, und Sin. Br : Sin. rE = Sin. tot. : Sin. B; folglich iſt, wenn man ſtatt der Sinus der kleinen Winkel A, B, und der Sinus von MR und rE die Bogen ſelbſt, und die jovicentriſche Länge des Trabanten in ſeiner Bahn = l ſetzt, weil AM und Ar wenig von einander verſchieden ſind, ſehr nahe

4.) $ME = i \text{ Sin. } (l - s) + J \text{ Sin. } (l - N)$.

Es iſt auch $ME = i \text{ Sin. } l \text{ Cos. } s - i \text{ Cos. } l \text{ Sin. } s + J \text{ Sin. } l \text{ Cos. } N - J \text{ Cos. } l \text{ Sin. } N$

$= (i \text{ Cos. } s + J \text{ Cos. } N) \text{ Sin. } l - (i \text{ Sin. } s + J \text{ Sin. } N) \text{ Cos. } l$

Aber, wenn die Länge des auf die Ebene BE der Ekliptik ſich beziehenden Knotens C der Bahn des Trabanten = N', und ihre Neigung MCE gegen die Ekliptik = J' geſetzt wird, iſt ebenfalls nahe

$ME = J' \text{ Sin. } (l - N') = J' \text{ Cos. } N' \text{ Sin. } l - J' \text{ Sin. } N' \text{ Cos. } l$.

Vergleicht man die Coefficienten von Sin. l und Cos. l in den zwey Ausdrücken der Breite ME mit einander; ſo erhält man

5.) $J' \text{Cos. } N' = i \text{Cos. } n + J \text{Cos. } N$

6.) $J' \text{Sin. } N' = i \text{ Sin. } n + J \text{ Sin. } N$, und daher

7.) $\text{Tg. } N' = \frac{i \text{ Sin. } n + J \text{ Sin. } N}{i \text{ Cos. } n + J \text{ Cos. } N}$

Man bestimmt die Länge N' des aufsteigenden Knotens in der Ekliptik mittelst ihrer Tangente so, daß ihr Sinus mit dem Zähler, und ihr Cosinus mit dem Nenner in dem Ausdruck derselben einerley Zeichen bekommt. Hat man N gefunden; so erhält man J' durch eine der zwey Gleichungen n. 5. und 6.

§. 224. Von der Erde aus gesehen erscheinen die Bahnen der Trabanten des Jupiters als schmale Ellipsen oder als gerade Linien. Um ihre Gestalt und Lage für jede gegebene Zeit zu bestimmen; denke man sich eine mit dem Mittelpunkt des Jupiters concentrische Kugel (Fig. 75.) welche von der Ebene der Ekliptik in dem gröſten Kreis DNR geschnitten werde. Es sey E der Pol dieses Kreises, und P der Pol des gröſten Kreises MNQ, in dessen Ebene die Bahn eines der Trabanten liege. Die durch den Mittelpunkt des Jupiters mit der von der Erde an den Punkt der Frühlingsnachtgleiche gehenden geraden Linie gezogene Parallele treffe den Kreis DB in V, die gerade Linie, welche die Mittelpunkte des Jupiters und der Erde mit einander verbindet, schneide die Oberfläche der Kugel in T, und der auf die Ekliptik bezogene aufsteigende Knoten der Bahn des Trabanten sey in N. Man lege durch P, E und T die Bogen PE, ET gröſter Kreise der Kugel; so ist VR die jovicentrische Länge der Erde = der um 180 Grade vermehrten geocentrischen Länge l des Jupiters, RT die (in der Figur südlich angenommene) jovicentrische Breite der Erde = der geocentrischen Breite b des Jupiters mit entgegengesetzten Zeichen genommen, und VN die Länge Ω des aufsteigenden Knotens der Bahn des Trabanten in der Ekliptik, gegen welche sie um einen Winkel i geneigt ist, dessen Maaß der Bogen PE ist. Da der Bogen TAP durch den Pol P des Kreises MNQ geht; so steht er in A auf der Bahn des Trabanten senkrecht, und mißt daher die Neigung der von der Erde an den Mittelpunkt des Jupiters gezogenen Gesichtslinie gegen die Ebene der Bahn des Trabanten. Folglich verhält sich die groſe Axe der dem Beobachter auf der Erde als eine Ellipse erscheinenden Bahn des Trabanten zu ihrer kleinen Axe wie der Sinus totus zu dem Sinus von AT. Ferner ist der Winkel ETP dem Winkel gleich, welchen die kleine Axe dieser Ellipse mit dem durch den Jupiter gehenden Breitenkreis macht; mithin bestimmen AT und ETP die Gestalt und Lage derselben. Endlich mißt der Bogen NA den jovicentrischen Abstand des Trabanten, wenn er sich in dem gegen die Erde gekehrten End-

punkt der kleinen Axe der Ellipſe befindet, von ſeinem auf die Ekliptik bezogenen aufſteigenden Knoten N, mittelſt deſſen man den Ort des Trabanten in der Ellipſe wird beſtimmen können. Um nun aus NR und RT, NA und AT zu finden, betrachte man NR und RT als Länge und Breite, NA und AT als gerade Aufſteigung und Abweichung des Punkts T; ſo hat man nach §. 36., wenn man den Bogen NT zieht, und den Hülfswinkel $RNT = y$ ſetzt,

1.) $\text{Tg. } y = \frac{\text{Tg. } RT}{\text{Sin. } RN} = \frac{\text{Tg. } b}{\text{Sin. } (\Omega - l)}$

2.) $\text{Sin. } AT = \frac{\text{Sin. } RT \text{Sin. } (ANR + y)}{\text{Sin. } y} = \frac{\text{Sin. } b \text{Sin. } (i + y)}{\text{Sin. } y}$

3.) $\text{Tg. } NA = \frac{\text{Tg. } RN \text{Cos. } (ANR + y)}{\text{Cos. } y} = - \frac{\text{Tg. } (\Omega - l) \text{Cos. } (i + y)}{\text{Cos. } y}$,

und weil $\left.\begin{matrix}\text{Sin. } PT \\ \text{Cos. } AT\end{matrix}\right\} : \left\{\begin{matrix}\text{Sin. } PET \\ \text{Cos. } RN\end{matrix}\right\} = \text{Sin. } PE : \text{Sin. } PTE$; ſo iſt

4.) $\text{Sin. } PTE = - \frac{\text{Sin. } i \text{ Cos. } (\Omega - l)}{\text{Cos. } AI}$.

Aus n. 2. und 3. erhält man auch, wenn man den Sinus und Coſinus von $i + y$ entwickelt die Diviſionen mit Sin. y und Cos. y wirklich macht, und aus n. 1. den Werth von Tg. y ſtatt $\frac{\text{Sin. } y}{\text{Cos. } y}$ ſubſtituirt,

5.) $\text{Sin. } AT = \text{Sin. } i \text{ Cos. } b \text{ Sin. } (\Omega - l) + \text{Sin. } b \text{ Cos. } i$

6.) $\text{Tg. } NA = \frac{\text{Sin. } i \text{ Tg. } b}{\text{Cos. } (\Omega - l)} - \text{Cos. } i \text{ Tg. } (\Omega - l)$

Wenn die geocentriſche Breite des Jupiters ſüdlich iſt; ſo ſetzt man b negativ. Wenn Tg. NA poſitiv iſt; ſo nimmt man den Bogen NA im erſten oder dritten Quadranten, je nachdem $\Omega - l$ in den erſten und vierten, oder in den zweyten und dritten Quadranten fällt. Iſt aber Tg. NA negativ; ſo nimmt man den Bogen NA im zweyten oder vierten Quadranten, je nachdem $\Omega - l$ in den erſten und vierten, oder in den zweyten und dritten Quadranten fällt.

Um die ſcheinbare Bahn des Trabanten zu verzeichnen, beſchreibe man mit einem beliebigen zur Einheit angenommenen Halbmeſſer einen Kreis (Fig. 76.) und ziehe den Durchmeſſer EE', welcher ein Stück des durch den Mittelpunkt des Jupiters gehenden, als eine gerade Linie erſcheinenden Breitenkreiſes vorſtelle. Man nehme an, der Halbzirkel EGE' falle auf diejenige Seite des Breitenkreiſes, nach welcher hin man die directen Bewegungen rechnet, und der Punkt E liege nördlich von C. Man nehme den Winkel ELP dem mittelſt ſeines Sinus nach n. 4. gefundenen ſpitzen Winkel gleich, und zwar auf der Seite

kleiner, als den des dritten Jupitersträbanten, und ſetzt ihn hienach auf eine Sekunde. Der Abſtand des Cometen von der Erde zur Zeit der Beobachtung war 1,169192, (die mittl. Diſtanz der Erde von der Sonne = 1 geſetzt). Demnach wäre ſein wahrer Durchmeſſer = 0,0664 des Erddurchmeſſers = 114 geogr. Meilen.

Fünftes Capitel.

Von der Bahn des Monds um die Erde, und den Bahnen der übrigen Nebenplaneten um ihre Hauptplaneten.

§. 218. Es iſt in dem vierten Capitel des erſten Buchs gezeigt worden, daß man die Bewegung des Monds um die Erde als eine Bewegung in einer durch den Mittelpunkt der Erde gelegten Ebene betrachten kann, welche theils durch die Veränderung der Länge des aufſteigenden Knotens, theils durch die beſtändige Veränderung der Neigung der Mondsbahn mit jedem Augenblick in eine andere Lage gegen die Ekliptik gebracht wird. Seine Bewegungen in dieſer veränderlichen Ebene zeigen neben der von ſeiner Lage gegen die Apſidenlinie abhängenden Ungleichheit eine große Anzahl kleinerer Ungleichheiten von verſchiedenen Perioden, unter welchen die im 69ſten §. bemerkten, nemlich die Evection, Variation und die jährliche Gleichung die beträchtlichſten ſind. Man findet, daß die von der Lage des Monds gegen die Apſidenlinie abhängende Ungleichheit ſehr nahe daſſelbe Geſetz befolgt, welches man in den elliptiſchen Bewegungen der Planeten um die Sonne beobachtet, und ſich durch eine Bewegung des Monds in einer Ellipſe darſtellen läßt, welche den Mittelpunkt der Erde zu einem ihrer Brennpunkte hat. Der Radius Vector des Monds ſchneidet den Zeiten proportionale Flächenräume ab, die Excentricität iſt = 0,0550268, und daher die gröſte Gleichung des Mittelpunkts des Monds = 6° 18′ 28″,1 (§. 188.). Die große Axe der Ellipſe, oder die Apſidenlinie der Mondsbahn hat eine vorwärts gehende Bewegung, ſo daß ſie in 3231 T.

11 St. 4 Min. 7,3 S. einen Umlauf in Beziehung auf die Aequinoktialpunkte macht. Diese Bewegung ist aber nicht gleichförmig, und einer Ungleichheit unterworfen, welche auf 22′ 17″ steigt, und dem Sinus der mittleren Anomalie der Sonne proportional ist. Die wahre Länge des Perigäums des Monds ist größer oder kleiner als die mittlere unter der Voraussetzung einer gleichförmigen Bewegung der Apsidenlinie berechnete, je nachdem die mittlere Anomalie der Sonne kleiner oder größer als 180 Gr. ist.

§. 219. Will man nur auf die bisher betrachteten Ungleichheiten der Mondsbewegungen Rücksicht nehmen; so wird man den geocentrischen Ort des Monds für eine gegebene Zeit auf folgende Art berechnen können. Man suche für den vorgegebenen Zeitpunkt die wahre Länge ☉ der Sonne, ihre mittlere Anomalie a, die mittlere Länge ☽ des Monds und seine mittlere Anomalie A unter der Voraussetzung einer gleichförmigen Bewegung der Apsidenlinie nach den §. 190. für die Planeten gegebenen Regeln. Man setze ☽ − ☉ = D; so ist die wegen der Evection und der jährlichen Gleichung verbesserte Länge des Monds

$$☽' = ☽ + (1^\circ\,20'\,29'',5)\ \text{Sin.}(2D - A) - (11'\,11'',8)\ \text{Sin.}\,a \quad (\text{§. 68.}).$$

Man verbessere die mittlere Anomalie des Monds durch eben diese zwey Gleichungen, und ziehe von ihr noch ferner wegen der ungleichförmigen Bewegung der Apsidenlinie (22′ 17″) Sin. a ab; so hat man die verbesserte mittlere Anomalie des Monds

$$A' = A + (1^\circ\,20'\,29'',5)\ \text{Sin.}\,2D - A) - (11'\,11'',8)\ \text{Sin.}\,a - (22'\,17'')\ \text{Sin.}\,a.$$

Mittelst der verbesserten mittleren Anomalie A' und der Excentricität der Mondsbahn suche man nach §. 186. den Ueberschuß Q der wahren Anomalie über die mittlere (wenn die erstere kleiner ist als die letztere; so wird Q negativ), und setze ☽′ + Q = ☽″, D' = ☽″ − ☉. Man verbessere noch diese Länge des Monds wegen der Variation; so erhält man die Länge des Monds in seiner Bahn

$$☽''' = ☽'' + (35'\,41'',7)\ \text{Sin.}\,2D'.$$

Endlich sey die unter der Voraussetzung einer gleichförmigen retrograden Bewegung berechnete mittlere Länge des aufsteigenden Mondsknotens = ☊; so ist seine verbesserte Länge

$$☊' = ☊ + (1^\circ\,30'\,26'')\ \text{Sin.}\,2(☉ - ☊)$$

und die verbesserte Neigung der Mondsbahn gegen die Ekliptik

$$i = 5^\circ\,8'\,47'' + (8'\,47'')\ \text{Cos.}\,2(☉ - ☊) \quad (\text{§. 66.}),$$

woraus sich nach den §. 190. S. 299. gegebenen Formeln [illegible] T.

und 2. die Länge des Monds in der Ekliptik und seine Breite ergiebt.

Diese Correktionen sind übrigens zu einer genaueren Bestimmung des geocentrischen Orts des Monds noch nicht hinreichend, und der Fehler kann sich zuweilen auf 8 bis 10 Minuten belaufen.

§. 220. Die Bahnen der vier Trabanten des Jupiters liegen in Ebenen, welche nur wenig gegen die Ebene der Ekliptik geneigt sind (§. 103). Ihre Neigungen gegen die Ebene der Bahn des Jupiters um die Sonne können also ebenfalls nicht beträchtlich seyn, da diese nur um $1^{\circ}\,18'\,51'',5$ (§. 191.) gegen die Ekliptik geneigt ist. Die Verschiedenheiten, welche man in der Dauer ihrer Verfinsterungen beobachtet, zeigen, daß sie nicht immer durch die Axe des Schattens gehen, welchen der Jupiter auf sie wirft, und da der vierte Trabant öfters unverfinstert vorüber geht; so muß seine jovicentrische Breite zuweilen größer seyn, als der aus dem Mittelpunkt des Jupiters gesehene scheinbare Halbmesser des Durchschnitts des Schattenkegels mit einer durch den Mittelpunkt dieses Trabanten auf die Axe des Kegels senkrecht gelegten Ebene. Wenn die Dauer der Verfinsterungen am größten ist (S. §. 111.); so muß die Axe des Schattenkegels in der Ebene der Bahn des Trabanten liegen, und folglich in die Durchschnittslinie dieser Ebene mit der Ebene der Bahn des Jupiters fallen. Zur Zeit des Mittels der Verfinsterung ist der Trabant in Opposition, und daher seine jovicentrische Länge der heliocentrischen Länge des Jupiters gleich, welche man für diesen Zeitpunkt berechnen kann. Mithin wäre hiedurch die Lage der Durchschnittslinie, in welcher die Ebene der Bahn des Trabanten die Ebene der Jupitersbahn durchschneidet, oder die Knotenlinie gegeben. Diese Beobachtungen können bey dem dritten und vierten Trabanten angestellt werden, von dem ersten und zweyten aber kann man, wenn sie in der Nähe ihrer Knoten sind, niemals die Eintritte und Austritte zugleich beobachten, und man ist daher genöthigt, die einige Tage vor der Opposition des Jupiters beobachteten Eintritte dieser Trabanten in den Schatten mit den einige Tage nach derselben beobachteten Austritten zu vergleichen, indem man

von den Zeiten der Austritte die zwiſchen dieſen und den Eintritten verfloßene ſynodiſche Umlaufszeiten abzieht. Die Dauer der Verfinſterungen findet ſich bey allen vier Trabanten am gröſten, wenn die heliocentriſche Länge des Jupiters ungefähr 10 Z. 14 Gr. oder 4 Z. 14 Gr. iſt; folglich können die jovicentriſchen Längen der Knoten der Jupiterstrabanten nicht ſehr von einander verſchieden ſeyn. Man bemerkt, daß, wenn die Trabanten in ihrer Oppoſition nördlich von dem Mittelpunkt des Jupiters ſich befinden, und die Dauer ihrer Verfinſterungen abnimmt, die heliocentriſche Länge des Jupiters von 10 Z. 14 Gr. in 1 Z. 14 Gr. übergeht; folglich fällt der aufſteigende Knoten der Bahnen der Jupitertrabanten in den Punkt der Ekliptik, deſſen Länge ungefähr 10 Z. 14 Gr. iſt.

§. 281. Die Neigungen der Bahnen des erſten und zweyten Trabanten des Jupiters ergeben ſich aus der gröſten Dauer ihrer Verfinſterungen auf folgende Art. Es ſey *AFB* (Fig. 72.) der hier als kreisförmig angenommene Durchſchnitt des Schattenkegels des Jupiters mit einer auf ſeiner Axe ſenkrechten und die Bahn des Trabanten berührenden Ebene, und *C* der Mittelpunkt des Schattens. Der Weg *mn* des Trabanten durch den Schatten kann ohne merklichen Fehler als eine Chorde des Kreiſes *AFB* betrachtet werden, welche durch das auf ſie aus dem Mittelpunkt *C* gefällte Perpendickel *CR* in *R* halbirt wird. Man ziehe den Halbmeſſer *Cm* an den Punkt des Eintritts *m*; ſo verhält ſich *Cm* zu *mR* wie die halbe gröſte Dauer der Verfinſterung zu der beobachteten halben kleinſten Dauer. In dem bey *R* rechtwinklichten Dreyeck *CmR*, welches man als ein geradlinigtes betrachten kann, iſt alſo das Verhältniß von *Cm* zu *mR*, mithin auch das Verhältniß von *Cm* : *CR* gegeben. Sucht man nun zu der ſynodiſchen Umlaufszeit des Trabanten zu der halben gröſten Dauer ſeiner Verfinſterung und zu 360° die vierte geometriſche Proportionalzahl; ſo erhält man die ſcheinbare aus dem Mittelpunkt des Jupiters geſehene Größe des Halbmeſſers *CA* oder *Cm* des Schattens, und weil das Verhältniß von *Cm* : *CR* gefun-

den worden ist, die scheinbare Größe von *CR*. Diese Linie steht aber, wenn die Dauer der Verfinsterung am kleinsten ist, so wohl auf *AB*, als auf *mn* senkrecht; folglich mißt die scheinbare Größe von *CR* die größte jovicentrische Breite des Trabanten, oder die Neigung seiner Bahn gegen die Bahn des Jupiters. Wegen der unter den Polen zusammengedrückten Gestalt des Jupiters (§. 109.) sind aber diese Neigungen zu groß. Unter der Voraussetzung, daß der Jupiter ein elliptisches Sphäroid sey, wird der Durchschnitt des Schattenkegels mit einer auf seiner Axe senkrechten und die Bahn des Trabanten berührenden Ebene sehr nahe eine Ellipse seyn, deren kleine Axe sich zu ihrer großen Axe wie die Umdrehungsaxe des Jupiters sich zu dem Durchmesser seines Aequators, d. i. wie 13 : 14 (§. 109.) verhält. Und weil die Umdrehungsaxe des Jupiters nahe auf der Ekliptik senkrecht ist; so werden die während der Verfinsterung von den Trabanten beschriebene Chorden des elliptischen Umfangs des Schattens nahe mit der großen Axe des elliptischen Schnitts parallel seyn. Es sey also *adbe* (Fig. 73.) der elliptische Durchschnitt des Schattens, *mn* die von dem Trabanten beschriebene mit der großen Axe *ab* parallele Chorde. Man ziehe *nq* auf die große Axe *ab* senkrecht, und verlängere sie über *n* hinaus, bis sie dem um die große Axe als Durchmesser beschriebenen Kreis in *n'* begegnet. Man ziehe den Halbmesser *Cf* auf *mn* senkrecht, welcher der *mn* in *r* begegne, und durch *n'* die Parallele *n'r'* mit *mn*. Unter der Voraussetzung, daß der Umfang des Schattens ein Kreis sey, hat man *Cr'* statt *Cr* gefunden. Es verhält sich aber $Cr' : Cr = nq : nq = Ca : Cd$ (Kegelschn. II, 7. Zus. 2.) = 14 : 13. Folglich muß man die unter der Voraussetzung eines kreisförmigen Umfangs des Schattens gefundene Neigungen der Bahnen in dem Verhältniß von 13 : 14 vermindern.

Die Neigungen der Bahnen des dritten und vierten Trabanten können nicht unmittelbar wie die der zwey vorhergehenden gefunden werden, weil sie, wenn sie ihre größte Breite haben, unverfinstert vorüber gehen. Beobachtet man aber die Dauer einer Verfinsterung, und bestimm-

daraus wie vorhin die scheinbare Größe des Perpendickels CR (Fig. 72.); so kennt man, wenn die Bahn mnN des Trabanten die Ebene CAN der Bahn des Jupiters in N schneidet, in dem bey R rechtwinklichten sphärischen Dreyeck CRN die Seite CR, und die Hypotenuse CN, welche dem Unterschied der schon beyläufig bekannten Länge des Knotens und der heliocentrischen Länge des Jupiters zur Zeit des Mittels der Verfinsterung gleich ist, woraus man den Neigungswinkel N findet.

Es verhält sich nemlich Sin. CN: Sin. CR = Sin. tot. : Sin. N. Will man die Länge des Knotens noch nicht als bekannt voraussetzen; so sey zu einer anderen Zeit der Jupitertrabant bey dem Mittel der Verfinsterung in r. Man bestimme wie vorhin die jovicentrische scheinbare Größe des Perpendickels cr auf die Bahn des Trabanten; so verhält sich in dem sphärischen Dreyeck cNr wiederum Sin. cN : Sin. cr = Sin. tot. : Sin. N und daher

$$\text{Sin. } CN : \text{Sin. } cN = \text{Sin. } CR : \text{Sin. } cr,$$

mithin $\text{Tg.}\frac{CN+cN}{2} : \text{Tg.}\frac{CN-cN}{2} = \text{Tg.}\frac{CR+cr}{2} : \text{Tg.}\frac{CR-cr}{2}$.

Es ist aber der Bogen $CN - cN$ dem Unterschied der heliocentrischen Längen des Jupiters zur Zeit des Mittels der zwey Verfinsterungen gleich, und daher gegeben; folglich erhält man durch diese Proportion mittelst der Tafel der Tangenten die halbe Summe der zwey unbekannten Bogen CN, cN, deren Unterschied Cc man kennt, und hieraus diese Bogen selbst. Hat man diese gefunden; so ergiebt sich aus der ersten oder zweyten Proportion die Neigung der Bahn. Man wird hiedurch die Lage der Knoten genauer als durch die Beobachtungen der größten Dauer der Verfinsterungen bestimmen können, weil die Trabanten schon merklich von ihren Knoten entfernt seyn können, ohne daß man einen Unterschied in der Dauer ihrer Verfinsterungen bemerkt. Zu der Bestimmung der Länge des Knotens muß man diejenige Beobachtungen wählen, bey welchen sich die Dauer der Verfinsterungen nicht zu langsam verändert.

§. 222. Die Neigung der Bahn des ersten Jupitertrabanten gegen die Bahn des Jupiters ist beynahe unveränderlich, und = 3° 5′ 24″, die Neigungen der übrigen aber sind kleinen periodischen Veränderungen unterworfen, welche ungefähr auf 30′ steigen. Die Länge des aufsteigen-

den Knotens des ersten Trabanten ist = 314° 27′ 54″ in der Bahn des Jupiters gerechnet. Die aufsteigenden Knoten der übrigen schwanken um diesen Punkt hin und her, von welchem sie sich zuweilen um 8 bis 9 Graden entfernen. Die Vergleichung weit von einander entfernter Beobachtungen zeigt, daß diese mittlere Knotenlinie gegen die Fixsterne ihre Lage nicht merklich verändert, und man hat daher, um die Länge des mittleren aufsteigenden der vier Bahnen gemeinschaftlichen Knotens zu finden, zu der für irgend einen Zeitpunkt bestimmten Länge desselben nur die Bewegung der Aequinoktialpunkte zu addiren, oder sie davon abzuziehen, je nachdem der vorgegebene Zeitpunkt nach oder vor die Epoche fällt, für welche man die mittlere Länge des aufsteigenden Knotens bestimmt hat. Die mittleren Neigungen der Bahnen der Jupiterstrabanten gegen die Ebene der Bahn des Jupiters sind folgende:

I. 3° 5′ 24″	III. 3° 0′ 28″
II. 3 4 45	IV. 2 40 58

und die mittlere Länge ihres aufsteigenden Knotens in der Bahn des Jupiters ist für den 1. Jan. 1801 = 314° 27′ 54″.

§. 223. Aus den Neigungen der Bahnen der Trabanten des Jupiters gegen seine Bahn und der Länge ihres aufsteigenden Knotens ergeben sich ihre Neigungen gegen die Ekliptik und die Länge ihres Knotens in derselben durch die Auflösung eines sphärischen Dreyecks. Es sey BAR (Fig. 74.) ein Bogen eines grösten in der Ebene der Bahn des Jupiters liegenden Kreises, BCE ein Bogen der Ekliptik, und der Bogen CAM liege in der Ebene der Bahn eines Trabanten. In dem Dreyeck ABC kennt man den Ueberschuß AB der Länge n des aufsteigenden Knotens A des Trabanten in Beziehung auf die Bahn des Jupiters über die Länge N des aufsteigenden Knotens B des Jupiters, die Neigung $ABC = J$ der Jupitersbahn gegen die Ekliptik, und die Neigung $BAC = i$ der Bahn des Trabanten gegen die Bahn des Jupiters. Es sey $BA < 90°$, und von B auf die Verlängerung von A des Perpendickel BD gefällt; so verhält sich Cotg. BAC : Sin. tot. = Cos. AB : Cotg. ABD, woraus man $CBD = ABD - ABC$ findet. Sodenn hat man

Sin. ABD : Sin. CBD = Cos. A ; Cos. BCD oder Cos. ACE, und Cos. CBD ; Cos. ABD = Tg. AB : Tg. BC.

Man suche also einen Hülfswinkel durch die Formel

1.) Tg. z = Tg. i Cos. $(s-N)$; ſo iſt

2.) Cos. $ACE = \frac{\text{Cos. } i \text{ Cos. } (J+z)}{\text{Cos. } z}$, und 3.) Tg. $BC = \frac{\text{Tg.}(s-N)\text{Sin.}z}{\text{Sin.}(J+z)}$.

Man nehme immer den Winkel z ſpitz und mit demſelben Zeichen, welches ſeine Tangente hat, und beſtimme den Bogen BC ſo, daß ſein Sinus mit dem Zähler, und ſein Coſinus mit dem Nenner in dem Ausdruck ſeiner Tangente einerley Zeichen erhält. Aus n. 2. erhält man die Neigung der Trabantenbahn gegen die Ekliptik, und der aus der Gleichung n. 3. gefundene Bogen BC zu der Länge N des aufſteigenden Knotens des Jupiters addirt giebt die Länge des auf die Ekliptik ſich beziehenden aufſteigenden Knotens des Trabanten.

In dem Dreyeck ABC findet man ferner die Seite AC mittelſt der Proportion Sin. A : Sin. B = Sin. BC : Sin. AC, und daher, wenn man zu dem auf die Bahn des Jupiters ſich beziehenden Argument AM der Breite des Trabanten den Bogen AC addirt, das Argument der Breite CM deſſelben in Beziehung auf die Ekliptik, woraus ſich ſeine jovicentriſche Breite ME über der Ekliptik ergiebt. Eben dieſe kann auch dadurch gefunden werden, daß man zuerſt die jovicentriſche Breite MR über die Bahn des Jupiters, und den Bogen AR ſucht. Addirt man zu dieſem den Bogen AB; ſo ergeben ſich aus BR und RM die Bogen BE und EM nach denſelben Regeln, nach welchen man aus der geraden Aufſteigung und Abweichung eines Sterns ſeine Länge und Breite berechnet (§. 36.)

Weil die Winkel A und B klein ſind; ſo kann die Breite ME näherungsweiſe kürzer berechnet werden. Wenn nemlich der Bogen ME von dem Bogen AR in r geſchnitten wird; ſo iſt nahe $MR = Mr$, und daher beynahe $ME = MR + rE$. Aber Sin. AM : Sin. MR = Sin. tot. : Sin. A, und Sin. Br : Sin. rE = Sin. tot. : Sin. B; folglich iſt, wenn man ſtatt der Sinus der kleinen Winkel A, B, und der Sinus von MR und rE die Bogen ſelbſt, und die jovicentriſche Länge des Trabanten in ſeiner Bahn = l ſetzt, weil AM und Ar wenig von einander verſchieden ſind, ſehr nahe

4.) $ME = i \text{ Sin. } (l-s) + J \text{ Sin. } (l-N)$.

Es iſt auch $ME = i \text{ Sin. } l \text{ Cos. } s - i \text{ Cos. } l \text{ Sin. } s + J \text{ Sin. } l \text{ Cos. } N - J \text{ Cos. } l \text{ Sin. } N$
$= (i \text{ Cos. } s + J \text{ Cos. } N) \text{ Sin. } l - (i \text{ Sin. } s + J \text{ Sin. } N) \text{ Cos. } l$

Aber, wenn die Länge des auf die Ebene BE der Ekliptik ſich beziehenden Knotens C der Bahn des Trabanten = N', und ihre Neigung MCE gegen die Ekliptik = J' geſetzt wird, iſt ebenfalls nahe

$ME = J' \text{ Sin. } (l-N') = J' \text{ Cos. } N' \text{ Sin. } l - J' \text{ Sin. } N' \text{ Cos. } l$.

Vergleicht man die Coefficienten von Sin. l und Cos. l in den zwey Ausdrücken der Breite ME mit einander; ſo erhält man

5.) $J' \text{Cos. } N' = i \text{Cos. } n + J \text{Cos. } N$

6.) $J' \text{Sin. } N' = i \text{ Sin. } n + J \text{ Sin. } N$, und daher

7.) $\text{Tg. } N' = \frac{i \text{ Sin. } n + J \text{ Sin. } N}{i \text{ Cos. } n + J \text{ Cos. } N}$

Man bestimmt die Länge N' des aufsteigenden Knotens in der Ekliptik mittelst ihrer Tangente so, daß ihr Sinus mit dem Zähler, und ihr Cosinus mit dem Nenner in dem Ausdruck derselben einerley Zeichen bekommt. Hat man N gefunden; so erhält man J' durch eine der zwey Gleichungen n. 5. und 6.

§. 224. Von der Erde aus gesehen erscheinen die Bahnen der Trabanten des Jupiters als schmale Ellipsen oder als gerade Linien. Um ihre Gestalt und Lage für jede gegebene Zeit zu bestimmen; denke man sich eine mit dem Mittelpunkt des Jupiters concentrische Kugel (Fig. 75.) welche von der Ebene der Ekliptik in dem grösten Kreis DNR geschnitten werde. Es sey E der Pol dieses Kreises, und P der Pol des grösten Kreises MNQ, in dessen Ebene die Bahn eines der Trabanten liege. Die durch den Mittelpunkt des Jupiters mit der von der Erde an den Punkt der Frühlingsnachtgleiche gehenden geraden Linie gezogene Parallele treffe den Kreis DB in V, die gerade Linie, welche die Mittelpunkte des Jupiters und der Erde mit einander verbindet, schneide die Oberfläche der Kugel in T, und der auf die Ekliptik bezogene aufsteigende Knoten der Bahn des Trabanten sey in N. Man lege durch P, E und T die Bogen PE, ET grösster Kreise der Kugel; so ist VR die jovicentrische Länge der Erde = der um 180 Grade vermehrten geocentrischen Länge l des Jupiters, RT die (in der Figur südlich angenommene) jovicentrische Breite der Erde = der geocentrischen Breite b des Jupiters mit entgegengesetzten Zeichen genommen, und VN die Länge Ω des aufsteigenden Knotens der Bahn des Trabanten in der Ekliptik, gegen welche sie um einen Winkel i geneigt ist, dessen Maaß der Bogen PE ist. Da der Bogen TAP durch den Pol P des Kreises MNQ geht; so steht er in A auf der Bahn des Trabanten senkrecht, und mißt daher die Neigung der von der Erde an den Mittelpunkt des Jupiters gezogenen Gesichtslinie gegen die Ebene der Bahn des Trabanten. Folglich verhält sich die große Axe der dem Beobachter auf der Erde als eine Ellipse erscheinenden Bahn des Trabanten zu ihrer kleinen Axe wie der Sinus totus zu dem Sinus von AT. Ferner ist der Winkel ETP dem Winkel gleich, welchen die kleine Axe dieser Ellipse mit dem durch den Jupiter gehenden Breitenkreis macht; mithin bestimmen AT und ETP die Gestalt und Lage derselben. Endlich mißt der Bogen NA den jovicentrischen Abstand des Trabanten, wenn er sich in dem gegen die Erde gekehrten End-

punkt der kleinen Axe der Ellipſe befindet, von ſeinem auf die Ekliptik bezogenen aufſteigenden Knoten N, mittelſt deſſen man den Ort des Trabanten in der Ellipſe wird beſtimmen können. Um nun aus NR und RT, NA und AT zu finden, betrachte man NR und RT als Länge und Breite, NA und AT als gerade Aufſteigung und Abweichung des Punkts T; ſo hat man nach §. 36., wenn man den Bogen NT zieht, und den Hülfswinkel $RNT = y$ ſetzt,

1.) $\text{Tg. } y = \frac{\text{Tg. } RT}{\text{Sin. } RN} = \frac{\text{Tg. } b}{\text{Sin. } (\Omega - l)}$

2.) $\text{Sin. } AT = \frac{\text{Sin. } RT \text{ Sin. } (ANR + y)}{\text{Sin. } y} = \frac{\text{Sin. } b \text{ Sin. } (i+y)}{\text{Sin. } y}$

3.) $\text{Tg. } NA = \frac{\text{Tg. } RN \text{Cos. } (ANR + y)}{\text{Cos. } y} = -\frac{\text{Tg. } (\Omega - l) \text{Cos. } (i+y)}{\text{Cos. } y}$,

und weil $\left.\begin{matrix}\text{Sin. } PT \\ \text{Cos. } AT\end{matrix}\right\} : \left\{\begin{matrix}\text{Sin. } PET \\ \text{Cos. } RN\end{matrix}\right\} = \text{Sin. } PE : \text{Sin. } PTE$; ſo iſt

4.) $\text{Sin. } PTE = -\frac{\text{Sin. } i \text{ Cos. } (\Omega - l)}{\text{Cos. } AI}$.

Aus n. 2. und 3. erhält man auch, wenn man den Sinus und Coſinus von $i+y$ entwickelt die Diviſionen mit Sin. y und Cos. y wirklich macht, und aus n. 1. den Werth von Tg. y ſtatt $\frac{\text{Sin. } y}{\text{Cos. } y}$ ſubſtituirt,

5.) $\text{Sin. } AT = \text{Sin. } i \text{ Cos. } b \text{ Sin. } (\Omega - l) + \text{Sin. } b \text{ Cos. } i$

6.) $\text{Tg. } NA = \frac{\text{Sin. } i \text{ Tg. } b}{\text{Cos. } (\Omega - l)} - \text{Cos. } i \text{ Tg. } (\Omega - l)$

Wenn die geocentriſche Breite des Jupiters ſüdlich iſt; ſo ſetzt man b negativ. Wenn Tg. NA poſitiv iſt; ſo nimmt man den Bogen NA im erſten oder dritten Quadranten, je nachdem $\Omega - l$ in den erſten und vierten, oder in den zweyten und dritten Quadranten fällt. Iſt aber Tg. NA negativ; ſo nimmt man den Bogen NA im zweyten oder vierten Quadranten, je nachdem $\Omega - l$ in den erſten und vierten, oder in den zweyten und dritten Quadranten fällt.

Um die ſcheinbare Bahn des Trabanten zu verzeichnen, beſchreibe man mit einem beliebigen zur Einheit angenommenen Halbmeſſer einen Kreis (Fig. 76.) und ziehe den Durchmeſſer EE', welcher ein Stück des durch den Mittelpunkt des Jupiters gehenden, als eine gerade Linie erſcheinenden Breitenkreiſes vorſtelle. Man nehme an, der Halbzirkel EGE' falle auf diejenige Seite des Breitenkreiſes, nach welcher hin man die directen Bewegungen rechnet, und der Punkt E liege nördlich von C. Man nehme den Winkel ECP dem mittelſt ſeines Sinus nach n. 4. gefundenen ſpitzen Winkel gleich, und zwar auf der Seite

C von E, wenn sein Sinus das Vorzeichen — behält, auf der Seite F hingegen, wenn er positiv wird, ziehe den Durchmesser PP' und auf diesen den Durchmesser DF senkrecht. Von C an nehme man auf dem Durchmesser PP' beyderseits $CA = CB =$ dem nach n. 5. gefundenen Sinus von AT (Fig. 75.), und beschreibe mit den Axen DF und AB eine Ellipse, welche die von der Erde aus gesehene scheinbare Bahn des Trabanten seyn wird. Findet sich der Sinus von AT positiv; so fällt der zwischen C und P liegende Endpunkt A der kleinen Axe zwischen die Erde und den Jupiter, hingegen fällt der andere Endpunkt B zwischen die Erde und dem Jupiter, wenn der Sinus von AT negativ wird. Um noch die scheinbare Lage des Trabanten in seiner Bahn zu bestimmen, berechne man seine jovicentrische Länge, und ziehe von ihr (wo nöthig um 360° vergrößert) die Summe der Länge seines aufsteigenden Knotens in der Ekliptik und des nach n. 6. gefundenen Bogens NA ab. Von P an nehme man den Bogen PM' nach der Richtung $PFP'G$ dem gefundenen Ueberschuß gleich, wenn Sin. AT positiv, hingegen von P' an nach der Richtung $P'FG$, wenn Sin. AT negativ ist, und ziehe durch M' die Parallele $M'O$ mit PP'; so wird der mit dem Punkt M' auf einerley Seite der grosen Axe DF liegende Durchschnittspunkt M der Ellipse und der Parallele der Ort des Trabanten in seiner scheinbaren Bahn seyn.

Beschreibt man aus C als Mittelpunkt mit einem Halbmesser Cr einen Kreis, welcher sich zu CF verhält, wie der Halbmesser des Jupiters zu dem mittleren Abstand des Trabanten von seinem Mittelpunkt, und bestimmt den Ort des Trabanten in seiner scheinbaren Bahn für den Augenblick des Anfangs und des Endes einer Verfinsterung; so werden nur diejenige Eintritte und Austritte sichtbar seyn, für welche die scheinbaren Oerter des Trabanten ausserhalb des Umfangs jenes Kreises fallen, und man wird hienach beurtheilen können, ob bey einer Verfinsterung der Eintritt, oder der Austritt, oder beyde zugleich sichtbar seyen.

§. 225. Die gröſeren Ungleichheiten, welche man in den Bewegungen der Jupitertrabanten beobachtet hat, sind folgende. Erstlich zeigen ihre Umlaufszeiten in Beziehung auf die Scheibe des Jupiters eine Ungleichheit, welche von dem Winkel abhängt, unter welchem die von dem Mittelpunkt des Jupiters an die Mittelpunkte der Erde und der Sonne gezogenen geraden Linien sich schneiden. Dieser beträgt in den mittleren Distanzen des Jupiters und der Erde von der Sonne 11° 4 53, und daher können jene Zu-

sam-

ſammenkünfte um ſo viel früher oder ſpäter eintreffen, als die Zeit ausmacht, welche die Trabanten zu der Beſchreibung jenes Winkels gebrauchen. Es gründet ſich hierauf die im 105ten §. gezeigte Methode den Abſtand des Jupiters von der Sonne zu finden. Auf die Zeiten der Verfinſterungen und auf die ſynodiſchen Umlaufszeiten der Trabanten hat übrigens dieſe Ungleichheit keinen Einfluß.

Die zweyte Ungleichheit hängt von der ungleichförmigen Bewegung des Jupiters um die Sonne ab, und hat einen beträchtlichen Einfluß auf die ſynodiſchen Umlaufszeiten der Trabanten. Denn die ſynodiſche Umlaufszeit eines Trabanten übertrifft die periodiſche Umlaufszeit deſſelben um die Zeit, welche der Trabant gebrauchte, um den während der erſteren von dem Jupiter durchlaufenen Bogen zu beſchreiben, und da dieſer nach der größeren oder kleineren Geſchwindigkeit des Jupiters bald größer, bald kleiner iſt; ſo werden die ſynodiſchen Umlaufszeiten ungleich ſeyn, und der Unterſchied zwiſchen der mittleren und wahren aus dem Jupiter geſehenen Oppoſition des Trabanten mit der Sonne kann ſo viel betragen, als der Trabant Zeit gebraucht, um einen Winkel zu beſchreiben, welcher der gröſten Gleichung des Mittelpunkts des Jupiters gleich iſt. Dieſe Ungleichheit hängt alſo von der mittleren Anomalie des Jupiters ab, und bringt eine ſcheinbare Irregularität in die Zeiten der Verfinſterungen der Jupiterstrabanten.

Die dritte Ungleichheit rührt von der nicht augenblicklichen Fortpflanzung des Lichts her (§. 107.), wegen welcher die Verfinſterungen ſich verzögern, wenn der Abſtand des Jupiters von der Erde wächst, und wiederum früher eintreten, wenn jener Abſtand abnimmt. Man nennt die deswegen nöthige Correction der berechneten Verfinſterungen die große Lichtgleichung, welche man für die verſchiedenen Stellungen der Erde gegen den Jupiter und die Sonne unter der Vorausſetzung eines unveränderlichen Abſtands des Jupiters von der Sonne berechnet hat. Wegen der Excentricität der Bahn des Jupiters verändert ſich aber dieſer Abſtand um 0,0481784 der mittleren Diſtanz dieſes Planeten von der Sonne (S. 300.) oder ſehr

nahe um den vierten Theil des mittleren Abstands der Erde von der Sonne, wozu das Licht eine Zeit von 2′ 3″,3 gebraucht (§. 107.). Folglich wird noch eine Verbesserung der berechneten Zeiten der Verfinsterungen erfordert, welche man die kleine Lichtgleichung nennt, und welche von der mittleren Anomalie des Jupiters abhängt. Alle diese Ungleichheiten beziehen sich also nicht auf die wahren Bewegungen der Jupitertrabanten.

§. 226. Es zeigen sich aber auch merkliche Ungleichheiten in den Bewegungen dieser Trabanten selbst, welche sich gröstentheils nach ihren verschiedenen Stellungen gegen einander richten. Der erste und zweyte Trabant bewegen sich sehr nahe in kreisförmigen Bahnen um den Jupiter, und, wenn man die von den verschiedenen Lagen der Trabanten gegeneinander abhängende Ungleichheiten vorläufig in Rechnung bringt, nahe mit gleichförmigen Geschwindigkeiten, und daher sind die Sectoren, welche ihre Radii Vectores beschreiben, der Zeit proportional. Die Bahn des dritten Trabanten zeigt eine kleine Excentricität, und die davon abhängende Mittelpunktsgleichung richtet sich nach den keplerischen Gesetzen der elliptischen Bewegung. Nach den Beobachtungen ist diese Excentricität veränderlich. Um das Jahr 1682 war nemlich die gröste Gleichung des Mittelpunkts = 13′ 16″, und hatte ihren grösten Werth. Im Jahr 1777 war sie am kleinsten, und = 5′ 7″. Die Bahn des vierten Trabanten ist sehr merklich elliptisch. Ihre gröste Mittelpunktsgleichung ist = 50′ 2″. Auch diese hängt von der Anomalie des Trabanten nach dem keplerischen Gesetz der elliptischen Bewegung der Planeten ab; so daß die Radii Vectores den Zeiten proportionale Flächenräume beschreiben.

Endlich beobachtet man die keplerische Proportion zwischen den Würfeln mittleren Entfernungen der Trabanten von dem Jupiter und den Quadraten ihrer siderischen Umlaufszeiten. Setzt man den Abstand des ersten Trabanten von dem Jupiter = 1; so sind die Abstände der Trabanten von dem Mittelpunkt des Jupiters *)

*) *Newtoni* philos. nat. princ. math. L. III. Phænom. I.

nach den	I.	II.	III.	IV.
Beobachtungen Borelli's	1	1,53	2,47	4,35
Townlei mit dem Mikrom.	1	1,59	2,44	4,48
Caſſini's mit dem Teleſkop	1	1,60	2,60	4,00
— aus den Verfinſter. der Trabanten *)	1	1,59	2,69	4,46
nach dem dritten keplerischen Geſetz	1	1,59	2,54	4,46

Die gröſte heliocentriſche Elongation des vierten Trabanten des Jupiters von ſeinem Mittelpunkt fand Pound mit dem Mikrometer einer fünfzehn Fuß langen Fernröhre in der mittleren Diſtanz des Jupiters von der Erde oder der Sonne = 8′ 10″, die des dritten in derſelben Diſtanz mit dem Mikrometer einer 123 Fuß langen Fernröhre = 4′ 42″, und mittelſt eben dieſer Fernröhre den ſcheinbaren Durchmeſſer des Jupiters in ſeiner mittleren Entfernung von der Sonne beſtändig kleiner als 40″, aber niemals kleiner als 38″ **). Setzt man den ſcheinbaren Durchmeſſer des Aequators des Jupiters in ſeiner mittleren Entfernung nach §. 109. auf 38″,2; ſo wären hienach die mittleren Abſtände des dritten und vierten Trabanten in Halbmeſſern des Aequators des Jupiters ausgedrückt 14,7014 und 25,96859. Aus dem letztern folgt nach dem dritten keplerischen Geſetz der Abſtand des dritten Trabanten = 14,76475, ſehr nahe mit dieſen Meſſungen übereinſtimmend.

§. 227. Die Bewegungen der ſieben Trabanten des Saturns ſind noch nicht genau bekannt. Wegen der Schwierigkeit, ihre Elongationen von dem Saturn zu meſſen, kennt man nur ihre Umlaufszeiten und ihre mittleren Entfernungen mit

*) Caſſini ſchloß aus der Hälfte der gröſten Dauer der Verfinſterung mittelſt der ſynodiſchen Umlaufszeit des Trabanten die jovicentriſche ſcheinbare Größe des Halbmeſſers des Schattens, deſſen wahren Halbmeſſer er dem Halbmeſſer des Jupiters gleich ſetzte. Unter dieſer Vorausſetzung iſt der ſcheinbare Halbmeſſer des Schattens dem ſcheinbaren Halbmeſſer des Jupiters von dem Trabanten aus geſehen gleich, woraus ſich das Verhältniß ſeines Abſtands von dem Jupiter zu dem Halbmeſſer des Jupiters ergiebt.

**) A. a. O. der Princip.

einiger Genauigkeit, und selbst über die letzteren bleibt noch einige Ungewißheit übrig. Man weiß nur so viel, daß ihre Bahnen nahe kreisförmig sind, und nur die Ellipticität der Bahn des sechsten (oder des ehmaligen vierten) merklich ist. Die Bahnen der sechs ersten Trabanten liegen nahe in der erweiterten Ebene des Rings, welcher den Saturn umgiebt. Denn sie scheinen sich in geraden Linien hin und her zu bewegen, wenn der Ring verschwindet, und in den übrigen Fällen Ellipsen zu beschreiben, welche der elliptischen Figur des Rings ähnlich sind. Die Bahnen dieser Trabanten sind daher um 30° 20′ (§. 113.) gegen die Ekliptik geneigt. Die Länge des aufsteigenden Knotens des Rings in der Ekliptik war im Jahr 1803 nach Schröters *) Beobachtungen = 167° 19′, und da der Knoten dieses Rings keine merkliche siderische Bewegung hat; so findet man hieraus seine Länge für eine andere gegebene Zeit, wenn man das Zurückweichen der Aequinoktialpunkte in Rechnung bringt. Mittelst der §. 191. angegebenen Länge des aufsteigenden Knotens der Saturnsbahn und ihrer Neigung gegen die Ekliptik findet man nach §. 223. die Länge des aufsteigenden Knotens des Rings und der Bahn der sechs ersten Saturnstrabanten in der Bahn des Saturns für das Jahr 1803 = 170° 51′, und die Neigung desselben gegen die Bahn des Saturns = 29° 58′ 51″. Gewöhnlich setzt man diese Neigung in runder Zahl auf 30° 0′.

Die Bahn des siebenten (oder des ehmaligen fünften) Saturnstrabanten liegt nicht in der Ebene des Rings. Cassini beobachtete im Jahr 1714, daß die Bahn dieses Trabanten als eine gerade Linie erschien, als der Ring noch eine elliptische Gestalt hatte. Aus diesen Beobachtungen fand Lalande **) die Länge des aufsteigenden Knotens der Bahn des siebenten Trabanten in der Ekliptik = 150° 27′, ihre Neigung gegen die Ekliptik = 24° 45′, und die Länge ihres aufsteigenden Knotens in der Bahn des Saturns = 154° 10′. Aus den von Bernard im Jahr 1787 zu Marseille angestellten Beobachtungen berechnete Lalande ***) die Län-

*) Kronographische Fragmente, pag. 210.
**) Astronomie, T. III. pag. 209. n. 3074. III. édit.
***) Ebendaselbst.

ge des auffteigenden Knotens des Trabanten in der Ekliptik = 145° 5', die Neigung gegen die Ekliptik = 24° 45', die Länge des auffteigenden Knotens des Trabanten in der Saturnsbahn = 148° 20', und die Neigung gegen die letztere = 22° 42'. Mittelft der von Schröter gefundenen Länge des auffteigenden Knotens des Rings findet man die Länge des auffteigenden Knotens der Bahn des ſiebenten Saturnstrabanten in der Ekliptik = 144° 57' 8", die Neigung der Bahn gegen die Ekliptik = 24° 45' 17", die Länge ihres auffteigenden Knotens in der Bahn des Saturns = 148° 11' 42", und die Neigungen gegen die letztere = 22° 42'. Die Knotenlinie dieſes Trabanten hat alſo eine merkliche retrograde Bewegung.

§. 228. Die von der Erde aus geſehene Geſtalt und Lage der Bahnen der Saturnstrabanten können nach den im 224ten §. für die Jupitерstrabanten gegebenen Regeln gefunden werden, wenn man ſtatt der geocentriſchen Länge und Breite des Jupiters, der Neigungen der Bahnen ſeiner Trabanten gegen die Ekliptik und der Längen ihrer auffteigenden Knoten die auf den Saturn und ſeine Trabanten ſich beziehende gleichnamige Größen ſetzt. Nach eben dieſen Regeln findet man für jede gegebene Zeit die von der Erde aus geſehene Geſtalt und Lage des Rings des Saturns, wenn man in den Formeln n. 4. und 5. des 224ten §. die geocentriſche Länge des Saturns $= l$, ſeine geocentriſche Breite $= b$ (ſüdliche Breite negativ), die Länge des auffteigenden Knotens des Rings in der Ekliptik $= \Omega$, und ſeine Neigung gegen die Ekliptik $= i$ ſetzt. Es verhalte ſich die kleine Axe der elliptiſchen Figur des Rings zur großen wie $n : 1$; ſo iſt nach n. 5.

1.) $n = \text{Sin.}\, i\, \text{Cos.}\, b\, \text{Sin.}\, (\Omega - l) + \text{Sin.}\, b\, \text{Cos.}\, i$, und zwar iſt die Südſeite des Rings gegen die Erde gekehrt, wenn n poſitiv, die Nordſeite hingegen, wenn n negativ herauskommt.

Setzt man die heliocentriſche Länge des Saturns $= l'$, und ſeine heliocentriſche Breite $= b'$; ſo hat man für die aus der Sonne geſehene Geſtalt des Rings

2.) $n' = \text{Sin.}\, i\, \text{Cos.}\, b'\, \text{Sin.}\, (\Omega - l') + \text{Sin}\, b'\, \text{Cos.}\, i$, und es iſt die Südſeite oder die Nordſeite des Rings von der Sonne beleuchtet, je nachdem n' poſitiv oder negativ iſt.

Der Ring verſchwindet nun, oder zeigt ſich durch ſtarke Teleſkope nur noch als eine gerade Linie, erſtlich, wenn $n = 0$, oder $\text{Sin.}\, (l - \Omega) = \text{Tg.}\, b\, \text{Cos.}\, i$ wird, wo ſeine erweiterte Ebene durch den Mittelpunkt der Erde geht.

Zweytens, wenn $n' = 0$, oder $\text{Sin.}\, (l' - \Omega) = \text{Tg.}\, b'\, \text{Cos.}\, i$

wird, wo seine erweiterte Ebene durch die Sonne geht, und nur noch seine schmale Kante beleuchtet wird.

Drittens, wenn n und n' verschiedene Zeichen haben, weil alsdenn die von der Sonne beleuchtete Seite des Rings von der Erde abgekehrt ist. Man sieht alsdenn durch starke Teleskope den Schatten des Rings auf dem Saturn, und zwar auf der Süd- oder Nordseite des Rings, je nachdem n' negativ oder positiv ist.

Wenn $\Omega - l = 90°$ oder $= 270°$; so wird $n = \text{Sin.}(i + b)$ oder $= -\text{Sin.}(i - b)$. Im ersten Fall ist $l = \Omega - 90° = 2\,\text{Z}.\,17°\,19'$, im zweyten $l = \Omega - 270° = 8\,\text{Z}.\,17°\,19'$, und daher, weil die Länge des aufsteigenden Knotens des Saturns $3\,\text{Z}.\,21°\,57'$ ist, im ersten Fall die Breite des Saturns südlich, im zweyten nördlich. Mithin wird die gröste Breite des Rings in beyden Fällen durch die Breite des Saturns vermindert. Dividirt man die kleine Axe des Rings, wenn er am breitesten erscheint, mit seiner großen Axe, und addirt zu dem Winkel, welcher diesem Quotienten als Sinus für den Halbmesser 1 betrachtet entspricht, die gleichzeitige geocentrische Breite des Saturns; so hat man nahe den Neigungswinkel i des Rings gegen die Ekliptik. Wenn der Ring aus der ersten der oben angeführten Ursachen verschwindet; so findet man $\text{Sin.}(l - \Omega) = \text{Tg.}\, b \,\text{Cotg.}\, i$ mittelst der beobachteten geocentrischen Breite b des Saturns, woraus sich die Länge des aufsteigenden Knotens des Rings in der Ekliptik mittelst der beobachteten geocentrischen Länge des Saturns ergiebt. Hat man einmal die Länge des Knotens des Rings nahe gefunden; so findet man aus der beobachteten gröstten Breite des Rings und der geocentrischen Länge und Breite des Saturns nach n. 1. die Neigung i genauer, mittelst welcher wiederum die Länge des aufsteigenden Knotens des Rings, wenn seine Breite verschwindet, berichtigt werden kann.

§. 229. Vergleicht man die siderischen Umlaufszeiten der Saturnstrabanten mit ihren mittleren Entfernungen von dem Mittelpunkt des Saturns; so findet man wiederum, daß nach dem dritten keplerischen Gesetz die Quadrate der erstern den Würfeln der letztern proportional sind. Setzt man den Abstand des dritten (oder des ehmaligen ersten) Trabanten von dem Mittelpunkt des Saturns $= 1$; so sind die Abstände der fünf älteren Trabanten *)

	III.	IV.	V.	VI.	VII.
nach den Beobachtungen	1	1,282	1,795	4,102	12,308
nach dem 3ten kepl. Gesetz	0,989	1,267	1,770	4,102	11,956

*) Newtoni princip. L. III. Phænom. II.

Die Unterſchiede ſind kleiner, als die Fehler, welchen man bey dieſen Beobachtungen ausgeſetzt iſt. Die in dem 117ten §. angegebenen Abſtände des erſten und zweyten Trabanten ſind, ſo wie die übrigen, aus dem Abſtand des ſechsten nach der kepleriſchen Regel mittelſt ihrer ſideriſchen Umlaufszeiten berechnet.

Was man bis jetzt von den ſechs Trabanten des Uranus weiß, iſt ſchon oben in dem 122ſten §. angeführt worden. Die daſelbſt angegebenen Umlaufszeiten ſind, mit Ausnahme der des zweyten und vierten Trabanten, aus den beobachteten gröſten Elongationen nach der kepleriſchen Regel berechnet, welche durch die Beobachtungen des zweyten und vierten Trabanten auch hier beſtätigt wird, ſo daß ſie als ein allgemeines Geſetz angeſehen werden muß, welches die um einen gemeinſchaftlichen Mittelpunkt laufende Körper beobachten.

Drittes Buch.

Von den Gesetzen der Bewegung, und ihrer Anwendung auf die Bewegung der Himmelskörper.

Erstes Capitel.

Von den Gesetzen der Bewegung.

§. 230. Wenn ein Körper sich bewegt; so kann man die Bewegung eines Punkts desselben besonders betrachten, und sodenn die Bewegungen seiner übrigen Punkte in Beziehung auf diesen bestimmen. Ist der Körper ein fester, und gehen alle Punkte desselben nach parallelen Richtungen fort; so ist die Bewegung des Körpers bestimmt, wenn man die Bewegung eines seiner Punkte kennt. Befindet sich aber einer seiner Punkte in Ruhe, während andere Punkte desselben sich bewegen; so wird dadurch eine Umdrehung des Körpers um eine durch den ruhenden Punkt gehende Axe entstehen, welche bestimmt ist, wenn man die Lage der Umdrehungsaxe, und die Bewegung eines ausserhalb derselbigen befindlichen Punkts des Körpers kennt. Finden beyde Bewegungen zugleich statt; so kann die ganze Bewegung des Körpers in zwey Bewegungen zerfällt werden, nemlich in die progressive Bewegung eines seiner Punkte, und in die drehende Bewegung eines anderen Punkts desselben um eine durch den ersteren gehende Axe. So ist die Bewegung der Planeten um die Sonne aus einer fortschreitenden Bewegung ihrer Mittelpunkte und einer Umdrehungsbewegung um ihre Axen zusammengesetzt. Dadurch, daß man jede dieser Bewegungen besonders betrachtet, wird die Untersuchung derselben sehr vereinfacht, und auf die Betrachtung der Bewegung von Punkten zurückgeführt, welche geradli-

nigt oder krummlinigt iſt, je nachdem der ſich bewegende Punkt eine gerade oder krumme Linie beſchreibt. Im erſteren Fall verſteht man unter der Richtung der Bewegung die Richtung der beſchriebenen geraden Linie ſelbſt, im letztern aber die Richtung der geraden Linie, welche den krummlinigten Weg in demjenigen Punkt berührt, in welchem ſich der Körper in dem Augenblick befindet, für welchen man die Richtung ſeiner Bewegung angiebt.

§. 231. Die einfachſte Bewegung iſt diejenige, wenn ein Punkt in einer geraden Linie ſich ſo bewegt, daß er in gleichen Zeiten gleiche Räume beſchreibt, und heißt eine gleichförmige Bewegung. Es ſeyen die in den Zeiten t und T mit einer gleichförmigen Bewegung beſchriebenen Wege a und A, und m, n zwey beliebige ganze Zahlen; ſo wird $ma \gtreqless nA$ ſeyn, je nachdem $mt \gtreqless nT$ iſt. Folglich ſind bey jeder gleichförmigen Bewegung die Räume den Zeiten proportional, in welchen ſie beſchrieben worden ſind, oder es iſt

1.) $a : A = t : T$.

Der mit einer anderen gleichförmigen Bewegung in der Zeit T beſchriebene Weg ſey A', ſo wird man den in der Zeit t durch dieſe Bewegung beſchriebenen Weg a' durch die Proportion finden $T' : t = A' : a'$. Dadurch iſt das Verhältniß der mit den zwey Bewegungen in einerley Zeit t beſchriebenen Räume a und a' gegeben, welches man das Verhältniß der Geſchwindigkeit dieſer Bewegungen nennt. Da die Zeit t bey der Berechnung dieſer Räume nach Belieben angenommen werden kann; ſo kan man ſie auch der Zeiteinheit gleich ſetzen, durch welche man die Zeiten der Bewegungen mißt, zum Beyſpiel = 1 Sekunde, und alsdenn heißen die in der angenommenen Zeiteinheit beſchriebenen Räume die Geſchwindigkeiten der Bewegungen. Demnach wird ſeyn, wenn man ſich die Zeiten durch Zahlen ausgedrückt denkt,

$T : 1 = A$: Geſchwindigkeit c der erſten Bewegung,

$T' : 1 = A'$: Geſchwindigkeit c' der zweyten Bewegung;

Oder 2.) $c = \frac{A}{T}$; $c' = \frac{A}{T'}$.

Hieraus folgt 3.) $A = cT$; $A' = c'T'$

und 4.) $A : A' = cT : c'T'$,

oder die mit ungleichen Geschwindigkeiten und in ungleichen Zeiten beschriebenen Räume sind im zusammengesetzten Verhältniß der Zeiten und der Geschwindigkeiten. Ferner ist aus n. 2.

5.) $c : c' = \frac{A}{T} : \frac{A'}{T'} = AT' : A'T$, oder die Geschwindigkeiten sind im zusammengesetzten Verhältniß aus dem directen der Räume und dem umgekehrten der Zeiten, in welchen sie beschrieben wurden. Endlich folgt aus n. 3.

6.) $T = \frac{A}{c}$; $T' = \frac{A'}{c'}$, und

$T : T' = \frac{A}{c} : \frac{A'}{c'} = Ac' : A'c$, oder die Zeiten, in welchen ungleiche Räume beschrieben werden, sind im zusammengesetzten Verhältniß aus dem directen der beschriebenen Räume und dem umgekehrten der Geschwindigkeiten.

§. 232. Eine Bewegung heißt ungleichförmig, wenn in gleichen Zeiten ungleiche Räume beschrieben werden, und zwar nennt man sie eine beschleunigte oder verzögerte, je nachdem in jedem nächstfolgenden Zeittheilchen ein größerer oder kleinerer Raum beschrieben wird, als in dem vorhergehenden gleich grossen Zeittheilchen. Sind die in gleichen Zeiten beschriebenen Räume beständig ungleich, wie klein man auch die Zeiten nehmen mag; so heißt die Bewegung eine stetig ungleichförmige oder sich stetig verändernde Bewegung. In diesem Fall wird man fürs erste, wenn von der Geschwindigkeit der Bewegung die Rede ist, die Zeit oder den Endpunkt des beschriebenen Wegs angeben müssen, welchen die gesuchte oder gegebene Geschwindigkeit entsprechen soll, und fürs zweyte wird man sie nicht mehr, wie bey der gleichförmigen Bewegung, dadurch bestimmen können, daß man zu irgend einer von einem gegebenen Zeitpunkt an verflossenen Zeit, zu der Zeiteinheit und zu dem in der ersteren Zeit beschriebenen Raum die vierte geometrische Proportionalgröße sucht, oder, den Raum mit der die Zeit messenden Zahl dividirt, weil man eben so viele verschiedene Resultate erhalten wird, als man verschiedene von dem ge-

gebenen Punkt an beschriebene kleinere oder größere Räume mit der zu ihrer Beschreibung gebrauchten Zeit verglichen hat. Sind nemlich die in einerley Zeit z unmittelbar nach einander beschriebene Räume a, und $a+b$; so wird der in der Zeit $2z$ beschriebene Raum $= 2a+b$, und $\frac{2a+b}{2z} = \frac{a}{z}+\frac{b}{2z}$ seyn, welcher Ausdruck nur alsdenn $= \frac{a}{z}$ wird, wenn b verschwindet, mithin die Bewegung gleichförmig ist. Die Geschwindigkeit einer sich stetig verändernden Bewegung kann also nicht durch die unmittelbare Vergleichung des wirklich beschriebenen Raums mit der dazu gebrauchten Zeit nach §. 231. n. 2. gefunden werden, aber man kann den Raum zu bestimmen suchen, welcher von einem gegebenen Punkt an in einer gegebenen Zeit würde beschrieben worden seyn, wenn von diesem Punkt an die Bewegung gleichförmig wäre fortgesetzt worden, und diesen Raum mit dem von einer gegebenen gleichförmigen Bewegung beschriebenen Raum vergleichen. Man versteht daher unter der Geschwindigkeit einer veränderlichen Bewegung in einem gegebenen Punkt oder zu einer gegebenen Zeit den Raum, welcher von da an in einem gegebenen Zeitraum, z. B. in der zur Einheit angenommenen Zeit, würde beschrieben worden seyn, wenn der sich bewegende Punkt diejenige Bewegung gleichförmig fortgesetzt hätte, welche er in dem gegebenen Zeitpunkt hatte. Zu ihrer Bestimmung werden folgende vier Grundsätze erfordert:

1.) Der mit einer stetig beschleunigten Bewegung in einer gegebenen Zeit beschriebene Raum ist größer als der Raum, welcher während derselben Zeit mit der ihrem Anfang entsprechenden Geschwindigkeit gleichförmig würde beschrieben worden seyn.

2.) Der mit einer stetig beschleunigten Bewegung in einer gegebenen Zeit beschriebene Raum ist kleiner als der Raum, welcher während derselben Zeit mit der ihrem Ende entsprechenden Geschwindigkeit gleichförmig würde beschrieben worden seyn.

3.) Der mit einer stetig verzögerten Bewegung in einer gegebenen Zeit beschriebene Raum ist kleiner als der Raum,

welcher während derselben Zeit mit der ihrem Anfang entsprechenden Geschwindigkeit gleichförmig würde beschrieben worden seyn.

4. Der mit einer stetig verzögerten Bewegung in einer gegebenen Zeit beschriebene Raum ist größer als der Raum, welcher während derselben Zeit mit der ihrem Ende entsprechenden Geschwindigkeit gleichförmig würde beschrieben worden seyn.

§. 233. Es seyen z. B. die beschriebenen Räume den Quadraten der von Anfang der Bewegung an verfloßenen Zeiten proportional; so wird, wenn die Zeit in Sekunden ausgedrückt wird, und der in der ersten Sekunde beschriebene Raum g heißt, der in der Zeit t beschriebene Raum $S = gt^2$ seyn. Setzt man ferner die in den Zeiten $t - z$ und $t + z$ beschriebene Räume $= S - s'$ und $S + s$; so wird man haben

$$S - s' = g(t-z)^2 = gt^2 - 2gtz + gz^2$$
$$S + s = g(t+z)^2 = gt^2 + 2gtz + gz^2$$

und die unmittelbar vor und nach dem Zeitpunkt, welcher dem Ende der Zeit t entspricht, während des Zeittheilchens z beschriebenen Räume werden, weil $S = gt^2$ ist, beziehungsweise $s' = 2gtz - gz^2$

und $s = 2gtz + gz^2$ seyn.

Die Bewegung ist in diesem Fall eine stetig beschleunigte Bewegung, weil s beständig größer ist als s', wie klein man auch das Zeittheilchen z annimmt. Die am Ende der Zeit t erreichte Geschwindigkeit der Bewegung heiße v; so wird der mit dieser Geschwindigkeit in der Zeit z gleichförmig beschriebene Raum $= vz$ (§. 231. n. 3.), und vermöge des ersten und zweyten Grundsatzes des vorhergehenden §. beständig

$vz < s$ oder $2gtz + gz^2$
aber $> s'$ oder $2gtz - gz^2$, mithin

I. $v < 2gt + gz$

II. $v > 2gt - gz$ seyn, wie klein man auch das Zeittheilchen z nehmen mag.

Da nun die Geschwindigkeit v beständig zwischen die zwey Größen $2gt + gz$ und $2gt - gz$ fallen muß, deren Un-

terſchied = $2gz$ iſt, welcher durch die Verminderung von z kleiner als jede gegebene Größe gemacht werden kann; ſo wird die geſuchte Geſchwindigkeit ſelbſt weder größer noch kleiner als $2gt$ ſeyn können, und daher = $2gt$ ſeyn. Wäre nemlich fürs erſte $v > 2gt$; ſo ſey $v = 2gt + a$. Man nehme die Zeit z kleiner als $\frac{a}{g}$; ſo wird $gz < a$, und $2gt + gz < 2gt + a$ ſeyn. Es iſt aber vermöge der Vorausſetzung $v = 2gt + a$; folglich müßte $v > 2gt + gz$ ſeyn, welches gegen n. I. iſt. Wäre aber zweytens $v < 2gt$; ſo ſey $v = 2gt - b$. Man nehme $z < \frac{b}{g}$; ſo wird $gz < b$, $2gt - gz > 2gt - b$ ſeyn. Da nun $v = 2gt - b$ (Vorausſ.); ſo müßte gegen n. II. die Geſchwindigkeit $v < 2gt - gz$ ſeyn. Demnach kann v weder größer noch kleiner als $2gt$ ſeyn, und daher iſt $v = 2gt$, oder die Geſchwindigkeit wächst der Zeit proportional. Wenn, wie in dem hier betrachteten Fall, die Geſchwindigkeit der Zeit proportional wächst; ſo heißt die Bewegung eine gleichförmig beſchleunigte. Eine gleichförmig verzögerte Bewegung iſt diejenige, bey welcher die Geſchwindigkeit der Zeit proportional abnimmt.

§. 234. Umgekehrt, wenn die Geſchwindigkeit der Zeit proportional wächst, oder die Bewegung eine gleichförmig beſchleunigte iſt; ſo verhalten ſich die ganzen beſchriebenen Räume wie die Quadrate der vom Anfang der Bewegung an verfloßenen Zeiten. Man denke ſich die vom Anfang der Bewegung an verfloßene Zeit t in n gleiche Theile getheilt, und die am Ende der erſten Sekunde erhaltene Geſchwindigkeit ſey = k; ſo werden die am Ende des erſten, zweyten, dritten ---- $n$ten Zeittheilchens erhaltene Geſchwindigkeiten $\frac{kt}{n}, \frac{2kt}{n}, \frac{3kt}{n}$ ------ $\frac{nkt}{n}$ ſeyn. Die in dem erſten, zweyten, dritten, ----- $n$ten Zeittheilchen beſchriebenen Räume ſeyen $s', s'', s''', \text{----} s^N$, und der ganze vom Anfang der Bewegung an während der Zeit t beſchriebene Raum ſey = S. Vermöge §. 231. n. 3. und des erſten Grundſatzes des 232ſten §. wird man haben

$$s' < \frac{kt}{n} \cdot \frac{t}{n}$$
$$s'' < \frac{2kt}{n} \cdot \frac{t}{n}$$
$$s''' < \frac{3kt}{n} \cdot \frac{t}{n}$$
$$\vdots$$
$$s^N < \frac{nkt}{n} \cdot \frac{t}{n}$$

$$\text{also } \left.\begin{matrix} s'+s''+\cdots+s^N \\ \text{oder } S \end{matrix}\right\} < \frac{kt}{n} \cdot \frac{t}{n} (1+2+3+\cdots+n)$$
$$< \frac{kt^2}{n^2} \cdot \frac{(n+1)}{2} < \tfrac{1}{2} kt^2 \left(1+\frac{1}{n}\right)$$

Vermöge des zweyten Grundsatzes aber

$$s' > 0$$
$$s'' > \frac{kt}{n} \cdot \frac{t}{n}$$
$$s''' > \frac{2kt}{n} \cdot \frac{t}{n}$$
$$\vdots$$
$$s^N > \frac{(n-1)kt}{n} \cdot \frac{t}{n}$$

$$\text{also } \left.\begin{matrix} s'+s''\cdots+s^N \\ \text{oder } S \end{matrix}\right\} > \frac{kt}{n} \frac{t}{n} (1+2+3+\cdots+n-1)$$
$$> \frac{kt^2}{n^2} \cdot \frac{n(n-1)}{2} > \tfrac{1}{2} kt^2 \left(1-\frac{1}{n}\right)$$

Mithin ist beständig, wie klein man auch die Zeittheilchen, wie groß man folglich n nehmen mag,

I. $S < \frac{1}{2} kt^2 \left(1+\frac{1}{n}\right)$

II. $S > \frac{1}{2} kt^2 \left(1-\frac{1}{n}\right)$,

und daher wird $S = \frac{1}{2} kt^2$ seyn. Wäre nemlich fürs erste $S > \frac{1}{2} kt^2$; so sey $S = \frac{1}{2} kt^2 (1+\frac{1}{r})$. Man nehme $n > r$; so ist $\frac{1}{n} < \frac{1}{r}$, $1+\frac{1}{n} < 1+\frac{1}{r}$, und $\frac{1}{2} kt^2 (1+\frac{1}{n}) < \frac{1}{2} kt^2 (1+\frac{1}{r})$. Die letztere Größe soll aber vermöge der Vor-

ausſetzung $= S$ ſeyn; folglich müßte $S > \frac{1}{2}kt^2(1+\frac{1}{n})$ ſeyn, welches gegen n. I. iſt. Wäre aber $S < \frac{1}{2}kt^2$; ſo ſey $S = \frac{1}{2}kt^2(1-\frac{1}{q})$. Man nehme $n > q$; ſo iſt $\frac{1}{n} < \frac{1}{q}$; $1-\frac{1}{n} > 1-\frac{1}{q}$, und $\frac{1}{2}kt^2(1-\frac{1}{n}) > \frac{1}{2}kt^2(1-\frac{1}{q})$. Die letztere Größe iſt aber vermöge der Vorausſetzung $= S$; folglich müßte gegen n. II. der Raum S kleiner als $\frac{1}{2}kt^2(1-\frac{1}{n})$ ſeyn. Daher iſt $S = \frac{1}{2}kt^2$, und der Raum S wächst, weil k eine gegebene Größe iſt, dem Quadrat der von Anfang der Bewegung an verfloſſenen Zeit proportional. Setzt man den in der erſten Sekunde beſchriebenen Raum $\frac{1}{2}k = g$; ſo hat man wie in dem vorhergehenden §. $S = gt^2$.

Bey jeder gleichförmig beſchleunigten Bewegung iſt daher, wenn man den in der erſten Sekunde beſchriebenen Raum $= g$, die vom Anfang der Bewegung an verfloſſene Zeit $= t$ Sekunden, die am Ende der Zeit t erlangte Geſchwindigkeit $= v$, und den in der Zeit t beſchriebenen Raum $= s$ ſetzt,

1.) $s = gt^2$
2.) $v = 2gt$,
3.) $v^2 = 4g^2t^2 = 4gs$ (n. 1.)

§. 235. Die Bewegung ſey wiederum eine gleichförmig beſchleunigte, aber es ſey jetzt im Anfang der Zeit t die Geſchwindigkeit einer gegebenen Größe c gleich; ſo wird am Ende der Zeit t die Geſchwindigkeit $= c + kt$ ſeyn. Man wird nun auf ähnliche Art, wie in dem vorhergehenden §. wenn der in der Zeit t beſchriebene Raum S heißt, erhalten,

$$S < \text{n. c. } \frac{t}{n} + \frac{1}{2}kt^2\left(1+\frac{1}{n}\right)$$

$$< ct + \frac{1}{2}kt^2\left(1+\frac{1}{n}\right)$$

und $S > ct + \frac{1}{2}kt^2\left(1-\frac{1}{n}\right)$, woraus wiederum folgt

$S = ct + \frac{1}{2}kt^2 = ct + gt^2$, wenn $\frac{1}{2}k = g$ geſetzt wird.

Die Bewegung ſey eine gleichförmig verzögerte, und

im Anfang der Zeit t die Geſchwindigkeit $= c$, der in der Zeit t beſchriebene Raum ſey $= S$; ſo wird am Ende der Zeit t die Geſchwindigkeit $= c - kt$ ſeyn, welche verſchwindet, wenn $t = \frac{c}{k}$ wird. Es ſey $t < \frac{c}{k}$, und man denke ſich die Zeit t in n gleiche Theile getheilt; ſo werden die am Ende des erſten, zweyten, dritten, ---nten Zeittheilchens erhaltene Geſchwindigkeiten $c - \frac{kt}{n}$, $c - \frac{2kt}{n}$, $c - \frac{3kt}{n}$, ---- $c - \frac{nkt}{n}$ ſeyn. Die nach einander in jedem der Zeittheilchen wirklich beſchriebenen Räume ſeyen $s', s'', s''' \cdots s^N$; ſo wird man vermöge des dritten Grundſatzes des 232ſten §. haben

$$s' < \frac{ct}{n}$$

$$s'' < \frac{ct}{n} - \frac{kt}{n} \cdot \frac{t}{n}$$

$$s''' < \frac{ct}{n} - \frac{2kt}{n} \cdot \frac{t}{n}$$

$$\vdots$$

$$s^N < \frac{ct}{n} - \frac{(n-1)kt}{n} \cdot \frac{t}{n}$$

$$\text{oder } S \left\{ \begin{array}{l} s' + s'' + \cdots + s^N \end{array} \right\} < \frac{nct}{n} - \frac{kt}{n} \cdot \frac{t}{n} (1 + 2 + \cdots + n - 1)$$

$$< ct - \frac{kt^2}{n^2} \cdot \frac{n(n-1)}{2}$$

$$< ct - \tfrac{1}{2}kt^2 \left(1 - \frac{1}{n}\right)$$

und vermöge des vierten Grundſatzes

$$s' > \frac{ct}{n} - \frac{kt}{n} \cdot \frac{t}{n}$$

$$s'' > \frac{ct}{n} - \frac{2kt}{n} \cdot \frac{t}{n}$$

$$\vdots$$

$$s^N > \frac{ct}{n} - \frac{nkt}{n} \cdot \frac{t}{n}$$

$$\text{also } S \left\{ \begin{array}{l} s' + s'' + \cdots + s^N \end{array} \right\} > \frac{nct}{n} - \frac{kt}{n} \cdot \frac{t}{n} (1 + 2 + \cdots + n)$$

$$> ct - \tfrac{1}{2}kt^2 \left(1 + \frac{1}{n}\right)$$

Und

Und nun kann wie in dem 234ſten §. gezeigt werden, daß S weder kleiner noch größer ſeyn könne, als $ct - \frac{1}{2}kt^2$. Folglich iſt $S = ct - \frac{1}{2}kt^2 = ct - gt^2$, wenn $k = 2g$ geſetzt wird.

§. 236. Lemma. Wenn a und b zwey Bogen eines mit dem Halbmeßer 1 beſchriebenen Kreiſes bezeichnen, deren Summe kleiner als der vierte Theil ſeines Umfangs oder $\frac{1}{2}\pi$ iſt; ſo iſt für eben dieſen Kreis

$$\left.\begin{array}{l}\text{Sin.}(a+b) - \text{Sin.}\,a \\ \text{oder } 2\,\text{Sin.}\tfrac{1}{2}b\,\text{Cos.}(a+\tfrac{1}{2}b)\end{array}\right\} < b\,\text{Cos.}\,a, \text{ aber} > b\,\text{Cos.}(a+b)$$

$$\text{und } \left.\begin{array}{l}\text{Cos.}\,a - \text{Cos.}(a+b) \\ \text{oder } 2\,\text{Sin.}\tfrac{1}{2}b\,\text{Sin.}(a+\tfrac{1}{2}b)\end{array}\right\} > b\,\text{Sin.}\,a, \text{ aber} < b\,\text{Sin.}(a+b)$$

Bew. Es ſeyen AA', BB' (Fig. 77.) zwey ſich ſenkrecht ſchneidende Durchmeſſer des mit dem Halbmeſſer $CA = 1$ beſchriebenen Kreiſes, und von den Punkten M, m des Bogen AB ſeyen die Perpendickel MP, mp auf CA, und die Perpendickel MQ, mq auf CB gefällt. Man ziehe an die Punkte M, m die Halbmeſſer CM, Cm, und die Tangenten MTS, tms. Die erſtere Tangente ſchneide den verlängerten Halbmeſſer CB in S, und die verlängerte ym in T, die letztere begegne der Verlängerung von QM in t, der Tangente MS in s, und dem verlängerten Halbmeſſer CB in s. Endlich ziehe man die Chorde Mm; ſo iſt (Archimedes über Kugel und Cyl. Ax. 2.) Der Bogen $Mm >$ Chorde Mm, und um ſo mehr $> MT$ (I, 19.), auf der andern Seite aber Bog. $Mm < me + eM$, und um ſo mehr $< me + et$ (I, 19.) $< mt$.

Da nun $MT : Qq = MS : SQ$
$= CM : MQ$ (VI, 8.)
und $mt : Qq = ms : sq$
$= Cm : Mq$ (VI, 8.);

ſo iſt $Qq = \frac{MQ}{CM} MT < \frac{MQ}{CM}$ Bogen Mm

$= \frac{mq}{Cm} mt > \frac{mq}{Cm}$ Bogen Mm,

d. i. wenn man $AM = a$; $Mm = b$ ſetzt
$\text{Sin.}(a+b) - \text{Sin.}\,a < b\,\text{Cos.}\,a$
$> b\,\text{Cos.}(a+b)$

Rechnet man aber die Bogen a und b von B an gegen A hin, und ſetzt $Bm = a$, $mM = b$; ſo iſt

$\text{Cos.}\,a - \text{Cos.}(a+b) < b\,\text{Sin.}(a+b)$
$> b\,\text{Sin.}\,a.$

Der Satz iſt auch auf diejenigen Fälle anwendbar, in welchen $a + b$ größer als $\frac{1}{2}\pi$ iſt, wenn b ganz in einerley Quadranten fällt, und man auf die algebraiſchen Zeichen Achtung giebt. Setzt

man z. B. den Bogen $A'm = a'$, den Bogen $mM = b$, mithin $A'M = a' + b$; ſo iſt $Qq = pm - PM = \text{Sin.}\, a - \text{Sin.}\,(a' + b)$, $MQ = \text{Cos.}\,(\pi - (a + q))$, $mq = \text{Cos.}\,(\pi - a')$, und vermöge des bewieſenen

$$\text{Sin.}\, a' - \text{Sin.}\,(a' + b) > b\,\text{Cos.}\,(\pi - a')$$
$$\text{Sin.}\, a' > \text{Sin.}\,(a + b) + b\,\text{Cos.}\,(\pi - a') > \text{Sin.}\,(+a'b) - b\,\text{Cos.}\, a'$$
$$\text{Sin.}\, a' + b\,\text{Cos.}\, a' > \text{Sin.}\,(a' + b)$$

und eben ſo $\text{Sin.}\, a' + b'\,\text{Cos.}\,(a + b) < \text{Sin.}\,(a' + b)$

Mithin iſt wiederum $\text{Sin.}\,(a' + b) - \text{Sin.}\, a' < b\,\text{Cos.}\, a'$
$> b\,\text{Cos.}\,(a' + b)$

welches dem Gang des algebraiſchen Calculs gemäß iſt, indem man dabey kleinere negative Größen als größere, und größere negative Größen als kleinere betrachtet.

§. 237. Es ſey nun der in der Zeit t beſchriebene Raum

1.) $S = ct + b\,\text{Sin.}\,(a + mt)$, wo a, b, c, und m gegebene Zahlen ſeyen. Ferner bedeute $a + mt$ die Länge eines mit dem Halbmeſſer 1 beſchriebenen Kreisbogens, und der Sinus beziehe ſich auf eben dieſen Halbmeſſer. Man verlangt die dem Ende der Zeit t entſprechende Geſchwindigkeit v dieſer Bewegung.

Heißen die in den Zeiten $t - z$ und $t + z$ beſchriebenen Räume $S - s'$ und $S + s$; ſo wird man haben

$$S - s' = c\,(t - z) + b\,\text{Sin.}\,(a + mt - mz)$$
$$S + s = c\,(t + z) + b\,\text{Sin.}\,(a + mt + mz)$$

alſo $s' = cz + b\,(\text{Sin.}\,(a + mt) - \text{Sin.}\,(a + mt - mz))$
$= cz + 2b\,\text{Sin.}\,\frac{1}{2}mz\,\text{Cos.}\,(a + mt - \frac{1}{2}mz)$

ebenſo $s = cz + 2b\,\text{Sin.}\,\frac{1}{2}mz\,\text{Cos.}\,(a + mt + \frac{1}{2}mz)$

Es ſey $a + mt + \frac{1}{2}mz$ nicht größer als $\frac{1}{2}\pi$; ſo iſt $s' > s$, und die Bewegung eine verzögerte.

Nun iſt $\left.\begin{array}{l} s' < cz + mbz\,\text{Cos.}\,(a + mt) \\ s > cz + mbz\,\text{Cos.}\,(a + mt + mz) \end{array}\right\}$ §. 236.

Folglich kann v nicht größer ſeyn als $c + mb\,\text{Cos.}\,(a + mt)$, ſonſt wäre $vz > cz + mbz\,\text{Cos.}\,(a + mt)$, und um ſo mehr $vz > s'$, welches gegen den vierten Grundſatz des 232ſten §. iſt.

Die Geſchwindigkeit v kann aber auch nicht kleiner ſeyn, als $c + mb\,\text{Cos.}\,(a + mt)$. Wäre ſie nemlich kleiner als dieſe Größe; ſo ſey ſie $= c + mb\,\text{Cos.}\,(a + mt + q)$. Man nehme $z < \frac{q}{m}$; ſo iſt $mz < q$, und $\text{Cos.}\,(a + mt + q) < \text{Cos.}\,(a + mt + mz)$. Folglich müßte ſeyn

$\left.\begin{array}{l} (c + mb\,\text{Cos.}\,(a + mt + q))\,z \\ \text{oder} \quad vz \end{array}\right\} < cz + mbz\,\text{Cos.}\,(a + mt + mz)$,

und um ſo mehr $vz < s$, welches dem dritten Grundſatz §. 232. widerſpricht. Daher iſt die am Ende der Zeit t erreichte Geſchwindigkeit $v = c + mb\,\text{Cos.}\,(a + mt)$.

2.) Sey $S = ct + b\,\text{Cos.}\,(a + mt)$; ſo ſind
$S - s' = c\,(t - z) + b\,\text{Cos.}\,(a + mt - mz)$

$$S + s = c(t+z) + b\,\mathrm{Cos.}(a+mt+mz)$$
$$\text{also } s' = cz - b\,(\mathrm{Cos.}(a+mt-mz) - \mathrm{Cos.}(a+mt))$$
$$= cz - 2b\,\mathrm{Sin.}\tfrac{1}{2}mz\,\mathrm{Sin.}(a+mt-\tfrac{1}{2}mz)$$
$$s = cz - 2b\,\mathrm{Sin.}\tfrac{1}{2}mz\,\mathrm{Sin.}(a+mt+\tfrac{1}{2}mz)$$

Man nehme wiederum an, $a+mt+\frac{1}{2}mz$ sey nicht gröſſer als $\frac{1}{2}\pi$; so ist $s' > s$, und die Bewegung eine verzögerte. Vermöge §. 236. ist

$$s' < cz - mbz\,\mathrm{Sin.}(a+mt-mz)$$
und $$s > cz - mbz\,\mathrm{Sin.}(a+mt);$$

folglich kann v nicht kleiner seyn, als $c - mb\,\mathrm{Sin.}(a+mt)$, sonst wäre $vz < cz - mbz\,\mathrm{Sin.}(a+mt)$, und um so mehr $< s$, gegen den dritten Grundsatz §. 232.

Wäre aber $v > c - mb\,\mathrm{Sin.}(a+mt)$; so sey $v = c - mb\,\mathrm{Sin.}(a+mt-q)$. Man nehme $z < \frac{q}{m}$; so ist $mz < q$, $a+mt-mz > a+mt-q$, $c - mb\,\mathrm{Sin.}(a+mt-mz) < c - mb\,\mathrm{Sin.}(a+mt-q)$. Folglich müßte seyn $cz - mbz\,\mathrm{Sin.}(a+mt-mz) < vz$, und um so mehr $s' < vz$, welches gegen den vierten Grundsatz §. 232. ist. Daher ist $v = c - mb\,\mathrm{Sin.}(a+mt)$.

Vergröſsert man in n. 1. den Bogen a um den vierten Theil des Umfangs oder um $\frac{1}{2}\pi$; so wird $S = ct + b\,\mathrm{Cos.}(a+mt)$, und der Ausdruck für die Geschwindigkeit v wird $c - mb\,\mathrm{Sin.}(a+mt)$, welcher mit dem in n. 2. gefundenen Ausdruck übereinstimmt.

In dem n. 1. betrachteten Fall ist die Bewegung in dem ersten Halbzirkel eine verzögerte, in dem zweyten Halbzirkel aber eine beschleunigte, und es kann auf ähnliche Art mittelst des ersten und zweyten Grundsatzes des 232sten §. gezeigt werden, daſs der gefundene Ausdruck der Geschwindigkeit auch in dem zweyten Halbzirkel gilt.

In dem n. 2. betrachteten Fall ist die Bewegung in dem ersten und dritten Quadranten eine verzögerte, in dem zweyten und vierten eine beschleunigte, und man beweiſst mittelst des ersten und zweyten Grundsatzes, daſs der für die Geschwindigkeit in dem ersten Quadranten gefundene Ausdruck auch für die drey übrigen Quadranten richtig ist.

Wenn m negativ ist; so hat man $\mathrm{Sin.}(a-mt) = -\mathrm{Sin.}(2\pi-a+mt)$, und $\mathrm{Cos.}(a-mt) = \mathrm{Cos.}(2\pi-a+mt)$. Mithin darf man nur in den bisher gefundenen Ausdrücken $2\pi-a$ statt a setzen, und das Vorzeichen der Sinus umkehren.

Aus den für die Geschwindigkeiten gefundenen Ausdrücken ergiebt sich, daſs die Bewegung beständig nach einerley Richtung geschieht, so lange mb nicht gröſser ist als c. Wird mb gröſser als c; so geht die Bewegung in eine retrograde über, wenn $mb\,\mathrm{Sin.}(a+mt)$ oder $mb\,\mathrm{Cos.}(a+mt)$ negativ, und $\mathrm{Sin.}(a+mt)$ oder $\mathrm{Cos.}(a+mt) > \frac{c}{mb}$ wird.

Die Ungleichheiten dieser Bewegungen haben eine Periode von $\frac{2\pi}{m}$ Sekunden, Minuten, u. s. w. je nachdem die Zeit t in Sekunden, Minuten, u. s. w. ausgedrückt ist. Ist nemlich $t = \frac{2\pi}{m} + t'$; so wird $a + mt = a + 2\pi + mt'$, und $\text{Sin.}(a+mt) = \text{Sin.}(a+mt')$, $\text{Cos.}(a+mt) = \text{Cos.}(a+mt')$.

§. 238. Die umgekehrte Aufgabe, aus dem Gesetz, nach welchem die Geschwindigkeit von der Zeit abhängt, den in einer gegebenen Zeit beschriebenen Raum zu finden, könnte auf ähnliche Art, wie in dem 234. und 235sten §. aufgelöst werden, wenn nicht die Summation der dabey vorkommenden Reihen in den meisten Fällen grosse Schwierigkeiten hätte. Kürzer läßt sich die Aufgabe auflösen, wenn man den gegebenen Ausdruck der Geschwindigkeit mit denjenigen Ausdrücken vergleicht, welche man aus gegebenen Ausdrücken der Räume durch die Zeiten abgeleitet hat. Wenn z. B. $v = C + B\,\text{Cos.}(A+Mt)$ wäre, wo A, B, C und M gegebene Größen bedeuten; so würde dieser Ausdruck mit dem §. 237. n. 1. gefundenen Ausdruck der Geschwindigkeit einerley Form haben, wenn B den Faktor M hätte. Man bringt ihn aber leicht auf diese Form, wenn man $M.\frac{B}{M}$ statt B schreibt. Aus der Vergleichung des §. 237. n. 1. gefundenen Ausdrucks der Geschwindigkeit mit Ausdruck des Raums S aus welchem er abgeleitet wurde, ergiebt sich in Beziehung auf den hier vorgegebenen Ausdruck der Geschwindigkeit der in der Zeit t beschriebene Raum $S = Ct + \frac{B}{M}\,\text{Sin.}(A+Mt)$.

Sucht man hieraus nach dem vorhergehenden §. die der Zeit t entsprechende Geschwindigkeit; so erhält man $v = C + B\,\text{Cos.}(A+Mt)$, übereinstimmend mit dem vorgegebenen Ausdruck der Geschwindigkeit, woraus folgt, daß der mit der vorgegebenen veränderlichen Geschwindigkeit in der Zeit t beschriebene Raum $S = Ct + \frac{B}{M}\,\text{Sin.}(A+Mt)$ ist. Wenn nemlich die Geschwindigkeiten zweyer Bewegungen beständig einander gleich sind; so sind die mit diesen Bewegungen in einerley Zeit beschriebenen Räume ebenfalls einander gleich. Um dieses zu beweisen *), seyen R und S die mit den zwey Bewegungen in der Zeit t beschriebene Räume. Die sich bewegende Punkte mögen P und Q heißen.

Erster Fall. Wenn die Geschwindigkeiten constant, oder die zwey Bewegungen gleichformig sind; so muß die Geschwindigkeit c von P der Geschwindigkeit c' von Q gleich, $ct = c't$ und $R = S$ seyn.

*) Treatise of Fluxions by Colin Maclaurin. Book I. Theor. IV. pag. 66.

Zweyter Fall. Wenn die Bewegung von P während einer gewißen Zeit t eine beſchleunigte iſt; ſo muß auch die Bewegung von Q innerhalb deſſelben Zeitraums eine beſchleunigte ſeyn. Wäre nun S nicht gleich R; ſo ſey 1.) $S < R$. Man nehme von dem Ende des Raums R ein Stück D hinweg, ſo daß $S = R - D$ werde, und theile die Zeit t in ſo viele gleiche Theile, bis eines dieſer Zeittheilchen z kleiner ſey, als die Zeit, welche der Punkt P zur Beſchreibung des Raums D gebraucht. Es ſeyen die nach einander während der Zeittheilchen z beſchriebene Räume

in Beziehung auf P } p', p'', p''', p'''';
in Beziehung auf Q } q', q'', q''', q'''';

und die dem Anfang eines jeden dieſer Zeittheilchen entſprechende Geſchwindigkeiten, welche vermöge der Vorausſetzung in den zwey Bewegungen beſtändig einander gleich ſind, ſeyen

v, v', v'', v'''; ſo werden (1. Grundſ. §. 232.)
$q'''' > v'''z$ und (2. Grundſ.) um ſo mehr $> p''''$
$q''' > v''z$ — — — $> p'''$
$q'' > v'z$ — — — $> p''$
$q' > vz$ ſeyn.

folglich wäre $q' + q'' + \cdots + q''''$ } $> p' + p'' + p'''$.
oder S }

Es iſt aber z kleiner gemacht, als die Zeit, welche der Punkt P zur Beſchleunigung des Raums D gebrauchte, und daher $D > p''''$. Mithin mußte um ſo mehr

$S + D > p' + p'' + p''' + p''''$, d. i. $> R$

und $S > R - D$ ſeyn.

Man hat aber angenommen $S = R - D$; folglich kann S nicht kleiner als R ſeyn. Wäre aber 2.) $S > R$; ſo müßte $R < S$ ſeyn. Und nun kann wie vorhin gezeigt werden, daß R nicht kleiner ſeyn kann als S. Daher muß $R = S$ ſeyn.

Dritter Fall. Die Bewegung von P, mithin auch die Bewegung von Q, ſey während der Zeit t beſtändig verzögert. Wäre S nicht gleich R; ſo ſey von den zwey Räumen S und R der Raum S der kleinere. Man nehme von dem Anfang des Raums R ein Stück D hinweg, ſo daß $S = R - D$ werde, und theile die Zeit t in ſo viele gleiche Theile, daß die Zeit, welche P zu der Beſchreibung des Raums D gebraucht, kleiner als eines dieſer Zeittheilchen z werde. Unter der Vorausſetzung der vorhin gebrauchten Benennungen werden nun

$q''' > v'''z$ (4. Grundſ.), und um ſo mehr $> p''''$ (3. Grundſ.)
$q'' > v''z$ — — — $> p'''$ —
$q' > v'z$ — — — $> p''$

folglich $q' + q'' + q'''$
und um so mehr $q' + q'' + q''' + q''''$ oder S $\Big\} > p'' + p''' + p''''$

und weil $D > p'$; so müßte um so mehr
$S + D > p' + p'' + p''' + p''''$, d. i. $> R$,
mithin $S > R - D$ seyn.

Man hat aber angenommen $S = R - D$; folglich kann S nicht kleiner als R seyn. Eben so kann gezeigt werden, daß R nicht kleiner S, mithin S nicht gröſſer als R seyn könne. Daher ist $S = R$.

Wenn eine Bewegung abwechslungsweise beschleunigt und verzögert ist; so kann man die mit einer beschleunigten und die mit einer verzögerten Bewegung beschriebenen Räume besonders betrachten, und durch die Verbindung des zweyten Falls mit dem dritten den aufgestellten Satz auch für diesen Fall beweisen.

§. 239. Wenn eine Bewegung gleichförmig ist; so ist durch die Geschwindigkeit derselben der während eines gegebenen Zeitraums beschriebene Raum gegeben, weil die in gleichen Zeiten beschriebene Räume einander gleich sind. Nicht so verhält es sich mit den ungleichförmigen Bewegungen. Wenn nemlich das Gesetz gegeben ist, nach welchem die Geschwindigkeit von der Zeit abhängt; so kann nach dem vorhergehenden §. der während einer gegebenen Zeit beschriebene Raum nur alsdenn gefunden werden, wenn der Anfang oder das Ende der während der Bewegung verflossenen Zeit gegeben ist. In beyden Fällen aber muß, um den Raum bestimmen zu können, welcher bis zu einem gegebenen Zeitpunkt hin beschrieben worden ist, der im Anfang der Zeit schon zurückgelegte Raum gegeben seyn. In dem besonderen Fall, wo die Zeit vom Anfang der Bewegung an gerechnet wird, muß der Ausdruck für den beschriebenen Raum so beschaffen seyn, daß er verschwindet, wenn man die Zeit $= o$ setzt.

Sey z. B. $v = c + mb \operatorname{Cos.}(a + mt)$; so ist, wenn A eine von den Veränderungen der Zeit independente oder constante Gröſſe bezeichnet, im allgemeinen $S = A + ct + b \operatorname{Sin.}(a + mt)$. Denn man erhält hieraus nach §. 237. n. 1, weil A aus den Ausdrücken von s' und s herausfällt, den vorgegebenen Ausdruck der Geschwindigkeit v, und daher ist der zwischen zwey gegebenen Zeitpunkten beschriebene Raum gegeben (§. 238.). Soll nun für $t = o$ der Raum $S = f$ seyn; so wird man haben $f = A + b \operatorname{Sin.} a$ für $t = o$, und daher $f - b \operatorname{Sin.} a = A$. Für diesen Fall ist also $= S = f - b \operatorname{Sin.} a + ct + b \operatorname{Sin.}(a + mt)$. Soll aber für $t = o$ auch $S = o$ seyn, so wird $A = -b \operatorname{Sin.} a$, und $S = ct + b \operatorname{Sin.}(a + mt) - b \operatorname{Sin.} a$.

Vermöge §. 237. und 238. wird man haben

1.) wenn $v = c + mb \operatorname{Cos.}(a + mt)$; $S = \operatorname{Const.} + ct + b \operatorname{Sin.}(a + mt)$

2.) $v = c - mb \operatorname{Sin.}(a + mt)$; $S = \text{Const.} + et + b \operatorname{Cos.}(a + mt)$
wo die conſtante Gröſſe durch die Bedingungen der Aufgabe zu beſtimmen iſt.

§. 240. Es ſeyen CA und CB (Fig. 78.) zwey ſich in C ſchneidende der Lage nach gegebene gerade Linien, und auſſerhalb derſelben, aber in der durch ſie gelegten Ebene, befinde ſich ein Punkt M, durch welchen die Parallelen MQ und MP mit CA und CB gezogen ſeyen; ſo iſt die Lage des Punkts M gegeben, wenn die Seiten CP und PM des Parallelogramms PQ gegeben ſind. Wenn ſich nun der Punkt M in der Ebene ACB nach einer weder mit CA noch mit CB parallel laufenden Richtung fortbewegt; ſo werden CP und CQ ſich verändern, und, wenn der Punkt M nach M' rückt, in CP' und CQ' übergehen. Dadurch wird die Bewegung des Punkts M in zwey geradlinigte Bewegungen nach den Richtungen CA und CB zerfällt, welche gegeben ſeyn wird, wenn die Bewegungen der Punkte P und Q in den geraden Linien CA und CB gegeben ſind.

Die Bewegungen von P und Q ſeyen erſtlich gleichförmig, ihre Geſchwindigkeiten c und c', die Bewegung von M gehe durch den Punkt C, und die von dem Augenblick an, da der Punkt M in C war, bis zu den Zeitpunkten, da er in M und M' war, verfloſſene Zeiten ſeyen t und T; ſo wird man haben $CP = ct$, $CP' = c.T$, $CQ = ct$, $CQ' = c'.T$, und daher

$$CP : CQ = CP' : CQ';$$

folglich wird die Diagonale CM' des Parallelogramms PQ' durch den Punkt M gehen (VI, 26.), und die Bewegung von M geradlinigt ſeyn. Man nehme auf den geraden Linien CA und CB die Linien Ca und Cb den Geſchwindigkeiten c und c' der Punkte P und Q gleich, und vollende das Parallelogramm $Cafb$. Da ſo wohl $Ca : CP$ als $Cb : CQ$ wie die Zeit durch Ca zu der Zeit durch CP (§. 231. n. 1.); ſo verhält ſich $Ca : Cb = CP : CQ$. Folglich liegen C, f, M in einer geraden Linie (VI, 26.), und die Diagonale Cf des Parallelogramms ab fällt mit der Richtung der Bewegung des Punkts M zuſammen. Und weil $Cf : CM$

$= Ca : CP =$ Zeit durch Ca oder 1 zu der Zeit durch CP oder t; so mißt zugleich die Diagonale Cf des Parallelogramms ab die Geschwindigkeit der gleichförmigen Bewegung des Punkts M nach der Richtung CfN. Sind die Geschwindigkeiten Ca und Cb sammt den Richtungen CA, CB der zwey Bewegungen gegeben; so ist die Diagonale Cf des Parallelogramms aus Ca und Cb der Größe und Lage nach gegeben, welche die mittlere aus Ca und Cb zusammengesetzte Geschwindigkeit heißt. Umgekehrt kann jede gleichförmige geradlinigte Bewegung, deren Geschwindigkeit Cf gegeben ist in zwey andere gleichförmige geradlinigte Bewegungen nach gegebenen Richtungen CA und CB zerfällt werden, deren Geschwindigkeiten Ca und Cb man erhält, wenn man durch den Punkt f die Parallelen fa und fb mit den Linien CB und CA zieht.

Zweytens sey die Bewegung von P (Fig. 79.) auf der geraden Linie CA gleichförmig, die Bewegung von Q aber auf der geraden Linie CB stetig beschleunigt. Man nehme auf beyden Seiten von P die Pp und Pp' einander gleich, und es befinde sich der Punkt Q in q' und q, wenn P in p' und p kommt; so werden $p'P$, Pp, $q'Q$, Qq in gleichen Zeiten von P und Q beschriebene Räume seyn. Man vollende die Parallelogramme $p'q'$, PQ, pq, so wird man die den Punkten p, P, p entsprechende Punkte m', M, m der Linie haben, welche der Punkt M beschreibt, während die Punkte P und Q die geraden Linien $p'p$ und $q'q$ beschreiben. Man ziehe die gerade Linie $m'm$, welche von der durch den Punkt M mit CB parallel gezogenen PS in k geschnitten werde, und durch k die Parallele ko mit CA. Da $p'P = Pp$; so ist $m'k = km$, und $q'o = oq$. Und weil die Bewegung von Q nach der Richtung CB eine stetig beschleunigte ist (Voraussf.); so ist beständig $q'Q \prec Qq$, und daher $\left\{\begin{matrix} Co \\ Pk \end{matrix}\right\} \succ \left\{\begin{matrix} CQ \\ PM \end{matrix}\right\}$. Der Punkt M beschreibt also eine stetig krumme Linie $m'Mm$, welche ihre erhabene Seite gegen die Linie CA kehrt. An den Punkt M dieser krummen Linie sey eine Tangente $t't$ gezogen, welche der pm in t, der $p'm'$ in t' begegne. Die Verlängerung von $p'm'$ begegne der QM in K', und die Ver-

lingerung von QM begegne der pm in R; ſo verhält ſich die Geſchwindigkeit der gleichförmigen Bewegung von P zu der Geſchwindigkeit von Q in dem Punkt Q oder zu der Geſchwindigkeit von M nach der mit CB parallelen Richtung, wie $MR : Rt$. Denn der Raum, welcher mit der letzteren Geſchwindigkeit in der Zeit beſchrieben wird, in welcher der Punkt P den Raum $p'P$ oder Pp zurücklegt, muß (1. und 2 Grundſ. §. 232.) kleiner als Rm aber größer als $R'm'$ ſeyn. Wäre nun die Geſchwindigkeit von Q in dem Punkt Q, oder die Geſchwindigkeit von M nach der mit CB parallelen Richtung größer als Rt; ſo ſeye ſie $= Rs > Rt$ aber $< Rm$. Man ziehe Ms; ſo wird dieſe, weil s zwiſchen t und m liegt, und Mt die krumme Linie in M berührt, dem Bogen Mm zwiſchen M und m in n begegnen. Man ziehe ln mit CB parallel, welche der MR in r begegne; ſo wird ſich verhalten $\left\{\begin{matrix} MR \\ Pp \end{matrix}\right\} : \left\{\begin{matrix} Mr \\ Pl \end{matrix}\right\} = Rs : rn$. Mithin müßte der Raum, welchen der Punkt M nach einer mit CB parallelen Richtung mit ſeiner Geſchwindigkeit in M, während der von P zur Beſchreibung des Raums Pl gebrauchten Zeit gleichförmig beſchrieben haben würde, eben ſo groß ſeyn, als der Raum rn welchen eben dieſer Punkt nach derſelben Richtung und während derſelben Zeit mit ſeiner beſchleunigten Bewegung wirklich zurücklegt, welches dem erſten Grundſatz §. 232. widerſpricht. Wäre aber jene Geſchwindigkeit kleiner als Rt oder $R't'$; ſo ſey ſie $= R's' > R'm'$. Da s' zwiſchen m' und t' liegt; ſo wird die gerade Linie Ms' dem Bogen Mm' in n' begegnen. Man ziehe durch n' die Parallele $r'n'l'$ mit CB; ſo wird ſich verhalten $\left\{\begin{matrix} MR' \\ Pp' \end{matrix}\right\} : \left\{\begin{matrix} Mr' \\ Pl' \end{matrix}\right\} = R's' : r'n'$, und es müßte der Raum, welcher von dem Punkt M nach der mit CB parallelen Richtung während der Zeit, in welcher der Punkt P den Raum $l'P$ beſchrieben hat, gleichförmig mit ſeiner Geſchwindigkeit in M beſchrieben haben würde dem Raum $r'n'$ gleich ſeyn, welchen er in derſelben Zeit wirklich beſchrieben hat, welches gegen den zweyten Grundſatz §. 232. iſt.

Unter derſelben Vorausſetzung wird die Bewegung von M in der krummen Linie $m'Mm$ eine ſtetig beſchleunigte

seyn. Denn verlängert man die $q'm'$, bis sie der Tangente Mt' in e begegnet; so ist, weil für jeden zwischen m' und M liegenden Punkt n' des Bogens $m'M$ die $l'n' > p'm'$ ist, der Bogen Mm' kleiner als $Me + em'$, und (I, 19.) um so mehr $< \left\{ \begin{matrix} Me + et' \\ Mt' \end{matrix} \right\}$ oder Mt, mithin um so mehr kleiner als die Chorde Mm (I, 19.). Folglich ist um so so viel mehr der Bogen Mm' kleiner als der Bogen Mm, und daher die Bewegung des Punkts M in der krummen Linie $m'Mm$ eine beschleunigte. Man ziehe die Chorde $M'm'$; so ist die Chorde $M'm' + t'm' > Mt'$, Chorde $M'm' > Mt' - t'm'$, und um so mehr der Bogen $Mm' > Mt' - t'm'$. Hingegen ist der Bogen Mm kleiner als $Mt + tm$. Folglich muß die Geschwindigkeit der Bewegung des Punkts M in der krummen Linie, wenn er sich in M befindet, kleiner als $Mt + tm$, aber größer als $Mt' - t'm'$ oder größer als $Mt - t'm'$ seyn (1. und 2. Grunds. §. 232.), wenn die Geschwindigkeit von P durch die Pp gemessen wird. In dem Punkt M wird also die Geschwindigkeit der krummlinigten Bewegung $= Mt$ seyn. Wäre sie nemlich größer als Mt; so sey sie $= Mt + ts$. Da diese Geschwindigkeit kleiner ist als $Mt + tm$; so muß $ts < tm$ seyn, und eine durch M und s gezogene gerade Linie Ms dem Bogen Mm zwischen M und m in n begegnen. Man ziehe durch n die Parallele nl mit CB, welche der Tangente Mt in h begegne; so verhält sich $Mt : st = Mh : hn$, $Mt + st : Mh + hn = Mt : Mh = MR : Mr = Pp : Pl$. Folglich müßte der mit der Geschwindigkeit $Mt + st$ der krummlinigten Bewegung in dem Punkt M gleichförmig beschriebene Raum $= Mh + hn$, und daher $>$ Bogen Mn, d. i. größer als der während derselben Zeit mit der beständig beschleunigten Bewegung beschriebene Raum seyn, welches gegen den ersten Grunds. §. 232. ist. Wäre aber die Geschwindigkeit der krummlinigten Bewegung kleiner als $\left\{ \begin{matrix} Mt \\ Mt' \end{matrix} \right\}$; so sey sie $= Mt - t's'$, wo s' zwischen m' und t' fallen muß, weil diese Geschwindigkeit, wie oben gezeigt wurde, größer als $Mt' - t'm'$ ist. Die gerade Linie Ms' wird also dem Bogen Mm' in n' zwischen M und m' begegnen. Man ziehe durch n' die $r'l'$ mit CB parallel, welche

der Tangente Mt' in h begegne; ſo wird ſich verhalten $Mt' : s't' = Mh' : h'n'$, $Mt' - s't' : Mh' - h'n' = Mt' : Mh = Pp' : Pi'$. Folglich müßte der mit der Geſchwindigkeit $Mt' - s't'$ der krummlinigten Bewegung in dem Punkt M gleichförmig beſchriebene Raum $= Mh' - h'n'$, und daher kleiner als der Bogen $n'M$, d. i. kleiner als der Raum ſeyn, welcher während derſelben Zeit mit einer beſchleunigten Bewegung wirklich beſchrieben wird, welches dem zweyten Grundſatz §. 232. widerſpricht. Daher verhält ſich die Geſchwindigkeit der krummlinigten Bewegung in dem Punkt M zu der Geſchwindigkeit von P wie $Mt : MR$.

Drittens ſey die Bewegung von P (Fig. 80.) gleichförmig, die Bewegung von Q aber verzögert; ſo wird unter der Vorausſetzung der vorigen Conſtruktion $q'o = oq$, $qQ > Qq$, und $\left\{\begin{matrix} CQ \\ PM \end{matrix}\right\} > \left\{\begin{matrix} Co \\ Pi \end{matrix}\right\}$, und daher die von dem Punkt M beſchriebene Linie eine gegen CA hole ſtetig krumme Linie ſeyn. Und wenn tt' die krumme Linie in M berührt, ſo wird ſich an dem Punkt M verhalten die Geſchwindigkeit von M nach der Richtung CA zur Geſchwindigkeit von M nach der Richtung CB wie $MR : Rt$. Denn der mit der letzteren Geſchwindigkeit in der Zeit, während welcher P den Raum Pp durchlauft, gleichförmig beſchriebene Raum muß größer als Rm, aber kleiner als $R'M'$ ſeyn (3. u. 4. Grundſ. §. 232), und daher müßte, wenn die Geſchwindigkeit von M nach der mit CB parallelen Richtung kleiner als Rt, z. B. $= Rs$ wäre, der Punkt s zwiſchen m und t fallen, und die gerade Linie Ms dem Bogen Mm in n zwiſchen M und m begegnen, und es würde ſich verhalten $\left\{\begin{matrix} MR \\ Pp \end{matrix}\right\} : \left\{\begin{matrix} Mr \\ Pi \end{matrix}\right\} = Rs : rn$. Demnach müßte der Raum, welchen der Punkt M nach der mit CB parallelen Richtung mit der Geſchwindigkeit, welche er in M hat, gleichförmig zurücklegen würde, eben ſo groß ſeyn, als der in derſelben Zeit mit der verzögerten Bewegung wirklich in derſelben Zeit beſchriebene Raum rn, welches gegen den dritten Grundſatz (§. 232.) iſt. Wäre aber die Geſchwindigkeit von M nach der mit CB parallelen Richtung größer als Rt oder $t'R'$, und z. B. $= R's'$; ſo müßte der Punkt s' zwiſchen t' und m' fallen, mithin die

gerade Linie Ms dem Bogen Mm' in n' zwischen M und m' begegnen. Alsdenn würde sich aber verhalten $\left\{\frac{MR'}{Pp'}\right\} : \left\{\frac{Mr'}{Pl'}\right\}$ $= R's' : r'n'$, und es müßte der Raum welchen der Punkt M nach der mit CB parallelen Richtung mit seiner Geschwindigkeit in M gleichförmig zurücklegen würde, eben so groß seyn als der Raum $n'r'$, welchen er in derselben Zeit mit seiner verzögerten Bewegung wirklich zurücklegt, welches gegen den vierten Grundsatz ist.

Ferner wird die krummlinigte Bewegung von M eine stetig verzögerte Bewegung seyn. Denn es ist der Bogen Mm kleiner als $Me + em$, und um so mehr kleiner als $Me + et$, d. i. $\lhd Mt$ oder Mt, und um so mehr kleiner als die Chorde Mm', also um noch viel mehr kleiner als der Bogen Mm'. Und weil $tm +$ Chorde $Mm \rhd Mt$; so ist die Chorde $Mm' \rhd Mt - tm$, und um so mehr der Bogen $Mm \rhd Mt - tm$, der Bogen Mm' hingegen $\lhd Mt' + t'm'$ oder $\lhd Mt + t'm'$. Daher muß die Geschwindigkeit der krummlinigten Bewegung in dem Punkt M größer als $M - tm$, und kleiner als $Mt' + t'm'$ oder als $Mt + t'm'$ seyn. Man beweißt nun wie in dem vorhergehenden Fall, mittelst des dritten und vierten Grundsatzes, daß diese Geschwindigkeit weder kleiner noch größer als Mt seyn könne. Mithin verhält sich die Geschwindigkeit der krummlinigten Bewegung in dem Punkt M zu der Geschwindigkeit des Punkt P wie $Mt : MR$.

Auf ähnliche Art kann gezeigt werden, daß, wenn die zwey Bewegungen nach den Richtungen CA und CB ungleichförmig sind, und die tt' die krumme Linie in M berührt, die Geschwindigkeiten von M nach der mit CB parallelen Richtung sich zu der Geschwindigkeit des Punkts P, wenn er in P ist, sich verhalte wie $Rt : MR$, und die Geschwindigkeit der krummlinigten Bewegung zu der Geschwindigkeit von P wie $Mt : MR$ *).

In dem besonderen Fall, wo die Geschwindigkeiten von P und Q zwar veränderlich sind, aber ein gegebenes Verhältniß zu einander haben, wird die Bewegung von M geradlinigt; wie in dem ersten Fall, aber wie die Bewe-

*) Maclaurin Treatise of fluxions, Book I. Prop. XIV.

gungen von P und Q ungleichförmig, ſo daß (Fig. 78.) $CM : CM' = CP : CP'$.

§. 241. Umgekehrt folgt aus den im vorhergehenden §. bewieſenen Eigenſchaften der krummlinigten Bewegung, daß, wenn ein Punkt M (Fig. 79. und 80.) eine krumme Linie beſchreibt, und man $MR : Rt$ in dem Verhältniß der Geſchwindigkeit von P zu der Geſchwindigkeit von Q nimmt, die gerade Linie Mt die krumme in dem Punkt M berührt. Wo nicht; ſo berühre ſie die Ms in dem Punkt M. Alsdenn müßte ſich nach dem vorhergehenden §. verhalten die Geſchwindigkeit von P zu der Geſchwindigkeit von Q wie $MR : Rs$. Mithin müßte $Rt = Rs$ ſey, welches unmöglich iſt.

Man vollende das Parallelogramm $MRtS$; ſo beſtimmt die Diagonale Mt die Richtung der krummlinigten Bewegung in dem Punkt M, und mißt zugleich die Geſchwindigkeit derſelben. Es verhalten ſich nemlich die Geſchwindigkeiten nach den Richtungen MS, MR und Mt, wie die Seiten MS und MR des Parallelogramms und ſeine Diagonale Mt.

Die krummlinigte Bewegung iſt gegeben, wenn man für jeden Abſchnitt CP der CA den dazu gehörigen Abſchnitt CQ der CB oder die PM beſtimmen kann, und umgekehrt, wenn die krumme Linie in Mm gegeben iſt, ſo ſind die den Abſciſſen CP, Cp, u. ſ. w zugehörige CQ, Cq, u. ſ. w. gegeben. Läßt man die CP immer um gleich große Stücke wachſen, oder den Punkt P ſich mit einer gleichförmigen Geſchwindigkeit fortbewegen; ſo kann man die den Veränderungen von CP entſprechende Veränderungen von CQ, und die Geſchwindigkeit beſtimmen, welche der Punkt Q in einem gegebenen Punkt der CB hat. Dadurch wird das Verhältniß von $MR : Rt$ gefunden, und die Lage der geraden Linie beſtimmt, welche die krumme in einem gegebenen Punkt berührt. Sey z. B. die krumme Linie AMm (Fig. 81.) ſo beſchaffen, daß, wenn a eine gegebene Größe bezeichnet, beſtändig $a.\ CQ =$ dem Quadrat von CP ſey; ſo wird, wenn man CP gleichförmig wachſen läßt, und die Geſchwindigkeit,

mit welcher der Punkt P nach der Richtung CA fortrückt, $= c$ seßt, ferner die Zeit t der Bewegung von dem Augenblick an rechnet, da der Punkt P in C war, der in der Zeit t beschriebene Raum $CP = ct$ seyn. Man wird also haben $a.CQ = c^2t^2$, und $CQ = \frac{c^2}{a}t^2$. Die Bewegung von Q ist also eine gleichförmig beschleunigte (§. 233.), und nach eben diesem §. die Geschwindigkeit von $Q = \frac{2c^2}{a}t$. Daher verhält sich die Geschwindigkeit von Q zu der Geschwindigkeit von $P = \frac{2c^2}{a}t : c = \frac{2c^2t^2}{a} : ct = 2CQ : CP$ oder, wenn man $CT = CQ$ nimmt, die Geschwindigkeit von Q zu der Geschwindigkeit von $P = TQ : \left\{\begin{matrix} CP \\ QM \end{matrix}\right\}$. Aber, wenn die Mt die krumme Linie in M berührt, und durch einen beliebigen von dem Berührungspunkt M verschiedenen Punkt t der Tangente eine Parallele tR mit CB gezogen wird, welche der QM oder ihrer Verlängerung in R begegnet, so verhält sich $Rt : MR$ wie die Geschwindigkeit von Q zu der Geschwindigkeit von P (§. 240.) Folglich verhält sich $Rt : MR = TQ : QM$, und die Punkte T, M, t liegen in einer geraden Linie. Nimmt man also $CT = CQ$, und zieht die TM; so berührt diese die krumme Linie in M. Die hier betrachtete krumme Linie ist eine Parabel (Kegelschn. I, 19. Zus. 1.), deren Durchmesser CB ist, und die gefundene Eigenschaft der Tangente stimmt mit Kegelschn. I, 7. Zus. 8. überein.

Um an eine gegebene krumme Linie eine Tangente zu ziehen, welche mit einer in ihrer Ebene liegenden der Lage nach gegebenen geraden Linie GH parallel sey, ziehe man durch einen beliebigen Punkt K der GH die gerade Linie KJ mit CB parallel. Da die Winkel AGH, und $AJK = ACB$ gegeben sind; so ist das Verhältniß von $KJ : GJ$ gegeben. Es sey dem Verhältniß von $m : n$ gleich, und Mt sey die gesuchte Tangente; so wird sich verhalten müßen $Rt : MR = KJ : JG = m : n$. Man suche also aus den Eigenschaften der vorgegebenen krummen Linie das Gesetz, nach welchem das Verhältniß der Geschwindigkeiten von Q und P, d. i. das Verhältniß von $Rt : MR$ sich mit den Ausschnitten CP

der CA oder der zu ihrer Beschreibung gebrauchten Zeit verändert, und bestimme CP oder die Zeit so, daß das Verhältniß von $Rt : MR$ dem gegebenen Verhältniß von $m : n$ gleich werde; so wird man CP, und dadurch den gesuchten Berührungspunkt M haben. In dem vorhin gewählten Beyspiel hatte man gefunden $Rt : MR = \frac{2c^2t}{a} : c = 2ct : a = 2CP : a$, weil $ct = CP$. Folglich wird sich verhalten müssen $2CP : a = m : n$, wodurch, weil a, m und n gegeben sind, die CP, mithin auch der Berührungspunkt M gegeben ist. Algebraisch betrachtet wird $\frac{Rt}{MR}$ ein Ausdruck seyn, welcher die unbekannte Größe t, oder die ihr proportionale CP und gegebene von der krummen Linie abhängende Größen enthalten wird. Dieser Ausdruck $= \frac{m}{n}$ gesetzt giebt eine Gleichung, aus deren Auflösung man die unbekannte Größe t oder CP erhält, und man wird eine, oder mehrere, oder gar keine Tangente ziehen können, welche mit der GH parallel ist, je nachdem die Gleichung eine, oder mehrere, oder gar keine mögliche Wurzel hat.

§. 242. Ein ruhender Körper kann sich nicht von selbst in Bewegung setzen, und ein sich bewegender Körper kann weder die Geschwindigkeit, noch die Richtung seiner Bewegung von selbst verändern. Wenn also ein ruhender Körper sich zu bewegen strebt, oder ein in Bewegung gesetzter Körper die Geschwindigkeit oder die Richtung seiner Bewegung oder beyde zugleich ändert; so schreibt man dieses dem Einfluß einer Kraft zu, welche die Veränderungen in dem Zustand der Ruhe oder der Bewegung des Körpers hervorzubringen strebt oder wirklich hervorbringt. So ruht z. B. ein Körper, welcher durch eine horizontale Ebene unterstützt ist, und wir fühlen, daß eine gewiße Kraft angewendet werden muß, um ihn auf dieser Ebene fortzubewegen. Ist aber der Körper einmal in Bewegung gesetzt, so behält er die ihm mitgetheilte Geschwindigkeit und Richtung seiner Bewegung eine desto längere Zeit hindurch unverändert bey, je mehr man alle Ursachen der Veränderungen

seiner Bewegung hinwegzuräumen sucht. Man findet, daß eine Kraft angewendet werden muß, um den in Bewegung gesetzten Körper in Ruhe zu bringen, oder die Geschwindigkeit und Richtung seiner Bewegung zu verändern. Dieses allgemeine Phänomen der Körper, nach welchem sie in dem Zustand ihrer Ruhe oder Bewegung zu beharren streben, nennt man ihre Trägheit (inertiam oder vim inertiæ *).

§. 243. Die Kräfte, welche die Bewegungen der Körper verändern, bringen in gleichen Zeiten entweder gleiche, oder ungleiche Veränderungen der Geschwindigkeiten hervor. Jene heißen unveränderliche, diese veränderliche Kräfte. Man mißt sie durch die Geschwindigkeiten, welche sie in einer gegebenen Zeit, im Fall sie unveränderlich sind, wirklich erzeugen, oder, im Fall sie veränderlich sind, erzeugt haben würden, wenn sie von dem Augenblick an, für welchen man ihre Größe bestimmt, mit gleicher Stärke auf den Körper fortgewirkt hätten. Wenn z. B. die beschriebenen Räume den Quadraten der vom Anfang der Bewegung an verflossenen Zeiten proportional sind; so wächst die Geschwindigkeit der Zeit proportional (§. 233.) und erhält also in gleichen Zeiten gleichen Zuwachs. Die Kraft, welche diese Bewegung beschleunigt, ist daher eine unveränderliche Kraft. Wenn aber die Geschwindigkeit nicht der Zeit proportional wächst; so wird man die Kraft eben so wenig durch die in einer gegebenen Zeit wirklich erzeugte Geschwindigkeit messen können, als man die Geschwindigkeit einer ungleichförmigen Bewegung durch den in einer gegebenen Zeit wirklich beschriebenen Raum messen kann (§. 232.). In diesem Fall mißt man daher die Kraft nicht durch die in in einer gegebenen Zeit wirklich erzeugte Geschwindigkeit, sondern durch die Geschwindigkeit, welche sie in einer gegebenen Zeit erzeugt haben würde, wenn sie von dem Augenblick an, für welchen man ihre Größe angiebt, gleichförmig fortgewirkt hätte, oder auch durch den Zuwachs an Geschwindigkeit

*) *Newtoni* princ. L. I. Lex I. Corpus omne perseverare in statu suo quiescendi vel movendi uniformiter in directum, nisi quatenus a viribus impressis cogitur illum statum mutare.

digkeit, welchen die Bewegung während einer gegebenen Zeit erhalten haben würde, wenn sie von jenem Augenblick an in eine gleichförmig beschleunigte Bewegung übergegangen wäre. Unter der Richtung der Kraft versteht man die Richtung der geraden Linie, nach welcher sie einen Körper bewegt, oder zu bewegen strebt. Wenn eine Kraft die Bewegung eines Körpers vermindert; so heißt sie eine verzögernde Kraft.

Wenn das Gesetz gegeben ist, nach welchem die Räume von den zu ihrer Beschreibung erforderlichen Zeiten abhängen; so können die Kräfte, welche die Bewegungen stetig verändern, auf ähnliche Art wie die Geschwindigkeit mittelst folgender Grundsätze gefunden werden:

1. und 2. Die Geschwindigkeit, welche eine stetig zunehmende Kraft während einer gegebenen Zeit wirklich erzeugt, ist $\left\{\begin{matrix}\text{größer}\\\text{kleiner}\end{matrix}\right\}$ als die Geschwindigkeit, welche während derselben Zeit würde erzeugt worden seyn, wenn die Kraft beständig mit derjenigen Stärke gewirkt hätte, welche sie am $\left\{\begin{matrix}\text{Anfang}\\\text{Ende}\end{matrix}\right\}$ jenes Zeitraums hatte.

3. und 4. Die Geschwindigkeit, welche eine stetig abnehmende Kraft während einer gegebenen Zeit wirklich erzeugt, ist $\left\{\begin{matrix}\text{kleiner}\\\text{größer}\end{matrix}\right\}$ als die Geschwindigkeit, welche während derselben Zeit würde erzeugt worden seyn, wenn die Kraft beständig mit derjenigen Stärke gewirkt hätte, welche sie am $\left\{\begin{matrix}\text{Anfang}\\\text{Ende}\end{matrix}\right\}$ jenes Zeitraums hatte.

§. 244. Es sey nun das Gesetz gegeben, nach welchem die Kraft mit dem beschriebenen Raum sich verändert, und man soll das Gesetz finden, nach welchem die Geschwindigkeit der Bewegung von dem beschriebenen Raum abhängt.

Wäre die Kraft constant, oder die Bewegung gleichförmig beschleunigt; so würde, wenn der von der Ruhe an durchlaufene Raum $= s$, die Kraft $= 2g$, und die erhaltene Geschwindigkeit $= v$ gesetzt wird, $v^2 = 4gs$ seyn (§. 234. n. 3.). Die dem Raum $s + y$ entsprechende Geschwindigkeit heiße v'; so wird man haben $v'^2 = 4g(s+y)$, und daher

$v'^2 - v^2 = 4gy$. Wenn aber die Kraft, während der Raum y beſchrieben wird, ſtetig wächst, und am Ende deſſelben $= 2g'$ wird; ſo wird die in der zur Beſchreibung des Raums y gebrauchten Zeit erzeugte Geſchwindigkeit größer ſeyn als diejenige, welche die Kraft $2g$ als conſtant betrachtet in derſelben Zeit erzeugt haben würde, aber kleiner als die durch die Kraft $2g'$ in eben dieſer Zeit erzeugte Geſchwindigkeit (1. und 2. Grundſ. §. 243.). Demnach wird ſeyn

1.) $v'^2 - v^2 > 4gy$
2.) $< 4g'y$ } wenn die Kraft wächst.

Eben ſo findet ſich mittelſt des dritten und vierten Grundſatzes des vorhergehenden §.

3.) $v'^2 - v^2 < 4gy$
4.) $> 4g'y$ } wenn die Kraft abnimmt.

Man theile den Raum s in n gleiche Theile, deren jeder $= y$ ſey, und es ſeyen die am Ende der Räume

$y, 2y, 3y \cdots (n-1)y, \left\{\frac{ny}{s}\right\}$ wirklich

erreichte Geſchwindigkeiten beziehungsweiſe

$v', v'', v''' \cdots V', V$, und die

eben dieſen Punkten entſprechende Kräfte

$2g', 2g'', 2g''', \cdots 2G', 2G$; ſo wird man, wenn am Anfang des Raums s die Kraft $= 2g$, die Geſchwindigkeit $= c$, und die Kraft eine ſtetig wachſende iſt, nach n. 1. und 2. haben

$v'^2 - c^2 > 4gy < 4g'y$
$v''^2 - v'^2 > 4g'y < 4g''y$
$v'''^2 - v''^2 > 4g''y < 4g'''y$
$\cdots$
$V^2 - V'^2 > 4G'y < 4Gy$

und daher 5.) $V^2 - c^2 > 4y(g + g' + g'' \cdots + G')$
6.) $< 4y(g' + g'' + g''' \cdots + G)$.

Eben ſo findet ſich, wenn die Kraft ſtetig abnimmt, nach n. 3. und 4.

7.) $V^2 - c^2 < 4y(g + g' + g'' + \cdots + G')$
8.) $> 4y(g' + g'' + g''' + \cdots + G)$

Mithin iſt die Auflöſung dieſer Aufgabe wie die des 234ſten §. auf die Summation der Reihen zurückgeführt.

§. 245. Eine veränderliche Kraft wirke z. B. auf einen Körper P (Fig. 82.) beſtändig nach der Richtung der

geraden Linie AC, welche direkt der Entfernung CP des Körpers von dem gegebenen Punkt C proportional, und in der gegebenen Distanz $CA = 2f$ sey. Der Körper ruhe anfangs in B in der gegebenen Distanz $CB = b$. Man sucht seine Geschwindigkeit in dem Augenblick, da er in P ankommt, und von der Ruhe an den Weg $BP = s$ beschrieben hat.

Da die Kraft in A oder $2f$: Kraft in $P = CA : CP = a : b - s$; so ist in dem Punkt P die Kraft $= \frac{2f}{a}(b-s)$, und in dem Punkt $B = \frac{2fb}{a}$. Man theile s in n gleiche Theile, deren jeder $= y$ sey; so ist die Kraft an dem Endpunkt des ersten Theilchens $= \frac{2f}{a}(b-y)$, am Ende des zweytens $= \frac{2f}{a}(b-2y)$, u. s. w. Weil nun die Kraft abnimmt, indem s wächst, und $c = 0$ ist; so ist nach n. 7. des vorhergehenden §.

$$V^2 < \frac{4fy}{a}(nb-(1+2+3+\cdots+(n-1)y)$$
$$< \frac{4fy}{a}\left(nb-\frac{n(n-1)}{2}y\right)$$
$$< \frac{2fs^1}{a}\left(2b-\left(1-\frac{1}{n}\right)s\right), \text{ weil } ny = s.$$
$$< \frac{2f}{a}(2b-s)s + \frac{2fs^2}{na}$$

und nach n. 8.

$$V^2 > \frac{4fy}{a}(nb-(1+2+\cdots+ny))$$
$$> \frac{2f}{a}(2b-s)s - \frac{2fs^2}{na}.$$

Nun kann durch die Vergrößerung von n die Größe $\frac{2fs^2}{na}$ kleiner als jede gegebene Größe gemacht werden; folglich kann wie in §. 233. u. f. gezeigt werden, daß V^2 weder größer noch kleiner seyn könne, als $\frac{2f}{a}(2b-s)s$, und daher ist $V^2 = \frac{2f}{a}(2b-s)s$.

Man beschreibe aus C als Mittelpunkt mit einem Halbmesser $= CB$ einen Kreis, welcher der über C hinaus verlängerten BC in E begegne, und errichte auf seinem Durch-

messer [illegible] in dem Punkt P ein Perpendickel PM, welches dem [illegible] M begegne; so ist das Quadrat von $PM =$ $EP \times$ [illegible] $= (2b - s)\,s$, und daher die Geschwindigkeit V der Ordinat[illegible] proportional. Der Körper erhält also in dem Punkt [illegible] $s = b$ wird, seine gröste Geschwindigkeit $= b\sqrt{\frac{2f}{a}}$. [illegible] dieser Geschwindigkeit würde er vermöge des Gesetzes der Trägheit (§. 242.) nach der Richtung CE fortgehen, wenn [illegible] ihn wirkte. Da diese beständig gegen [illegible] wirkt; so verzögert sie seine Bewegung von [illegible] e Geschwindigkeit mit der Ordinate des K[illegible] proportional ist, zugleich verschwindet. [illegible] sich der Körper wiederum gegen B hin, wi[illegible] B nach E bewegte, und geht also zwische[illegible] und E hin und her.

Indem der [illegible] die gerade Linie BE beschreibt, beschreibt der Punkt M den Halbzirkel BDE, und wenn der Punkt M in den anderen Halbzirkel EFB übergeht; so bewegt sich der Punkt P wiederum gegen B hin. Es sey die Geschwindigkeit von P in dem Punkt $P = Pp$, in dem Punkt C aber $= Cc$. Man ziehe durch p eine Parallele pt mit PM, welche der an den Punkt M des Kreises gezogenen Tangente TMt in t begegne; so verhält sich an den Punkten P und M die Geschwindigkeit von P zu der Geschwindigkeit der kreisförmigen Bewegung von $M = Pp : Mt$ (240.).

$$= PT : TM = PM : \begin{cases} CM \\ CD \end{cases}$$

$$= \text{Geschw. von } P \text{ in } M : \begin{cases} \text{Geschw. von } P \text{ in } C \\ \text{oder } Cc \end{cases}$$

folglich ist die Geschwindigkeit, mit welcher der Punkt M in dem Kreis fortrückt, der gegebenen Geschwindigkeit Cc oder $b\sqrt{\frac{2f}{a}}$ gleich, welche der Punkt P hat, wenn er in C ankommt, und daher die Bewegung von M gleichförmig.

Es verhalte sich die Umlaufszeit von M zu der Zeit, in welcher der Raum Cc oder $b\sqrt{\frac{2f}{a}}$ beschrieben wird $= T : 1$, d. i. die Zeit T sey in Sekunden oder Minuten u. s. w. ausgedrückt, wenn die Geschwindigkeit durch den in einer Sekunde, oder Minute u. s. w. beschriebenen Raum gemessen

wird; ſo wird ſich verhalten $b\sqrt{\frac{2f}{a}} : 2b\pi = 1 : T$, und die Umlaufszeit T wird $= 2\pi\sqrt{\frac{a}{2f}}$ ſeyn. Mithin iſt die Zeit, in welcher der Punkt P den Weg BC beſchreibt $= \frac{1}{2}\pi\sqrt{\frac{a}{2f}}$, und die Zeit durch $BE = \pi\sqrt{\frac{a}{2f}}$.

Die Zeiten durch BC und BE hängen alſo allein von a und f ab, und bleiben daher unverändert, die anfängliche Entfernung b des Körpers von dem Punkt C mag groß oder klein ſeyn, welches daher rührt, daß die Geſchwindigkeit von M ſowohl als der Raum welchen der Punkt M zu beſchreiben hat, d. i. der vierte Theil oder die Hälfte des Umfangs des Kreiſes $BDEF$ dem Halbmeſſer CB oder b proportional ſind.

§. 246. Zur ferneren Erläuterung der bisherigen Sätze dienen folgende geometriſche Darſtellungen derſelben. Es ſey $BACB$ (Fig. 83.) eine durch die krumme Linie AB und durch die geraden auf einander ſenkrechten Linien AC, CB begränzte Fläche. Man theile AC in eine beliebige Anzahl gleicher Theile, ziehe durch die Theilungspunkte a, c, P u. ſ. w. die Parallelen ab, cd, PM u. ſ. w. mit CB und vollende die Rechtecke Ab, cb, ad, Pd, cM u. ſ. w.; ſo iſt die Summe der in die Figur beſchriebenen Rechtecke cb, Pd--- Cf kleiner als der Flächeninhalt der Figur, die Summe der um dieſelbige beſchriebenen Rechtecke Ab, ad,--- eB größer als ihr Flächeninhalt. Verlängert man die mit AC parallelen Seiten der Rechtecke bis an die CB; ſo ſind die Rechtecke Ab, bd, dM --- mf den Rechtecken eb', $b'd'$, $d'M'$ --- $m'f'$ gleich, und daher iſt der Ueberſchuß der Summe der um die Figur beſchriebenen Rechtecke über die Summe der in die Figur beſchriebenen Rechtecke der Summe der Rechtecke eb', $b'd'$, ---$f\varphi$, d. i. (II, 1.) dem letzten um die Figur beſchriebenen Rechteck $C\varphi$ gleich. Dieſer Ueberſchuß kann durch die Vergrößerung der Anzahl der gleichen Theile der CA kleiner als jeder gegebene Raum B gemacht werden. Man ſuche nemlich zu CB und der Seite Q des Quadrats,

deſſen Inhalt dem gegebenen Raum *B* gleich iſt, die dritte geometriſche Proportionallinie *q*, theile die *AC* durch ſolche geſetzte Halbirungen in ſo viele gleiche Theile, bis jeder derſelben, wie *CC'* kleiner als *c* ſey, und beſchreibe wie vorhin die Rechtecke in und um die Figur; ſo wird der Ueberſchuß der letzteren über die erſteren dem Rechteck aus *BC* und *CC'* gleich, und, weil $CC' < q$ iſt, kleiner als das Rechteck aus *BC* und *q*, d. i. kleiner als das Quadrat von *Q*, oder kleiner als der Raum *B* ſeyn. Folglich kann um ſo mehr der Ueberſchuß der um die Figur beſchriebenen Rechtecke über den vermiſchtlinigten Raum *ABCA*, oder der Ueberſchuß des letztern über die Summe der in die Figur beſchriebenen Rechtecke kleiner gemacht werden, als jeder gegebene Raum.

§. 247. Es ſey die Linie *AMB* (Fig. 83.) ſo beſchrieben, daß die Abſciſſen *AP*, *Ap*, *AC* den vom Anfang einer Bewegung in *A* verfloſſenen Zeiten, und die Ordinaten *PM*, *pm*, *CB* den am Ende der Zeiten *Ap*, *Ap*, *AC* erlangten Geſchwindigkeiten proportional ſeyen. Man nehme die gerade Linie *CF* der Geſchwindigkeit *c* einer gegebenen gleichförmigen Bewegung proportional, vollende das Rechteck *CG*, theile die *AC* in eine beliebige Anzahl gleicher Theile, und beſchreibe wie vorhin die Rechtecke *cb*, *Pd*, --- *Cf* in, und die Rechtecke *Ab*, *ad*, *eB* um die Figur.

Die Bewegung ſey erſtlich eine ſtetig beſchleunigte; alſo $cd > ab$, $PM\,cd > cd$ u. ſ. w. Da die mit gleichförmigen Bewegungen beſchriebenen Räume im zuſammengeſetzten Verhältniß aus den Zeiten und den Geſchwindigkeiten ſind (§. 231. n. 4.); ſo wird ſich der während der Zeit *Aa* mit der am Ende derſelben erlangten Geſchwindigkeit *ab* gleichförmig beſchriebene Raum zu dem in derſelben Zeit mit der gegebenen Geſchwindigkeit *CF* oder *c* beſchriebenen Raum verhalten, wie das erſte um die Figur beſchriebene Rechteck *Ab* zu dem Rechteck aus *Aa* und *CF* (VI, 23.), und eben
der mit der Geſchwindigkeit *cd* in der Zeit $ae = Aa$ gleichförmig beſchriebene Raum zu dem in derſelben Zeit mit der
Geſchwindigkeit *CF* beſchriebenen, wie das zweyte

um die Figur beschriebene Rechteck *ad* zu dem Rechteck aus *ac* und *CF*, u. s. w. Folglich wird sich (V, 24. Coroll.) die Summe der ersteren Räume zu der Summe der letzteren, d. i. zu dem mit der Geschwindigkeit *CF* in der Zeit *AC* beschriebenen Raum verhalten, wie die Summe der um die Figur beschriebenen Rechtecke zu der Summe der Rechtecke aus *Aa* und *CF*, *ac* und *CF* --- *eC* und *CF*, d. i. (II, 1.) zu dem Rechteck *CG*. Aber die mit der stetig beschleunigten Bewegung in den Zeittheilchen *Aa*, *ac* u. s. w. wirklich beschriebenen Räume sind kleiner als die mit den am Ende eines jeden derselben erlangten Geschwindigkeiten *ab*, *cd* u. s. w. gleichförmig beschriebenen Räume (2. Grundsl. §. 232.); folglich ist, wenn der ganze in der Zeit *AC* mit der beschleunigten Bewegung wirklich beschriebene Raum = *S*, der mit der Geschwindigkeit *CF* in derselben Zeit gleichförmig beschriebene Raum = S, die Summe der in die Figur beschriebenen Rechtecke = *R*, das letzte um die Figur beschriebene Rechteck *eB* = *r*, mithin die Summe der um die Figur beschriebenen = *R* + *r* gesetzt wird (§. 246.),

1.) $S : \mathfrak{S} < R + r : CG$.

Ferner verhalten sich die in den Zeittheilchen *ac*, *cP*, --- *eC* mit den am Anfang eines jeden derselben erhaltenen Geschwindigkeiten *ab*, *cd*, --- *ef*, gleichförmig beschriebenen Räume zu den in denselben Zeittheilchen mit der Geschwindigkeit *CF* beschriebenen, wie die Rechtecke *cb*, *Pd*, *PM* --- *Cf* in der Figur zu den Rechtecken aus *ac* und *CF*, *cP* und *CF*, --- *eC* und *CF*; also wiederum (V, 24. Coroll.) die Summe der ersteren, oder, weil unter dieser Voraussetzung der während des ersten Zeittheilchen *Aa* beschriebene Raum = o ist, der in der Zeit *AC* mit der stoßweise wachsenden Geschwindigkeit beschriebene Raum zu der Summe der letzteren, d. i. zu dem in der Zeit *ac* mit der Geschwindigkeit *CF* beschriebenen, wie *R* zu dem Rechteck aus *Ca* und *CF*. Und weil die mit einerley Geschwindigkeit *CF* in den Zeiten *Ca* und *CA* beschriebenen Räume sich verhalten wie *Ca* : *CA* = Rechteck aus *Ca* und *CF* : Rechteck aus *CA* und *CF* oder zu *CG*; so verhält sich die Summe der in den Zeiten *Aa*, *ac*, --- *eC* mit den Geschwindigkeiten o, *ab*, --- *ef* gleich-

ſtetig beſchriebenen Raume zu dem mit der Geſchwindigkeit CF in derſelben Zeit AC beſchriebenen Raum $\mathfrak{S}$, wie R: CG. Aber die mit der ſtetig beſchleunigten Bewegung in den Zeiten At, $2t$ u. ſ. w. wirklich beſchriebenen Räume ſind größer als die Räume, welche während derſelben Zeitſtellen mit den am Anfang derſelben erhaltenen Geſchwindigkeiten gleichförmig würden beſchrieben worden ſeyn (1. Grundſ. §. 232.); folglich iſt

2.) $S : \mathfrak{S} > R : CG$.

Das Verhältniß von $S : \mathfrak{S}$ fällt alſo, wie das Verhältniß der Fläche $AMBC$ zu dem Rechteck CG (§. 246.), beſtändig zwiſchen die zwey Verhältniſſe $R+r : CG$ und $R : CG$, und, da durch die Vergrößerung der Anzahl der gleichen Theile von AC das Rechteck r oder Cc kleiner gemacht werden kann, als jeder gegebene Raum; ſo wird ſich verhalten $S : \mathfrak{S} = \left\{ \begin{matrix} AMBC \\ A \end{matrix} \right\} : CG$. Denn wäre 1.) $S : \mathfrak{S} > A : CG$; ſo ſey $S : \mathfrak{S} = A+q : CG$. Man theile AC in ſo viele gleiche Theile, daß das letzte um die Figur beſchriebene Rechteck CB' oder r kleiner als q werde (§. 246.); ſo wird $R+r < R+q$, und um ſo mehr $< A+q$, mithin $A+q : CG > R+r : CG$ ſeyn. Folglich müßte, weil $S : \mathfrak{S} = A+q : CG$ (Vorausſ.), $S : \mathfrak{S} > R+r : CG$ ſeyn, gegen die Proportion n. 1. Wäre 2.) $S : \mathfrak{S} < A : CG$; ſo ſey $S : \mathfrak{S} = A-q : CG$. Man mache wiederum $r < q$; ſo wird $R+r < R+q$, und um ſo mehr $A < R+q$, $A-q < R$, mithin $A-q : CG < R : CG$. Folglich müßte $S : \mathfrak{S} < R : CG$ ſeyn, welches der Proportion n. 2. widerſpricht. Daher iſt $S : \mathfrak{S} = \left\{ \begin{matrix} A \\ AMBC \end{matrix} \right\} : CG$. Man ſetze den mit der ſtetig beſchleunigten Bewegung in der Zeit AP beſchriebenen Raum $= S'$, und den in derſelben Zeit mit der Geſchwindigkeit CF beſchriebenen $= \mathfrak{S}'$; ſo verhält ſich ebenfalls

$$\begin{array}{rl} & S' : \mathfrak{S}' = AMP : PG \\ \text{aber } & \mathfrak{S}' : \mathfrak{S} = PG : CG \\ \hline \text{folglich } & S' : \mathfrak{S} = AMP : CG \\ \text{da nun } & \mathfrak{S} : S = CG : AMBC \\ \hline \text{ſo verhält ſich } & S' : S = AMP : AMBC. \end{array}$$

Ebenſo wird zweytens für eine ſtetig verzögerte Bewegung der Beweiß mittelſt des dritten und vierten Grund-

ſatzes des 232ſten §. geführt, indem man die Bewegung in dem Punkt C anfangen läßt.

Wenn z. B. die Geſchwindigkeiten den Zeiten proportional wachſen; ſo wird AMB eine gerade Linie (Fig. 84.), und es verhält ſich die Fläche AMP zu der Fläche ABC wie das Quadrat von AP zu dem Quadrat von AC (VI, 19.). Folglich ſind die beſchriebenen Räume den Quadraten der vom Anfang der Bewegung verfloßenen Zeiten proportional, wie man §. 234. gefunden hat. Ferner verhält ſich der mit der gleichförmig beſchleunigten Bewegung in der Zeit AP beſchriebene Raum zu dem in derſelben Zeit mit der Geſchwindigkeit PM gleichförmig beſchriebenen Raum, wie das Dreyeck APM zu dem Rechteck $PN = 1 : 2$; folglich iſt, wenn der in der erſten Sekunde mit der gleichförmig beſchleunigten Bewegung beſchriebene Raum $= g$ iſt, die am Ende der erſten Sekunde erlangte Geſchwindigkeit $= 2g$. Und weil das Quadrat von PM zu dem Quadrat von BC ſich verhält wie das Dreyeck APM zu dem Dreyeck ABC; ſo verhalten ſich die Quadrate der erlangten Geſchwindigkeiten wie die vom Anfang der Bewegung an beſchriebenen Räume. Alſo iſt, wenn die am Ende des beſchriebenen Raums s erlangte Geſchwindigkeit $= v$ geſetzt wird, $v^2 : 4g^2 = s : g = 4gs : 4g^2$, mithin $v^2 = 4gs$, übereinſtimmend mit §. 234. n. 3.

§. 248. Wenn die Abſciſſen AP, Ap (Fig. 83.) den Zeiten, und die Ordinaten AD, PQ, pq der Linie DNE den beſchleunigenden Kräften proportional ſind; ſo wird ſich unter der Vorausſetzung der im vorhergehenden §. gemachten Conſtruktion, wenn die Kraft ſtetig wächst, die in der Zeit Aa durch die Kraft ah gleichförmig erzeugte Geſchwindigkeit zu der in derſelben Zeit durch eine gegebene Kraft CF erzeugten ſich verhalten wie $ah : CF =$ das erſte um die Figur $ADEC$ beſchriebene Rechteck hA zu dem Rechteck aus Aa und CF, und eben ſo wird es ſich verhalten, wenn man während eines jeden der folgenden Zeittheilchen die Kraft beſtändig mit derjenigen Stärke wirken läßt, welche ſie am Ende derſelben hatte. Folglich wird ſich die Summe aller auf

diese Art erzeugten Geschwindigkeiten zu der Summe aller durch die Kraft CF erzeugten, d. i. zu der durch die letztere in der Zeit AC erzeugten Geschwindigkeit verhalten, wie die Summe aller um die Figur beschriebenen Rechtecke zu der Summe der Rechtecke aus Aa und CF, ac und CF---eC und CF, d. i. zu dem Rechteck CC (V, 24. Coroll.). Läßt man aber die Kraft während eines jeden der Zeittheilchen mit derjenigen Stärke wirken, welche sie am Anfang derselben hatte; so wird sich die Summe aller so erzeugten Geschwindigkeiten zu der durch die Kraft CF in der Zeit AC erzeugten verhalten, wie die Summe der in die Figur beschriebenen Rechtecke zu dem Rechteck CG. Heißt nun die in der Zeit AC durch die stetig wachsende Kraft wirklich erzeugte Geschwindigkeit V, und die in derselben Zeit durch die Kraft CF erzeugte $\mathfrak{V}$; so wird (1. u. 2. Grundſ. §. 245.)

1.) $V : \mathfrak{V} > R : CG$

2.) $V : \mathfrak{V} < R+r : CG$ seyn, wenn man die Summe der in die Figur beschriebenen Rechtecke $= R+r$, mithin r dem Ueberschuß des letzten um die Figur beschrieben Ee über das erste in dieselbe beschriebene Da oder dem Rechteck aus Ce und der gegebenen ED' gleich setzt. Da nun r durch die Vermehrung der Anzahl der gleichen Theile von CA kleiner als jeder gegebene Raum gemacht werden kann; so kann, wie in dem vorhergehenden §. gezeigt werden, daß $V : \mathfrak{V}$ = die Fläche $ADEC$: Rechteck CG, woraus ferner folgt, daß die Geschw. V : Geschw. V' in P $\left.\begin{matrix} \\ CB: \end{matrix}\right.$ $\left.\begin{matrix} \\ PM \end{matrix}\right\} = ADEC : ADQP.$

Eben so wird der Satz mittelst des dritten und vierten Grundsatzes des 245sten §. bewiesen, wenn die Kraft stetig abnimmt.

§. 249. Es seyen die Abscissen AP, Ap den beschriebenen Räumen, die Ordinaten PM, pm den in P, p erlangten Geschwindigkeiten, und die Ordinaten AD, PQ, pq den Geschwindigkeiten gleich, welche die Kraft in einer gegebenen Zeit erzeugen würde, wenn sie während derselben beständig mit derjenigen Stärke wirkte, welche sie in A, P, p hat, so daß also diese Ordinaten den beschleunigenden Kräften in

A, P, p proportional ſeyen. Wäre nun die Bewegung durch A eine gleichförmig beſchleunigte; ſo würde (§. 247. Beyſp.) das Quadrat der Geſchwindigkeit, welche die Kraft AD in der zur Beſchreibung von Aa gebrauchten Zeit erzeugt haben würde, $= 2AD \times Aa = 2$ Rechteck Da ſeyn. Eben ſo würde, wenn die Bewegung von A bis c durch die Kraft ha gleichförmig beſchleunigt würde, das Quadrat der in a erlangten Geſchwindigkeit $= 2ha \times Aa$, das Quadrat der in c erlangten $= 2ha \times Ac$, und der Unterſchied dieſer Quadrate $= 2ha \times ac = 2$ Rechteck hc ſeyn, u. ſ. w. Wenn aber die Kraft ſtetig zunimmt; ſo werden vermöge des erſten und zweyten Grundſatzes §. 245.

$$\overline{ab}^2 > 2 \text{ Rk. } Da < 2 \text{ Rk. } hA$$
$$\overline{ed}^2 - \overline{ab}^2 > 2 \text{ Rk. } ch < 2 \text{ Rk. } ai$$
$$\vdots \quad \vdots \quad \vdots$$
$$\overline{fe}^2 - \overline{gm}^2 > 2 \text{ Rk. } eq < 2 \text{ Rk. } ph$$
$$\overline{BC}^2 - \overline{fe}^2 > 2 \text{ Rk. } Ck < 2 \text{ Rk. } Ee \text{ ſeyn.}$$

folglich iſt $\overline{BC}^2 > 2(Da + ch + \cdots + eq + Ck)$
$< 2(hA + ai + \cdots + ph + Ee)$,

das iſt, $\overline{BC}^2 > 2R$
$< 2(R+r)$. Da nun das Quadrat der in C erlangten Geſchwindigkeit, ſo wie $2ADEC$, beſtändig zwiſchen die zwey Flächenräume $2R$ und $2(R+r)$ fällt, und r durch die Vergrößerung der Anzahl der gleichen Theile der AC kleiner als jeder gegebene Raum gemacht werden kann (§. 246.); ſo iſt das Quadrat der in C erlangten Geſchwindigkeit $=$ 2 Fläche $ADEC$. Eben ſo iſt das Quadrat der in P erlangten Geſchwindigkeit $=$ 2 Fläche $ADQP$; folglich verhält ſich

$$\overline{PM}^2 : \overline{CB}^2 = 2ADQP : 2ADEC = ADQP : ADEC.$$

Wenn die Kraft ſtetig abnimmt; ſo wird der Beweiß eben ſo mittelſt des 3. und 4ten Grundſ. §. 245. geführt.

Die Geſchwindigkeit PM in P iſt alſo der Seite eines Quadrats proportional, deſſen Inhalt dem Flächenraum $ADQP$ gleich iſt (velocitas in P est ut recta, quæ *potest* aream curvilineam $ADQP$. *Newt.* princ. L. I. prop. XXXIX.)

Es sey z. B. die Kraft PQ dem Abstand CP proportional; so wird die Linie DQ eine durch C gehende gerade Linie DQC (Fig. 85.), und es verhält sich, wenn man $CE = CA$ nimmt, und über AE einen Halbzirkel beschreibt,

die Fläche ADC : Fl. $PCD = \overline{AC}^2 : \overline{CP}^2$
$= AP \times PE + \overline{CP}^2 : \overline{CP}^2$ (II, 5.)

folglich $ADQP : ACD = AP \times PE : \overline{AC}^2$
$= P\overline{M}^2 : \overline{CB}^2$.

Mithin verhält sich die Geschwindigkeit in P zu der Geschwindigkeit in C wie $PM : CB$, übereinstimmend mit §. 245.

§. 250. Endlich seyen die Abscissen AP, Ap, AC (Fig. 86.) den beschriebenen Räumen, die Ordinaten PM, pm, CB den Geschwindigkeiten, und die Ordinaten PQ, pq, CE umgekehrt den Geschwindigkeiten proportional. Es verhalte sich die Geschwindigkeit in C zu der Geschwindigkeit einer gegebenen gleichförmigen Bewegung wie $CB : CF$, und es sey die CH so genommen, daß $CF : CB = CE : CH$; so verhält sich die Zeit, in welcher der Raum Pp mit der seinem Anfang entsprechenden Geschwindigkeit PM gleichförmig beschrieben wird zu der Zeit, in welcher derselbe Raum mit der gegebenen Geschwindigkeit CF beschrieben wird, wie $Pp \times CF : Pp \times PM$ (§. 231. n. 6.) $= Pp \times PQ : Pp \times CH$, weil $CF : PM = PQ : CH$ (Constr.). Daher wird sich die Summe jener ersteren dem beschriebenen Weg aC entsprechenden Zeittheilchen zur Summe der zweyten, d. i. zu der Zeit Z der gleichförmigen Bewegung von a bis C verhalten, wie die Summe der Rechtecke aus ab und ac, de und ce - - - Ch und hi, zu der Summe der Rechtecke aus ac und CH, ce und CH, - - - hC und CH, d. i. (wenn die Geschwindigkeit wächst, mithin die Ordinaten PQ, pq u. s. w. abnehmen, indem AP zunimmt) wie die Summe $R + r$ der um die Figur $abEC$ beschriebenen Rechtecke zu dem Rechteck Cg. Aber jedes der ersteren Zeittheilchen ist wegen der stetig beschleunigten Bewegung größer, als die wirklich zur Beschreibung der Räume ac, ce u. s. w. gebrauchten Zeiten; folglich ist, wenn die zur Beschreibung von aC gebrauchte Zeit $= Z$ gesetzt wird,

1.) $Z : \mathfrak{Z} \prec R + r : Cg$,

und ebenſo findet ſich, wenn man jeden der Räume ac, ce u. ſ. w. mit den ihren Endpunkten entſprechenden Geſchwindigkeiten gleichförmig beſchrieben vorausſetzt, und die Summe der in die Figur $abEC$ beſchriebenen Rechtecke R nennt,

2.) $Z : \mathfrak{Z} \succ R : Cg$.

Mithin iſt $Z : \mathfrak{Z} = abEC : Cg$, und, wenn die zur Beſchreibung von aP gebrauchte Zeit Z' heißt

$Z' : Z = abQP : abEC$.

Ebenſo wird der Beweiß geführt, wenn die Bewegung ſtetig verzögert iſt.

§. 251. Wenn auf einen Körper zwey conſtante Kräfte zugleich nach einerley Richtung wirken, und die erſte in einer gegebenen Zeit die Geſchwindigkeit K, die zweyte in derſelben Zeit die Geſchwindigkeit K' einzeln genommen erzeugt haben würde; ſo wird die Geſchwindigkeit, welche beyde zugleich erzeugen der Summe $K + K'$ jener Geſchwindigkeiten gleich ſeyn. Da nemlich vermöge der Vorausſetzung die Kräfte conſtant ſind, und daher in gleichen Zeiten gleiche Geſchwindigkeiten erzeugen, der Körper mag in Ruhe oder in Bewegung ſeyn; ſo wird, wenn die erſte Kraft die Geſchwindigkeit K erzeugt hat, die Bewegung durch die Wirkung der zweyten Kraft einen ferneren Zuwachs an Geſchwindigkeit erhalten, welcher eben ſo groß ſeyn wird, als wenn dieſe Kraft auf den anfangs in Ruhe befindlichen Körper gewirkt hätte. Nun werden aber conſtante Kräfte durch die Geſchwindigkeiten gemeßen, welche ſie in einer gegebenen Zeit erzeugen; folglich iſt die ganze erzeugte Geſchwindigkeit $K + K'$ eben ſo groß, als wenn eine Kraft, welche der Summe der zwey Kräfte gleich iſt, auf den Körper gewirkt hätte. Wirken die zwey Kräfte nach entgegengeſetzten Richtungen; ſo wird durch ihre gleichzeitige Wirkung nach der Richtung der größeren Kraft während einer gegebenen Zeit eine Geſchwindigkeit erzeugt, welche eben ſo groß iſt, als wenn eine der Differenz der zwey Kräfte gleiche Kraft während derſelben Zeit auf den Körper gewirkt hätte.

Weil ferner veränderliche Kräfte durch die Geſchwindigkeiten gemeßen werden, welche ſie in einer gegebenen Zeit erzeugt haben würden, wenn ſie beſtändig mit derjenigen Stärke gewirkt hätten, welche ſie im Anfang dieſer Zeit hatten (§. 243.); ſo wird die Summe oder die Differenz der Geſchwindigkeiten welche zwey nach einerley oder nach entgegengeſetzten Richtungen wirkende Kräfte in einer gegebenen Zeit erzeugt haben würden, eben ſo groß ſeyn, als wenn eine der Summe oder Differenz der zwey Kräfte im Anfang jener Zeit gleiche Kraft während derſelben Zeit die Bewegung des Körpers gleichförmig beſchleuniget hätte.

Hieraus folgt, daß, wenn mehrere Kräfte nach einerley oder zum Theil nach entgegengeſetzten Richtungen auf einen Körper wirken, alle dieſe Kräfte zuſammengenommen einer Kraft äquipollent ſind, welche dem Ueberſchuß der Summe der nach der einen Richtung wirkenden Kräfte über die Summe der nach der andern Richtung wirkenden gleich iſt, und deren Richtung mit der Richtung derjenigen Kräfte zuſammenfällt, welche die größere Summe ausmachen.

§. 252. Wenn auf einen anfänglich in C (Fig. 78.) ruhenden Körper zwey conſtante Kräfte A und B beſtändig mit den der Lage nach gegebenen geraden Linien CA und CB parallel wirken; ſo wird ſich der Körper weder nach der Richtung CA, noch nach der Richtung CB bewegen können, ſondern eine gewiße mittlere Richtung CN annehmen. Es ſeyen CP', CQ' die Geſchwindigkeiten, welche jede der zwey Kräfte A und B einzeln genommen in einer gegebenen Zeit t erzeugen würden. Man halbire CP' und CQ' in P und Q; ſo werden (§. 247. Beyſp.) CP und CQ die Räume ſeyn, welche der Körper in der Zeit t zurückgelegt haben würde, wenn entweder die Kraft A oder die Kraft B allein auf ihn gewirkt hätte. Da nun die Kraft A beſtändig mit der CA parallel wirkt (Vorausſ.); ſo kann dieſe Kraft die Bewegung in der mit CB parallelen Richtung nicht verändern, welche die Kraft B hervorzubringen ſtrebt, und der Körper muß ſich am Ende der Zeit t auf einer durch Q mit CA parallel gezogenen QM befinden. Eben ſo muß ſich der

Körper, weil ſeine Bewegung nach der Richtung CA durch die Kraft Q nicht verändert wird, am Ende der Zeit t auf der geraden PM befinden, welche durch P mit CB parallel gezogen wird, und daher wird er am Ende der Zeit t in die Ecke M des Parallelogramms $CPMQ$ gekommen ſeyn. Man vollende das Parallelogramm $CP'M'Q'$, und ziehe ſeine Diagonale CM'; ſo wird dieſe, weil CP' und CQ' in P und Q halbirt ſind, durch M gehen (VI, 26.), und, weil $CP' : \left\{\begin{matrix} CQ' \\ PM' \end{matrix}\right\} = A : B$, die Bewegung des Körpers geradlinigt und gleichförmig beſchleunigt ſeyn. Endlich iſt $CM' = 2CM$, weil $CP' = 2CP$; mithin CM' die in der Zeit t nach der Richtung CMN erzeugte Geſchwindigkeit. Folglich bewegt ſich der Körper nach der Richtung CN ebenſo, als wenn er durch eine conſtante Kraft beſchleunigt würde, welche ſich zu den Kräften A und B verhält wie CM' zu CP' und CQ'. Man nehme auf den geraden Linien CA und CB die Ca zu der Cb wie $A : B$, vollende das Parallelogramm $Cafb$, und ziehe ſeine Diagonale Cf; ſo wird dieſe die Richtung der Bewegung beſtimmen, und eine Kraft C, welche nach dieſer Richtung wirkt, und ſich zu A oder B wie Cf zu Ca oder Cb verhält wird dieſelbe Wirkung hervorbringen, welche durch die gleichzeitige Wirkung der Kräfte A und B hervorgebracht wird. Dieſe Kraft heißt die mittlere aus den Kräften A und B zuſammengeſetzte Kraft. Umgekehrt kann eine nach der gegebenen Richtung CN wirkende Kraft C als aus zwey anderen Kräften A und B, welche nach den gegebenen Richtungen CA und CB wirken, zuſammengeſetzt betrachtet, und in dieſe zerfällt werden, wenn man auf der CN die Cf nach Belieben nimmt, und durch f die Parallelen fb und fa mit CA und CB zieht. Alsdenn verhalten ſich nemlich die Kräfte A, B und C wie Ca, Cb und Cf.

Wenn die zwey Kräfte veränderlich ſind, aber beſtändig nach Richtungen wirken, welche mit zweyen der Lage gegebenen geraden Linien parallel laufen; ſo wird, weil veränderliche Kräfte nicht durch die wirklich erzeugte Geſchwindigkeiten, ſondern durch diejenige Geſchwindigkeiten gemeßen werden, welche dieſe Kräfte von einem gegebenen Zeitpunkt

an in einer gegebenen Zeit erzeugt haben würden, wenn sie während dieser Zeit gleichförmig fortgewirkt hätten, dieser Fall auf den vorhergehenden zurückgeführt. In dem besonderen Fall, wo die Kräfte ein gegebenes Verhältniß zu einander haben, wird das Verhältniß von $Ca : af$ diesem gegebenen Verhältniß gleich, und daher die Bewegung von C geradlinigt seyn.

Endlich weil constante Kräfte auf einen ruhenden Körper eben so wirken wie auf einen schon in Bewegung befindlichen; so wird die Kraft Cf sich bestreben, dem in Bewegung gesetzten Körper dieselbe Geschwindigkeit nach der Richtung CN mitzutheilen, welche sie dem in C ruhenden Körper mitgetheilt haben würde. Aber die Bewegung des Körpers selbst wird nur in dem Fall geradlinigt bleiben, wenn die Richtung CN der mittleren Kraft mit der Richtung seiner anfänglichen Bewegung zusammenfällt, in den übrigen Fällen aber krummlinigt, und z. B. aus einer geradlinigten gleichförmigen und aus einer gleichförmig beschleunigten nach einer mit CN parallelen Richtung zusammengesetzt seyn, wenn die Kraft Cf constant ist, welche Bewegungen in der Folge werden betrachtet werden.

Es seyen drey Kräfte A, B, D gegeben, welche nach den gegebenen Richtungen CA, CB, CD (Fig. 87.) wirken. Man nehme nach den Richtungen der Kräfte die Ca, Cb, Cd so, daß $Ca : Cb = A : B, Ca : Cd = A : D$, und vollende das Parallelogramm $Cbfa$; so ist die Kraft Cf, den Kräften Ca und Cb äquipollent, und es sind noch die zwey Kräfte Cf und Cd übrig. Man vollende das Parallelogramm $fCde$; so kann man statt der Kräfte Cd und Cf die Kraft Ce setzen, welche nun dieselbe Wirkung hervorbringen wird, als die drey Kräfte Ca, Cb und Cd. So kann man fortfahren, und eine beliebige Anzahl von Kräften, welche nach gegebenen Richtungen auf einen gegebenen Punkt wirken, die Richtungen mögen in einer, oder in verschiedenen Ebenen liegen, auf eine Kraft reduciren. Denn es liegen die Richtungen von je zwey Kräften in einer durch den gegebenen Punkt gehenden Ebene, und man findet nach dem vorhergehenden §. die mittlere Kraft, welche statt der zwey Kräfte

sub-

ſubſtituirt werden kann. Dadurch reducirt man z. B. vier Kräfte auf drey, und dieſe drey, wie ſo eben gezeigt worden iſt, auf eine, und ebenſo verfährt man, wenn fünf, ſechs Kräfte u. ſ. w. auf einen Körper wirken.

Zweytes Capitel.

Von den Wirkungen der Schwere.

§. 253. Nach den Beobachtungen verhalten ſich die Höhen, von welchen die Körper frey und von der Ruhe an fallen, wie die Quadrate der vom Anfang des Falls verfloſſenen Zeiten, wenn man den Widerſtand der Luft, und alle fremde Urſachen der Veränderung der Bewegung zu beſeitigen ſucht. Folglich iſt die Bewegung der frey fallenden Körper, ſo weit die Genauigkeit der Beobachtungen reicht, eine gleichförmig beſchleunigte (§. 233.), oder die Schwere theilt den Körpern Geſchwindigkeiten mit, welche der Zeit proportional wachſen. Man beobachtet ferner, daß große oder kleine Körper in gleichen Zeiten von gleichen Höhen mit einer gleichförmig beſchleunigten Bewegung fallen; folglich wirkt die Schwere auf alle Theilchen der Materie mit gleicher Stärke, die Körper mögen in Ruhe oder in Bewegung ſeyn. Mithin finden hier die §. 233. bis 235. von der gleichförmig beſchleunigten Bewegung bewieſenen Sätze in ſo fern ihre Anwendung, als man den Widerſtand der Luft und andere Störungen dieſer Bewegungen bey Seite ſetzt. Sey die Fallhöhe in der erſten Sekunde $= g$, die nach Verfluß von t Sekunden erlangte Geſchwindigkeit $= v$, die der Zeit t zugehörige Fallhöhe $= h$; ſo hat man nach §. 234. n. 1. 2. 3.

1.) $h = gt^2$
2.) $v = 2gt$
3.) $v^2 = 4gh$

Aus n. 3. erhält man 4.) $h = \frac{v^2}{4g}$, oder die Höhe, von welcher ein Körper fallen muß, um eine gegebene Geſchwindigkeit v zu erlangen. Dieſe Höhe heißt die der Geſchwin-

digkeit v zugehörige Fallhöhe (altitudo celeritati v debita).

Wenn einem Körper nach der Richtung der Schwere eine Geschwindigkeit c mitgetheilt wird; so würde er mit dieser Geschwindigkeit in der Zeit t den Weg ct zurücklegen. Wegen der durch die Schwere hervorgebrachten Beschleunigung legt aber der Körper noch überdiß in der Zeit t den Raum gt^2 nach derselben Richtung zurück; folglich ist der ganze in der Zeit t beschriebene Raum $= ct + gt^2$ (§. 235.). Wird aber ein Körper mit der Geschwindigkeit c senkrecht in die Höhe geworfen; so wirkt die Schwere der dem Körper mitgetheilten Bewegung entgegen, und der Körper steigt mit einer gleichförmig verzögerten Bewegung, so daß am Ende der Zeit t seine Geschwindigkeit $= c - 2gt$ ist. Diese verschwindet, wenn $t = \frac{c}{2g}$ wird. Alsdenn ist aber $c^2 = 4g^2t^2 = 4gh$ (n. 1.); folglich ist die Höhe h, auf welche der Körper steigt, $= \frac{c^2}{2g}$ = der Höhe, von welcher der Körper hätte fallen müssen, um die ihm anfänglich mitgetheilte Geschwindigkeit c zu erlangen (n. 4.). Und da $4g^2t^2 = 4gh$; so ist $gt^2 = h$, und daher die Zeit, welche der Körper gebraucht, um auf seine gröste Höhe zu steigen, ebenso groß als die Zeit, welche er gebraucht haben würde, um von eben dieser Höhe zu fallen.

§. 254. Ein Körper K (Fig. 88.) falle jetzt auf einer gegen die Horizontalebene BC um den Winkel ABC geneigten Ebene AC. Es sey KG die Geschwindigkeit, welche die Schwere in einer gegebenen Zeit nach einer vertikalen oder auf BC senkrechten Richtung erzeugen würde, wenn die geneigte Ebene AC nicht da wäre. Man ziehe durch K die gerade Linie NL mit AC parallel, und auf diese durch G die GL senkrecht. Wird das Parallelogramm $GLKR$ vollendet; so sind die Kräfte KL und KR der Kraft KG äquipollent (§. 252.). Die letztere, welche vermöge der Konstruktion auf NL oder AC senkrecht ist, wird durch den Widerstand der geneigten Ebene aufgehoben, und es bleibt

nur die Kraft KL übrig, welche den Körper längſt der Ebene AC herunterbewegt, und in derſelben Zeit die Geſchwindigkeit KL erzeugt, in welcher die Schwere nach der vertikalen Richtung KG die Geſchwindigkeit KG erzeugt haben würde. Man ziehe AB auf BC ſenkrecht; ſo verhält ſich, weil GK auf BC, und GL auf AC ſenkrecht, mithin die Dreyecke ABC und GKL ähnlich ſind, $GK : KL = AC : AB$. Folglich verhält ſich die conſtante Kraft der Schwere zu der mit der geneigten Ebene AC parallel wirkenden Kraft wie die Länge AC der geneigten Ebene zu ihrer Höhe AB, und der Körper fällt auf derſelben mit einer gleichförmig beſchleunigten Bewegung. Nun iſt das Quadrat der durch den freyen Fall von der Höhe AB erlangten Geſchwindigkeit $= 2GK \times AB$, und das Quadrat der durch den Fall von A bis C auf der geneigten Ebene erlangten Geſchwindigkeit $= 2KL \times AC$ (§. 234. n. 3.), d. i. weil $GK : KL = AC : AB$ ſich verhält, ebenfalls dem Rechteck aus $2GK$ und AB gleich; folglich erlangt

1.) ein Körper durch den Fall auf der geneigten Ebene AC dieſelbe Geſchwindigkeit, welche er durch den ſenkrechten freyen Fall von der Höhe AB der geneigten Ebene erhalten haben würde.

Ferner, weil der Körper mit der in C erlangten Geſchwindigkeit den Weg $2AC$ in derſelben Zeit gleichförmig zurückgelegt haben würde, in welcher er mit ſeiner gleichförmig beſchleunigten Bewegung durch AC gefallen iſt (§. 247. Beyſp.); ſo iſt die Zeit des Falls durch AC der Zeit gleich, in welcher der Körper den Raum $2AC$ mit der in C erlangten Geſchwindigkeit gleichförmig beſchrieben haben würde, und ebenſo iſt die Zeit des Falls durch AB der Zeit gleich, in welcher der freyfallende Körper den Weg $2AB$ mit der in B erlangten Geſchwindigkeit gleichförmig würde beſchrieben haben. Da nun die Geſchwindigkeiten in C und in B einander gleich ſind (n. 1.); ſo verhalten ſich die Zeiten der gleichförmigen Bewegungen mit den in C und B erlangten Geſchwindigkeiten durch die Räume $2AC$ und $2AB$, d. i. die Fallzeiten durch AC und AB wie die Räume $2AC$ und $2AB$ oder wie $AC : AB$. Mithin verhält ſich

2.) Die Fallzeit auf der geneigten Ebene AC zur Fallzeit durch ihre Höhe AB wie die Länge AC der geneigten Ebene zu ihrer Höhe AB. Hieraus folgt

3.) Daß die Fallzeiten von gleich hohen geneigten Ebenen ihren Längen proportional sind.

Von den Endpunkten A, B (Fig. 89.) des vertikalen Durchmeſſers AB eines Kreiſes ſeyen die Chorden AC, BC gezogen. Man ziehe CD auf AB ſenkrecht; ſo verhält ſich $AB : BC = BC : BD$, mithin

$$\overline{AB^2} : \overline{BC^2} = AB : BD$$
$$= \left\{\begin{matrix}\text{Quadr. d. Fallzeit}\\ \text{durch } AB\end{matrix}\right\} : \left\{\begin{matrix}\text{Quadr. d. Fallz.}\\ \text{durch } BD\end{matrix}\right\}$$
$$AB : BC = \text{Fallz. d. } AB : \text{Fallz. d. } BD$$
$$\text{Aber } BC : BD$$
$$AB : BC \Big\} = \text{Fallz. d. } BC : \text{Fallz. d. } BD \text{ (n. 2.)}$$

Folglich iſt die Fallzeit durch BC = der Fallzeit durch AB. Ebenſo kann gezeigt werden, daß die Fallzeit durch die Chorde AC der Fallzeit durch den Durchmeſſer AB gleich iſt. Alſo ſind

4.) Die Zeiten einander gleich, welche ein Körper gebraucht, um durch die von dem unteren oder oberen Endpunkt des vertikalen Durchmeſſers eines Kreiſes ausgehende Chorden zu fallen. Dieſe Zeiten ſind nemlich der Fallzeit durch den vertikalen Durchmeſſer des Kreiſes gleich.

§. 255. Es ſeyen AD, DC (Fig. 90.) zwey Ebenen, welche in D einen ſtumpfen Winkel ADC mit einander machen, und ein von A nach D ſich bewegender Körper komme in D mit der Geſchwindigkeit Dq an, mit welcher er ſich, wenn keine Kraft auf ihn wirkte, und die Ebene DC nicht da wäre, nach der Verlängerung von AD gleichförmig fortbewegen würde. Man ziehe qp auf DC ſenkrecht, und vollende das Parallelogramm $Dpqr$; ſo zerfällt die Geſchwindigkeit Dq in die Geſchwindigkeiten Dp und Dr. Die leztere wird durch den Widerſtand der Ebene DC aufgehoben, und es bleibt nur die Geſchwindigkeit Dp übrig, mit welcher der Körper auf der Ebene DC gleichförmig fortgehen würde. Folglich leidet der Körper an der Ecke D einen Verluſt an ſeiner Geſchwindigkeit, welcher ſich zu der Geſchwin-

digkeit, mit welcher er in D ankommt, wie der Ueberſchuß von Dq über Dp zu Dq verhält.

Es ſey z. B. BDC eine horizontale Ebene, AB die Höhe der geneigten Ebene AD, und Dq die durch den Fall auf der geneigten Ebene AD erlangte Geſchwindigkeit; ſo wird, weil die Wirkung der Schwere durch die horizontale Ebene DC aufgehoben wird, die Bewegung auf DC gleichförmig, und ihre Geſchwindigkeit $= Dp$ ſeyn.

Die Zeit, welche ein von A aus fallender Körper gebraucht, um auf dem gebrochenen Weg ADC an einen gegebenen Punkt C der über D hinaus verlängerten Horizontallinie BC zu kommen, wird alſo aus einem doppelten Grund größer ſeyn als die Zeit, welche er gebraucht haben würde, um auf der über D hinaus nach H verlängerten geneigten Ebene AH zu fallen, deren Länge $AH = AD + DC$ iſt, einmal, weil die Bewegung auf DC durch die Schwere nicht weiter beſchleunigt wird, ſodenn, weil die Geſchwindigkeit Dp dieſer Bewegung kleiner als die in D erlangte Geſchwindigkeit Dq iſt. Nichts deſto weniger kann die Zeit der Bewegung auf dem gebrochenen Weg ADC kleiner ſeyn, als die Zeit des Falls auf der geneigten Ebene AC, deren Länge kleiner iſt als $AD + DC$ (I, 20.) Da nemlich die Zeit des Falls auf AD der Zeit einer gleichförmigen Bewegung mit der in D erlangten Geſchwindigkeit Dq durch den Raum $2AD$ gleich, und $Dq : Dp = AD : DB$ iſt; ſo verhält (§. 231. n. 6.)

die Zeit durch $CD : \left\{\begin{matrix}\text{Zeit durch } 2AD \\ \text{Fallzeit d. } AD\end{matrix}\right\} = CD \times AD : 2AD \times DB$
$= CD : 2BD,$

und die Zeit durch ADC: Fallzeit d. $AD = CD + 2BD : 2BD$
$= CF : DF$ (wenn $BF = BD$)
$= CG : AD$ (wenn man FAG,

und durch C die Parallele CG mit AD zieht)

Aber Fallzeit d. AD: Fallzeit d. $AC = AD : AC$ (§. 254. n. 3.)

folglich Zeit d. ADC: Fallzeit d. $AC = CG : AC$.

Demnach iſt die Zeit durch $ADC \begin{matrix}< \\ = \\ >\end{matrix}$ Fallzeit durch AC,

je nachdem $CG \begin{matrix}< \\ = \\ >\end{matrix} AC$, $\left.\begin{matrix}GAC \\ EAF\end{matrix}\right\} \begin{matrix}< \\ = \\ >\end{matrix} \left\{\begin{matrix}AGC \\ FAD \\ 2BAD\end{matrix}\right.$.

$EAF+FAB \left\{\begin{matrix}<\\=\\>\end{matrix}\right\} 2BAD+FAB \left\{\begin{matrix}<\\=\\>\end{matrix}\right\} 3BAD$ ist.

Wenn der Winkel $BAD > \frac{1}{3}R$ aber $< \frac{1}{2}R$ ist; so kann man immer eine geneigte Ebene AC finden, so daß die Zeit durch ADC der Fallzeit durch AC gleich wird, wenn man den Winkel $BAE = 3BAD$ macht, und die gerade Linie EAC zieht, welche in diesem Fall der über D hinaus verlängerten BD begegnen wird.

§. 256. Der seiner mancherley Anwendungen wegen wichtigste Fall der Bewegung auf vorgeschriebenen Wegen ist derjenige, wenn ein Körper durch äussere Hindernisse genöthigt wird, sich in einer krummen Linie, z. B. in einem gekrümmten Canal, zu bewegen. Es sey AFG (Fig. 91.) eine in einer Ebene liegende krumme Linie, deren Bogen nach einerley Seite hol, und so beschaffen sey, daß die an seine Endpunkte A, F gezogene Tangenten AN, FO sich auf der erhabenen Seite dieses Bogens in O schneiden. Ein Körper komme in A mit einer gegebenen Geschwindigkeit v nach der Richtung AN an, und treffe daselbst auf die krumme Linie AFG, so daß er seinen Weg nicht anders, als in dieser krummen Linie fortsetzen könne. Während seiner Bewegung durch AF wirke weiter keine Kraft auf ihn. Man sucht die Geschwindigkeit, mit welcher er in dem gegebenen Punkt F der krummen Linie ankommt.

Man theile den Winkel FON durch fortgesetzte Halbierungen in eine beliebige Anzahl n gleicher Theile durch die geraden Linien OB', OC', OD', und ziehe mit diesen parallel die Tangenten bC, cD, dE an die krumme Linie (§. 241.); so werden diese ein um den Bogen AF beschriebenes gleichwinklichtes Vieleck $ABCDEF$ bilden, welches ebenso viele Ecken haben wird, als die Anzahl n der gleichen Theile des Winkel FON ausmacht. Man bezeichne zur Abkürzung die äusseren Winkel ABb, BCc u. s. w. des Vielecks mit B, C, D, E; so ist (I, 32.) $FON = OdE + E = dcD + D + E$ $B + C + D + E$; mithin der Winkel FON immer gleich der Summe der äusseren Winkel des Vielecks, und jeder der letzteren Winkel $= \frac{FON}{n}$.

Ueber einer nach Belieben angenommenen geraden Linie *ab* (Fig. 92) als Durchmeſſer ſey ein Halbzirkel *afb* beſchrieben, und der Winkel *acf* ſey dem gegebenen Winkel *FON* (Fig. 91.) gleich gemacht. Man theile den Bogen *af* in ebenſo viele gleiche Theile, als den Winkel *FON*, ziehe an den erſten Theilungspunkt *e* von *a* an gerechnet den Halbmeſſer *ce*, und *cd* auf *ab* ſenkrecht. Da vermöge dieſer Conſtruktion der Winkel $ace = NOB' = cBC$; ſo würde der Körper, wenn er ſich in dem Vieleck bewegte, an der Ecke *B* einen Verluſt an ſeiner anfänglichen Geſchwindigkeit erleiden, welcher ſich zu dieſer wie $ce : ce - cd$ oder zu *ad* verhält (§. 255.), und daher dieſer Verluſt $= \frac{da}{ac} v$ ſeyn. Mit der um dieſe Größe verminderten Geſchwindigkeit v' würde ſich der Körper auf der zweyten Seite *BC* des Vielecks gleichförmig fortbewegen, und an der Ecke *C* einen zweyten Verluſt an ſeiner Geſchwindigkeit leiden, welcher $= \frac{da}{ac} v'$, mithin kleiner als $\frac{da}{ac} v$ ſeyn wird. An jeder folgenden Ecke wird der Verluſt um ſo mehr kleiner als $\frac{da}{ac} v$, und daher wenn das Vieleck *n* Ecke hat, der ganze Verluſt an Geſchwindigkeit, welche der Körper bey ſeiner Bewegung auf dem Vieleck leiden würde, kleiner als $\frac{nda}{ac} v$ ſeyn. Es verhält ſich aber, wenn man die Chorden *ae* und *eb* zieht, $da : ae = ae : ab$

folglich $da : \left\{\frac{ab}{2ac}\right\} = \overline{ae}^2 : \left\{\frac{\overline{ab}^2}{4ac^2}\right\}$

$$da : ac = \overline{ae}^2 : 2\overline{ac}^2;$$

mithin iſt der geſammte Verluſt an Geſchwindigkeit, welche der Körper bey ſeiner Bewegung durch das Vieleck leidet $< \frac{nv}{2}\left(\frac{ae}{ac}\right)^2$, und um ſo mehr $< \frac{nv}{2}\left(\frac{\text{Bogen } ae}{ac}\right)^2$ $< \frac{v}{2n}\left(\frac{n.\text{ Bogen } ae}{ae}\right) < \frac{v}{2n}\left(\frac{af}{ac}\right)^2$, weil zumal der Bogen $ae =$ Bogen *af* iſt. Da nun der Winkel $acf = FON$ gegeben iſt; ſo wird der ganze Verluſt an Geſchwindigkeit deſto kleiner, je

größer n wird, je mehr sich folglich das Vieleck einer stetig krummen Linie nähert, und dieser Verlust kann durch die Vergrößerung von n kleiner gemacht werden, als jede gegebene Größe.

Unter der Voraussetzung des Grundsatzes, daß der Verlust an Geschwindigkeit, welchen ein Körper bey seiner Bewegung auf einer stetig krummen Linie leidet, kleiner sey als derjenige, welchen er bey seiner Bewegung auf einem um die krumme Linie beschriebenen gleichwinklichten Vieleck leiden würde, wird nun gezeigt werden können, daß der auf der krummen Linie sich bewegende Körper mit derselben Geschwindigkeit v in F ankomme, welche er in A nach der Richtung AN der Tangente der krummen Linie hatte. Hätte nemlich der Körper den Verlust u an seiner Geschwindigkeit erlitten; so theile man den Winkel FON durch fortgesetzte Halbierungen in so viele gleiche Theile, daß ihre Anzahl m größer als $\frac{v}{2u}\left(\frac{af}{ac}\right)^2$, werde, und beschreibe wie vorhin ein Vieleck von m Ecken um den Bogen AF der krummen Linie. Alsdenn wird vermöge des oben bewiesenen der Verlust an Geschwindigkeit, welchen der Körper bey seiner Bewegung auf dem Vieleck leiden würde, kleiner als $\frac{v}{2m}\left(\frac{af}{ac}\right)^2$ seyn. Man hat aber m größer als $\frac{v}{2u}\left(\frac{af}{ac}\right)^2$ gemacht, und daher müßte $u > \frac{v}{2m}\left(\frac{af}{ac}\right)^2$, d. i. der Verlust an Geschwindigkeit, welchen der Körper bey seiner Bewegung auf der stetig krummen Linie leidet, größer als der Verlust seyn, welchen er bey seiner Bewegung auf dem Vieleck gelitten haben würde, gegen den aufgestellten Grundsatz. Der Körper durchlauft also den Bogen AF mit einer gleichförmigen Bewegung. Und wenn der vorgeschriebene Weg eine in sich selbst zurückkehrende krumme Linie ist; so durchlauft er jeden gegebenen Bogen derselben gleichförmig mit derjenigen Geschwindigkeit, welche er am Anfang dieses Bogens hatte. Folglich durchlauft er den Umfang der krummen Linie gleichförmig, und kommt, wenn er einen Umlauf gemacht hat, wieder mit derselben Geschwindigkeit an, welche er im An-

fang ſeiner Bewegung hatte. Dieſe Umlaufsbewegung würde alſo beſtändig fortdauern, wenn nicht die Friction und der Widerſtand der Luft nach und nach ſeine Geſchwindigkeit verminderten.

Ebenſo kann gezeigt werden, daß, wenn ein Körper bey ſeiner Bewegung auf der krummen Linie und auf dem um die krumme Linie beſchriebenen Vieleck durch die Wirkung einer Kraft beſchleunigt oder verzögert wird, und ſeine gröſte Geſchwindigkeit auf dem Vieleck, welche er ohne an den Ecken deſſelben einen Verluſt zu erleiden erlangt haben würde, gleich v geſetzt wird, der geſammte von den Brechungen dieſes Wegs herrührende Verluſt an Geſchwindigkeit kleiner ſey als $\frac{v}{2n}\left(\frac{af}{ac}\right)^2$, und daher die Bewegung des Körpers auf der krummen Linie nur in ſo fern eine Veränderung leide, als ſie durch den mit der Tangente an jedem Punkt des krummlinigten Wegs parallel wirkenden Theil der Kraft beſchleunigt oder verzögert wird.

§. 257. Ein Körper falle aus der Ruhe in A (Fig. 93.) auf der in einer Vertikalebene liegenden krummen Linie AKD, und es werde ſeine Geſchwindigkeit geſucht, wenn er durch den Bogen AD gefallen iſt. Man beſchreibe um die krumme Linie ein gleichwinklichtes Vieleck $ABCD$, ziehe durch die Berührungspunkte A, D, und die Ecken B, C die Horizontallinien Aa, Dd, Bb, Cc, welche der Vertikallinie ad in a, d, b, c begegnen, und verlängere CB, DC, bis ſie der erſten Horizontallinie Aa in E und F begegnen. Fiele nun der Körper auf dem Vieleck; ſo würde er in B mit der Geſchwindigkeit ankommen, welche er durch den freyen Fall von der Höhe ab erlangt haben würde (§. 254, n. 1.), und, wenn er an der Ecke B kein Verluſt an ſeiner Geſchwindigkeit ſtatt fände, mit dieſer Geſchwindigkeit auf BC fortgehen, mithin in C mit der Geſchwindigkeit ankommen, welche er durch den Fall auf EC oder durch den freyen Fall von der Höhe ac erlangt haben würde. Demnach würde er, wenn an den Ecken nichts von ſeinen Geſchwindigkeiten verlohren gienge, in D mit der durch den Fall auf ED, oder

durch den freyen Fall von der Höhe *ad* erlangten Geschwindigkeit ankommen. Nun kann aber durch die Vergrößerung der Anzahl der Seiten des Vielecks der gesammte Verlust an Geschwindigkeit kleiner gemacht werden, als jede gegebene Größe (§. 256.); folglich kommt der Körper wenn er auf der krummen Linie gefallen ist, in *D* mit einer Geschwindigkeit an, welche er durch den freyen Fall von der Höhe *ad* erlangt haben würde. Wenn die an den Punkt *H* der krummen Linie gezogene Tangente *Hh* eine Horizontallinie ist; so kommt der Körper in *H* mit einer Geschwindigkeit an, welche er durch den freyen Fall von der Höhe *ah* erlangt haben würde, mit welcher er sich nach der Richtung der Verlängerung *HT* dieser Tangente auf der durch den Berührungspunkt *H* gelegten Horizontalebene gleichförmig fortbewegen würde.

Es sey *AB A'* (Fig. 94.) eine gegen die Horizontallinie *BH* erhabene in einer Vertikalebene liegende krumme Linie, welche von der *BH* in *B* berührt werde, und ein Körper falle aus der Ruhe in *A* auf der krummen Linie *AB*. Man ziehe durch *A* die Horizontallinie *AA'*, welche der krummen Linie in *A'* begegne, und durch *B* die Vertikallinie *CB*; so wird der Körper in *B* eine der Fallhöhe *CB* zugehörige Geschwindigkeit erlangt haben, mit welcher er durch den Bogen *BA'*, auf welchem nun die Schwere seine Bewegung verzögert, so lange steigen wird, bis seine in *B* erlangte Geschwindigkeit zernichtet ist. Dieß wird in dem Punkt *A'* geschehen, wo er sich auf eine Höhe erhoben hat, welche der Höhe seines Falls von *A* bis *B* gleich ist. Von *A'* an wird er wiederum gegen *B* fallen, und mit seiner in *B* erlangten Geschwindigkeit auf *A* steigen, und so beständig zwischen den Punkten *A* und *A'* hin und her oscilliren.

Beyspiel. Die krumme Linie sey ein Kreis (Fig. 95.), dessen vertikaler Durchmesser *BA* sey, und ein Körper sey von *D* aus der Ruhe auf dem Bogen *DA* gefallen. Man ziehe *DE* auf *AB* senkrecht; so gehört die in *A* erlangte Geschwindigkeit der Höhe *AE* zu. Mithin verhält sich (§. 234. n. 3.) das Quadrat der durch den Fall von der Höhe *AB* er-

langten Geschwindigkeit zu dem Quadrat der durch den Fall von der Höhe AE oder durch den Bogen DA erlangten Geschwindigkeit wie $AB : AE = AB^2 : AD^2$, weil $AB : AD = AD : AE$. Folglich verhält sich die durch den freyen Fall von einer dem Durchmesser des Kreises gleichen Höhe erlangte Geschwindigkeit zu der durch den Fall auf dem Bogen DA in A erlangten Geschwindigkeit wie des Kreises Durchmesser zu der Chorde DA dieses Bogens, und daher verhalten sich die durch den Fall auf verschiedenen Bogen des Kreises an dem unteren Endpunkt A seines vertikalen Durchmessers erlangten Geschwindigkeiten wie die Chorden dieser Bogen.

§. 258. Man denke sich den einen Endpunkt eines Fadens in C (Fig. 95.) und an seinem anderen Endpunkt A einen schweren Körper befestigt; so wird der Körper, wenn man ihn von der Vertikallinie CA um den Winkel ACD ablenkt, und ihn hierauf sich selbst überläßt, anfangen, um C als Mittelpunkt ein Kreisbogen DA zu beschreiben, in A seine gröste Geschwindigkeit erlangen, und mit dieser auf der anderen Seite der Vertikallinie so lange steigen, bis er in die durch D gezogene Horizontallinie DED' kommt, wo seine Ablenkung ACD' von der Vertikallinie $= ACD$ wird. Der Faden nöthigt jetzt den Körper, einen Kreisbogen zu beschreiben, welchen er ebenso beschrieben haben würde, wenn ein nach diesem Bogen gekrümmter Canal angebracht, und der Faden weggenommen worden wäre. Der Körper wird also, wie in dem vorhergehenden §. gezeigt worden ist, beständig zwischen den Punkten D und D' hin und her schwingen. Man nennt diese Vorrichtung ein Pendel, und zwar ein einfaches Pendel, wenn man sich den Faden ohne Schwere und die ganze Masse des angehängten Körpers in einem Punkt vereinigt denkt. Dieses einfache Pendel kann man ebenso wenig verfertigen, als den mathematischen Hebel, aber man kann, wie hernach gezeigt werden soll, die Bewegungen eines aus schweren Körpern zusammengesetzten Pendels auf die des einfachen Pendels reduciren, welchem letzteren man sich übrigens in der Aus-

M und m die Geschwindigkeiten V und v in einerley Zeit mittheilen, ungleich; so sey $F > f$. Alsdenn würde die Kraft f der Masse M eine Geschwindigkeit V' mittheilen, welche kleiner seyn müßte als V, und es würde sich verhalten $M:m = v:V'$ (n. 4.). Aber vermöge der Voraussetzung ist $M:m = v:V$; folglich müßte $V' = V$ seyn, welches unmöglich ist.

6.) Wenn die Kraft F der Masse M die Geschwindigkeit V, und die Kraft f der Masse m die Geschwindigkeit v mittheilt; so ist $F:f = M.V:m.v$.

Bew. Man bestimme die Geschwindigkeit V' so, daß $M:m = v:V'$; so wird die Kraft, welche der Masse M die Geschwindigkeit V' mittheilt, der Kraft f gleich seyn (n. 5.). Da nun die Kräfte F, f derselben Masse M die Geschwindigkeiten V und V' mittheilen; so verhält sich $F:f = V:V'$ (n. 1.), $= M.V:M.V'$. Es ist aber $M:m = v:V'$; folglich $MV' = mv$, und $F:f = M.V:m.v$.

7.) Unter derselben Voraussetzung verhält sich $m.F:M.f = V:v$.

Bew. Es sey wiederum $M:m = v:V'$; so verhält sich wie vorhin $F:f = V:V'$ (n. 1.)

aber $m:M = V':v$;

folglich $m.F:Mf = V:v$.

Beyspiel. An einem um die in C (Fig. 97.) unterstützte Rolle AB gehenden Faden hängen zwey Gewichte P und Q, und es sey P größer als Q; so wird P sinken, und Q um eben so viel steigen, und daher, wenn man das Gewicht der Rolle und des Fadens bey Seite setzt, die ganze zu bewegende Masse $= P+Q$ seyn. Auf der Seite von P wird ein Uebergewicht $= P-Q$ seyn, welchem die Schwere die Geschwindigkeit $2g$ in einer Sekunde mitzutheilen strebt. Dieselbe Kraft wird aber jetzt auf die Bewegung der Masse $P+Q$ verwendet; folglich verhält sich, wenn die am Ende der ersten Sekunde erlangte Geschwindigkeit, mit welcher P sinkt und Q steigt, $= v$ gesetzt wird, $P+Q:P-Q = 2g:v$ (n. 4.). Die constante Kraft der Schwere wird also in dem gegebenen Verhältniß $P-Q:P+Q$ vermindert; folglich sinkt P mit einer gleichförmig beschleunigten Bewegung,

förmig mit der in A erlangten Geſchwindigkeit zu durch-
n. Man ſetze die durch den Fall von der Höhe $2AC$
BA erlangte Geſchwindigkeit $= V$, die durch den Fall
m Bogen DA erlangte Geſchwindigkeit $= v$, die Fall-
urch $BA = T$, die Zeit der Bewegung durch $DA = t'$,
das Verhältniß des Umfangs eines Kreiſes zu ſeinem
hmeſſer $= \pi : 1$; ſo iſt die Fallzeit T durch BA der Zeit
gleichförmigen Bewegung durch $2BA$ mit der Geſchwin-
eit V, und die Zeit t' durch DbA der Zeit einer gleich-
tigen Bewegung durch den vierten Theil des Umfangs
s Kreiſes mit der Geſchwindigkeit v gleich, deſſen Halb-
ſſer $= DdA$ oder in gegenwärtigem Fall nahe $=$ der Chor
DA dieſes Bogens iſt. Der vierte Theil des Umfangs
ſes Kreiſes iſt $= \frac{1}{2}\pi\, AD$; folglich iſt nach §. 231. n. 6.

$t' : T$ im zuſammengeſ. Verhältn. von $\left(\begin{matrix}\frac{1}{2}\pi. AD : 2AD \\ AD : AD\end{matrix}\right)$

oder von $\left(\begin{matrix}\frac{1}{2}\pi. AD : 2AD \\ AB : AD\end{matrix}\right)$ (§. 257. Beyſp.)

Daher verhält ſich $t' : T = \left\{\begin{matrix}\frac{1}{2}\pi : 2 \\ \frac{1}{4}\pi : 1\end{matrix}\right\}$, oder wie der vier-
te Theil des Umfangs eines Kreiſes zu ſeinem Durchmeſſer.

Es iſt aber die Fallzeit durch BA der Fallzeit durch die Chorde DA gleich; (§. 254. n. 4.); folglich iſt die Zeit des Falls durch einen kleinen Kreisbogen DA in demſelben Verhältniß kleiner als die Fallzeit durch ſeine Chorde, in welchem der Umfang eines Kreiſes kleiner als das vierfache ſeines Durchmeſſers. Alſo iſt, wie man ſchon §. 255. geſehen hat, die gerade Linie, welche zwey gegebene weder in einerley Horizontalebene noch in einerley Vertikallinie liegende Punkte mit einander verbindet, nicht die Linie auf welcher ein fallender Körper in der kürzeſten Zeit von dem einen Punkt an den andern kommt.

§. 259. Die Schwingungszeit eines Pendels durch den Bogen DAD' iſt der doppelten Zeit des Falls durch den Bogen DA gleich; folglich verhält ſich

1.) Die Schwingungszeit t eines einfachen Pendels durch einen ſehr kleinen Bogen DAD' zu der Zeit T des freyen

wirkende Theil der Schwere wird nur einen Druk auf den Punkt c hervorbringen, und keinen Einfluß auf die Bewegung des Pendels haben. Dieselben Geschwindigkeiten würden auch den übrigen Körpern einzeln genommen in derselben Zeit mitgetheilt worden seyn, so daß, wenn man durch t'' die Parallele $t''t$ mit cb zieht, welche die übrigen Tangenten in t' und t schneidet, diese Geschwindigkeiten $m't'$ und mt seyn würden. Aber weil die Körper sich an einer unbiegsamen geraden Linie befinden, so muß die Geschwindigkeit der dem Punkt c näher liegenden kleiner seyn, als die der entfernteren. Es sey ms die Geschwindigkeit, welche der Punkt m der geraden Linie cb erhalten würde, wenn die Schwere auf die mit einander verbunden n Körper m, m', m'' zugleich mit derjenigen Stärke nach der Richtung der Tangenten fortwirkte, welche sie bey der angenommenen Lage der cb hatte. Man ziehe die gerade Linie css'', welche den Tangenten mt, $m't'$, $m''t''$ und ihren Verlängerungen in s, s', s'', und der tt'' in k begegne, und fälle von k das Perpendickel ko auf cb; so wird o der Punkt seyn, welcher durch die Wirkung der Schwere auf die mit einander verbundene Massen zugleich dieselbe Beschleunigung erhält, als durch ihre Wirkung auf jede einzelne Masse. Dabey müssen die zwischen o und c liegende Massen m und m die Geschwindigkeiten st, und $s't'$ verlieren, und die weiter, als der Punkt o, von c entfernte Masse m'' muß die Geschwindigkeit $t''s''$ gewinnen, und die Verzögerungen $st, s't'$ auf der einen Seite müssen sich gegen die Beschleunigung $s''t''$ auf der anderen Seite aufheben, sonst würde die Beschleunigung des Punkts o größer oder kleiner als ok oder $m''t''$ seyn, gegen die Voraussetzung. Wenn auf beyden Seiten von o mehrere Körper wären; so würde ebenfalls die Summe dieser Beschleunigungen auf der einen Seite der Summe der Verzögerungen auf der anderen Seite gleich seyn müssen. Die hieraus entstehende Kräfte sind im zusammengesetzten Verhältniß aus den Massen m, m', m'', und den Geschwindigkeiten $st, s't', s''t''$ (§. 262. n. 6.), und da sie sich gegen einander aufheben müssen; so müssen vermöge des Gesetzes des Hebels ihre Momente gleich seyn. Man wird also haben

$\cdot cm.m.ss + cm'.m'.s's' = cm''.m''.s''s''.$

Es iſt aber wegen der ähnlichen Dreyecke sks, $s'ks'$, u. ſ. w.

$ss : s's' = ks : ks' = mo : m'o$

$s's' : s''s'' = ks' : ks'' = m'o : m''o$; folglich muß

$cm.m.mo + cm'.m'.m'o = cm''.m''.m''o$, oder

$cm.m.(co - cm) + cm'.m'.(co - cm') = cm''.m''.(cm'' - co)$ ſeyn,

woraus man erhält $co = \frac{\overline{cm}^2.m + \overline{cm'}^2.m' + \overline{cm''}^2.m''}{cm.m + cm'.m' + cm''.m''}$.

Der Schwerpunkt der Maſſen falle in p, und ihre Summe ſey $= M$; ſo iſt vermöge der Eigenſchaften dieſes Punkts der Nenner des für co gefundenen Ausdrucks $= M.cp$.

Es ſeyen nun m, m', m'' (Fig. 99.) mehrere nicht in einer geraden Linie aber in der Ebene des Schwungs liegende feſt mit einander verbundene Maſſen, deren Summe mit M bezeichnet werde, und p ihr Schwerpunkt, durch welche aus dem Aufhängungspunkt c die gerade Linie cb gezogen ſey. Wenn dieſe mit der Vertikallinie ca zuſammenfällt; ſo ruht das Pendel, und daher hängt die Kraft, mit welcher das zuſammengeſetzte Pendel zu ſinken ſtrebt, von dem Ablenkungswinkel acb der an den Schwerpunkt p gezogenen geraden Linie von der Vertikallinie ca ab. Die gleichen Geſchwindigkeiten, welche die Schwere einer jeden dieſer Maſſen beſonders, wenn ſie frey fallen könnten in vertikaler Richtung während einer gegebenen Zeit mittheilen würde, ſeyen durch die gleiche mit ca parallele gerade Linien mh, $m'h'$, $m''h''$ ausgedrückt. Man ziehe mt auf cm ſenkrecht, durch h die Parallele ht mit cm, und vollende das Parallelogramm $mdht$; ſo zerfällt die Kraft mh in die auf cm ſenkrechte nach der Richtung der Bewegung von m wirkende Kraft mt, und in die Kraft md welche wegen des Widerſtands des Aufhängungspunkts c keinen Einfluß auf die Bewegung haben kann. Ebenſo ſeyen die Kräfte mh, $m'h'$, $m''h''$ in die auf cm, cm'' ſenkrechte $m't'$, $m''t''$, und in die auf c wirkende $m'd'$, $m''a''$ zerfällt; ſo werden mt, $m't'$, $m''t''$ die Geſchwindigkeiten ſeyn, welche die Schwere jeder dieſer Maſſen beſonders nach der Richtung ihrer Bewegungen um den Punkt c in einerley Zeit mittheilen würde, wenn ſie während dieſer Zeit mit derjenigen Stärke fortwirkte, welche ſie in m, m', m'' nach jenen Richtungen hatte. Es ſey auf der

durch den Schwerpunkt p gehenden geraden Linie ch die co der Länge des einfachen Pendels gleich genommen, welches mit dem zusammengesetzten seine Schwingungen in gleichen Zeiten macht; so muß, wenn man durch o die go mit ca parallel, und den Linien mh, oder $m'h'$ u. s. w. gleich nimmt, und die Kraft der Schwere go in die auf co senkrechte ot, und die nach c wirkende or zerfällt, die Geschwindigkeit ot, welche die Schwere einer einzelnen in dem Punkt o befindlichen Masse nach der Richtung ot der Bewegung mittheilen würde, dieselbe seyn, welche eben dieser Punkt durch die Wirkung der Schwere auf das ganze System der mit einander verbundenen Massen erhält.

Man mache den Winkel $mcs = oct$; so wird, weil die Massen mit einander verbunden sind, die Geschwindigkeit der Masse $m = ms$ seyn, welche sich zu ot verhalten wird, wie cm zu co. Ebenso wird, wenn $m's'$, $m''s''$ die Geschwindigkeiten der übrigen Massen sind, $m's' : m''s'' = cm' : cm''$ seyn. Die Massen m, m' verlieren an den Geschwindigkeiten mt, $m't'$, welche ihnen die Schwere mitzutheilen strebt, die Geschwindigkeiten st, $s't'$, und die Masse m'' gewinnt die Geschwindigkeit $t''s''$; folglich muß wie in dem zuerst betrachteten Fall vermöge §. 262. n. 6. und des Gesetzes des Hebels

$$cm.m.st + cm'.m'.s't' = cm''.m''.s''t'',$$
oder $cm.m.(mt - ms) + cm'.m'(m't' - m's') = cm''.m''(m''s'' - m''t'')$,
mithin 1.) $cm.m.mt + cm'.m'.m't' + cm''.m''.m''t''$
$= cm.m.ms + cm'.m'.m's' + cm''.m''.m''s''$ seyn.

Man fälle aus den Punkten m, m', p, o und m'' die Perpendickel mn, $m'n'$ u. s. w. auf ca; so sind die Dreyecke mht und cmn, $m'h't'$ und $cm'n'$ u. s. w. ähnlich, und es verhält sich

$$mt : \left\{\begin{matrix} mh \\ go \end{matrix}\right\} = mn : cm.$$

Daher ist $cm.m.mt = mn.m.go$
ebenso $cm'.m'.m't' = m'n'.m'.go$
$cm''.m''.m''t'' = m''n''.m''.go$;

folglich 2.) $cm.m,mt + cm'.m'.m't' + cm''.m''.m''t''$
$= (mn.m + m'n'.m' + m''n''.m'')go$,
$= (m + m' + m'')pf.go$, weil p der Schwerpunkt ist
$= M.cp.ot$, weil $go : ot = co : ol = cp : pf$.
Ferner verhält sich $cm : ms = co : ot$,

also auch $m.\overline{cm}^2 : cm.m.ms = co : os$

ebenso $m'.\overline{cm'}^2 : cm'.m'.m's' = co : os$

$m''.\overline{cm''}^2 : cm''.m''.m''s'' \; co : os.$

Man ſetze die Summe der erſten Glieder $= S$; ſo verhält ſich, weil die Summe der zweyten Glieder $= M.cp.os$ iſt (n. 1. und 2.),

$S : M.cp.os = co : os$ (V, 12.)

$= M.cp.co : M.cp.os$

Folglich iſt $M.cp.co = S$,

oder 3.) $co = \frac{S}{M.cp}$.

Endlich befinde ſich eine Maſſe i auſſerhalb der Ebene acb des Schwungs. Man fälle von ihr ein Perpendickel im auf die Ebene des Schwungs, welches dieſer Ebene in m begegne; ſo wird die Geſchwindigkeit von i beſtändig der Geſchwindigkeit von m gleich ſeyn, und die Schwere auf die Maſſe i mit derſelben Stärke wirken, mit welcher ſie auf die Maſſe m wirkt. Mithin kann man ſtatt der Maſſe i eine ihr gleiche in m ſubſtituiren, und die in n. 3. gegebene Regel zur Beſtimmung der Länge co des einfachen Pendels iſt auch auf dieſen Fall anwendbar, wenn man unter cm, cm' u. ſ. w. die ſenkrechten Abſtände der Maſſen von der Axe ce des Schwungs, und unter cp den ſenkrechten Abſtand des Schwerpunkts aller Maſſen von eben dieſer Axe verſteht.

§. 264. Der Abſtand des Punkts m von dem Schwerpunkt p iſt der Hypotenuſe eines rechtwinklichten Dreyecks gleich, deſſen Seiten um den rechten Winkel $cf-cn$ und $mn-pf$ ſind. Folglich iſt (I, 47.)

$\overline{pm}^2 = (ef-cn)^2 + (mn-pf)^2,$

$= \overline{ef}^2 - 2ef.cn + \overline{cn}^2 + \overline{mn}^2 - 2pf.mn + \overline{pf}^2$

$= \overline{cp}^2 + \overline{cm}^2 - 2ef.cn - 2pf.mn;$

also $m.\overline{pm}^2 = m.\overline{cp}^2 + m.\overline{cm}^2 - 2m.ef.cn - 2m.pf.mn,$

ebenso $m'.\overline{pm'}^2 = m'.\overline{cp}^2 + m'.\overline{cm'}^2 + m'.cf.cn' - 2m'.pf.m'n'$

$m''.\overline{pm''}^2 = m''.\overline{cp}^2 + m''.\overline{cm''}^2 - 2m''.ef.cn'' - 2m''.pf.m''n''.$

Man addire dieſe Ausdrücke; ſo giebt die Summe der vor dem Gleichheitszeichen ſtehenden Glieder die Summe

der Produkte der Massen in die Quadrate ihrer Abstände von einer durch den Schwerpunkt p gehenden mit der Axe ce des Schwungs parallelen Axe, welche Summe mit S' bezeichnet werde. Die Summe der ersten Glieder hinter dem Gleichheitszeichen giebt die Summe der Produkte der Massen in das Quadrat des Abstands cp des Schwerpunkts von der Axe ce des Schwungs, oder $M.\overline{cp}^2$. Die Summe der zweyten Glieder giebt die Summe S der Produkte der Massen in die Quadrate ihrer Abstände von der Axe des Schwungs. Die Summe der dritten Glieder giebt das Produkt von $2cf$ in die Summe der Produkte $m.cn, m'.cn', m''.cn''$, welche vermöge der Eigenschaften des Schwerpunkts $= M.cf$ ist, und ebenso giebt die Summe der vierten Glieder das Produkt von $2pf$ in $M.pf$. Daher ist

$$\begin{aligned} S' &= M.\overline{cp}^2 + S - 2M.\overline{cf}^2 - 2M.\overline{pf}^2 \\ &= M.\overline{cp}^2 + S - 2M.\overline{cp}^2, \text{ (weil } \overline{cf}^2 + \overline{pf}^2 = \overline{cp}^2\text{)} \\ &= S - M.\overline{cp}^2 \end{aligned}$$

oder 1.) $S = + M.\overline{cp}^2 + S'$.

Hieraus folgt vermöge §. 263. n. 3.

2.) $co = cp + \frac{S'}{M.cp}$.

Wenn man also die gerade Linie cp, welche durch den Schwerpunkt p des zusammengesetzten Pendels auf die Schwingungsaxe ce senkrecht gezogen wird, so über p hinaus verlängert, daß $po = \frac{S'}{M.cp}$ wird; so ist co die Länge des einfachen Pendels, welches mit dem zusammengesetzten seine Schwingungen in gleichen Zeiten macht. Diesen Endpunkt o des einfachen Pendels nennt man den **Mittelpunkt des Schwungs** (centrum oscillationis) des zusammengesetzten Pendels, und den Punkt c den **Aufhängungspunkt** (centrum suspensionis). Man ziehe in der Ebene des Schwungs durch den Schwerpunkt p die Parallele pv mit ot, welche der ct in v begegne; so ist die Geschwindigkeit pv des Schwerpunkts in demselben Verhältniß kleiner als die Geschwindigkeit ot des Mittelpunkts des Schwungs, in welchem cp kleiner ist als co. Die Schwere des ganzen Sy-

stems der mit einander verbundenen Massen, welche man sich in dem Schwerpunkt p desselben vereinigt denken kann, theilt also diesem Punkt nicht diejenige Geschwindigkeit mit, welche sie erzeugen würde, wenn alle Punkte des Systems nach parallelen Richtungen sich fortbewegen könnten, und die Bewegung ist so beschaffen, als ob dieselbe Kraft, welche vorher auf die Masse M wirkte, jetzt auf eine in dem Verhältniß von $ot : pv$ größere Masse wirkte (§. 262. n. 4.). Es verhält sich aber $ot : pv = eo : ep = S : M.ep^2$ (§. 263. n. 3.), und daher nennt man die Summe S der Produkte aller der kleinen Massen eines Körpers in die Quadrate ihrer Abstände von einer mit dem Körper verbundenen Axe das Moment der Trägheit oder der Masse (momentum inertiæ s. massæ) des Körpers in Beziehung auf diese Axe.

Man erhält also die Länge des einfachen Pendels, dessen Schwingungen mit den Schwingungen eines gegebenen festen Körpers um eine gegebene Axe von gleicher Dauer sind, wenn man das Moment der Trägheit dieses Körpers um die Schwingungsaxe mit dem Produkt aus der Masse des Körpers in den Abstand seines Schwerpunkts von eben dieser Axe dividirt (§. 263. n. 3.). Nach n. 3. des gegenwärtigen §. erhält man auch den Ueberschuß der Länge des einfachen Pendels über den Abstand des Schwerpunkts des zusammengesetzten Pendels von der Axe des Schwungs, wenn man das Moment der Trägheit des Körpers in Beziehung auf eine durch seinen Schwerpunkt gehende mit der Axe des Schwungs parallel laufenden Axe, mit dem Produkt aus der Masse des Körpers in den Abstand seines Schwerpunkts von der Axe des Schwungs dividirt, woraus sich wiederum die Länge des einfachen Pendels ergiebt.

Man dividire die Summe S der Produkte aller der kleinen Massen in die Quadrate ihrer Abstände von der Axe des Schwungs mit der Summe M dieser Massen oder mit der Masse des Körpers, und setze den Quotienten $= h^2$; so ist das Moment der Trägheit des Körpers in Beziehung auf die Axe des Schwungs $= M.h^2$. Eben so ist, wenn man $\frac{S}{M} = h^2$ setzt, das Moment der Trägheit des Körpers

in Beziehung auf eine durch seinen Schwerpunkt gehende mit der Axe des Schwungs parallel laufende Axe $= M.k^2$. Setzt man nun den Abstand des Schwerpunkts des Körpers von der Axe des Schwungs $= f$, und den Abstand des Mittelpunkts des Schwungs von eben dieser Axe oder die Länge des einfachen Pendels $= l$; so wird

3.) $l = \frac{M.k^2}{Mf}$ (§. 263. n. 3.), $= \frac{k^2}{f}$

und 4.) $l = f + \frac{M.k^2}{Mf}$ (n. 2. d. gegenw. §.), $= f + \frac{k^2}{f}$.

Der Mittelpunkt des Schwungs fällt also desto näher zu dem Schwerpunkt, je kleiner k^2, oder je kleiner das Moment der Trägheit des zusammengesetzten Pendels in Beziehung auf die durch den Schwerpunkt gehende Axe ist.

Aus n. 4. folgt $fl = f^2 + k^2$, also ist

5.) $f(l-f) = k^2$.

Mithin ist für alle einander parallele Schwingungsaxen eines Körpers das Rechteck aus den Abständen seines Schwerpunkts von der Axe des Schwungs und dem Schwingungspunkt einer gegebenen Größe gleich.

Aus n. 1. dieses §. folgt $Mh^2 = Mf^2 + M.k^2$, oder

6.) $k^2 = f^2 + k^2$.

Man erhält also das Moment der Trägheit eines Körpers in Beziehung auf eine gegebene nicht durch seinen Schwerpunkt gehende Axe, wenn man zu seinem Moment der Trägheit für eine durch seinen Schwerpunkt gehende mit der gegebenen parallel laufende Axe das Produkt aus seiner Masse in das Quadrat des Abstands seines Schwerpunkts von der gegebenen Axe hinzufügt.

§. 265. Bey der Bestimmung des Moments der Trägheit eines Systems mehrerer mit einander verbundener Massen hat man in dem 263sten §. die Massen m, m', u. s. w. so klein angenommen, daß sie als Punkte können betrachtet werden. Nun sey aber eine Masse M gleichförmig auf der geraden Linie CA (Fig. 100.) verbreitet, so daß, wenn man die CA in a, b, c in eine beliebige Anzahl gleicher Thei-

le theilt, alle dieſe Theilchen gleiche Gewichte haben. Man ſetze jedes der einander gleichen Theilchen, in welche die Maſſe M durch die Theilung der geraden Linie CA getheilt wird, $= m$; ſo wird das Moment der Trägheit des erſten Theilchens in Beziehung auf eine durch C gehende auf CA ſenkrechte Axe > 0 aber $< m.\overline{Ca}^2$, das Moment der Trägheit des zweyten $> m.\overline{Ca}^2$, aber $< m.\overline{Cb}^2$, u. ſ. w. das Moment der Trägheit des letzten $> m.\overline{Cc}^2$, aber $< m.\overline{CA}^2$ ſeyn. Man ziehe durch C eine gerade Linie CB unter einem beliebigen ſpitzen Winkel mit CA, und errichte in den Punkten a, b, c, A die Perpendickel ae, bf, cg, AB auf AC, welche der CB in e, f, g, B begegnen. In einer durch den Punkt A auf CA ſenkrecht gelegten Ebene denke man ſich ein Dreyeck verzeichnet, welches die gerade Linie AB zu einer ſeiner Seiten habe, und auf dieſem Dreyeck als Grundfläche eine Pyramide errichtet, deren Spitze in C falle. Auf eben dieſer Grundfläche ſey ein gerade ſtehendes Prisma AD errichtet, welches mit der Pyramide einerley Höhe AC habe. Durch die Punkte a, b, c ſeyen die Ebenen aa', bb', cc' mit der Grundfläche AB parallel gelegt; ſo werden die Durchſchnitte dieſer Ebenen mit den Seitenflächen der Pyramide Dreyecke ſeyn, welche der Grundfläche AB ähnlich ſind, und ähnlich liegen, die Durchſchnitte derſelben mit den Seitenflächen des Prismas aber werden der Grundfläche AB gleiche Dreyecke ſeyn, und das Prisma wird dadurch in ebenſo viele gleiche Prismen Ca', ab' u. ſ. w. getheilt werden, als die CA gleiche Theile enthält. Endlich denke man ſich die Prismen ad, be u. ſ. w. um, und die Prismen be, cf u. ſ. w. in die Pyramide beſchrieben. Man ſetze die Summe der letzteren $= P$; ſo wird, wenn das letzte in die Pyramide beſchriebene Prisma $Ag = p$ geſetzt wird, die Summe der um die Pyramide beſchriebenen $= P + p$ ſeyn. Da nun $Ca : CA = ae : AB$; ſo verhält ſich $\overline{Ca}^2 : \overline{CA}^2 = \overline{ae}^2 : \overline{AB}^2 =$ Fläche ae : Fläche AB (VI, 19.), und daher $m.\overline{Ca}^2 : m\,\overline{CA}^2 =$ Ca. Fläche ae : Ca. Fläche AB

= Prisma ad : Prisma Ca'

ebenſo $m.\overline{Cb}^2 : m.\overline{CA}^2 =$ Prisma af : Prisma ab'

$$\vdots \quad : \quad \vdots \quad = \quad \vdots \quad : \quad \vdots$$

$m.\overline{CA}^2 : m.\overline{CA}^2 =$ Prisma cB : Prisma cB

folglich verhält ſich (V, 24. Coroll.) $m.\overline{Ca}^2 + m.\overline{Cb}^2 + \cdots + m.\overline{CA}^2 : M.\overline{CA}^2 = P + p$: Prisma AD. Ebenſo findet ſich $m.0 + m.\overline{Ca}^2 + \cdots + m.\overline{Cc}^2 : M.\overline{CA}^2 = P$: Prisma AD. Mithin iſt, wenn man das Moment der Trägheit der Linie CA mit $M.h^2$ bezeichnet,

1.) $\left.\begin{matrix} Mh^2 : M.\overline{CA}^2 \\ h^2 : \overline{CA}^2 \end{matrix}\right\} < P + p$: Prisma AD

2.) $h^2 : \overline{CA}^2 > P$: Prisma AD

Es iſt aber $P + p$ größer und P kleiner als der Inhalt der Pyramide; folglich iſt das Verhältniß von h^2 zu dem Quadrat von $\overline{CA}^2$ beſtändig kleiner als ein Verhältniß welches größer iſt, als das Verhältniß des Inhalts der Pyramide zu dem Inhalt eines mit der Pyramide einerley Grundfläche und Höhe habenden Preißmas, oder als das Verhältniß von 1 : 3 (XII, 7.), aber beſtändig größer als ein Verhältniß, welches kleiner iſt als das Verhältniß von 1 : 3. Da nun p durch die Vergrößerung der Anzahl der gleichen Theile von CA kleiner gemacht werden kann, als jeder gegebene Raum; ſo folgt auf ähnliche Art, wie §. 247.

$h^2 : \overline{CA}^2 = 1 : 3$, und daher iſt das Moment der Trägheit der Linie CA um die durch C gehende auf CA ſenkrechte Axe $= \frac{1}{3} M.\overline{CA}^2$. Auf ähnliche Art kann man von Linien auf Flächen, und von Flächen auf Körper übergehen, indem man die Beſtimmung des Moments der Trägheit auf die Beſtimmung des Inhalts gewißer Körper zurückführt, deren Figur von der Figur des gegebenen Körpers abhängt *). Die algebraiſche Auflöſung dieſer Aufgabe erfordert höhere Analyſis.

Die gerade Linie CA ſchwinge um den Punkt C als ein Pendel. Da ihr Schwerpunkt in ihre Mitte fällt; ſo iſt der Abſtand CO des Mittelpunkts des Schwungs von dem

*) *Hugenii* Horologium oscillatorium. P. IV.

Aufhängungspunkt $C = \frac{\frac{1}{3}\overline{CA}^2}{\frac{1}{2}CA}$ (§. 264. n. 3.) $= \frac{2}{3}CA$. Eine cylindrische oder prismatische gleichförmig dichte an dem einen ihrer Endpunkte aufgehängte Stange nähert sich diesem zusammengesetzten Pendel desto mehr, je geringer ihre Dicke ist.

Das Moment der Trägheit einer Kugel, deren Halbmesser $= r$ und deren Masse $= M$ ist, findet man $= \frac{2}{5} M.r^2$ *). Ihr Schwerpunkt fällt in ihren Mittelpunkt, und daher ist, wenn die Kugel an einen feinen Faden aufgehängt wird, dessen Gewicht man in Vergleichung mit dem Gewicht der Kugel vernachläßigen kann, und der Abstand des Mittelpunkts der Kugel von dem Aufhängungspunkt $= f$ gesetzt wird, die Länge des einfachen Pendels, welches mit diesem zusammengesetzten Pendel seine Schwingungen in gleicher Zeit vollbringt, $= f + \frac{2}{5}\frac{r^2}{f}$ (§. 264. n. 4.).

§. 266. Es sey das Moment der Trägheit eines Körpers (Fig. 101.) für eine durch seinen Schwerpunkt p gehende Axe $= Mk^2$, und A der Mittelpunkt des Schwungs um eine durch C gehende mit jener parallel laufende Axe; so ist

1.) $CA = Cp + \frac{k^2}{Cp}$ (§. 264. n. 4.)

Man nehme in der Ebene des Schwungs $pc = pA$, und lasse den Körper um eine durch c gehende Axe schwingen, welche mit der ersteren durch den Punkt C gehenden parallel sey. Der Mittelpunkt des Schwungs falle jetzt in a; so ist $ca = cp + \frac{k^2}{cp}$ (§. 264. n. 4.), $= pA + \frac{k^2}{pA}$ (weil $cp = pA$), $= pA + Cp$ (weil $Cp.pA = k^2$ (§. 264. n. 5.)) $= CA$. Mithin sind die Schwingungen um die einander parallen durch C und c gehende Axen von gleicher Dauer. Namentlich können der Aufhängungspunkt und der Mittelpunkt des Schwungs mit einander verwechselt werden, und die Schwingungen um die durch diese Punkte gehende einander parallele Axen bleiben von gleicher Dauer **).

*) Ebendaselbst Prop. XXII.
**) — — Prop. XX.

Umgekehrt, wenn um zwey einander parallele durch beliebige Punkte C und c eines Körpers gehende Axen die Schwingungen von gleicher Dauer sind; so muß, wenn die Mittelpunkte des Schwungs beziehungsweise in A und a fallen, $CA = ca$, mithin nach §. 264. n. 4.

$$Cp + \frac{k^2}{Cp} = cp + \frac{k^2}{cp}$$

$$cp.\overline{Cp}^2 + cp.k^2 = \overline{cp}^2.Cp + Cp.k^2$$

$cp.Cp\,(Cp - cp) = (Cp - cp)\,k^2$, und daher entweder $Cp = cp$, oder $cp.Cp = k^2$ seyn. Weiß man nun, daß Cp und cp ungleich sind; so ist $cp \times Cp = k^2$, $cp = \frac{k^2}{Cp}$, und $Cp + cp = Cp + \frac{k^2}{Cp}$ = der Länge des einfachen um C schwingenden Pendels, welches mit dem zusammengesetzten seine Schwingungen in gleichen Zeiten macht (§. 264. n. 4.). Insbesondere ist, wenn der Schwerpunkt eines Körpers in die Ebene zweyer einander parallelen Schwingungsaxen fällt, aber ungleich von denselben absteht, und die Schwingungen des Körpers um diese Axen von gleicher Dauer sind, die Länge des correspondirenden einfachen Pendels dem Abstand der Schwingungsaxen gleich. Demnach kann man die Länge des einfachen mit einem gegebenen zusammengesetzten seine Schwingungen in gleichen Zeiten vollbringenden Pendels durch Versuche bestimmen. An einer cylindrischen oder prismatischen Stange CA (Fig. 102.) seyen bey C und c zwey keilförmige Zapfen angebracht, deren Schneiden gegen einander gekehrt, auf der Stange senkrecht und einander parallel seyen. Die eine befinde sich an dem Ende C der Stange, die andere in c um etwas über $\frac{2}{3}$ der Länge der Stange von C entfernt, so daß der Mittelpunkt o des Schwungs um die Schneide C zwischen C und c falle (§. 265.). Auf dem übrigen Theil cA der Stange lasse sich ein kleines Gewicht n hin und her schieben. Nun kann man durch die Verminderung der Masse der Stange auf der einen oder der anderen Seite es leicht dahin bringen, daß, wenn dieses Pendel mit seiner Schneide C aufgehängt wird, ein von dieser herabhängendes Lot auf die Schneide c trifft, mithin der Schwerpunkt des Pendels in die Ebene der Schwin-

gungs-

gungsaxen fällt. Durch das Verschieben des Gewichts *n* kann man ferner machen, daß der Mittelpunkt der Schwingung um *C* in die Schneide *c* fällt, welches man daran erkennt, wenn die Schwingungen um *C* und *c* isochronisch sind. Alsdenn ist der Abstand der Schneiden der Länge des einfachen Pendels gleich, welches mit diesem zusammengesetzten isochronisch ist.

§. 267. Weil die Schwingungszeiten eines in Kreisbogen schwingenden Pendels von einer desto größeren Dauer sind, je größere Schwingungen es macht (§. 261.); so muß man, um verschiedene Pendel mit einander vergleichen zu können, aus den beobachteten Schwingungszeiten diejenige ableiten, welche man beobachtet haben würde, wenn die Pendel ähnliche Kreisbogen beschrieben hätten. Man ist übereingekommen, unter der Schwingungszeit eines Pendels diejenige zu verstehen, welcher sich die Schwingungszeiten eines Pendels desto mehr nähern, je kleiner sie werden, oder die Zeit, in welcher ein Pendel eine Schwingung in einer Cykloide machen würde, deren beschreibender Kreis die halbe Länge des Pendels zum Durchmesser hat. Diese Zeit wird aus der beobachteten Schwingungszeit mittelst der Größe der Schwingungen gefunden, wenn man die beobachtete Zeit einer Schwingung mit der §. 201. angegebenen durch *S* bezeichneten Reihe dividirt. Aus der so reducirten Zeit und der Länge des einfachen Pendels ergiebt sich sodenn nach der Proportion n. 3. §. 259. die Länge eines einfachen Pendels, welches seine Schwingungen in einer gegebenen Zeit, z. B. in einer Sekunde mittlerer Sonnenzeit macht. Endlich muß noch eine kleine Verbesserung wegen des Widerstands der Luft angebracht werden, welcher die Bewegungen des Pendels verzögert, so daß die beobachtete Pendellänge größer ist, als diejenige, welche man im leeren Raum würde beobachtet haben.

Bouguer setzt die Länge des auf den leeren Raum reducirten einfachen Sekundenpendels in Paris = 440,67 par. Linien, unter dem Aequator aber = 439,21 Linien. Das Pendel, welches er gebrauchte, bestund aus einer kupfernen

durch den Schwerpunkt p gehenden geraden Linie cb die co der Länge des einfachen Pendels gleich genommen, welches mit dem zusammengesetzten seine Schwingungen in gleichen Zeiten macht; so muß, wenn man durch o die go mit ca parallel, und den Linien mh, oder $m'h'$ u. s. w. gleich nimmt, und die Kraft der Schwere go in die auf co senkrechte ot, und die nach c wirkende or zerfällt, die Geschwindigkeit ot, welche die Schwere einer einzelnen in dem Punkt o befindlichen Masse nach der Richtung ot der Bewegung mittheilen würde, dieselbe seyn, welche eben dieser Punkt durch die Wirkung der Schwere auf das ganze System der mit einander verbundenen Massen erhält.

Man mache den Winkel $mcs = oct$; so wird, weil die Massen mit einander verbunden sind, die Geschwindigkeit der Masse $m = ms$ seyn, welche sich zu ot verhalten wird, wie cm zu co. Ebenso wird, wenn $m's'$, $m''s''$ die Geschwindigkeiten der übrigen Massen sind, $m's' : m''s'' = cm' : cm''$ seyn. Die Massen m, m' verlieren an den Geschwindigkeiten mt, $m't'$, welche ihnen die Schwere mitzutheilen strebt, die Geschwindigkeiten st, $s't'$, und die Masse m'' gewinnt die Geschwindigkeit $t''s''$; folglich muß wie in dem zuerst betrachteten Fall vermöge §. 262. n. 6. und des Gesetzes des Hebels

$$cm.m.st + cm'.m'.s't' = cm''.m''.s''t'',$$

oder $cm.m.(mt - ms) + cm'.m'(m't' - m's') = cm''.m''(m''s'' - m''t'')$,

mithin 1.) $cm.m.mt + cm'.m'.m't' + cm''.m''.m''t''$
$= cm.m.ms + cm'.m'.m's' + cm''.m''.m''s''$ seyn.

Man fälle aus den Punkten m, m', p, o und m'' die Perpendickel mn, $m'n'$ u. s. w. auf ca; so sind die Dreyecke mht und cmn, $m'h't'$ und $cm'n'$ u. s. w. ähnlich, und es verhält sich

$$mt : \left\{ \begin{matrix} mh \\ go \end{matrix} \right\} = mn : cm.$$

Daher ist $cm.m.mt = mn.m.go$
ebenso $cm'.m'.m't' = m'n'.m'.go$
$cm''.m''.m''t'' = m''n''.m''.go$;

folglich 2.) $cm.m,mt + cm'.m'.m't' + cm''.m''.m''t''$
$= (mn.m + m'n'.m' + m''n''.m'')go$,
$= (m + m' + m'')pf.go$, weil p der Schwerpunkt ist
$= M.cp.ot$, weil $go : ot = co : ol = cp : pf$.
Ferner verhält sich $cm : ms = co : ot$,

also auch $m.\overline{em}^2 : cm.m.ms = co : os$

ebenso $m'.\overline{cm'}^2 : cm'.m'.m's' = co : os$

$m''.\overline{cm''}^2 : cm''.m''.m''s'' = co : os.$

Man setze die Summe der ersten Glieder $= S$; so verhält sich, weil die Summe der zweyten Glieder $= M.cp.os$ ist (n. 1. und 2.),

$S : M.cp.os = co : os$ (V, 12.)

$= M.cp.co : M.cp.os$

Folglich ist $M.cp.co = S$,

oder 3.) $co = \frac{S}{M.cp}$.

Endlich befinde sich eine Masse i ausserhalb der Ebene acb des Schwungs. Man fälle von ihr ein Perpendickel im auf die Ebene des Schwungs, welches dieser Ebene in m begegne; so wird die Geschwindigkeit von i beständig der Geschwindigkeit von m gleich seyn, und die Schwere auf die Masse i mit derselben Stärke wirken, mit welcher sie auf die Masse m wirkt. Mithin kann man statt der Masse i eine ihr gleiche in m substituiren, und die in n. 3. gegebene Regel zur Bestimmung der Länge co des einfachen Pendels ist auch auf diesen Fall anwendbar, wenn man unter cm, cm' u. s. w. die senkrechten Abstände der Massen von der Axe ce des Schwungs, und unter cp den senkrechten Abstand des Schwerpunkts aller Massen von eben dieser Axe versteht.

§. 264. Der Abstand des Punkts m von dem Schwerpunkt p ist der Hypotenuse eines rechtwinklichten Dreyecks gleich, dessen Seiten um den rechten Winkel $cf - cn$ und $mn - pf$ sind. Folglich ist (I, 47.)

$\overline{pm}^2 = (ef - cn)^2 + (mn - pf)^2$,

$= \overline{ef}^2 - 2ef.cn + \overline{cn}^2 + \overline{mn}^2 - 2pf.mn + \overline{pf}^2$

$= \overline{cp}^2 + \overline{cm}^2 - 2cf.cn - 2pf.mn$;

also $m.\overline{pm}^2 = m.\overline{cp}^2 + m.\overline{cm}^2 - 2m.ef.cn - 2m.pf.mn$,

ebenso $m'.\overline{pm'}^2 = m'.\overline{cp}^2 + m'.\overline{cm'}^2 + m'.cf.cn' - 2m'.pf.m'n'$

$m''.\overline{pm''}^2 = m''.\overline{cp}^2 + m''.\overline{cm''}^2 - 2m''.ef.cn'' - 2m''.pf.m''n''$.

Man addire diese Ausdrücke; so giebt die Summe der vor dem Gleichheitszeichen stehenden Glieder die Summe

der Produkte der Massen in die Quadrate ihrer Abstände von einer durch den Schwerpunkt p gehenden mit der Axe ce des Schwungs parallelen Axe, welche Summe mit S' bezeichnet werde. Die Summe der ersten Glieder hinter dem Gleichheitszeichen giebt die Summe der Produkte der Massen in das Quadrat des Abstands cp des Schwerpunkts von der Axe ce des Schwungs, oder $M.\overline{cp}^2$. Die Summe der zweyten Glieder giebt die Summe S der Produkte der Massen in die Quadrate ihrer Abstände von der Axe des Schwungs. Die Summe der dritten Glieder giebt das Produkt von $2cf$ in die Summe der Produkte $m.cn, m'.cn', m''.cn''$, welche vermöge der Eigenschaften des Schwerpunkts $= M.cf$ ist, und ebenso giebt die Summe der vierten Glieder das Produkt von $2pf$ in $M.pf$. Daher ist

$$S' = M.\overline{cp}^2 + S - 2M.\overline{cf}^2 - 2M.\overline{pf}^2$$
$$= M.\overline{cp}^2 + S - 2M.\overline{cp}^2, \text{ (weil } \overline{cf}^2 + \overline{pf}^2 = \overline{cp}^2\text{)}$$
$$= S - M.\overline{cp}^2$$

oder 1.) $S = + M.\overline{cp}^2 + S'$.

Hieraus folgt vermöge §. 263. n. 3.

2.) $co = cp + \frac{S'}{M.\overline{cp}}$.

Wenn man also die gerade Linie cp, welche durch den Schwerpunkt p des zusammengesetzten Pendels auf die Schwingungsaxe ce senkrecht gezogen wird, so über p hinaus verlängert, daß $po = \frac{S'}{M.cp}$ wird; so ist co die Länge des einfachen Pendels, welches mit dem zusammengesetzten seine Schwingungen in gleichen Zeiten macht. Diesen Endpunkt o des einfachen Pendels nennt man den Mittelpunkt des Schwungs (centrum oscillationis) des zusammengesetzten Pendels, und den Punkt c den Aufhängungspunkt (centrum suspensionis). Man ziehe in der Ebene des Schwungs durch den Schwerpunkt p die Parallele pv mit ot, welche der ct in v begegne; so ist die Geschwindigkeit pv des Schwerpunkts in demselben Verhältniß kleiner als die Geschwindigkeit ot des Mittelpunkts des Schwungs, in welchem cp kleiner ist als co. Die Schwere des ganzen Sy-

ſtems der mit einander verbundenen Maſſen, welche man ſich in dem Schwerpunkt p deſſelben vereinigt denken kann, theilt alſo dieſem Punkt nicht diejenige Geſchwindigkeit mit, welche ſie erzeugen würde, wenn alle Punkte des Syſtems nach parallelen Richtungen ſich fortbewegen könnten, und die Bewegung iſt ſo beſchaffen, als ob dieſelbe Kraft, welche vorher auf die Maſſe M wirkte, jetzt auf eine in dem Verhältniß von $ot : pv$ größere Maſſe wirkte (§. 262. n. 4.). Es verhält ſich aber $ot : pv = co : cp = S : M.cp^2$ (§. 263. n. 3.), und daher nennt man die Summe S der Produkte aller der kleinen Maſſen eines Körpers in die Quadrate ihrer Abſtände von einer mit dem Körper verbundenen Axe das Moment der Trägheit oder der Maſſe (momentum inertiæ s. massæ) des Körpers in Beziehung auf dieſe Axe.

Man erhält alſo die Länge des einfachen Pendels, deſſen Schwingungen mit den Schwingungen eines gegebenen feſten Körpers um eine gegebene Axe von gleicher Dauer ſind, wenn man das Moment der Trägheit dieſes Körpers um die Schwingungsaxe mit dem Produkt aus der Maſſe des Körpers in den Abſtand ſeines Schwerpunkts von eben dieſer Axe dividirt (§. 263. n. 3.). Nach n. 3. des gegenwärtigen §. erhält man auch den Ueberſchuß der Länge des einfachen Pendels über den Abſtand des Schwerpunkts des zuſammengeſetzten Pendels von der Axe des Schwungs, wenn man das Moment der Trägheit des Körpers in Beziehung auf eine durch ſeinen Schwerpunkt gehende mit der Axe des Schwungs parallel laufenden Axe, mit dem Produkt aus der Maſſe des Körpers in den Abſtand ſeines Schwerpunkts von der Axe des Schwungs dividirt, woraus ſich wiederum die Länge des einfachen Pendels ergiebt.

Man dividire die Summe S der Produkte aller der kleinen Maſſen in die Quadrate ihrer Abſtände von der Axe des Schwungs mit der Summe M dieſer Maſſen oder mit der Maſſe des Körpers, und ſetze den Quotienten $= h^2$; ſo iſt das Moment der Trägheit des Körpers in Beziehung auf die Axe des Schwungs $= M.h^2$. Eben ſo iſt, wenn man $\frac{S'}{M} = k^2$ ſetzt, das Moment der Trägheit des Körpers

in Beziehung auf eine durch seinen Schwerpunkt gehende mit der Axe des Schwungs parallel laufende Axe $= M.k^2$. Setzt man nun den Abstand des Schwerpunkts des Körpers von der Axe des Schwungs $= f$, und den Abstand des Mittelpunkts des Schwungs von eben dieser Axe oder die Länge des einfachen Pendels $= l$; so wird

3.) $l = \frac{M.k^2}{Mf}$ (§. 263. n. 3.), $= \frac{k^2}{f}$

und 4.) $l = f + \frac{M.k^2}{M.f}$ (n. 2. d. gegenw. §.), $= f + \frac{k^2}{f}$.

Der Mittelpunkt des Schwungs fällt also desto näher zu dem Schwerpunkt, je kleiner k^2, oder je kleiner das Moment der Trägheit des zusammengesetzten Pendels in Beziehung auf die durch den Schwerpunkt gehende Axe ist.

Aus n. 4. folgt $fl = f^2 + k^2$, also ist

5.) $f(l-f) = k^2$.

Mithin ist für alle einander parallele Schwingungsaxen eines Körpers das Rechteck aus den Abständen seines Schwerpunkts von der Axe des Schwungs und dem Schwingungspunkt einer gegebenen Größe gleich.

Aus n. 1. dieses §. folgt $Mh^2 = Mf^2 + M.k^2$, oder

6.) $h^2 = f^2 + k^2$.

Man erhält also das Moment der Trägheit eines Körpers in Beziehung auf eine gegebene nicht durch seinen Schwerpunkt gehende Axe, wenn man zu seinem Moment der Trägheit für eine durch seinen Schwerpunkt gehende mit der gegebenen parallel laufende Axe das Produkt aus seiner Masse in das Quadrat des Abstands seines Schwerpunkts von der gegebenen Axe hinzufügt.

§. 265. Bey der Bestimmung des Moments der Trägheit eines Systems mehrerer mit einander verbundener Massen hat man in dem 263sten §. die Massen m, m', u. s. w. so klein angenommen, daß sie als Punkte können betrachtet werden. Nun sey aber eine Masse M gleichförmig auf der geraden Linie CA (Fig. 100.) verbreitet, so daß, wenn man die CA in a, b, c in eine beliebige Anzahl gleicher Thei-

le theilt, alle dieſe Theilchen gleiche Gewichte haben. Man ſetze jedes der einander gleichen Theilchen, in welche die Maſſe M durch die Theilung der geraden Linie CA getheilt wird, $= m$; ſo wird das Moment der Trägheit des erſten Theilchens in Beziehung auf eine durch C gehende auf CA ſenkrechte Axe > 0 aber $< m.\overline{Ca}^2$, das Moment der Trägheit des zweyten $> m.\overline{Ca}^2$, aber $< m.\overline{Cb}^2$, u. ſ. w. das Moment der Trägheit des letzten $> m.\overline{Cc}^2$, aber $< m.\overline{CA}^2$ ſeyn. Man ziehe durch C eine gerade Linie CB unter einem beliebigen ſpitzen Winkel mit CA, und errichte in den Punkten a, b, c, A die Perpendickel ae, bf, cg, AB auf AC, welche der CB in e, f, g, B begegnen. In einer durch den Punkt A auf CA ſenkrecht gelegten Ebene denke man ſich ein Dreyeck verzeichnet, welches die gerade Linie AB zu einer ſeiner Seiten habe, und auf dieſem Dreyeck als Grundfläche eine Pyramide errichtet, deren Spitze in C falle. Auf eben dieſer Grundfläche ſey ein gerade ſtehendes Prisma AD errichtet, welches mit der Pyramide einerley Höhe AC habe. Durch die Punkte a, b, c ſeyen die Ebenen aa', bb', cc' mit der Grundfläche AB parallel gelegt; ſo werden die Durchſchnitte dieſer Ebenen mit den Seitenflächen der Pyramide Dreyecke ſeyn, welche der Grundfläche AB ähnlich ſind, und ähnlich liegen, die Durchſchnitte derſelben mit den Seitenflächen des Prismas aber werden der Grundfläche AB gleiche Dreyecke ſeyn, und das Prisma wird dadurch in ebenſo viele gleiche Prismen Ca', ab' u. ſ. w. getheilt werden, als die CA gleiche Theile enthält. Endlich denke man ſich die Prismen ad, be u. ſ. w. um, und die Prismen be, cf u. ſ. w. in die Pyramide beſchrieben. Man ſetze die Summe der letzteren $= P$; ſo wird, wenn das letzte in die Pyramide beſchriebene Prisma $Ag = p$ geſetzt wird, die Summe der um die Pyramide beſchriebenen $= P + p$ ſeyn. Da nun $Ca : CA = ae : AB$; ſo verhält ſich $\overline{Ca}^2 : \overline{CA}^2 = \overline{ae}^2 : \overline{AB}^2 =$ Fläche ae : Fläche AB (VI, 19.), und daher $m.\overline{Ca}^2 : m.\overline{CA}^2 =$ Ca. Fläche ae : Ca. Fläche AB

= Prisma ad : Prisma Ca'

ebenso $m.\overline{Cb}^2 : m.\overline{CA}^2 =$ Prisma af : Prisma ab'

$$\vdots \quad \vdots \quad \vdots \quad \vdots$$

$m.\overline{CA}^2 : m.\overline{CA}^2 =$ Prisma cB : Prisma cB

folglich verhält sich (V, 24. Coroll.) $m.\overline{Ca}^2 + m\,\overline{C}^2 + \cdots + m.\overline{CA}^2 : M.\overline{CA}^2 = P + p$: Prisma AD. Ebenso findet sich $m.0 + m.\overline{Ca}^2 + \cdots + m.\overline{Cc}^2 : M\,\overline{CA}^2 = P$: Prisma AD. Mithin ist, wenn man das Moment der Trägheit der Linie CA mit $M.h^2$ bezeichnet,

1.) $\left.\begin{matrix} Mh^2 : M.\overline{CA}^2 \\ h^2 : \overline{CA}^2 \end{matrix}\right\} < P + p$: Prisma AD

2.) $h^2 : \overline{CA}^2 > P$: Prisma AD

Es ist aber $P + p$ größer und P kleiner als der Inhalt der Pyramide; folglich ist das Verhältniß von h^2 zu dem Quadrat von $\overline{CA}^2$ beständig kleiner als ein Verhältniß welches größer ist, als das Verhältniß des Inhalts der Pyramide zu dem Inhalt eines mit der Pyramide einerley Grundfläche und Höhe habenden Preißmas, oder als das Verhältniß von 1 : 3 (XII, 7.), aber beständig größer als ein Verhältniß, welches kleiner ist als das Verhältniß von 1 : 3. Da nun p durch die Vergrößerung der Anzahl der gleichen Theile von CA kleiner gemacht werden kann, als jeder gegebene Raum; so folgt auf ähnliche Art, wie §. 217.

$h^2 : \overline{CA}^2 = 1 : 3$, und daher ist das Moment der Trägheit der Linie CA um die durch C gehende auf CA senkrechte Axe $= \frac{1}{3} M.\overline{CA}^2$. Auf ähnliche Art kann man von Linien auf Flächen, und von Flächen auf Körper übergehen, indem man die Bestimmung des Moments der Trägheit auf die Bestimmung des Inhalts gewißer Körper zurückführt, deren Figur von der Figur des gegebenen Körpers abhängt *). Die algebraische Auflösung dieser Aufgabe erfordert höhere Analysis.

Die gerade Linie CA schwinge um den Punkt C als ein Pendel. Da ihr Schwerpunkt in ihre Mitte fällt; so ist der Abstand CO des Mittelpunkts des Schwungs von dem

*) *Hugenii* Horologium oscillatorium. P. IV.

Aufhängungspunkt $C = \frac{\frac{1}{3}\widetilde{CA}^2}{\frac{1}{2}CA}$ (§. 264. n. 3.) $= \frac{2}{3}CA$. Eine cylindrische oder prismatische gleichförmig dichte an dem einen ihrer Endpunkte aufgehängte Stange nähert sich diesem zusammengesetzten Pendel desto mehr, je geringer ihre Dicke ist.

Das Moment der Trägheit einer Kugel, deren Halbmesser $= r$ und deren Masse $= M$ ist, findet man $= \frac{2}{5} M.r^2$ *). Ihr Schwerpunkt fällt in ihren Mittelpunkt, und daher ist, wenn die Kugel an einen feinen Faden aufgehängt wird, dessen Gewicht man in Vergleichung mit dem Gewicht der Kugel vernachläßigen kann, und der Abstand des Mittelpunkts der Kugel von dem Aufhängungspunkt $= f$ gesetzt wird, die Länge des einfachen Pendels, welches mit diesem zusammengesetzten Pendel seine Schwingungen in gleicher Zeit vollbringt, $= f + \frac{2}{5}\frac{r^2}{f}$ (§. 264. n. 4.).

§. 266. Es sey das Moment der Trägheit eines Körpers (Fig. 101.) für eine durch seinen Schwerpunkt p gehende Axe $= Mk^2$, und A der Mittelpunkt des Schwungs um eine durch C gehende mit jener parallel laufende Axe; so ist

1.) $CA = Cp + \frac{k^2}{Cp}$ (§. 264. n. 4.)

Man nehme in der Ebene des Schwungs $pc = pA$, und lasse den Körper um eine durch c gehende Axe schwingen, welche mit der ersteren durch den Punkt C gehenden parallel sey. Der Mittelpunkt des Schwungs falle jetzt in a; so ist $ca = cp + \frac{k^2}{cp}$ (§. 264. n. 4.), $= pA + \frac{k^2}{pA}$ (weil $cp = pA$), $= pA + Cp$ (weil $Cp.pA = k^2$ (§. 264. n. 5.)) $= CA$. Mithin sind die Schwingungen um die einander parallen durch C und c gehende Axen von gleicher Dauer. Namentlich können der Aufhängungspunkt und der Mittelpunkt des Schwungs mit einander verwechselt werden, und die Schwingungen um die durch diese Punkte gehende einander parallele Axen bleiben von gleicher Dauer **).

*) Ebendaselbst Prop. XXII.
**) — — Prop. XX.

Umgekehrt, wenn um zwey einander parallele durch beliebige Punkte C und c eines Körpers gehende Axen die Schwingungen von gleicher Dauer sind; so muß, wenn die Mittelpunkte des Schwungs beziehungsweise in A und a fallen, $CA = ca$, mithin nach §. 264. n. 4.

$$Cp + \frac{k^2}{Cp} = cp + \frac{k^2}{cp}$$

$$cp.\overline{Cp}^2 + cp.k^2 = \overline{cp}^2.Cp + Cp.k^2$$

$$cp.Cp\,(Cp - cp) = (Cp - cp)\,k^2, \text{ und daher}$$

entweder $Cp = cp$, oder $cp.Cp = k^2$ seyn. Weiß man nun, daß Cp und cp ungleich sind; so ist $cp \times Cp = k^2$, $cp = \frac{k^2}{Cp}$, und $Cp + cp = Cp + \frac{k^2}{Cp}$ = der Länge des einfachen um C schwingenden Pendels, welches mit dem zusammengesetzten seine Schwingungen in gleichen Zeiten macht (§. 264. n. 4.). Insbesondere ist, wenn der Schwerpunkt eines Körpers in die Ebene zweyer einander parallelen Schwingungsaxen fällt, aber ungleich von denselben absteht, und die Schwingungen des Körpers um diese Axen von gleicher Dauer sind, die Länge des correspondirenden einfachen Pendels dem Abstand der Schwingungsaxen gleich. Demnach kann man die Länge des einfachen mit einem gegebenen zusammengesetzten seine Schwingungen in gleichen Zeiten vollbringenden Pendels durch Versuche bestimmen. An einer cylindrischen oder prismatischen Stange Cn (Fig. 102.) seyen bey C und c zwey keilförmige Zapfen angebracht, deren Schneiden gegen einander gekehrt, auf der Stange senkrecht und einander parallel seyen. Die eine befinde sich an dem Ende C der Stange, die andere in c um etwas über $\frac{2}{3}$ der Länge der Stange von C entfernt, so daß der Mittelpunkt a des Schwungs um die Schneide C zwischen C und c falle (§. 265.). Auf dem übrigen Theil cA der Stange lasse sich ein kleines Gewicht n hin und her schieben. Nun kann man durch die Verminderung der Masse der Stange auf der einen oder der anderen Seite es leicht dahin bringen, daß, wenn dieses Pendel mit seiner Schneide C aufgehängt wird, ein von dieser herabhängendes Lot auf die Schneide c trifft, mithin der Schwerpunkt des Pendels in die Ebene der Schwin-

gungs-

gungsaxen fällt. Durch das Verschieben des Gewichts *n* kann man ferner machen, daß der Mittelpunkt der Schwingung um *C* in die Schneide *c* fällt, welches man daran erkennt, wenn die Schwingungen um *C* und *c* isochronisch sind. Alsdenn ist der Abstand der Schneiden der Länge des einfachen Pendels gleich, welches mit diesem zusammengesetzten isochronisch ist.

§. 267. Weil die Schwingungszeiten eines in Kreisbogen schwingenden Pendels von einer desto größeren Dauer sind, je größere Schwingungen es macht (§. 261.); so muß man, um verschiedene Pendel mit einander vergleichen zu können, aus den beobachteten Schwingungszeiten diejenige ableiten, welche man beobachtet haben würde, wenn die Pendel ähnliche Kreisbogen beschrieben hätten. Man ist übereingekommen, unter der Schwingungszeit eines Pendels diejenige zu verstehen, welcher sich die Schwingungszeiten eines Pendels desto mehr nähern, je kleiner sie werden, oder die Zeit, in welcher ein Pendel eine Schwingung in einer Cykloide machen würde, deren beschreibender Kreis die halbe Länge des Pendels zum Durchmesser hat. Diese Zeit wird aus der beobachteten Schwingungszeit mittelst der Größe der Schwingungen gefunden, wenn man die beobachtete Zeit einer Schwingung mit der §. 201. angegebenen durch *S* bezeichneten Reihe dividirt. Aus der so reducirten Zeit und der Länge des einfachen Pendels ergiebt sich sodenn nach der Proportion n. 3. §. 259. die Länge eines einfachen Pendels, welches seine Schwingungen in einer gegebenen Zeit, z. B. in einer Sekunde mittlerer Sonnenzeit macht. Endlich muß noch eine kleine Verbesserung wegen des Widerstands der Luft angebracht werden, welcher die Bewegungen des Pendels verzögert, so daß die beobachtete Pendellänge größer ist, als diejenige, welche man im leeren Raum würde beobachtet haben.

Bouguer setzt die Länge des auf den leeren Raum reducirten einfachen Sekundenpendels in Paris = 440,67 par. Linien, unter dem Aequator aber = 439,21 Linien. Das Pendel, welches er gebrauchte, bestund aus einer kupfernen

Kugel, welche an einem Faden von einer Aloeribbe hieng. Nach sehr genauen von Borda angestellten Versuchen ist die Länge des einfachen Decimalsekunden-Pendels in Paris $= 0^{me},741887$, woraus sich mittelst der Proportion n. 3. und des §. 144. angegebenen Verhältnißes der Decimalsekunde zu der Sexagesimalsekunde die Länge des gewöhnlichen Sekundenpendels $= (\frac{1000}{864})^2 . 0^{me},741887 = \frac{513074}{864} . 0,741887$ Toiſ. (§. 144.), $= \frac{513074}{864} . 0,741887$ par. Lin. $= 440,559$ Lin. ergiebt. Zu Formentera unter einer Breite von 38° 39′ 55″ fand man nach der Borda'schen Methode die Länge des einfachen Sekundenpendels (Decimalsek.) $= 0^{me},7412001$, welches für die Länge des gewöhnlichen Sekundenpendels unter dieser Breite 440,154 par. Lin. giebt. Setzt man die von Borda gefundene Länge des Sekundenpendels $= 1$; so ist die Länge des Sekundenpendels zu Formentera $= \frac{7412061}{7418870} = 0,99908$. Vergleicht man ebenso die an anderen Orten der Erde nach Bouguer's Methode gefundenen auf den leeren Raum reducirten Pendellängen mit der von eben diesem angegebenen Länge des Sekundenpendels in Paris; so erhält man folgende Tafel *)

Beobachter	Ort	Breite	Verhältn. d. Sek. Pend. zum pariser
Bouguer	Peru	0° 0′	0,99669
——	Portobello	9 34	0,99689
Le Gentil	Pondichery	11 56	0,99710
Campbell	Jamaica	18 0	0,99745
Bouguer	klein Goava	18 27	0,99728
de la Caille	Cap	33 55	0,99877
	Formentera	38 40	0,99908
Darquier	Toulouſe	43 36	0,99950
Liesganig	Wien	48 13	0,99987
Bouguer	Paris	48 50	1,00000
v. Zach	Gotha	50 56	1,00006
Graham	London	51 31	1,00018
Griſchow	Arensberg	58 15	1,00074
Mallet	Petersburg	59 56	1,00101
Maupertuis	Pello	66 48	1,00137
Mallet	Ponoi	67 5	1,00148

*) Mécanique céleste. T. II. L. III. n. 42. pag. 147.

Die vierte und die fünf letzten Pendellängen sind mittelst eines unveränderlichen Pendels durch die Beobachtung seiner Schwingungszeiten zu London und Jamaica, London und Paris, Paris und den übrigen Orten bestimmt, wodurch das Verhältniß der Schweren an diesen Orten (§. 259. n. 5.), mithin auch das Verhältniß der Pendellängen gegeben ist (§. 259. n. 4.). Multiplicirt man die Verhältnißzahlen dieser Tafel mit 440,67; so erhält man die in pariser Linien ausgedrükte Pendellängen mit Ausnahme von Formentera, weil diese Pendellänge mit der Borda'schen verglichen worden ist.

§. 268. Man sieht aus dieser Tafel, daß die Pendellängen vom Aequator an gegen die Pole hin beständig zunehmen, mit Ausnahme der vierten und fünften, wo übrigens die Breiten so wenig verschieden sind, daß der von dem Unterschied der Breiten herrührende Unterschied der Pendellängen kleiner seyn kann, als die Fehler, welchen man bey diesen Beobachtungen ausgesetzt ist. Eine genauere Vergleichung der Zunahmen der Pendellängen mit den Breiten zeigt, daß sie von dem Aequator an gerechnet nahe den Quadraten der Sinus der Breiten proportional sind. Unter dieser Voraussetzung würden zwey unter verschiedenen Breiten beobachtete Pendellängen hinreichend seyn, um einen allgemeinen Ausdruck für die Länge des Sekundenpendels unter einer gegebenen Breite zu bestimmen. Allein die Beobachtungsfehler machen einen solchen auf wenige Beobachtungen sich gründenden Ausdruck unsicher. Um den wahrscheinlichsten Ausdruck zu finden, bestimme man die Pendellänge unter dem Aequator und ihre Zunahme von dem Aequator an bis zu den Polen so, daß, wenn man die Zunahmen der Pendellängen den Quadraten der Sinus der Breiten proportional setzt, die Summe der unter dieser Voraussetzung gefundenen positiven Abweichungen der berechneten Pendellängen von den beobachteten der Summe der negativen Abweichungen gleich, und die Summe aller Abweichungen als positiv betrachtet am kleinsten werde *). Un-

*) Méc. cél. T. II. L. III. Chap. V. n. 40. pag. 135.

ter dieſer Bedingung wird, wenn man die in der Tafel §. 267. ſtehende Zahlen ſtatt der Pendellängen gebraucht, die Pendellänge unter der Breite l zu der Pendellänge unter dem Aequator ſich verhalten, wie

$0{,}996868 + 0{,}0054160\ \overline{\text{Sin.}\,l^2} : 0{,}996868.$

Setzt man l der Breite der pariſer Sternwarte gleich; ſo erhält man das Verhältniß der Pendellänge in Paris zu der Pendellänge unter dem Aequator = 999937 : 9968680, und, wenn man die erſtere nach Borda = 440,559 ſetzt, die Länge des Sekundenpendels unter dem Aequator = 439,2066. Demnach verhält ſich die Pendellänge unter der Breite l zu der Pendellänge $439{,}2066 = 0{,}996868 + 0{,}0054160\ \overline{\text{Sin.}\,l^2} : 0{,}996808$, und es iſt die Länge des einfachen Sekundenpendels unter der Breite l und im Vacuo

$= 439{,}2066 + 2{,}3862\ \overline{\text{Sin.}\,l^2}$ par. Linien.

Die Länge des einfachen Pendels, welches eine Schwingung in einer Decimalſekunde macht, findet ſich ebenſo = $0^{me},7396100 + 0^{me},0040183\ \overline{\text{Sin.}\,l^2}$ *).

§. 269. Die Uebereinſtimmung des in dem vorhergehenden §. gefundenen Ausdrucks $0{,}996868 + 0{,}005416\ \overline{\text{Sin.}\,l^2}$

*) La Place fand aus den §. 267. angeführten Beobachtungen, mit Ausnahme der neueren zu Formentera, $0^{me},739502 + 0^{me},004208\ \overline{\text{Sin.}\,l^2}$ (Méc. cél. T. II. pag. 151.). Es iſt aber der Coefficient von y in der zehnten der mit A'' bezeichneten Gleichungen (a. a. O. pag. 148.) welche ſich auf die Gothaiſche Pendellänge bezieht, unrichtig. Verbeſſert man dieſen Fehler; ſo wird $x^{(15)} = 0$; $y = 0{,}0054806$; $z = 0{,}99683$. Die Summe der poſitiven ſowohl als der negativen Fehler wird 0,00056, und mittelſt der Borda'ſchen Pendellänge für Paris die Länge des Decimalſekunden-Pendels $= 0^{me},739582 + 0^{me},004066\ \overline{\text{Sin.}\,l^2}$. Hieraus findet ſich die Länge des Pendels unter der Breite von Formentera $= 0^{me},741179$, nur um $0^{me},000271$, oder um $\frac{1}{3}$ Lin. kleiner, als nach der Beobachtung. Mithin ſtimmt dieſe Pendellänge ſehr genau mit Borda's Beſtimmung der pariſer Pendellänge überein, auf welche ſich in obiger Formel die Länge des Pendels unter dem Aequator gründet. Daß die älteren Angaben der Pendellängen nicht ſehr zuverläßig ſeyen, ſieht man aus der Vergleichung der an einerley Ort gefundenen Pendellängen. Mairan fand für Paris 440,5666, und nach einer Berichtigung von Lalande (Astron. T. III. n. 2649. pag. 12.), weil Mairan ſich einer unrichtigen Toiſe bediente, 440,52. La Caille fand 440,55, und Bouguer 440,67.

[redacted]

mit den in der Tafel §. 267. nach den Beobachtungen angegebenen Verhältnißen der Pendellängen zeigt folgende Tafel:

Ort	Verhältniße der Pendellängen nach den Beob.	nach d. Formel	Unterschiede
Peru	0,99669	0,99687	+ 0,00018
Portobello	0,99689	0,99702	+ 13
Pondichery	0,99710	0,99710	0
Jamaica	0,99745	0,99738	— 7
klein Goava	0,99728	0,99741	+ 13
Cap	0,99877	0,99855	— 22
Formentera	0,99908	0,99898	— 10
Toulouse	0,99950	0,99944	— 6
Wien	0,99987	0,99988	+ 1
Paris	1,00000	0,999937	— 6
Gotha	1,00006	1,00013	+ 7
London	1,00018	1,00019	+ 1
Arensberg	1,00074	1,00078	+ 4
Petersburg	1,00101	1,00092	— 9
Pello	1,00137	1,00144	+ 7
Ponoi	1,00148	1,00146	— 2

Folglich sind die Zunahmen der Pendellängen von dem Aequator an gegen die Pole hin sehr nahe den Quadraten der Sinus der Breiten proportional, und wenn man von Borda's Bestimmung der Pendellänge zu Paris ausgeht; so ist die Länge des einfachen Sekundenpendels an einem Ort der Erde, dessen Breite $= l$ ist,

$$= 0{,}508341 + 0{,}0027618\ \overline{\text{Sin.}\, l}^2 \text{ Tois.}$$

$$= 439{,}2066 + 2{,}3862\ \overline{\text{Sin.}\, l}^2 \text{ pariser Linien,}$$

und unter den Polen $= 441{,}5928$. Lin.

Für die Breite von Formentera erhält man 440,138, welches nur um 0,016 par. Linien von dem abweicht, was die Beobachtungen (§. 267.) gegeben haben.

Bey der Vergleichung der übrigen Pendellängen mit der hier gegebenen Formel ist zu bemerken, daß dieselben entweder nach Bouguers Methode mittelst eines Aloefadens, welcher seiner Biegung einen kleinen Widerstand an dem Aufhängungspunkt entgegensetzt, und daher den eigentlichen

Aufhängungspunkt etwas tiefer fallen macht, mithin die Pendellänge zu groß giebt, bestimmt, oder aus der von Bouguer für Paris angegebenen Pendellänge mittelst der in Paris und an anderen Orten beobachteten Schwingungszeiten unveränderlicher Pendel geschlossen sind. Hätte man bey der Bestimmung der letzteren die Borda'sche Pendellänge zum Grund gelegt; so würden sie in dem Verhältniß von 440,559 zu 440,67 oder um 0,111 Lin. kleiner herausgekommen seyn, und die so verminderten Pendellängen wird man gebrauchen müßen, wenn man eine Vergleichung der auf Borda's Pendellänge sich gründenden Formel mit den Beobachtungen anstellen will. Die folgende Tafel, welche in der ersten Columne die nach Bouguers Methode beobachteten, in der zwey die nach Borda's Methode bestimmten, und aus den Schwingungszeiten mittelst der Borda'schen Pendellänge geschlossenen, in der dritten die nach der Formel berechneten Pendellängen enthält, dient zur Vergleichung der berechneten Pendellängen mit den beobachteten.

	beobachtete Pendellängen nach		
Ort.	Bouguer	Borda.	Formel
Peru	439,21		439,21
Portobello	439,30		439,27
Pondichery	439,39		439,31
Jamaica		439,44	439,43
klein Goava	439,47		439,45
Cap	440,13		439,95
Formentera		440,15	440,14
Toulouse	440,45		440,34
Wien	440,61		440,53
Paris	440,67	440,56	440,56
Gotha	440,69		440,64
London		440,64	440,67
Arensberg		440,89	440,93
Petersburg		441,00	440,99
Pello		441,16	441,22
Ponoi		441,21	441,23

§. 270. Aus der Länge des einfachen Sekundenpendels ergiebt sich nun die freye Fallhöhe der Körper in der ersten Sekunde weit genauer, als man sie durch die unmittelbare Beobachtung würde bestimmen können. Drückt man die Länge des einfachen Sekundenpendels in pariser Fuß aus, und multiplicirt sie mit $\frac{1}{2}\pi^2$ oder die §. 269. in Toisen ausgedrückte Pendellänge mit $3\pi^2$; so erhält man nach §. 259. n. 2. die freye Fallhöhe in der ersten Sekunde mittlerer Sonnenzeit

$$= 15{,}05138 + 0{,}08177 \overline{\text{Sin.}\, l}^2 \text{ par. Fuß.}$$

Unter den Polen ist also die Höhe des freyen Falls in der ersten Sekunde nur um 0,08177 Fuß oder nicht ganz um einen Zoll größer als unter dem Aequator, woraus man sieht, daß die Verschiedenheit der Schwere an verschiedenen Orten der Erde durch die unmittelbare Beobachtung der Fallhöhen nicht würde haben bemerkt werden können.

Die Beobachtungen, welche Bouguer in verschiedenen Höhen über der Meeresfläche angestellt hat, zeigen eine merkliche Abnahme der Schwere in beträchtlichen Höhen. Er fand die auf den leeren Raum reducirte Länge des einfachen Sekundenpendels unter dem Aequator

in einer Höhe v. 2434 Tois. über d. Meeresfläche = 438,69 Lin.
— — 1466 — — — = 438,88
in gleicher Höhe mit der Meeresfläche = 439,21

welche Unterschiede zu beträchtlich sind, als daß sie auf Beobachtungsfehler könnten geschoben werden *).

Die Pendelversuche zeigen ferner, daß große und kleine Körper an einerley Ort der Erde in gleichen Zeiten von gleichen Höhen fallen. Verfertigt man nemlich aus einerley Materie mehrere dem Gewicht und der Ausdehnung nach verschiedene Pendel, bestimmt die Längen der mit ihnen isochronischen einfachen Pendel, und leitet daraus nach §. 259.

*) Das Gegentheil hievon wollte ein gewisser Coultoud im Jahr 1768 auf den Alpen beobachtet haben, weil das Pendel in einer Höhe von 1085 Toisen dem am tieferen Standort in zwey Monaten um 27. Min. 20 Sek. vorgeeilt sey. Bey genauer Nachfrage fand es sich, daß die angeführten Versuche niemals angestellt worden seyen, und das ganze eine Erdichtung sey. Man sehe de Lüc Briefe über die Geschichte der Erde. I Th. 45 Brief.

n. 2. die freyen Fallhöhen her; so finden sich diese den Quadraten der Schwingungszeiten der Pendel proportional. Mithin sind, wenn man den Widerstand der Luft in Rechnung nimmt, an einerley Ort der Erde die Höhen einander gleich, von welchen große oder kleine Körper von der Ruhe an in gleichen Zeiten fallen.

Newton stellte auch mit ungleichartigen Körpern hierüber genaue Versuche an *). Er nahm zwey hölzerne runde und einander gleiche Büchsen, füllte die eine mit Holz, und hieng in dem Oscillationspunkt der andern (so genau als möglich) ebenso viel Gold dem Gewicht nach auf. Die an Fäden von eilf Fuß Länge aufgehängten Büchsen bildeten zwey Pendel, welche in Hinsicht auf das Gewicht, die Figur und den Widerstand der Luft einander gleich waren. Er setzte diese nebeneinander aufgehängte Pendel in Bewegung, so daß ihre Schwingungen in einerley Zeit auf einerley Seite der Vertikallinie anfiengen und gleich groß waren. Sie setzten ihre Schwingungen sehr lange und mit einander übereinstimmend fort, und waren daher isochronisch. Hieraus folgt, daß das Gold durch die Schwere ebenso beschleunigt wird, wie das Holz, und, wenn man den Widerstand der Luft beseitigt, eine Masse Gold in einer gegebenen Zeit von einer eben so großen Höhe fällt, als eine dem Gewicht nach ebenso große Masse Holz. Er stellte die Versuche mit Gold, Silber, Bley, Glas, Sand, Kochsalz, Holz, Wasser und Waizen an, und fand beständig dieselben Resultate, so, daß, wenn auch ein kleiner, durch diese Versuche nicht bemerkbarer Unterschied statt finden sollte, dieser nach der von Newton angegebenen Gränze der Genauigkeit weniger als den tausendsten Theil des Ganzen hätte betragen müßen. Ungleichartige Körper von gleichem Gewicht würden also im leeren Raum und an einerley Ort der Erde in gleichen Zeiten von gleichen Höhen fallen, oder es können wenigstens die Fallhöhen nicht um ihren tausendsten Theil von einander verschieden seyn. Demnach wird man die Geschwindigkeit, welche die Schwere den Körpern in einer gegebenen Zeit und an einem gegebenen Ort, wenn der Widerstand der Luft und

*) Philos. nat. princ. mathem. L. III. prop. VI. theor. VI.

andere Störungen der Bewegung beſeitigt werden, mittheilen würde, ſo lange als eine bey allen Körpern gleich bleibende Größe zu betrachten haben, als man nicht durch genauere Verſuche eine Verſchiedenheit in den erzeugten Geſchwindigkeiten dargethan hat.

Drittes Capitel.

Von der Theorie der Bewegung der Himmelskörper, und der allgemeinen Schwere.

§. 271. Wenn auf einen in Bewegung geſetzten Körper eine Kraft wirkt, deren Richtung nach einem gewißen unveränderlichen Punkt hin geht; ſo wird ſeine Bewegung nur in dem beſondern Fall geradlinigt ſeyn können, wo die anfängliche Richtung ſeiner Bewegung mit der Richtung der Kraft zuſammenfällt. In den übrigen Fällen wird ſich der Körper in einer gebrochenen aus geraden Linien zuſammengeſetzten, oder in einer ſtetig krummen Linie bewegen, je nachdem die Kraft ſtoßweiſe oder ſtetig wirkt. Der Körper habe nemlich während eines gewißen Zeittheilchens die gerade Linie MA (Fig. 103) beſchrieben, und S ſey ein auſſerhalb der MAT liegender Punkt. Man nehme auf der Verlängerung AT von MA die $AG = MA$; ſo würde der Körper in dem nächſtfolgenden gleich großen Zeittheilchen den Weg AG zurücklegen, wenn keine Kraft auf ihn wirkte (§. 242.). In dem Augenblick da er in A ankommt, theile ihm eine gegen S hin wirkende Kraft die Geſchwindigkeit Aa mit; ſo hat er in A die zwey Geſchwindigkeiten AG und Aa, und er geht nun durch die Diagonale AB des Parallelogramms $AGBa$ in derſelben Zeit, in welcher er den Weg AG zurückgelegt haben würde. Man ziehe SG; ſo iſt das Dreyeck $MSA = ASG = ASB$ (I, 38. 37.). Mit der Geſchwindigkeit ſeiner Bewegung durch AB würde er ferner nach der Verlängerung BH von AB fortgehen, und in dem nächſtfolgenden gleich großen Zeittheilchen den Weg $BH = AB$ zurücklegen, ſo daß, wenn man SH zieht, das Dreyeck $BSH = ABS = ASM$ ſeyn würde. Aber in dem Augen-

blick da er in *B* ankommt, theile ihm die Kraft die Geschwindigkeit *Bb* gegen den Punkt *S* hin mit; so wird er die Diagonale *Bc* des Paralleloramms *BHCb* durchlaufen, und das Dreyeck *BCS* wird dem Dreyeck *BCH*, mithin wiederum dem Dreyeck *ASM* gleich seyn. Eben so wird der Körper, wenn er ferner in dem Anfang eines jeden der folgenden Zeittheilchen durch die stoßweise wirkende gegen den Punkt *S* gerichtete Kraft von seinen in den unmittelbar vorhergehenden Zeittheilchen beschriebenen Wegen abgelenkt, und ihm die Geschwindigkeiten *Cc*, *Dd*, *Ee* mitgetheilt würden, die Diagonalen *CD*, *DE*, *EF* der Parallelogramme *Jc*, *Kd*, *Le* in gleichen Zeiten durchlaufen, und die Radii Vectores *SA*, *SB*, *SC* u. s. w. werden die unter sich und dem Dreyeck *ASM* gleiche Dreyecke *ASB*, *BSC* u. s. w. in gleichen Zeiten beschreiben, so daß der ganze von *A* bis *F* beschriebene Flächenraum *ASF* das ebenso vielfache des Flächenraums *ASB* seyn wird, das wie vielfache die zur Beschreibung der Fläche *ASF* gebrauchte Zeit von derjenigen Zeit ist, in welcher die Fläche *ASB* beschrieben wurde. Die Flächenräume, welche die von *S* ausgehende Radii Vectores abschneiden wachsen also der Zeit proportional. Ferner liegen die Dreyecke *ASG* und *ASB* wegen der Parallelen *AG*, *Ba* in einer Ebene, sodenn, weil *ABH* eine gerade Linie ist, liegen auch die Dreyecke *ASB* und *BSH*, mithin auch wegen der Parallelen *BH*, *Cb* die Dreyecke *BSC* und *BSH*, und daher *ASB* und *BSC* in einer Ebene. Ebenso kann gezeigt werden, daß jedes der beschriebenen Dreyecke mit dem unmittelbar vorhergehenden in einer Ebene liegt; folglich liegt die Bahn des Körpers in einer durch den Punkt *S* und durch die anfängliche Richtung *MAT* der Bewegung des Körpers gelegten Ebene, in welcher er unter der Voraussetzung einer stoßweise gegen *S* hin wirkenden Kraft ein Vieleck *ABCDEF* so beschreiben wird, daß sich der Flächenraum *ASD* zu dem Flächenraum *ASF* verhält wie die Zeit durch *ASD* zu der Zeit durch *ASF*. Der Punkt *S*, gegen welchem der Körper beständig hin getrieben wird, heißt der Mittelpunkt der Kräfte (centrum virium), die Kraft, welche ihn dahin treibt, die Centripetalkraft (vis centri-

peta), und die Bewegung ſelbſt heißt eine Centralbewegung.

§. 272. Umgekehrt, wenn ein Körper ein in einer Ebene liegendes Vieleck ſo beſchreibt, daß die Flächenräume, welche die von einem gegebenen in der Ebene des Vielecks liegenden Punkt *S* ausgehende Radii Vectores abſchneiden, den Zeiten proportional ſind, in welchen ſie beſchrieben wurden; ſo iſt der Punkt *S* der Mittelpunkt der Kräfte. Sind nemlich *CSD*, *DSE* die in zwey gleichen unmittelbar auf einander folgenden Zeittheilchen beſchriebenen Flächenräume; ſo müßen die Dreyecke *CSD*, *DSE* einander gleich ſeyn. Man verlängere *CD* nach *K* ſo, daß *DK* = *CD* und ziehe *CK*; ſo würde der Körper, wenn in *D* die Centralkraft nicht auf ihn gewirkt hätte, in dem zweyten Zeittheilchen das Dreyeck *DSK* = *CDS* beſchrieben haben. Nun ſoll aber auch das Dreyeck *DSE* = *CDS* ſeyn; folglich müßen die Dreyecke *DSE* und *DSK* einander gleich ſeyn, mithin ihre Spitzen *K*, *E* auf einer mit der *DS* parallel laufenden geraden Linie *KE* liegen (I, 30.). Man ziehe noch durch *E* die Parallele *Ed* mit *DK*; ſo iſt *DKEd* ein Parallelogramm, und die Geſchwindigkeit *DE* kann als aus den zwey Geſchwindigkeiten *DK* und *Dd* zuſammengeſetzt betrachtet werden (§. 240.). Die erſtere iſt diejenige, mit welcher der Körper in *D* ankam, und mit welcher er ſich gleichförmig nach der Verlängerung *DK* von *CD* fortbewegt haben würde. Die letztere *Dd* muß von einer nach der Richtung *Dd* wirkenden Kraft herrühren, weil man unter der Richtung einer Kraft die Richtung verſteht, nach welcher ſie einen Körper zu bewegen ſtrebt (§. 243.). Folglich iſt der Punkt *S*, von welchem die Radii Vectores ausgehen, der Mittelpunkt der Kräfte.

Man fälle aus dem Mittelpunkt *S* der Kräfte die Perpendickel *SR*, *SP* auf die Richtungen *MA*, *DE* der Bewegung des Körpers von *M* bis *A* und von *D* bis *E*; ſo verhält ſich, weil die Dreyecke *AMS* und *DSE* einander gleich ſind, *MA* : *DE* = *SP* : *SR*. Aber *MA* und *DE* ſind in gleichen Zeiten beſchriebene Wege; folglich verhält ſich die

Geschwindigkeit der Bewegung von *M* bis *A* zu der Geschwindigkeit der Bewegung von *D* bis *E* (§. 231.), wie das aus dem Mittelpunkt *S* der Kräfte auf die letztere Richtung der Bewegung gefällte Perpendickel *SP* zu dem Perpendickel *SR* auf die erstere Richtung.

Je kleiner man nun die Zeittheilchen nimmt, in welchen die Stöße der Centripetalkraft aufeinander folgen, desto mehr nähert sich die stoßweise wirkende Kraft einer stetig wirkenden, und zu gleicher Zeit nähert sich das Vieleck einer stetig krummen Linie. Dabey bleiben beständig die Flächenräume den Zeiten proportional, in welchen sie beschrieben wurden. Man lasse die Kraft stetig nach einem gegebenen Punkt *S* hin wirken; so wird das Vieleck in eine gegen den Mittelpunkt *S* der Kraft hole stetig krumme Linie übergehen, und die Sectoren, welche die von *S* ausgehende Radii Vectores abschneiden, werden den Zeiten proportional seyn, in welchen sie beschrieben wurden. Und umgekehrt, wenn ein frey sich bewegender Körper eine in einer Ebene liegende krumme Linie so beschreibt, daß die von einem in dieser Ebene liegenden Punkt ausgehende Radii Vectores den Zeiten proportionale Flächenräume abschneiden; so ist der erwähnte Punkt der Mittelpunkt der Kräfte. Die Centripetalkraft kann übrigens aus mehreren nach verschiedenen Richtungen wirkenden Kräften zusammengesetzt seyn, nur muß die aus allen diesen Kräften zusammengesetzte Kraft gegen den gegebenen Punkt hin gerichtet seyn, von welchem die Radii Vectores ausgehen.

Die Perpendickel *SR*, *SP* aus dem Mittelpunkt *S* der Kraft auf die Richtungen *MA*, *DE* der Bewegung des Körpers werden im Fall der stetig krummlinigten Bewegung in diejenigen Perpendickel übergehen, welche aus dem Mittelpunkt der Kräfte auf die Tangenten der krummlinigten Bahn gefällt werden. Bey jeder freyen krummlinigten Centralbewegung werden also die aus dem Mittelpunkt der Kräfte auf die Tangenten der Bahn gefällten Perpendickel umgekehrt den Geschwindigkeiten proportional seyn, welche der Körper in den Berührungspunkten hat.

§. 273. Vermöge des zweyten keplerischen Gesetzes (§. 179.) sind die elliptischen Sectoren, welche die aus dem Mittelpunkt der Sonne an einen Planeten gezogene Radii Vectores abschneiden, den Zeiten proportional, in welchen sie beschrieben werden; folglich ist die Kraft, welche die Planeten nöthigt, um die Sonne ihre krummlinigte Bahnen zu beschreiben, gegen den Mittelpunkt der Sonne hin gerichtet. Das zweyte keplerische Gesetz ist ein allgemeines Gesetz der freyen Centralbewegung. Jeder Körper, welcher durch eine, oder durch eine aus mehreren zusammengesetzte Kraft beständig gegen einen unbeweglichen Punkt hin getrieben wird, und nach einer Richtung, welche weder mit der Richtung der Centripetalkraft zusammenfällt, noch ihr entgegengesetzt ist, auf irgend eine Weise in Bewegung gesetzt worden ist, wird, wenn keine Hindernisse der Bewegung vorhanden sind, eine gegen den Mittelpunkt der Kräfte hole krumme Linie beschreiben, so daß die Flächenräume, welche die aus dem Mittelpunkt der Kräfte ausgehende Radii Vectores abschneiden, den Zeiten proportional wachsen, nach welchem Gesetz auch die Centripetalkraft mit der Veränderung des Abstands des Körpers von dem Mittelpunkt der Kräfte sich verändern mag.

Um nun das Gesetz zu finden, nach welchem die Centripetalkraft von der Entfernung des Körpers vom Mittelpunkt der Kraft abhängt, und die Größe der Kraft selbst angeben zu können, welche den Körper von seinem geradlinigten Weg beständig ablenkt, wird man die Größe der Ablenkung von der Tangente der krummen Linie, welche der Körper beschreibt, zu bestimmen haben, und zwar wird, weil die Kräfte durch diejenige Geschwindigkeit gemeßen werden, welche sie nach einer gegebenen Richtung in einer gegebenen Zeit erzeugen würden, wenn sie während dieser Zeit constant blieben, diejenige Ablenkung von der Tangente auszumitteln seyn, welche die Centralkraft in einer gegebenen Zeit hervorbringen würde, wenn sie während dieser Zeit nach ihrer anfänglichen Richtung mit gleicher Stärke fortwirkte. Der einfachste Fall ist derjenige, wenn ein Körper einen Kreis beschreibt, und des Kreises Mittelpunkt der

Mittelpunkt der Kraft ist. In diesem Fall sind die aus dem Mittelpunkt der Kraft auf die Tangenten des Kreises gefällten Perpendickel dem Halbmesser des Kreises gleich, und folglich ist diese Centralbewegung gleichförmig (§. 272.). Es sey AB (Fig. 104.) der Bogen, welchen der in dem aus C als Mittelpunkt mit dem Halbmesser CA beschriebenen Kreis sich bewegende Körper in einer gegebenen Zeit, z. B. in einer Sekunde beschreibt, und AG sey die Höhe, von welcher der Körper von dem Punkt A aus gegen C in derselben Zeit, in welcher der Bogen AB beschrieben wird, fallen würde, wenn auf ihn die Centralkraft mit derjenigen Stärke, welche sie in A hat, fortwirkte, und der Körper keine Geschwindigkeit nach der Richtung der Tangente AT gehabt hätte, oder anfänglich in Ruhe gewesen wäre. Man theile die Zeit, in welcher der Bogen AB beschrieben wird, so wie den Bogen AB selbst in eine beliebige Anzahl gleicher Theile, welche $= n$ sey. Es sey $AE = \frac{1}{n} AB$. Man ziehe EP auf den durch A gehenden Durchmesser AD senkrecht, vollende das Parallelogramm $APEH$ und ziehe die Chorden AE, ED. Wirkte die Centralkraft stoßweise, und theilte sie dem Körper in dem Punkt A plötzlich die Geschwindigkeit AP mit, so würde er, wenn er nach der Richtung der Tangente AT die Geschwindigkeit AH hätte, am Ende der Zeit, in welcher er den Bogen AE wirklich beschrieben hat, durch die Bewegung auf der Chorde AE des Kreises an demselben Punkt E gekommen seyn.

Es verhält sich aber $\left.\begin{matrix} AD \\ 2AC \end{matrix}\right\}$: Chorde AE = Chorde AE : AP;

folglich ist $AP = \frac{\text{dem Quadr. d. Chorde } AE}{2AC}$

Da nun der Weg, welchen der Körper nach der Richtung AT der Tangente in $\frac{1}{n}$tel Sekunde zurücklegen würde dem Bogen AE gleich, und daher größer als AH ist; so muß der Raum, durch welchen die Centralkraft den Körper in $\frac{1}{n}$ Sekunde fallen machen würde, größer AP seyn, und weil vermöge der Gesetze der gleichförmig beschleunigten Be-

[redacted]

wegung die Fallhöhe in $\frac{1}{n}$ Sekunde zu der Fallhöhe in 1 Sek. sich verhält, wie $\frac{1}{n^2} : 1 = 1 : n^2$; so wird die Fallhöhe in 1 Sekunde, d. i. $AG > n^2 . AP$ oder $> \frac{\overline{n \text{ Chorde } AE}^2}{2AC}$ $> \frac{n^2 . \overline{AE}^2}{2AC} \left(\frac{\text{Chorde } AE}{\text{Bogen } AE}\right)^2$, oder auch, weil $n . AE = AB$ ist (Constr.),

$$AG > \frac{\overline{AB}^2}{2AC} \left(\frac{\text{Chorde } \frac{1}{n} AB}{\text{Bogen } \frac{1}{n} AB}\right)^2 \text{ seyn.}$$

Man ziehe an den anderen Endpunkt E des Bogens AE den Durchmesser FE, dessen Verlängerung der Tangente AT in T begegne, und vollende das Parallelogramm $AQET$; so würde der Körper, wenn er nach der Richtung der Tangente eine Geschwindigkeit gehabt hätte, mit welcher er in $\frac{1}{n}$ Sekunde den Weg AT gleichförmig hätte zurücklegen können, und zugleich in A nach der mit TE parallelen Richtung AQ die Geschwindigkeit AQ erhalten hätte, die Diagonale AE des Parallelogramms $AQET$ in $\frac{1}{n}$ Sekunde beschrieben haben, und am Ende dieses Zeittheilchens in dem Endpunkt E des Bogens AE angekommen seyn, welchen er in dieser Zeit wirklich beschrieben hat. Dieser Bogen ist aber kleiner als AT; folglich muß der Raum, durch welchen die Centralkraft den Körper in $\frac{1}{n}$ Sek. fallen machen würde kleiner als TE, und die Fallhöhe AG in 1 Sek. kleiner als $n^2 . TE$ seyn. Es ist aber (III, 36.) $FT \times TE = \overline{AT}^2$, und daher $TE = \frac{\overline{AT}^2}{FT} < \frac{\overline{AT}^2}{FE}$, $n^2 . TE < \frac{n^2 . \overline{AT}^2}{2AC}$; folglich muß um so mehr

$$AG < \frac{n^2 . \overline{AT}^2}{2AC} < \frac{n^2 . \overline{AE}^2}{2AC} \left(\frac{AT}{AE}\right)^2 < \frac{\overline{AB}^2}{2AC} \left(\frac{\text{Tang. } \frac{1}{n} AB}{\text{Bogen } \frac{1}{n} AB}\right) \text{ seyn.}$$

Nun ist die Geschwindigkeit, welche eine constante Kraft während einer gegebenen Zeit erzeugt das Doppelte

des Raums, durch welchen sie einen Körper während derselben Zeit fallen machen würde; folglich ist die Geschwindigkeit, welche die Centralkraft während der Zeit, in welcher der im Kreis sich bewegende Körper den Bogen AB beschreibt, erzeugen würde, wenn sie beständig mit derjenigen Stärke fortwirkte, welche sie in A hat, beständig

$$> \frac{\overline{AB}^2}{AC}\left(\frac{\text{Chorde}\,\frac{1}{n}\,AB}{\text{Bogen}\,\frac{1}{n}\,AB}\right)^2,$$

aber

$$< \frac{\overline{AB}^2}{AC}\left(\frac{\text{Tang.}\,\frac{1}{n}\,AB}{\text{Bogen}\,\frac{1}{n}\,AB}\right)^2.$$

Diese zwey Ausdrücke können aber durch die Vergrößerung der Anzahl n der gleichen Theile, in welche man den Bogen AB eintheilt, um weniger als jede gegebene Größe von einander verschieden gemacht werden; folglich kann die Centripetalkraft weder größer noch kleiner seyn als $\frac{\overline{AB}^2}{AC}$, wenn sie nemlich wie gewöhnlich durch die Geschwindigkeit gemeßen wird, welche sie als constant betrachtet in einer gegebenen Zeit erzeugen würde.

Man setze die Geschwindigkeit, mit welcher sich der Körper im Kreis bewegt, gleich v, seinen Halbmesser $= r$, und die Geschwindigkeit, welche die Centralkraft in der Zeiteinheit erzeugen würde $= k$; so wird man haben

1.) $k = \frac{v^2}{r}$,

wo k die in einer Sekunde, Minute, u. s. w. erzeugte Geschwindigkeit seyn wird, je nachdem v den Weg bezeichnet, welchen der Körper in einer Sekunde, Minute, u. s. w. beschreiben würde, wenn die Centralkraft aufhörte zu wirken.

Es sey die Umlaufszeit des Körpers $= t$; so durchlauft er in dieser Zeit den Umfang des Kreises oder den Raum $2r\pi$, wenn der Umfang zum Durchmesser sich wie $\pi : 1$ verhält. Da nun der Körper den Kreis mit einer

gleich-

gleichförmigen Bewegung durchlauft; ſo wird ſeine Geſchwindigkeit $v = \frac{2r\pi}{t}$, und vermöge der Gleichung n. 1.

2.) $k = \frac{4r\pi^2}{t^2}$ ſeyn.

Da ein Körper, welcher ſich in einem Kreiſe bewegen ſoll, gegen des Kreiſes Mittelpunkt hin durch eine Kraft getrieben werden muß, welche $= \frac{v^2}{r}$ iſt (n. 1.); ſo beſtrebt er ſich mit einer ebenſo großen Kraft von des Kreiſes Mittelpunkt zu entfernen, und nach der Richtung der Tangente fortzugehen. Dieſes Beſtreben eines im Kreiſe ſich bewegenden Körpers, ſich von des Kreiſes Mittelpunkt zu entfernen, heißt die Schwungkraft (vis centrifuga). Wird ein Körper durch einen Faden mit einem unbeweglichen Punkt verbunden, und dadurch genöthigt, einen Kreis zu beſchreiben, deſſen Halbmeſſer der Länge des Fadens gleich iſt; ſo muß der Faden ſtark genug ſeyn, um der Schwungkraft zu widerſtehen, und dieſer vertritt nun die Stelle der Centripetalkraft. Gewöhnlich verſteht man unter der Schwungkraft den Exponenten ihres Verhältniſſes zu der Kraft der Schwere. Man ſetze die freye Fallhöhe der Körper in der erſten Sekunde $= g$, alſo die Geſchwindigkeit, welche die Schwere in einer Sekunde erzeugt $= 2g$; ſo wird ſich verhalten

die Schwungkraft : Schwere $= \frac{v^2}{r} : 2g$, oder es wird ſeyn

3.) die Schwungkraft $= \frac{v^2}{2gr}$.

§. 274. Wenn ein Körper einen Kreis mit einer gleichförmigen Bewegung beſchreibt; ſo kann zwar nach dem vorhergehenden §. die Centripetalkraft gefunden werden, welche den Körper nöthigt, dieſen Kreis zu beſchreiben, aber das Geſetz, nach welchem die Centripetalkraft mit dem Abſtand des Körpers von des Kreiſes Mittelpunkt ſich verändert, bleibt unbeſtimmt, weil in dieſem Fall alle Radii Vectores einander gleich ſind. Da aber die Planeten keine Kreiſe, ſondern Ellipſen beſchreiben, in deren einem Brennpunkt ſich die Sonne befindet, und dieſer Punkt vermöge des vor-

hergehenden §. zugleich der Mittelpunkt der Kräfte ist; so verändern sich die Abstände der Planeten von dem Mittelpunkt der Kräfte um den Abstand der Brennpunkte der Ellipsen, welche sie um die Sonne beschreiben, und man wird das Gesetz finden können, nach welchem die Centripetalkraft sich verändert. Es sey AP (Fig. 105.) die große, DE die kleine Axe der elliptischen Bahn eines Planeten, F und S seyen ihre Brennpunkte, und die Sonne in S. Da bey jeder Centralbewegung die Geschwindigkeiten umgekehrt den Perpendickeln aus dem Mittelpunkt der Kräfte auf die Tangenten der Bahn proportional sind (§. 272.), und die geraden Linien, welche auf der großen Axe in den Scheiteln A, P senkrecht stehen, die Ellipse in diesen Punkten berühren; so verhält sich die Geschwindigkeit des Planeten im Perihelio P zu seiner Geschwindigkeit im Aphelio A wie $SA : SP$. Es sey M ein beliebiger anderer Punkt der Ellipse, in welchem sie von der geraden Linie RT berührt werde. Man ziehe SM, FM, verlängere die letztere nach Q so, daß $FQ = AP$ werde, ziehe SQ, und verbinde den Punkt R, in welchem die SQ die Tangente RT schneidet, mit dem Mittelpunkt C der Ellipse durch die gerade Linie CR. Da vermöge der Eigenschaften der Ellipse $SM + MF = AP = FQ$ (Constr.) $= QM + MF$; so ist $SM = QM$. Weil ferner die RT die Ellipse in M berührt; so ist der Winkel $SMR = FMT$ (Kegelschn. II, 12. Zus. 1.) $= RMQ$ (I, 15.), und daher $SR = RQ$ (I, 4.), und SR auf RT senkrecht. Es ist aber auch $SC = CF$; folglich CR mit FQ parallel (VI, 2.), und $CR = \frac{1}{2} FQ = CP$. Mithin liegen die Endpunkte R aller Perpendickel SR, welche aus dem Brennpunkt S auf die Tangenten der Ellipse gefällt werden, auf dem Umfang eines über der großen Axe als Durchmesser beschriebenen Kreises, und vermöge III, 7. ist SP am kleinsten, SA am größten, $SR > SP$. Da nun die Geschwindigkeiten umgekehrt diesen Perpendickeln proportional sind; so ist die Geschwindigkeit der Bewegung des Planeten im Perihelio P am größten, im Aphelio A am kleinsten, sie nimmt von dem Perihelium an bis zu dem Aphelio beständig ab,

und auf der anderen Seite der groſsen Axe wieder ebenſo zu, bis ſie im Perihelio wieder am gröſten wird.

Man nehme auf der groſsen Axe AP der Ellipſe von ihren Scheiteln P und A aus die Linien PJ, AK dem halben Parameter der groſsen Axe gleich, und beſchreibe aus J und K als Mittelpunkten mit den Halbmeſſern JP, KA Kreiſe; ſo werden dieſe die Ellipſe in P und A berühren, und ganz innerhalb der Ellipſe fallen, auch wird kein anderer Kreis, welcher die Ellipſe in P oder A berührt, zwiſchen der Ellipſe und dem aus J oder K beſchriebenen Kreis durchgehen können (Kegelſchn. II, 35.). Folglich muſs die Centripetalkraft in P eben ſo groſs ſeyn als die Centripetalkraft, welche erfordert wird, um einen Körper, welcher in P einerley Richtung und Geſchwindigkeit ſeiner Bewegung mit dem Planeten hat, einen Kreis von dem Halbmeſſer JP beſchreiben zu machen, deſſen Mittelpunkt der Kraft in J fällt. Eben ſo muſs die Centripetalkraft in A derjenigen Kraft gleich ſeyn, welche einen von A mit der dieſem Punkt entſprechenden Geſchwindigkeit und Richtung des Planeten ausgehenden Körper nöthigen würde, um K als Mittelpunkt der Kraft einen Kreis, deſſen Halbmeſſer $= KA$ iſt, beſchreiben zu machen. Wegen der gleichen Halbmeſſer JP und KA wird ſich aber vermöge §. 273. n. 1. verhalten

die Centrip. Kraft im Kreis JP, oder Centrip. Kraft des Planeten in P } . { Centrip. Kraft im Kr. KA oder Centrip. Kr. d. Plan. in A }

= Quadr. d. Geſchw. in P : Quadr. d. Geſchw. in A

= $\overline{SA}^2$: $\overline{SP}^2$;

folglich iſt die Kraft, welche die Planeten gegen dem Mittelpunkt der Sonne treibt, wenigſtens im Aphelio und Perihelio umgekehrt den Quadraten ihrer Entfernungen von dem Mittelpunkt der Sonne proportional. Was hier von den Endpunkten der groſsen Axe bewieſen worden iſt, gilt auch, wie hernach gezeigt werden ſoll, von den übrigen Punkten der Ellipſe. Nun wird es ſich auch begreiflich machen laſſen, warum die Planeten, wenn ſie im Perihelio angekommen ſind, ſich wiederum von der Sonne entfernen, ungeachtet im Perihelio die Centralkraft am gröſten iſt, und warum ſie, wenn ſie im Aphelio angekommen ſind, ſich wiederum der Sonne

nähern. Da nemlich PJ dem halben Parameter der groſſen Axe der Ellipſe gleich iſt; ſo verhält ſich

$$AC : CD = CD : PJ$$

mithin $\frac{AC}{CP} : PJ = \left\{\frac{\overline{AC}}{\overline{CP}^2 + \overline{CD}^2}\right\} : \overline{CD}^2,$

$$\frac{CP - PJ}{CD} : CP = \overline{CD}^2 : \left\{\frac{\overline{AC}^2}{CP}\right\},$$

folglich $\frac{CJ : CS}{CK : CF} = CS : CP.$

Da nun in der Ellipſe immer CS kleiner als CP iſt; ſo iſt $CJ < CS$, $CK < CF$, und daher $PJ > PS$, $AK < AC$ und um ſo mehr $< AS$. Mit der Geſchwindigkeit, welche der Planet in P hat, könnte er einen Kreis um J als Mittelpunkt der Kraft beſchreiben, deſſen Halbmeſſer $JP > PS$ iſt; folglich muß er in P anfangen ſich von dem Brennpunkt S zu entfernen. In A kommt er mit einer Geſchwindigkeit an, vermöge welcher er um K als Mittelpunkt einen Kreis beſchreiben könnte, deſſen Halbmeſſer $KA < AS$ iſt. Mithin muß er, wenn er durch den Endpunkt A der groſſen Axe gegangen iſt, anfangen, ſich dem Brennpunkt S wiederum zu nähern. Mit dieſer Annäherung wächſt ſeine Geſchwindigkeit bis zu dem Perihelium P, ſo daß er nun wiederum einen Kreis um den Mittelpunkt J beſchreiben könnte, wenn dieſer Punkt der Mittelpunkt der Kraft wäre. Er muß ſich alſo von dem wirklichen Mittelpunkt S der Kraft, welcher vermöge des oben bewieſenen zwiſchen P und J fällt, wiederum entfernen. In dem hier betrachteten Fall von Centralbewegungen übertreffen die Geſchwindigkeit des Planeten in ſeiner Bahn und die Geſchwindigkeit in einem Kreis, welcher aus dem Mittelpunkt der Sonne durch den Ort des Planeten beſchrieben wird, einander wechſelsweiſe, die erſtere in dem Perihelio, die letztere in dem Aphelio.

§. 275. Vermöge des dritten keplerischen Geſetzes (§. 180.) verhalten ſich die Quadrate der ſideriſchen Umlaufszeiten der Planeten wie die Würfel ihrer mittleren Entfernungen von der Sonne. Dieſe Umlaufszeiten ſind alſo

von der Excentricität der Planetenbahnen unabhängig, und ſie werden daher unverändert bleiben, wenn man die Planeten Kreiſe um die Sonne beſchreiben läßt, deren Halbmeſſer den halben großen Axen der elliptiſchen Planetenbahnen gleich ſind. Bezeichnet man die Halbmeſſer dieſer Kreiſe mit r und R, und die Umlaufszeiten mit t und T; ſo wird man die Proportion haben $t^2 : T^2 = r^3 : R^3$.

Aber, wenn mehrere Körper um einen gemeinſchaftlichen Mittelpunkt als Mittelpunkt der Kräfte Kreiſe von den Halbmeſſern r und R in den Zeiten t und T beſchreiben; ſo ſind die Centralkräfte beziehungsweiſe $k = \frac{4r\pi^2}{t^2}$ und $K = \frac{4R\pi^2}{T^2}$ (§. 273. n. 2.) folglich iſt $k : K$ im zuſammengeſetzten Verhältniß von $r : R$ und von $T^2 : t^2$ od. im zuſammengeſetzten Verhältniß von $r : R$ und von $R^3 : r^3$ (3tes kep. Geſ.); mithin $k : K = R^2 : r^2$.

Daſſelbe Geſetz der Centripetalkraft, welches für die kleinſte und gröſte Entfernung eines jeden Planeten von der Sonne gilt, beſtätigt ſich alſo auch von einem Planeten zu dem anderen, und es iſt ſehr wahrſcheinlich, daß es ſich auf alle Punkte der Planetenbahnen, und allgemein auf alle Entfernungen von der Sonne erſtrekt. Die folgenden Unterſuchungen werden die Allgemeinheit dieſes Geſetzes auſſer allem Zweifel ſetzen.

§. 276. Ein Körper gehe 1.) von dem gegebenen Punkt A (Fig. 106.) mit einer gegebenen Geſchwindigkeit nach der gegebenen Richtung AB aus, und eine conſtante Kraft wirke auf ihn beſtändig mit der gegebenen geraden Linie AD parallel; ſo wird die Bewegung des Körpers aus einer gleichförmigen mit der geraden Linie AB parallelen und aus einer gleichförmig beſchleunigten mit der geraden Linie AD parallel laufenden Bewegung zuſammengeſetzt, und daher krummlinigt ſeyn. Man ziehe durch beliebige Punkte B, Q der AB die Parallelen BG, QM mit AD, welche der von dem Körper beſchriebenen krummen Linie in G und M begegnen, und durch G, M die GK, MP mit AB parallel. Da die mit AD parallel laufende Bewegung eine gleichförmig beſchleunigte iſt; ſo wird ſich verhalten $\left\{\frac{BG}{AK}\right\} : \left\{\frac{QM}{AP}\right\} =$

Geschwindigkeit der Bewegung von *M* bis *A* zu der Geschwindigkeit der Bewegung von *D* bis *E* (§. 231.), wie das aus dem Mittelpunkt *S* der Kräfte auf die letztere Richtung der Bewegung gefällte Perpendickel *SP* zu dem Perpendickel *SR* auf die erstere Richtung.

Je kleiner man nun die Zeittheilchen nimmt, in welchen die Stöße der Centripetalkraft aufeinander folgen, desto mehr nähert sich die stoßweise wirkende Kraft einer stetig wirkenden, und zu gleicher Zeit nähert sich das Vieleck einer stetig krummen Linie. Dabey bleiben beständig die Flächenräume den Zeiten proportional, in welchen sie beschrieben wurden. Man lasse die Kraft stetig nach einem gegebenen Punkt *S* hin wirken; so wird das Vieleck in eine gegen den Mittelpunkt *S* der Kraft hole stetig krumme Linie übergehen, und die Sectoren, welche die von *S* ausgehende Radii Vectores abschneiden, werden den Zeiten proportional seyn, in welchen sie beschrieben wurden. Und umgekehrt, wenn ein frey sich bewegender Körper eine in einer Ebene liegende krumme Linie so beschreibt, daß die von einem in dieser Ebene liegenden Punkt ausgehende Radii Vectores den Zeiten proportionale Flächenräume abschneiden; so ist der erwähnte Punkt der Mittelpunkt der Kräfte. Die Centripetalkraft kann übrigens aus mehreren nach verschiedenen Richtungen wirkenden Kräften zusammengesetzt seyn, nur muß die aus allen diesen Kräften zusammengesetzte Kraft gegen den gegebenen Punkt hin gerichtet seyn, von welchem die Radii Vectores ausgehen.

Die Perpendickel *SR*, *SP* aus dem Mittelpunkt *S* der Kraft auf die Richtungen *MA*, *DE* der Bewegung des Körpers werden im Fall der stetig krummlinigten Bewegung in diejenigen Perpendickel übergehen, welche aus dem Mittelpunkt der Kräfte auf die Tangenten der krummlinigten Bahn gefällt werden. Bey jeder freyen krummlinigten Centralbewegung werden also die aus dem Mittelpunkt der Kräfte auf die Tangenten der Bahn gefällten Perpendickel umgekehrt den Geschwindigkeiten proportional seyn, welche der Körper in den Berührungspunkten hat.

§. 273. Vermöge des zweyten keplerischen Gesetzes (§. 179.) sind die elliptischen Sectoren, welche die aus dem Mittelpunkt der Sonne an einen Planeten gezogene Radii Vectores abschneiden, den Zeiten proportional, in welchen sie beschrieben werden; folglich ist die Kraft, welche die Planeten nöthigt, um die Sonne ihre krummlinigte Bahnen zu beschreiben, gegen den Mittelpunkt der Sonne hin gerichtet. Das zweyte keplerische Gesetz ist ein allgemeines Gesetz der freyen Centralbewegung. Jeder Körper, welcher durch eine, oder durch eine aus mehreren zusammengesetzte Kraft beständig gegen einen unbeweglichen Punkt hin getrieben wird, und nach einer Richtung, welche weder mit der Richtung der Centripetalkraft zusammenfällt, noch ihr entgegengesetzt ist, auf irgend eine Weise in Bewegung gesetzt worden ist, wird, wenn keine Hindernisse der Bewegung vorhanden sind, eine gegen den Mittelpunkt der Kräfte hole krumme Linie beschreiben, so daß die Flächenräume, welche die aus dem Mittelpunkt der Kräfte ausgehende Radii Vectores abschneiden, den Zeiten proportional wachsen, nach welchem Gesetz auch die Centripetalkraft mit der Veränderung des Abstands des Körpers von dem Mittelpunkt der Kräfte sich verändern mag.

Um nun das Gesetz zu finden, nach welchem die Centripetalkraft von der Entfernung des Körpers vom Mittelpunkt der Kraft abhängt, und die Größe der Kraft selbst angeben zu können, welche den Körper von seinem geradlinigten Weg beständig ablenkt, wird man die Größe der Ablenkung von der Tangente der krummen Linie, welche der Körper beschreibt, zu bestimmen haben, und zwar wird, weil die Kräfte durch diejenige Geschwindigkeit gemessen werden, welche sie nach einer gegebenen Richtung in einer gegebenen Zeit erzeugen würden, wenn sie während dieser Zeit constant blieben, diejenige Ablenkung von der Tangente auszumitteln seyn, welche die Centralkraft in einer gegebenen Zeit hervorbringen würde, wenn sie während dieser Zeit nach ihrer anfänglichen Richtung mit gleicher Stärke fortwirkte. Der einfachste Fall ist derjenige, wenn ein Körper einen Kreis beschreibt, und des Kreises Mittelpunkt der

Mittelpunkt der Kraft ist. In diesem Fall sind die aus dem Mittelpunkt der Kraft auf die Tangenten des Kreises gefällten Perpendickel dem Halbmesser des Kreises gleich, und folglich ist diese Centralbewegung gleichförmig (§. 272.). Es sey AB (Fig. 104.) der Bogen, welchen der in dem aus C als Mittelpunkt mit dem Halbmesser CA beschriebenen Kreis sich bewegende Körper in einer gegebenen Zeit, z. B. in einer Sekunde beschreibt, und AG sey die Höhe, von welcher der Körper von dem Punkt A aus gegen C in derselben Zeit, in welcher der Bogen AB beschrieben wird, fallen würde, wenn auf ihn die Centralkraft mit derjenigen Stärke, welche sie in A hat, fortwirkte, und der Körper keine Geschwindigkeit nach der Richtung der Tangente AT gehabt hätte, oder anfänglich in Ruhe gewesen wäre. Man theile die Zeit, in welcher der Bogen AB beschrieben wird, so wie den Bogen AB selbst in eine beliebige Anzahl gleicher Theile, welche $= n$ sey. Es sey $AE = \frac{1}{n} AB$. Man ziehe EP auf den durch A gehenden Durchmesser AD senkrecht, vollende das Parallelogramm $APEH$ und ziehe die Chorden AE, ED. Wirkte die Centralkraft stoßweise, und theilte sie dem Körper in dem Punkt A plötzlich die Geschwindigkeit AP mit, so würde er, wenn er nach der Richtung der Tangente AT die Geschwindigkeit AH hätte, am Ende der Zeit, in welcher er den Bogen AE wirklich beschrieben hat, durch die Bewegung auf der Chorde AE des Kreises an demselben Punkt E gekommen seyn.

Es verhält sich aber $\left.\begin{matrix} AD \\ 2AC \end{matrix}\right\}$: Chorde AE = Chorde AE : AP;

folglich ist $AP = \frac{\text{dem Quadr. d. Chorde } AE}{2AC}$

Da nun der Weg, welchen der Körper nach der Richtung AT der Tangente in $\frac{1}{n}$-tel Sekunde zurücklegen würde dem Bogen AE gleich, und daher größer als AH ist; so muß der Raum, durch welchen die Centralkraft den Körper in $\frac{1}{n}$ Sekunde fallen machen würde, größer AP seyn, und weil vermöge der Gesetze der gleichförmig beschleunigten Be-

wegung die Fallhöhe in $\frac{1}{n}$ Sekunde zu der Fallhöhe in 1 Sek. ſich verhält, wie $\frac{1}{n^2} : 1 = 1 : n^2$; ſo wird die Fallhöhe in 1 Sekunde, d. i. $AG \geqslant n^2 . AP$ oder $\geqslant \frac{n^2 . \overline{\text{Chorde } AE}^2}{2AC}$ $\geqslant \frac{n^2 . \overline{AE}^2}{2AC} \left(\frac{\text{Chorde } AE}{\text{Bogen } AE}\right)^2$, oder auch, weil $n . AE = AB$ iſt (Conſtr.),

$$AG \geqslant \frac{\overline{AB}^2}{2AC} \left(\frac{\text{Chorde } \frac{1}{n} AB}{\text{Bogen } \frac{1}{n} AB}\right)^2 \text{ ſeyn.}$$

Man ziehe an den anderen Endpunkt E des Bogens AE den Durchmeſſer FE, deſſen Verlängerung der Tangente AT in T begegne, und vollende das Parallelogramm $AQET$; ſo würde der Körper, wenn er nach der Richtung der Tangente eine Geſchwindigkeit gehabt hätte, mit welcher er in $\frac{1}{n}$ Sekunde den Weg AT gleichförmig hätte zurücklegen können, und zugleich in A nach der mit TE parallelen Richtung AQ die Geſchwindigkeit AQ erhalten hätte, die Diagonale AE des Parallelogramms $AQET$ in $\frac{1}{n}$ Sekunde beſchrieben haben, und am Ende dieſes Zeittheilchens in dem Endpunkt E des Bogens AE angekommen ſeyn, welchen er in dieſer Zeit wirklich beſchrieben hat. Dieſer Bogen iſt aber kleiner als AT; folglich muß der Raum, durch welchen die Centralkraft den Körper in $\frac{1}{n}$ Sek. fallen machen würde kleiner als TE, und die Fallhöhe AG in 1 Sek. kleiner als $n^2 . TE$ ſeyn. Es iſt aber (III, 36.) $FT \times TE = \overline{AT}^2$, und daher $TE = \frac{\overline{AT}^2}{FT} < \frac{\overline{AT}^2}{FE}$, $n^2 . TE < \frac{n^2 . \overline{AT}^2}{2AC}$; folglich muß um ſo mehr

$$AG < \frac{n^2 . \overline{AT}^2}{2AC} < \frac{n^2 . \overline{AE}^2}{2AC} \left(\frac{AT}{AE}\right)^2 < \frac{\overline{AB}^2}{2AC} \left(\frac{\text{Tang. } \frac{1}{n} AB}{\text{Bogen } \frac{1}{n} AB}\right) \text{ ſeyn.}$$

Nun iſt die Geſchwindigkeit, welche eine conſtante Kraft während einer gegebenen Zeit erzeugt das Doppelte

§. 278. Wenn ein Körper A durch eine gegen einen gegebenen Punkt S (Fig. 109.) gerichtete Kraft genöthigt wird, eine krumme Linie AMm zu beschreiben, und ein anderer Körper B in der geraden Linie BS durch ebendieſe Kraft getrieben gegen den Mittelpunkt S der Kraft fällt; ſo wird, wenn der letztere durch den freyen Fall von der Höhe BN in dem Punkt N eine Geſchwindigkeit erlangt hat, welche der Geſchwindigkeit des in der krummen Linie ſich bewegenden Körpers an dem eben ſo weit, als N, von S entfernten Punkt M gleich iſt, auch in allen übrigen gleichweit von S entfernten Punkten der geraden Linie BS und der krummen Linie AMm die Geſchwindigkeit von B der Geſchwindigkeit von A gleich ſeyn *).

Man beſchreibe aus S als Mittelpunkt mit den Halbmeſſern SN, Sn die Kreisbogen NM, nm. Der erſtere wird, weil $SM = SN$, durch den Punkt M gehen, der letztere begegne der krummen Linie in m und dem Halbmeſſer SM in p. Ferner ziehe man die Tangente Mt an den Punkt M der krummen Linie, und die Tangente pt an den Punkt p des Kreisbogens mn, welche der Tangente Mt in t begegne, vollende das Parallelogramm $Mptq$, und ziehe pr auf Mt ſenkrecht. Die Bewegung von A an dem Punkt M zerfällt alſo in die zwey Bewegungen Mq und Mp, und weil vermöge der Vorausſetzung die Geſchwindigkeiten von A und B an den Punkten M N einander gleich ſind; ſo verhält ſich die Zeit der Bewegung von A durch Mt zu der Zeit der Bewegung von B durch Nn wie $Mt : Nn = Mt : Mp$. Die nach der Richtung Mp wirkende Centripetalkraft zerfällt in die Seitenkräfte Mr und rp, von welchen die erſtere nach der Richtung Mt der Bewegung von A wirkende die Geſchwindigkeit von A vergrößert, die letztere auf Mt ſenkrechte keinen Einfluß auf die Geſchwindigkeit von A hat, ſondern nur den Körper A von ſeinem geradlinigten Weg ablenkt, und ihn eine krumme Linie beſchreiben macht. Die in gleichen Zeiten durch die Centripetalkraft und durch die Kraft Mr erzeugte Geſchwindigkeiten werden ſich alſo zu einander verhalten wie $Mp : Mr$. Da aber die Zeiten der Bewegungen ungleich ſind; ſo wird der Zuwachs der Geſchwindigkeit von N zu dem Zuwachs der Geſchwindigkeit von M im zuſammengeſetzten Verhältniß aus den Kräften und den Zeiten ſeyn. Mithin wird ſich verhalten die Zunahme der Geſchwindigkeit von B zu der Zunahme der Geſchwindigkeit von $A = \overline{Mp}^2 : tM \cdot Mr$. Es verhält ſich aber (VI, 8.) $tM : Mp = Mp : Mr$; folglich iſt $tM \cdot Mr = \overline{Mp}^2$. Alſo erhalten die Bewegungen von B und A bey gleichen Annäherungen zu dem Mittelpunkt S der Kraft gleichen Zuwachs an Geſchwindigkeit, und daher müſſen die Geſchwindigkeiten von B und A, wenn ſie in den gleichen Entfernungen SN und SM einander gleich waren, auch in den gleichen Diſtanzen Sn und Sm einander gleich ſeyn. Ebenſo kann gezeigt

*) Newt. princ. L. I. prop. XL.

werden, daß die Bewegungen der zwey Körper, wenn sie sich um gleich viel von dem Mittelpunkt der Kraft entfernen, gleiche Verzögerungen leiden.

Hieraus folgt nun auch, daß ein Körper A, welcher genöthigt wird, sich auf einer stetig krummen Linie AM als vorgeschriebenem Weg zu bewegen, und in irgend einem Punkt M seines Wegs diejenige Geschwindigkeit hat, welche ein frey von der Höhe BN fallender Körper B in N erreicht haben würde, in jedem anderen Punkt m seines Wegs mit derjenigen Geschwindigkeit ankommen werde, welche der frey von der Höhe Bn fallende Körper in n erlangt haben würde. Denn nun vertritt der Widerstand des vorgeschriebenen Wegs die Stelle der Kraft rp, und die Geschwindigkeit des Körpers nach der Richtung der Tangente Mt wird durch die Krümmung des Wegs nicht geändert (§. 256.). Was also in dem 257sten §. von dem Fall auf einem vorgeschriebenen Weg bewiesen worden ist, wenn die Kraft constant ist, und nach parallelen Richtungen wirkt, gilt allgemein von jeder veränderlichen nach einem gegebenen Punkt hin wirkenden Kraft.

§. 279. Wenn die krumme Linie gegeben ist, welcher ein Körper A mit einer freyen Centralbewegung beschreibt, so kann man das Gesetz finden, nach welchem die aus dem Mittelpunkt der Kraft auf die Tangenten der krummen Linie gefällten Perpendikel, mithin auch die Geschwindigkeiten der Bewegung (§. 272.), von den an die Berührungspunkte gezogenen Radiis abhängen. Alsdenn wird die Bestimmung des Gesetzes der Centripetalkraft auf die Auflösung der Aufgabe zurückgeführt: aus dem Gesetz, nach welchem die Geschwindigkeit der geradlinigten Bewegung eines anderen Körpers B mit seinen Entfernungen von einem in dieser geraden Linie liegenden Punkt S sich verändert, das Gesetz der Kraft finden, welche den Körper gegen diesem Punkt hin treibt.

Die krumme Linie sey z. B. eine Ellipse $ADPE$ (Fig. 105.), und der Brennpunkt S der Mittelpunkt der Kraft. Man ziehe SR auf die Tangente RF senkrecht; so liegt, wie §. 274. gezeigt worden ist, der Punkt R auf dem Umfang eines über der großen Axe als Durchmesser beschriebenen Kreises. SR verlängert begegne diesem Kreis auf der a dern Seite von S in r. Man nehme $rq = rS$, ziehe Fq, Cr und durch S die Parallele Sm mit FM, welche von der Fq in m geschnitten werde. Da $SC = CF$ und $Sr = rq$; so sind Cr und Fq einander parallel (VI, 2), und daher ist $Fq = 2Cr = AP = FQ$ (S. §. 274.). Und weil $QM = MS$; so ist MS mit Fq parallel, und $Sm = FM$, $SM = Fm$ (I, 34), mithin m ein Punkt ebendieser Ellipse, welche von der geraden Linie mr in m berührt wird, weil $Sm = mq$ und $Sr = rq$, also $Smr = rmq$ ist. Wegen der Aehnlichkeit der Dreyecke RMS u. Smr verhält sich aber $SM : \left\{\begin{matrix} Sm \\ MF \end{matrix}\right\} = SR : Sr$

$$= \overline{SR}^2 : \begin{cases} SR.Sr \\ PS.SA \text{ (III, 35.)} \\ \overline{CD}^2 \text{ (Kegelschn. II, 2.)}; \end{cases}$$

folglich verhält sich, wenn man den Radius Vector $SM = z$, die halbe große Axe $= a$, und die halbe kleine Axe $= b$ setzt

$$z : 2a - z = \overline{SR}^2 : b^2$$

Man setze die Geschwindigkeit in $P = c$, die Geschwindigkeit in $M = v$, und $SP = h$; so verhält sich

$$v : c = h : SR$$
$$v^2 : c^2 = h^2 : \overline{SR}^2.$$

Da nun $z : 2a - z = \overline{SR}^2 : b^2$

so ist $v^2 z : c^2 (2a - z) = h^2 : b^2$,

und $v^2 = \frac{c^2 h^2}{b^2} \cdot \frac{2a - z}{z}$.

Die Geschwindigkeit v verschwindet, wenn $z = 2a$ wird. Wenn man also den Radius Vector SM so über den Punkt M hinaus verlängert, daß $SB = 2a$ oder $=$ der großen Axe AP wird; so wird ein von dem Punkt B von der Ruhe an fallender Körper durch die Einwirkung der Centripetalkraft in dem Augenblick, da er in M auf dem Umfang der Ellipse ankommt, dieselbe Geschwindigkeit erlangt haben, welche der in der Ellipse sich bewegende Körper in M hat.

Man setze die den Distanzen $z + x$ und $z - x$ entsprechende Geschwindigkeiten beziehungsweise $= u$ und u'; so wird man haben

$$u^2 = \frac{c^2 h^2}{b^2} \cdot \frac{2a - (z + x)}{z + x},$$

$$u'^2 = \frac{c^2 h^2}{b^2} \cdot \frac{2a - (z - x)}{z - x};$$

und 1.) $v^2 - u^2 = \frac{2ac^2 h^2 x}{b^2 z (z + x)}$

2.) $u'^2 - v^2 = \frac{2ac^2 h^2 x}{b^2 z (z - x)}$.

Es ist aber das Quadrat der Geschwindigkeit, welche eine constante Kraft $2g$ während der Zeit erzeugt, in welcher der von ihr beschleunigte Körper den Weg s zurücklegt, $= 4gs$ (§. 234. n. 5.) und daher wächst, wenn die Kraft constant ist, das Quadrat der Geschwindigkeit dem Raum s proportional. Folglich muß, da (vermöge n. 3. und 4.) $v^2 - u^2 < u'^2 - v^2$ ist, die Centralkraft in der Distanz $z + x$ kleiner, als in der Distanz $z - x$, mithin die Centralkraft selbst beständig

$$> \text{als } \frac{v^2 - u^2}{2x} \text{ oder } > \frac{ac^2 h^2}{b^2 z (z + x)}$$

aber $<$ als $\frac{u'^2 - v^2}{2x}$ oder $< \frac{ac^2 h^2}{b^2 z (z - x)}$ seyn.

Da nun durch die Verminderung von x der Unterſchied dieſer zwey Ausdrücke kleiner gemacht werden kann, als jede gegebene Größe; ſo iſt die Centripetalkraft $= \frac{ac^2k^2}{b^2z^2}$, und daher umgekehrt dem Quadrat der Entfernung von dem Brennpunkt der Ellipſe proportional.

Eben ſo findet man, daß in der Hyperbel, wenn man ihre halbe Querare $= a$, die halbe zugeordnete Axe $= b$, und den Abſtand eines ihrer Punkte von dem auf der holen Seite liegenden Brennpunkt $= z$ ſetzt, $z : 2a + z =$ Quadr. des Perp. aus dem Brennpunkt auf die Tangente: b^2, und

$$v^2 = \frac{c^2k^2}{b^2} \cdot \frac{2a+z}{z}$$

$$u^2 = \frac{c^2k^2}{b^2} \cdot \frac{2a+z+x}{z+x}$$

$$u'^2 = \frac{c^2k^2}{b^2} \cdot \frac{2a+z-x}{z-x},$$

mithin $\frac{v^2-u^2}{2x} = \frac{ac^2k^2}{b^2z(z+x)}$

$\frac{u'^2-v^2}{2x} = \frac{ac^2k^2}{b^2z(z-x)}$,

woraus wiederum die Centripetalkraft $= \frac{ac^2k^2}{b^2z^2}$ folgt, welche demnach auch in der Hyperbel umgekehrt dem Quadrat der Entfernung von dem Mittelpunkt der Kraft proportional iſt.

Endlich findet ſich, wenn z den aus dem Brennpunkt der Parabel gezogenen Radius Vector, und h den Abſtand des Brennpunkts von dem Scheitel der Axe, oder den vierten Theil ihres Parameters bezeichnet, $v^2 = \frac{c^2h}{z}$;

mithin $\frac{v^2-u^2}{2x} = \frac{c^2h}{2z(z+x)}$

$\frac{u'^2-v^2}{2x} = \frac{c^2h}{2z(z-x)}$

folglich iſt die Centripetalkraft $= \frac{\frac{1}{2}c^2h}{z^2}$, und daher iſt ſie auch in der Parabel umgekehrt dem Quadrat der Entfernung von dem Mittelpunkt der Kraft proportional.

§. 280. Man bezeichne die der Diſtanz z entſprechende Centripetalkraft mit k; ſo wird k diejenige Geſchwindigkeit ſeyn, welche dieſe Kraft als conſtant betrachtet in derſelben Zeit erzeugen würde, in welcher der Körper mit ſeiner dem kleinſten Abſtand von dem Mittelpunkt der Kraft entſprechenden Geſchwindigkeit den Raum c

schrieben haben würde. Ferner sey der halbe Para-
elschnitts $= l$; so wird man für die Ellipse und Hy-
$\ldots : b = b : l$ (Kegelschn. II, Erkl. 9. III, Erkl. 13.),
$\ldots = b^2$. Für die Parabel ist $l = 2h$ (Kegelschn. I, Erkl. 6.
Vermöge des vorhergehenden §. ist nun, wenn der
p r Mittelpunkt der Kraft ist,

1.) $k = \frac{ac^2h^2}{b^2z^2} = \frac{c^2h^2}{lz^2}$ für die Ellipse und Hyperbel.

2.) $k = \frac{\frac{1}{2}c^2h}{z^2}$ für die Parabel, welcher Ausdruck auch aus n. 1. folgt, wenn man, wie es in der Parabel seyn muß, $l = 2h$ setzt. Mithin ist allgemein für jeden Kegelschnitt $k = \frac{c^2h^2}{lz^2}$.

Sodenn ist nach eben diesem §.

3.) $v^2 = \frac{c^2h^2(2a-z)}{b^2z}$ für die Ellipse

4.) $v^2 = \frac{c^2h^2(2a+z)}{b^2z}$ für die Hyperbel.

5.) $v^2 = \frac{c^2h}{z}$ für die Parabel.

Es ist aber $\frac{c^2h^2}{b^2z} = \frac{kz}{a}$ (n. 1.); folglich ist, wenn man diesen Ausdruck in n. 3. substituirt, $v^2 = \frac{k}{a}(2a-z)z$, woraus man erhält

6.) $2a = \frac{2kz^2}{2kz-v^2}$ für die Ellipse.

Eben so findet sich

7.) $2a = \frac{2kz^2}{v^2-2kz}$ für die Hyperbel.

Für die Parabel ist $2kz^2 = c\,h$ (n. 2.), und $v^2z = c^2h$ (n. 5); folglich $2kz^2 = v^2z$, und $2kz = v^2$.

So lange als $2kz > v^2$ ist, bleibt in n. 6. die große Axe $2a$ positiv. Wird $2kz = v^2$; so wird $2a = \infty$, und für $2kz < v^2$ wird $2a$ negativ. Der Ausdruck n. 6. kann also auch auf die Parabel und Hyperbel angewendet werden.

Aus n. 6. folgt $2a - z = \frac{v^2z}{2kz-v^2}$; mithin verhält sich $2a-z : z = v^2 : 2kz - v^2$, und daher ist in der Ellipse

8.) $2a - z > z$, wenn $\begin{cases} v^2 > 2kz - v^2, \\ v^2 > kz, \end{cases}$

9.)

9.) $2a - z < z$, wenn $\begin{cases} v^2 < 2kz - v^2 \\ v^2 < kz. \end{cases}$

10.) $2a - z = z$, wenn $v^2 = kz$.

Im letzteren Fall müßte der Radius Vector z an einen der Scheitel der kleinen Axe der Ellipse gehen, und, wenn zugleich die Richtung der Bewegung des Körpers auf dem Radius Vector z senkrecht wäre; so müßten die von einem der Endpunkte der kleinen Axe an die zwey Brennpunkte der Ellipse gezogenen geraden Linien auf einander fallen, oder die Ellipse in einen Kreis, dessen Halbmesser $= a$, übergehen.

Man setze den Winkel, welchen die Tangente der krummen Linie mit dem an den Berührungspunkt gezogenen Radius Vector macht $= m$; so ist das aus dem Mittelpunkt der Kraft auf diese Tangente gefällte Perpendikel $= z \sin. m$, und es verhält sich (§. 272.)

$v : c = k : z \sin. m$, mithin ist $c^2 k^2 = v^2 z^2 \sin.\overline{m}^2$, und vermöge n. 1.

$$k = \frac{av^2 z^2 \sin.\overline{m}^2}{b^2 z^2} = \frac{av^2 \sin.\overline{m}^2}{b^2}.$$ Also verhält sich

11.) $k : a = v^2 \sin.\overline{m}^2 : b^2$

Es werde eine andere Ellipse vermöge einer Centripetalkraft beschrieben, welche in der Distanz z der Kraft k gleich sey. In ebendieser Distanz sey auch die Geschwindigkeit v der Geschwindigkeit in der ersten Ellipse gleich, der Winkel des Radius Vector z mit der Tangente sey $= m'$; so ist die halbe große Axe wie in der ersteren $= a$, (§. 280. n. 6.). Sey die halbe kleine Axe $= b'$; so wird man haben $k' : a = v^2 \sin.\overline{m'}^2 : b'^2$, also $v^2 \sin.\overline{m}^2 : v^2 \sin.\overline{m'}^2 = b^2 : b'^2$, oder

12.) $\sin. m : \sin. m' = b : b'$.

Demnach sind in diesem Fall die kleinen Axen den Sinus der Winkel m, m' oder den aus dem Mittelpunkt der Kraft auf die Tangenten gefällten Perpendikeln proportional. Ebendieser Satz gilt auch von der Hyperbel.

Da $b^2 = al$; so verhält sich nach n. 11. $\left.\begin{matrix} k : a \\ kl : al \end{matrix}\right\} = v^2 \sin.\overline{m}^2 : \left\{\begin{matrix} b^2 \\ al \end{matrix}\right\}$.

Folglich ist $kl = v^2 \sin.\overline{m}^2$, oder es verhält, wenn eine Ellipse, Parabel, oder Hyperbel um den Brennpunkt als Mittelpunkt der Kraft beschrieben wird,

13.) $k : v \sin. m = v \sin. m : l$, mithin auch $k : l = k^2 : v^2 \sin.\overline{m}^2$.

Für den Kreis wird $m = 90°$, und l wird dem Halbmesser des Kreises gleich, woraus $k = \frac{v^2}{l}$ folgt, wie man in dem 273sten §. gefunden hat.

§. 281. Wenn die Centripetalkraft umgekehrt dem Quadrat

der Entfernung von dem Mittelpunkt S (Fig. 110.) der Kraft proportional, ihre Größe für eine gegebene Entfernung SH gegeben ist, und einem Körper in einem gegebenen Punkt A eine gegebene Geschwindigkeit AC nach einer gegebenen auf AS schiefen Richtung mitgetheilt wird; so kann immer ein Kegelschnitt gefunden werden, welcher unter diesen Umständen von dem Körper beschrieben werden kann. Da nemlich sich verhält die Kraft in H : Kraft in $A = \overline{SA}^2 : \overline{SH}^2$; so ist die Größe der Centripetalkraft in dem gegebenen Punkt A gegeben. Man setze sie $= k$, die gegebene Distanz $SA = z$, und die anfängliche Geschwindigkeit $AC = v$; so wird der gesuchte Kegelschnitt eine Ellipse (den Kreis mit eingeschlossen), oder eine Parabel, oder eine Hyperbel seyn, je nachdem $v^2 \begin{matrix} < \\ = \\ > \end{matrix} 2kz$ ist. Im ersten und dritten Fall ist die große Axe der Ellipse nach §. 280. n. 6. und die Queraxe der Hyperbel nach n. 7. gegeben, und für alle drey Fälle erhält man den Parameter des Kegelschnitts nach n. 13. Ferner muß der Kegelschnitt die gerade Linie AC in dem gegebenen Punkt A berühren; mithin ist der Kegelschnitt gegeben, und er kann, wie hernach gezeigt werden soll, verzeichnet oder berechnet werden.

Es kann aber gezeigt werden, daß ein Körper, welcher von einem gegebenen Punkt nach einer gegebenen Richtung mit einer gegebenen Geschwindigkeit ausgeht, und gegen einen gegebenen Punkt hin durch eine Kraft getrieben wird, deren Größe in einer gegebenen Entfernung von dem Mittelpunkt der Kraft sammt dem Gesetz, nach welchem sie sich mit den Entfernungen von diesem Mittelpunkt verändert, gegeben ist, nur Eine krumme Linie beschreiben kann. Man nehme zuerst wie in §. 271. an, die Kraft wirke stoßweise; so wird, wenn man das Vieleck $ABCDEF$ (Fig. 103.) nach dem angeführten §. construirt hat, und sich nun, indem man von denselben gegebenen Größen ausgeht, ein zweytes Vieleck verzeichnet gedenkt, dieses zweyte Vieleck mit dem ersteren congruent seyn, weil vermöge der Bedingungen SA, SAT, AG, Aa in beyden Vielecken einander gleich seyn müßen, und daher das erste Dreyeck des zweyten Vielecks das Dreyeck ASB des ersten, ferner das zweyte Dreyeck jenes Vielecks das Dreyeck BSC u. s. w. decken muß. Man nehme die Zwischenzeiten der Stöße immer kleiner und kleiner; so werden, weil das Gesetz der Kraft in den zwey Vielecken dasselbe bleiben soll, beständig die in gleichen Zeiten beschriebene Vielecke einander decken, wie klein man auch jene Zwischenzeiten nehmen mag. Mithin werden auch die stetig krummen Linien, welchen sich die Vielecke bey der Verkleinerung der Zwischenzeiten beständig nähern, aufeinander fallen müßen, wenn man sie so aufeinander legt, daß der Anfangspunkt A der Bewegung, der Mit-

telpunkt S der Kräfte, und die gerade Linie AT, welche die anfängliche Richtung der Bewegung bezeichnet, auf einander zu liegen kommen.

Ein anderer Beweiß dieſes Satzes gründet ſich auf §. 278. Es ſeyen S und s (Fig. 110. und 111.) die Mittelpunkte der Kräfte, welche auf die Körper A und a wirken, und AC, ac ſeyen die anfänglichen Geſchwindigkeiten. Wenn nun $SAC = sac$, $AC = ac$, und die auf A und a wirkende Kräfte in gleichen Abſtänden von S und s beſtändig einander gleich ſind; ſo werden die Körper A und a einerley krumme Linie beſchreiben. Es ſey nemlich BA die Höhe, von welcher der Körper A fallen müßte, um in A durch die Wirkung der Centripetalkraft die Geſchwindigkeit AC zu erlangen. Die krumme Linie FGQ ſey ſo beſchrieben, daß die Ordinaten BF. AG, NQ der Centripetalkraft in den Diſtanzen BS, AS, NS proportional ſeyen; ſo werden die Quadrate der durch den Fall von den Höhen BA, BN, erlangten Geſchwindigkeiten den Flächenräumen $BFGK$, $BFQN$ proportional ſeyn (§. 249.). Eben ſo wird ſich in Fig. 111. verhalten das Quadrat der Geſchwindigkeit in a zu dem Quadrat der Geſchwindigkeit in n, wie die Fläche $bfga$: Fläche $bfqn$. Da nun die Kräfte in gleichen Entfernungen von den Mittelpunkten S, s einander gleich ſind (Vorausſ.); ſo werden, wenn $BA = ba$, $BN = bn$ ſind, die Flächenräume $BFGA$, $bfga$, und $BFNQ$, $bfnq$, mithin auch die durch den Fall von gleichen Höhen BA, ba, oder BN, bn erlangte Geſchwindigkeiten einander gleich ſeyn. Aus S und s ſeyen mit gleichen Halbmeſſern SN, sn die Kreiſe NM, nm beſchrieben, welche den krummen Linien AM, am in M und m begegnen, und NQ, nq ſeyen die den Punkten N, n entſprechende Ordinaten der krummen Linien FGQ, fgq. Nach §. 278. ſind die Geſchwindigkeiten in M und m den durch den freyen Fall von den Höhen BN, bn erlangten Geſchwindigkeiten gleich, und es verhält ſich

$$\left.\begin{matrix}\text{das Quadr. der Geſchw. in } M\\ \text{oder d. Q. der Geſchw. in } M\end{matrix}\right\} : \left\{\begin{matrix}\text{Quadr. d. Geſchw. in } A\\ \text{Quadr. d. Geſchw. in } a\end{matrix}\right\} = BFQN : \left\{\begin{matrix}BFGA\\ bfga\end{matrix}\right\}$$

$$\text{Quadr. d. Geſchw. in } a : \left\{\begin{matrix}\text{Quadr. d. Geſchw. in } n\\ \text{Quadr. d. Geſchw. in } m\end{matrix}\right\} = bfga : bfqn$$

$$\text{mithin Quadr. d. Geſchw. in } M : \text{Quadr. d. Geſchw. in } m = BFQN : bfqn.$$

Da nun die zwey Glieder des zweyten Verhältniſſes einander gleich ſind; ſo ſind in gleichen Diſtanzen SM, sm die Geſchwindigkeiten der krummlinigten Bewegungen einander gleich. Man ziehe an die Punkte M. m die Tangenten MT, mt und ziehe SP, SD, sp, sd auf MT, AC, mt, ac ſenkrecht; ſo verhält ſich (§. 272.)

$$\text{Die Geſchw. in } M : \text{Geſchw. in } A = SD : SP$$

$$\left.\begin{matrix}\text{Geſchw. in } a\\ \text{Geſchw. in } A\end{matrix}\right\} : \text{Geſchw. in } m = sp : \left\{\begin{matrix}sd\\ SD\end{matrix}\right\};$$

folglich Geschw. in M : Geschw. in $m = sp : SP$.

Die Geschwindigkeiten in M und m sind aber einander gleich; folglich muß $sp = SP$, und $smt = SMT$ seyn.

Demnach ist noch der rein geometrische Satz zu beweisen, daß, wenn $SA = sa$, $SAC = sac$, und auch an jeden anderen gleich weit von S und s entfernten Punkten M, m der krummen Linien AM, am die Winkel SMT, smt, oder die Perpendickel SP, sp einander gleich sind, auch die Winkel ASM, asm einander gleich seyen. Man nehme auf der SA einen Punkt E nach Belieben, mache $se = SE$, und beschreibe aus S und s als Mittelpunkten mit den Halbmessern $\left\{\begin{matrix} SE \\ se \end{matrix}\right\}$ die Kreisbogen EL, el, welche den geraden Linien SM, sm in L und l begegnen. An die Punkte L und l ziehe man die Tangenten LK, lk und verlängere sie bis an die wo nöthig verlängerte Tangenten MT, mt nach O und o. Man denke sich die krummen Linie $\left\{\begin{matrix} AM \\ am \end{matrix}\right\}$ durch die Bewegung eines Punkts beschrieben, welcher auf der geraden Linie $\left\{\begin{matrix} SM \\ sm \end{matrix}\right\}$ sich bewegt, indem zugleich die $\left\{\begin{matrix} SM \\ sm \end{matrix}\right\}$ sich um $\left\{\begin{matrix} S \\ s \end{matrix}\right\}$ dreht; so wird man die Geschwindigkeit von $\left\{\begin{matrix} M \\ m \end{matrix}\right\}$ als aus den Geschwindigkeiten $\left\{\begin{matrix} ML \\ ml \end{matrix}\right\}$ und $\left\{\begin{matrix} LO \\ lo \end{matrix}\right\}$ zusammengesetzt betrachten können, und es werden sich die Geschwindigkeiten nach den Richtungen MT, MS und LK verhalten wie MO, ML und LO. Da nun in gleichen Distanzen SM, sm beständig $SMT = smt$ ist, und man $\left\{\begin{matrix} se \\ sl \end{matrix}\right\} = \left\{\begin{matrix} SE \\ SL \end{matrix}\right\}$ genommen hat; so sind die Dreyecke MLO und mlo einander gleich, so daß, wenn man die Geschwindigkeiten, mit welchen die Punkte L und l sich im Kreis bewegen, einander gleich nimmt, die Geschwindigkeiten von M und m nach den Richtungen ML und ml in den zwey krummen Linien beständig einander gleich sind. Mithin ändern sich die Distanzen SM, sm in gleichen Zeiten, während welcher die Punkte L und l gleiche Winkel oder Bogen beschreiben, um gleich viel (§. 238.), und da in den Punkten A und a die SA der sa gleich war; so wird für $SM = sm$ auch $ASM = asm$ seyn. Eben dieses gilt von allen übrigen Punkten der krummen Linien AM und am; folglich wird, wenn man die Figur asm auf die ASM so legt, daß as auf die AS und ad auf die AD zu liegen kommt, der Bogen am auf den Bogen AM fallen. Demnach kann ein Körper, welcher von einem gegebenen Punkt A nach einer gegebenen Richtung AD mit einer gegebenen Geschwindigkeit AG ausgeht, und gegen einen gegebenen Punkt S hin durch eine gegebene und nach einem gegebenen Gesetz von den Distanzen SA, SM abhängende Kraft getrieben wird, nur

Eine krumme Linie beſchreiben, und wenn man eine krumme Linie gefunden hat, welche ein Körper unter dieſen Bedingungen beſchreiben kann; ſo muß er dieſe krumme Linie beſchreiben.

§. 282. Die Centripetalkraft ſey umgekehrt dem Quadrat der Entfernung von dem Mittelpunkt S (Fig. 112. 113. 114.) proportional, und ein Körper gehe von dem gegebenen Punkt M nach der gegebenen Richtung MT mit der gegebenen Geſchwindigkeit $\left\{\begin{matrix} MV \\ v \end{matrix}\right\}$ aus. In der gegebenen Diſtanz $\left\{\begin{matrix} SM \\ z \end{matrix}\right\}$ ſey die Centripetalkraft $= \left\{\begin{matrix} MQ \\ k \end{matrix}\right\}$, d. h. es ſey MG die Geſchwindigkeit, welche die Centripetalkraft, wenn ſie mit derjenigen Stärke, welche ſie in M hat, fortwirkte, in derſelben Zeit erzeugen würde, in welcher der Körper mit ſeiner anfänglichen Geſchwindigkeit den Weg MV gleichförmig zurücklegen würde. Man ſucht die krumme Linie, welche der Körper beſchreibt.

Es ſey 1.) $v < 2k$ oder $\overline{MV}^2 < 2GM.MS$ (Fig. 112.). Auf dem Radius Vector SM errichte man in ſeinem Endpunkt M das Perpendickel $ML = MV$, ziehe SL, und LE auf SL in L ſenkrecht, welche der verlängerten SM in E begegnen wird; ſo iſt $EM.MS = \overline{ML}^2 = \overline{MV}^2 < 2GM.MS$ (Vorausſ.), mithin $ME < 2GM$. Man trage von E gegen S die $EK = 2GM$; ſo fällt K auf die Verlängerung von EM. Man ziehe KL, und LQ auf KL in L ſenkrecht, welche die verlängerte SM in Q ſchneiden wird.

$$\begin{aligned}
&\text{Da } SM : ML = ML : ME \\
&\text{und } ML : MQ = MK : ML \\
&\text{ſo iſt } SM : MQ = MK : ME \\
&\quad SM : SQ = MK : \left\{\begin{matrix} EK \\ 2GM \end{matrix}\right. \\
&\qquad = SM.MK : 2GM.MS \\
&\qquad = 2GM.MS - EM.MS : 2GM.MS \\
&\qquad = 2GM.MS - \overline{ML}^2 : 2GM.MS \\
&\text{oder } z : SQ = 2kz - v^2 : 2kz
\end{aligned}$$

mithin $SQ = \frac{2kz^2}{2kz - v^2} =$ der großen Axe der Ellipſe (§. 280. n. 6). Man fälle von Q das Perpendickel QR auf die wo nöthig verlängerte TM, verlängere es ſo nach F, daß $RF = RQ$, ziehe durch S und F die gerade Linie SF, halbire SF in C, nehme $CP = CA = \frac{1}{2} SQ$, und beſchreibe um die Brennpunkte S, F eine Ellipſe, deren große Axe $= AP$ oder $= SQ$ ſey.

Da $FR = RQ$ und $MRF = R$; ſo iſt $FM = MQ$, und $SM + MF = SM + MQ = SQ$, mithin M ein Punkt der Ellipſe. Und weil $QMR = RMF$; ſo berührt die gerade Linie MT die Ellipſe in M (Kegelſchn. II, 12.). Die Centripetalkraft

ist, weil der Brennpunkt S der Mittelpunkt der Kraft ist, umgekehrt dem Quadrat der Distanz proportional (§. 279.). Um noch zu zeigen, daß in der gegebenen Distanz SM die Centripetalkraft $= GM$ sey, ziehe man die halbe kleine Axe CD der Ellipse, und fälle das Perpendickel Sr auf die Tangente MT; so verhält sich, wie §. 279 gezeigt worden ist,

$$SM : \begin{Bmatrix} FM \\ MQ \end{Bmatrix} = \overline{Sr}^2 : \overline{CD}^2$$

mithin auch $\overline{SM}^2 : SM.MQ = \overline{Sr}^2 : \overline{CD}^2$

und es ist $\overline{CD}^2 . \overline{SM}^2 = SM.MQ.\overline{Sr}^2$. Folglich verhält sich, wenn man die §. 279. gebrauchte Benennungen beybehält

$$b^2z^2 : c^2h^2 = SM.MQ.\overline{Sr}^2 : \begin{Bmatrix} c^2h^2 \\ v2.\overline{Sr}^2 \end{Bmatrix} *)$$
$$= SM.MQ : v^2.$$

Aber vermöge des oben bewiesenen verhält sich

$$\left.\begin{matrix} SQ : 2GM \\ 2AC : 2GM \\ AC : GM \end{matrix}\right\} = SM : MK$$
$$= SM.MQ : \begin{Bmatrix} QM.MK \\ ML^2 \\ v^2 \end{Bmatrix};$$

folglich ist $b^2z^2 : c^2h^2 = \binom{AC}{a} : GM$. Mithin ist nach §. 280. n. 1. die Centripetalkraft an dem Punkt $M = GM$, und daher kann der Körper die gefundene Ellipse beschreiben. Vermöge §. 281. kann er aber keine andere krumme Linie beschreiben; folglich muß der Körper eben diese Ellipse beschreiben.

Es sey 2.) $v = 2kz$ (Fig. 113.), mithin $ME = 2GM$. Die Punkte M und K fallen jetzt zusammen, und die Bahn des Körpers ist eine Parabel. Man ziehe SR auf MT senkrecht, verlängere SR nach N so, daß $RN = SR$, ziehe MN, und mit dieser durch S die Parallele SO. Man fälle aus R das Perpendickel RP auf SO, und beschreibe um den Punkt S als Brennpunkt eine Parabel, deren Axe SO, und deren Parameter $= 4SP$ sey.

Man ziehe durch N die Parallele NO mit RP; so ist $OP = PS$, weil $NR = RS$ (Constr.), und daher NO die Directrix dieser Parabel. Weil ferner $RN = RS$ und $NRM = R$; so ist $SM = MN$, und die Parabel geht durch den Punkt M. Endlich weil $SMR = RMN$; so berührt MT die Parabel in M (Kegelschn. I, 7.).

Da der Brennpunkt S der Mittelpunkt der Kraft ist; so ist (§. 279.) die Centripetalkraft umgekehrt dem Quadrat der Entfernung proportional. Daß diese Kraft in dem Punkt M

*) Weil $c : v = Sr : \binom{SP}{k}$ (§. 272.)

der Parabel $= MG$ sey, kann so gezeigt werden. Es ist $\left\{\begin{matrix} MD^2 \\ v^2 \end{matrix}\right\}$ $SM.ME = 2SM.GM$, weil $ME = 2GM$ (Voraus.), und $c^2 : v^2 = z : h$ (§. 280. n. 5.)

$$= z^2 : hz$$
$$c^2 : z^2 = v^2 : hz$$
$$= 2GM.z : hz$$
$$= 2GM : h$$
$$\tfrac{1}{2}c^2 : z^2 = GM : h.$$

Folglich ist nach §. 280. n. 2. die Centripetalkraft in dem Punkt M der Parabel $= GM$.

Es sey 3.) $v^2 > 2kz$, oder $\overline{MV}^2 > 2GM.MS$ (Fig. 114.). Man bestimme ME wie in n. 1. und nehme auf der ES von E an gegen S die $EK = 2GM$. Da $EM.MS = \overline{ML}^2 = \overline{MV}^2 > 2GM.MS$ (Voraus.); so ist $EM > 2GM$, und der Punkt K fällt zwischen E und M. Man ziehe KL, und die LQ auf LK in L senkrecht, welche der über M hinaus verlängerten KM in Q begegnen wird. Von Q fälle man das Perpendikel QR auf MT und verlängere es so nach F, daß $RF = RQ$. Man ziehe SF, halbire diese in C, nehme $CP = CA = \frac{1}{2}SQ$, und beschreibe mit der Querare AP oder SQ um den Punkt S als Brennpunkt eine Hyperbel, so daß F der Brennpunkt der entgegengesetzten Hyperbel sey.

Wegen der gleichen Dreyecke QMR und FMR ist $MF = MQ = MS + SQ$; folglich $MF - MS = SQ = AP$, und dabey M ein Punkt dieser Hyperbel. Und weil $QMR = FMT$; so berührt die gerade Linie MT die Hyperbel in M (Kegelschn. III, 39.). Endlich ist die Centripetalkraft umgekehrt dem Quadrat der Entfernung proportional (§. 279.), und man beweißt wie in n. 1. daß in der Entfernung SM die Centripetalkraft $= GM$ sey.

Wenn der Winkel SMT ein rechter (Fig. 115.) und $v^2 < 2kz$, oder $\overline{MV}^2 < 2GM.MS$ ist; so beschreibt der Körper eine Ellipse, welche den Punkt M zu einem ihrer Scheitel der großen Are hat, und zwar ist der Punkt M der von dem Brennpunkt S entfernteste oder ihm am nächsten liegende Scheitel, je nachdem v^2 kleiner oder größer als kz ist. Es sey $v^2 < kz$, oder $\overline{MV}^2 < GM.MS$, und ME sey wie in n. 1. die dritte geometrische Proportionallinie zu SM und MV; so ist $EM.MS = \overline{MV}^2 < GM.MS$, und $EM < GM$. Man nehme wie in n. 1. $EK = 2GM$. Da $2EM < \left\{\begin{matrix} 2GM \\ EK \end{matrix}\right\} < EM + MK$; so ist $EM < MK$, und MQ wird kleiner als MS. Und da vermöge n. 1. die große Are der Ellipse $= SQ$ ist; so wird, wenn man $MF = MQ$ macht, der Punkt F der andere Brennpunkt dieser Ellipse seyn, welche nun beschrieben werden kann. Es sey m der der andere

Scheitelpunkt der großen Axe; also $Sm = MQ$. Ich behaupte, daß der Körper, wenn er von dem Punkt m nach der auf Sm senkrechten Richtung mt mit derjenigen Geschwindigkeit ausgegangen wäre, welche er bey seiner Bewegung in der Ellipse an eben diesem Punkt m erhalten hat, um den Brennpunkt S als Mittelpunkt der Kraft dieselbe Ellipse beschrieben haben würde. Es sey nemlich mv die Geschwindigkeit des Körpers in m, und mg sey die Centripetalkraft an eben diesem Punkt; so verhält sich (S. d. Bew. von n. 1.)

$$SM : SQ = MK : EK$$
$$= QM.MK : QM.EK$$
$$= \overline{MV}^2 : \begin{pmatrix} QM.EK \\ 2Sm.MG \end{pmatrix}$$

ferner $\overline{Sm}^2 : \overline{SM}^2 = \begin{pmatrix} MG : mg \\ 2MG : 2mg \end{pmatrix}$ vermöge des Gesetzes der Centrip. Kraft

und $\overline{SM}^2 : \overline{Sm}^2 = \overline{mv}^2 : MV^2$ (§. 272.);

folglich $SM : SQ = \overline{mv}^2 : 2gm.Sm$,

und $2SM : SQ = \overline{mv}^2 : gm.Sm$.

Da nun $SM < SQ$; so ist $\overline{mv}^2 < 2gm.Sm$, und es kann mit der Geschwindigkeit mv eine Ellipse um den Mittelpunkt S der Kraft als Brennpunkt beschrieben werden (n. 1.). Und weil $SM > MQ$; so ist $2SM > SQ$, mithin $\overline{mv}^2 > gm.Sm$. Man mache dieselbe Construktion wie in n. 1.; so wird $em > mk$, und $mq > Sm$ werden. (S. den vorhergeh. Bew.). Es verhält sich aber

$$\overline{Sm}^2 : \overline{SM}^2 = \overline{MV}^2 : \overline{mv}^2$$
$$= QM.MK : Sm.me$$
$$= Sm.MK : Sm.me$$
$$= MK : me$$

und $\overline{Sm}^2 : \overline{SM}^2 = GM : gm$
$$= 2HM : 2gm$$
$$= EK : ek$$

folglich auch $\overline{Sm}^2 : \overline{SM}^2 = \begin{pmatrix} EK - MK \\ ME \end{pmatrix} : \begin{pmatrix} ek - me \\ mk \end{pmatrix}$

oder $\overline{MV}^2 : \overline{mv}^2 = ME.mq : \begin{pmatrix} mk.mq \\ \overline{mv}^2 \end{pmatrix}$.

Daher ist $\begin{pmatrix} MV^2 \\ SM.ME \end{pmatrix} = ME.mq$

und $SM = mq$.

Aber $MQ = Sm$ Constr.

folglich $\begin{pmatrix} MQ \\ Mm \end{pmatrix} = Sq$.

Wenn also der Winkel SMT ein rechter ist; so beschreibt der Körper eine Ellipse, und fängt seine Bewegung in dem von dem Mittelpunkt der Kraft entferntesten Scheitel an, so lange als $v^2 < kz$ ist. Wird $v^2 < kz$; so ist noch immer $v^2 < 2kz$, aber

[redacted]

es wird jetzt $EM.MS = \overline{MV}^2 = GM.MS$ (Vorauss.), mithin $FM = GM$, $2EM = \binom{2GM}{EK}$, und $MQ.MS$. Folglich geht die Ellipse in einen Kreis über, dessen Mittelpunkt S ist. Wird $v^2 > kz$; so beschreibt der Körper wiederum eine Ellipse, so lange als $v^2 < 2kz$ bleibt, aber die Bewegung nimmt jetzt in dem am nächsten bey dem Mittelpunkt der Kraft liegenden Scheitel ihren Anfang.

Hieraus folgt nun, daß, wenn die Centripetalkraft umgekehrt dem Quadrat der Entfernung proportional ist, der Körper um den Mittelpunkt der Kraft als Brennpunkt einen Kegelschnitt beschreibt, und der Kegelschnitt

eine Ellipse ist, wenn $v^2 < kz$
eine Parabel wenn $v^2 = kz$
eine Hyperbel wenn $v^2 > kz$,

und daß der Kegelschnitt in einen Kreis übergeht, wenn $v^2 = kz$, und zugleich der Winkel, welchen die anfängliche Richtung der Bewegung mit dem Radius Vector macht, ein rechter ist.

§. 283. Es ist jetzt noch die Umlaufszeit eines in einer Ellipse sich bewegenden Körpers zu bestimmen, wenn der Mittelpunkt der Kraft in einen ihrer Brennpunkte fällt; folglich die Centripetalkraft umgekehrt dem Quadrat der Entfernung proportional ist (§. 277.).

Man ziehe an einem der Scheitel der großen Axe, z. B. an den am nächsten bey dem Mittelpunkt S (Fig. 105.) der Kraft liegenden Scheitel P die Tangente PN, welche auf AP senkrecht seyn wird, setze $SP = h$, die Geschwindigkeit in $P = c$, die Zeit, in welcher der Sector PSM beschrieben wird, $= t'$, die halbe große Axe $= a$, und ihren halben Parameter $= l$. Man nehme $PN = ct'$, und ziehe SN. Da ct' der Weg ist, welchen der Körper mit seiner dem Punkt P entsprechenden Geschwindigkeit in der Zeit t' gleichförmig zurückgelegt haben würde; so wird der Sector PSM dem Dreyeck PSN gleich seyn (§. 272.). Folglich ist 2 Sector $PSM = SP.PN = cht'$. Es ist aber in der Distanz z die Centripetalkraft $= \frac{c^2h^2}{lz^2}$ (§. 280. n. 1.); mithin ist in der Distanz $\binom{SP}{h}$ die Centripetalkraft $k' = \frac{c^2}{l}$, und $k'l = c^2$. Ferner verhält sich

$$\left(\begin{matrix}\text{die Umlaufszeit}\\ \text{oder } t\end{matrix}\right) : \left(\begin{matrix}\text{Zeit von } P \text{ bis } M\\ t'\end{matrix}\right) = \left(\begin{matrix}\text{Fläche der Ellipse}\\ ab\pi\ ^{*)}\end{matrix}\right) : \begin{matrix}\text{Sect. } PSM\\ \frac{1}{2}cht'\end{matrix}$$

$$= 2ab\pi \qquad cht';$$

also $t^2 : t'^2 = 4a^2b^2\pi^2 : c^2h^2t'^2$

*) Kegelschn. II, 38.

§. 278. Wenn ein Körper A durch eine gegen einen gegebenen Punkt S (Fig. 109.) gerichtete Kraft genöthigt wird, eine krumme Linie AMm zu beschreiben, und ein anderer Körper B in der geraden Linie BS durch ebendieſe Kraft getrieben gegen den Mittelpunkt S der Kraft fällt; ſo wird, wenn der letztere durch den freyen Fall von der Höhe BN in dem Punkt N eine Geſchwindigkeit erlangt hat, welche der Geſchwindigkeit des in der krummen Linie ſich bewegenden Körpers an dem eben ſo weit, als N, von S entfernten Punkt M gleich iſt, auch in allen übrigen gleichweit von S entfernten Punkten der geraden Linie BS und der krummen Linie AMm die Geſchwindigkeit von B der Geſchwindigkeit von A gleich ſeyn *).

Man beſchreibe aus S als Mittelpunkt mit den Halbmeſſern SN, Sn die Kreisbogen NM, nm. Der erſtere wird, weil $SM = SN$, durch den Punkt M gehen, der letztere begegne der krummen Linie in m und dem Halbmeſſer SM in p. Ferner ziehe man die Tangente Mt an den Punkt M der krummen Linie, und die Tangente pt an den Punkt p des Kreisbogens mn, welche der Tangente Mt in t begegne, vollende das Parallelogramm $Mptq$, und ziehe pr auf Mt ſenkrecht. Die Bewegung von A an dem Punkt M zerfällt alſo in die zwey Bewegungen Mq und Mp, und weil vermöge der Vorausſetzung die Geſchwindigkeiten von A und B an den Punkten M N einander gleich ſind; ſo verhält ſich die Zeit der Bewegung von A durch Mt zu der Zeit der Bewegung von B durch Nn wie $Mt : Nn = Mt : Mp$. Die nach der Richtung Mp wirkende Centripetalkraft zerfällt in die Seitenkräfte Mr und rp, von welchen die erſtere nach der Richtung Mt der Bewegung von A wirkende die Geſchwindigkeit von A vergrößert, die letztere auf Mt ſenkrechte keinen Einfluß auf die Geſchwindigkeit von A hat, ſondern nur den Körper A von ſeinem geradlinigten Weg ablenkt, und ihn eine krumme Linie beſchreiben macht. Die in gleichen Zeiten durch die Centripetalkraft und durch die Kraft Mr erzeugte Geſchwindigkeiten werden ſich alſo zu einander verhalten wie $Mp : Mr$. Da aber die Zeiten der Bewegungen ungleich ſind; ſo wird der Zuwachs der Geſchwindigkeit von N zu dem Zuwachs der Geſchwindigkeit von M im zuſammengeſetzten Verhältniß aus den Kräften und den Zeiten ſeyn. Mithin wird ſich verhalten die Zunahme der Geſchwindigkeit von B zu der Zunahme der Geſchwindigkeit von $A = \overline{Mp}^2 : tM . Mr$. Es verhält ſich aber (VI, 8.) $tM : Mp = Mp : Mr$; folglich iſt $tM . Mr = \overline{Mp}^2$. Alſo erhalten die Bewegungen von B und A bey gleichen Annäherungen zu dem Mittelpunkt S der Kraft gleichen Zuwachs an Geſchwindigkeit, und daher müſſen die Geſchwindigkeiten von B und A, wenn ſie in den gleichen Entfernungen SN und SM einander gleich waren, auch in den gleichen Diſtanzen Sn und Sm einander gleich ſeyn. Ebenſo kann gezeigt

*) Newt. princ. L. I. prop. XL.

werden, daß die Bewegungen der zwey Körper, wenn sie sich um gleich viel von dem Mittelpunkt der Kraft entfernen, gleiche Verzögerungen leiden.

Hieraus folgt nun auch, daß ein Körper A, welcher genöthigt wird, sich auf einer stetig krummen Linie AM als vorgeschriebenem Weg zu bewegen, und in irgend einem Punkt M seines Wegs diejenige Geschwindigkeit hat, welche ein frey von der Höhe BN fallender Körper B in N erreicht haben würde, in jedem anderen Punkt m seines Wegs mit derjenigen Geschwindigkeit ankommen werde, welche der frey von der Höhe Bn fallende Körper in n erlangt haben würde. Denn nun vertritt der Widerstand des vorgeschriebenen Wegs die Stelle der Kraft rp, und die Geschwindigkeit des Körpers nach der Richtung der Tangente Mt wird durch die Krümmung des Wegs nicht geändert (§. 256.). Was also in dem 257sten §. von dem Fall auf einem vorgeschriebenen Weg bewiesen worden ist, wenn die Kraft constant ist, und nach parallelen Richtungen wirkt, gilt allgemein von jeder veränderlichen nach einem gegebenen Punkt hin wirkenden Kraft.

§. 279. Wenn die krumme Linie gegeben ist, welcher ein Körper A mit einer freyen Centralbewegung beschreibt, so kann man das Gesetz finden, nach welchem die aus dem Mittelpunkt der Kraft auf die Tangenten der krummen Linie gefällten Perpendikel, mithin auch die Geschwindigkeiten der Bewegung (§. 272.), von den an die Berührungspunkte gezogenen Radiis abhängen. Alsdenn wird die Bestimmung des Gesetzes der Centripetalkraft auf die Auflösung der Aufgabe zurückgeführt: aus dem Gesetz, nach welchem die Geschwindigkeit der geradlinigten Bewegung eines anderen Körpers B mit seinen Entfernungen von einem in dieser geraden Linie liegenden Punkt S sich verändert, das Gesetz der Kraft finden, welche den Körper gegen diesem Punkt hin treibt.

Die krumme Linie sey z. B. eine Ellipse $ADPE$ (Fig. 105.), und der Brennpunkt S der Mittelpunkt der Kraft. Man ziehe SR auf die Tangente RF senkrecht; so liegt, wie §. 274. gezeigt worden ist, der Punkt R auf dem Umfang eines über der großen Axe als Durchmesser beschriebenen Kreises. SR verlängert begegne diesem Kreis auf der andern Seite von S in r. Man nehme $rq = rS$, ziehe Fq, Cr und durch S die Parallele Sm mit FM, welche von der Fq in m geschnitten werde. Da $SC = CF$ und $Sr = rq$; so sind Cr und Fq einander parallel (VI, 2), und daher ist $Fq = 2Cr = AP = FQ$ (S. §. 274.). Und weil $QM = MS$; so ist MS mit Fq parallel, und $Sm = FM$, $SM = Fm$ (I, 34), mithin m ein Punkt ebendieser Ellipse, welche von der geraden Linie mr in m berührt wird, weil $Sm = mq$ und $Sr = rq$, also $Smr = rmq$ ist. Wegen der Aehnlichkeit der Dreyecke RMS u. Smr verhält sich aber $SM : \left\{\begin{matrix} Sm \\ Mr \end{matrix}\right\} = SR : Sr$

$$= \overline{SR}^2 : \begin{cases} SR.Sr \\ PS.SA \text{ (III, 35.)} \\ \overline{CD}^2 \text{ (Kegelschn. II, 2.)}; \end{cases}$$

folglich verhält sich, wenn man den Radius Vector $SM = z$, die halbe große Axe $= a$, und die halbe kleine Axe $= b$ setzt

$$z : 2a - z = \overline{SR}^2 : b^2$$

Man setze die Geschwindigkeit in $P = c$, die Geschwindigkeit in $M = v$, und $SP = h$; so verhält sich

$$v : c = h : SR$$
$$v^2 : c^2 = h^2 : \overline{SR}^2.$$

Da nun $z : 2a - z = \overline{SR}^2 : b^2$

so ist $v^2 z : c^2 (2a - z) = h^2 : b^2$,

und $v^2 = \frac{c^2 h^2}{b^2} \cdot \frac{2a - z}{z}$.

Die Geschwindigkeit v verschwindet, wenn $z = 2a$ wird. Wenn man also den Radius Vector SM so über den Punkt M hinaus verlängert, daß $SB = 2a$ oder = der großen Axe AP wird; so wird ein von dem Punkt B von der Ruhe an fallender Körper durch die Einwirkung der Centripetalkraft in dem Augenblick, da er in M auf dem Umfang der Ellipse ankommt, dieselbe Geschwindigkeit erlangt haben, welche der in der Ellipse sich bewegende Körper in M hat.

Man setze die den Distanzen $z + x$ und $z - x$ entsprechende Geschwindigkeiten beziehungsweise $= u$ und u'; so wird man haben

$$u^2 = \frac{c^2 h^2}{b^2} \cdot \frac{2a - (z + x)}{z + x},$$

$$u'^2 = \frac{c^2 h^2}{b^2} \frac{2a - (z - x)}{z - x};$$

und 1.) $v^2 - u^2 = \frac{2ac^2h^2x}{b^2z(z+x)}$

2.) $u'^2 - v^2 = \frac{2ac^2h^2x}{b^2z(z-x)}$.

Es ist aber das Quadrat der Geschwindigkeit, welche eine constante Kraft $2g$ während der Zeit erzeugt, in welcher der von ihr beschleunigte Körper den Weg s zurücklegt, $= 4gs$ (§. 234. n. 5.) und daher wächst, wenn die Kraft constant ist, das Quadrat der Geschwindigkeit dem Raum s proportional. Folglich muß, da (vermöge n. 3. und 4.) $v^2 - u^2 < u'^2 - v^2$ ist, die Centralkraft in der Distanz $z + x$ kleiner, als in der Distanz $z - x$, mithin die Centralkraft selbst beständig

$$> \text{als } \frac{v^2 - u^2}{2x} \text{ oder } > \frac{ac^2h^2}{b^2z(z+x)}$$

aber $<$ als $\frac{u'^2 - v^2}{2x}$ oder $< \frac{ac^2h^2}{b^2z(z-x)}$ seyn.

Da nun durch die Verminderung von x der Unterſchied dieſer zwey Ausdrücke kleiner gemacht werden kann, als jede gegebene Größe; ſo iſt die Centripetalkraft $= \frac{ac^2h^2}{b^2z^2}$, und daher umgekehrt dem Quadrat der Entfernung von dem Brennpunkt der Ellipſe proportional.

Eben ſo findet man, daß in der Hyperbel, wenn man ihre halbe Querare $= a$, die halbe zugeordnete Are $= b$, und den Abſtand eines ihrer Punkte von dem auf der holen Seite liegenden Brennpunkt $= z$ ſetzt, $z : 2a + z =$ Quadr. des Perp. aus dem Brennpunkt auf die Tangente: b^2, und

$$v^2 = \frac{c^2h^2}{b^2} \cdot \frac{2a+z}{z}$$

$$u^2 = \frac{c^2h^2}{b^2} \cdot \frac{2a+z+x}{z+x}$$

$$u'^2 = \frac{c^2h^2}{b^2} \cdot \frac{2a+z-x}{z-x},$$

mithin $\frac{v^2-u^2}{2x} = \frac{ac^2h^2}{b^2z(z+x)}$

$$\frac{u'^2-v^2}{2x} = \frac{ac^2h^2}{b^2z(z-x)},$$

woraus wiederum die Centripetalkraft $= \frac{ac^2h^2}{b^2z^2}$ folgt, welche demnach auch in der Hyperbel umgekehrt dem Quadrat der Entfernung von dem Mittelpunkt der Kraft proportional iſt.

Endlich findet ſich, wenn z den aus dem Brennpunkt der Parabel gezogenen Radius Vector, und h den Abſtand des Brennpunkts von dem Scheitel der Are, oder den vierten Theil ihres Parameters bezeichnet, $v^2 = \frac{c^2h}{z}$;

mithin $\frac{v^2-u^2}{2x} = \frac{c^2h}{2z(z+x)}$

$$\frac{u'^2-v^2}{2x} = \frac{c^2h}{2z(z-x)}$$

folglich iſt die Centripetalkraft $= \frac{\frac{1}{2}c^2h}{z^2}$, und daher iſt ſie auch in der Parabel umgekehrt dem Quadrat der Entfernung von dem Mittelpunkt der Kraft proportional.

§. 280. Man bezeichne die der Diſtanz z entſprechende Centripetalkraft mit k; ſo wird k diejenige Geſchwindigkeit ſeyn, welche dieſe Kraft als conſtant betrachtet in derſelben Zeit erzeugen würde, in welcher der Körper mit ſeiner dem kleinſten Abſtand von dem Mittelpunkt der Kraft entſprechenden Geſchwindigkeit den Raum c

schrieben haben würde. Ferner sey der halbe Para-
elschnitts $= l$; so wird man für die Ellipse und Hy-
$: b = b : l$ (Kegelschn. II, Erkl. 9. III, Erkl. 13.),
. Für die Parabel ist $l = 2h$ (Kegelschn. I, Erkl. 6.
Vermöge des vorhergehenden §. ist nun, wenn der
r Mittelpunkt der Kraft ist,

$\frac{ac^2h^2}{b^2z^2} = \frac{c^2h^2}{lz^2}$ für die Ellipse und Hyperbel.

$k = \frac{2h}{z^2}$ für die Parabel, welcher Ausdruck auch aus
wenn man, wie es in der Parabel seyn muß, $l = 2h$

§ ist allgemein für jeden Kegelschnitt $k = \frac{c^2h^2}{lz^2}$.
nun ist nach eben diesem §.

3.) $v^2 = \frac{c^2h^2(2a-z)}{b^2z}$ für die Ellipse

4.) $v^2 = \frac{c^2h^2(2a+z)}{b^2z}$ für die Hyperbel.

5.) $v^2 = \frac{c^2h}{z}$ für die Parabel.

Es ist aber $\frac{c^2h^2}{b^2z} = \frac{kz}{a}$ (n. 1.); folglich ist, wenn man diesen Ausdruck in n. 3. substituirt, $v^2 = \frac{k}{a}(2a-z)z$, woraus man erhält

6.) $2a = \frac{2kz^2}{2kz-v^2}$ für die Ellipse.

Eben so findet sich

7.) $2a = \frac{2kz^2}{v^2-2kz}$ für die Hyperbel.

Für die Parabel ist $2kz^2 = c\,h$ (n. 2.), und $v^2z = c^2h$ (n. 5); folglich $2kz^2 = v^2z$, und $2kz = v^2$.

So lange als $2kz > v^2$ ist, bleibt in n. 6. die große Axe $2a$ positiv. Wird $2kz = v^2$; so wird $2a = \infty$, und für $2kz < v^2$ wird $2a$ negativ. Der Ausdruck n. 6. kann also auch auf die Parabel und Hyperbel angewendet werden.

Aus n. 6. folgt $2a - z = \frac{v^2z}{2kz-v^2}$; mithin verhält sich

$2a - z : z = v^2 : 2kz - v^2$, und daher ist in der Ellipse

8.) $2a - z > z$, wenn $\begin{cases} v^2 > 2kz - v^2, \\ v^2 > kz, \end{cases}$

9.)

9.) $2a - z < z$, wenn $\begin{cases} v^2 < 2kz - v^2 \\ v^2 < kz. \end{cases}$

10.) $2a - z = z$, wenn $v^2 = kz$.

Im letzteren Fall müßte der Radius Vector z an einen der Scheitel der kleinen Axe der Ellipse gehen, und, wenn zugleich die Richtung der Bewegung des Körpers auf dem Radius Vector z senkrecht wäre; so müßten die von einem der Endpunkte der kleinen Axe an die zwey Brennpunkte der Ellipse gezogenen geraden Linien auf einander fallen, oder die Ellipse in einen Kreis, dessen Halbmesser $= a$, übergehen.

Man setze den Winkel, welchen die Tangente der krummen Linie mit dem an den Berührungspunkt gezogenen Radius Vector macht $= m$; so ist das aus dem Mittelpunkt der Kraft auf diese Tangente gefällte Perpendikel $= z \sin. m$, und es verhält sich (§. 272.)

$v : v = k : z \sin. m$, mithin ist $c^2 k^2 = v^2 z^2 \sin.\overline{m}^2$, und vermöge n. 1.

$k = \frac{av^2 z^2 \sin.\overline{m}^2}{b^2 z^2} = \frac{av^2 \sin.\overline{m}^2}{b^2}$. Also verhält sich

11.) $k : a = v^2 \sin.\overline{m}^2 : b^2$

Es werde eine andere Ellipse vermöge einer Centripetalkraft beschrieben, welche in der Distanz z der Kraft k gleich sey. In ebendieser Distanz sey auch die Geschwindigkeit v der Geschwindigkeit in der ersten Ellipse gleich, der Winkel des Radius Vector z mit der Tangente sey $= m'$; so ist die halbe große Axe wie in der ersteren $= a$, (§. 280. n. 6.). Sey die halbe kleine Axe $= b'$; so wird man haben $k' : a = v^2 \sin.\overline{m'}^2 : b'^2$, also $v^2 \sin.\overline{m}^2 : v^2 \sin.\overline{m'}^2 = b^2 : b'^2$, oder

12.) $\sin. m : \sin. m' = b : b'$.

Demnach sind in diesem Fall die kleinen Axen den Sinus der Winkel m, m' oder den aus dem Mittelpunkt der Kraft auf die Tangenten gefällten Perpendikeln proportional. Ebendieser Satz gilt auch von der Hyperbel.

Da $b^2 = al$; so verhält sich nach n. 11. $\left.\begin{matrix} k : a \\ kl : al \end{matrix}\right\} = v^2 \sin.\overline{m}^2 : \left\{\begin{matrix} b^2 \\ al \end{matrix}\right\}$.

Folglich ist $kl = v^2 \sin.\overline{m}^2$, oder es verhält, wenn eine Ellipse, Parabel, oder Hyperbel um den Brennpunkt als Mittelpunkt der Kraft beschrieben wird,

13.) $k : v \sin. m = v \sin. m : l$, mithin auch $k : l = k^2 : v^2 \sin.\overline{m}^2$.

Für den Kreis wird $m = 90°$, und l wird dem Halbmesser des Kreises gleich, woraus $k = \frac{v^2}{l}$ folgt, wie man in dem 273sten §. gefunden hat.

§. 281. Wenn die Centripetalkraft umgekehrt dem Quadrat

der Entfernung von dem Mittelpunkt S (Fig. 110.) der Kraft proportional, ihre Größe für eine gegebene Entfernung SH gegeben ist, und einem Körper in einem gegebenen Punkt A eine gegebene Geschwindigkeit AC nach einer gegebenen auf AS schiefen Richtung mitgetheilt wird; so kann immer ein Kegelschnitt gefunden werden, welcher unter diesen Umständen von dem Körper beschrieben werden kann. Da nemlich sich verhält die Kraft in H : Kraft in $A = \overline{SA}^2 : \overline{SH}^2$; so ist die Größe der Centripetalkraft in dem gegebenen Punkt A gegeben. Man setze sie $= k$, die gegebene Distanz $SA = z$, und die anfängliche Geschwindigkeit $AC = v$; so wird der gesuchte Kegelschnitt eine Ellipse (den Kreis mit eingeschlossen), oder eine Parabel, oder eine Hyperbel seyn, je nachdem $v^2 \gtreqless 2kz$ ist. Im ersten und dritten Fall ist die große Axe der Ellipse nach §. 280. n. 6. und die Queraxe der Hyperbel nach n. 7. gegeben, und für alle drey Fälle erhält man den Parameter des Kegelschnitts nach n. 13. Ferner muß der Kegelschnitt die gerade Linie AC in dem gegebenen Punkt A berühren; mithin ist der Kegelschnitt gegeben, und er kann, wie hernach gezeigt werden soll, verzeichnet oder berechnet werden.

Es kann aber gezeigt werden, daß ein Körper, welcher von einem gegebenen Punkt nach einer gegebenen Richtung mit einer gegebenen Geschwindigkeit ausgeht, und gegen einen gegebenen Punkt hin durch eine Kraft getrieben wird, deren Größe in einer gegebenen Entfernung von dem Mittelpunkt der Kraft sammt dem Gesetz, nach welchem sie sich mit den Entfernungen von diesem Mittelpunkt verändert, gegeben ist, nur Eine krumme Linie beschreiben kann. Man nehme zuerst wie in §. 271. an, die Kraft wirke stoßweise; so wird, wenn man das Vieleck $ABCDEF$ (Fig. 103.) nach dem angeführten §. construirt hat, und sich nun, indem man von denselben gegebenen Größen ausgeht, ein zweytes Vieleck verzeichnet gedenkt, dieses zweyte Vieleck mit dem ersteren congruent seyn, weil vermöge der Bedingungen SA, SAT, AG, Aa in beyden Vielecken einander gleich seyn müßen, und daher das erste Dreyeck des zweyten Vielecks das Dreyeck ASB des ersten, ferner das zweyte Dreyeck jenes Vielecks das Dreyeck BSC u. s. w. decken muß. Man nehme die Zwischenzeiten der Stöße immer kleiner und kleiner; so werden, weil das Gesetz der Kraft in den zwey Vielecken dasselbe bleiben soll, beständig die in gleichen Zeiten beschriebene Vielecke einander decken, wie klein man auch jene Zwischenzeiten nehmen mag. Mithin werden auch die stetig krummen Linien, welchen sich die Vielecke bey der Verkleinerung der Zwischenzeiten beständig nähern, aufeinander fallen müßen, wenn man sie so aufeinander legt, daß der Anfangspunkt A der Bewegung, der Mit-

telpunkt S der Kräfte, und die gerade Linie AT, welche die anfängliche Richtung der Bewegung bezeichnet, auf einander zu liegen kommen.

Ein anderer Beweiß dieſes Satzes gründet ſich auf §. 278. Es ſeyen S und s (Fig. 110. und 111.) die Mittelpunkte der Kräfte, welche auf die Körper A und a wirken, und AC, ac ſeyen die anfänglichen Geſchwindigkeiten. Wenn nun $SAC = sac$, $AC = ac$, und die auf A und a wirkende Kräfte in gleichen Abſtänden von S und s beſtändig einander gleich ſind; ſo werden die Körper A und a einerley krumme Linie beſchreiben. Es ſey nemlich BA die Höhe, von welcher der Körper A fallen müßte, um in A durch die Wirkung der Centripetalkraft die Geſchwindigkeit AC zu erlangen. Die krumme Linie FGQ ſey ſo beſchrieben, daß die Ordinaten BF. AG, NQ der Centripetalkraft in den Diſtanzen BS, AS, NS proportional ſeyen; ſo werden die Quadrate der durch den Fall von den Höhen BA, BN, erlangten Geſchwindigkeiten den Flächenräumen $BFGK$, $BFQN$ proportional ſeyn (§. 249.). Eben ſo wird ſich in Fig. 111. verhalten das Quadrat der Geſchwindigkeit in a zu dem Quadrat der Geſchwindigkeit in n, wie die Fläche $bfga$: Fläche $bfqn$. Da nun die Kräfte in gleichen Entfernungen von den Mittelpunkten S, s einander gleich ſind (Vorausſ.); ſo werden, wenn $BA = ba$, $BN = bn$ ſind, die Flächenräume $BFGA$, $bfga$, und $BFNQ$, $bfnq$, mithin auch die durch den Fall von gleichen Höhen BA, ba, oder BN, bn erlangte Geſchwindigkeiten einander gleich ſeyn. Aus S und s ſeyen mit gleichen Halbmeſſern SN, sn die Kreiſe NM, nm beſchrieben, welche den krummen Linien AM, am in M und m begegnen, und NQ, nq ſeyen die den Punkten N, n entſprechende Ordinaten der krummen Linien FGQ, fgq. Nach §. 278. ſind die Geſchwindigkeiten in M und m den durch den freyen Fall von den Höhen BN, bn erlangten Geſchwindigkeiten gleich, und es verhält ſich

$$\left.\begin{matrix}\text{das Quadr. der Geſchw. in } N\\ \text{oder d. Q. der Geſchw. in } M\end{matrix}\right\} : \left\{\begin{matrix}\text{Quadr. d. Geſchw. in } A\\ \text{Quadr. d. Geſchw. in } a\end{matrix}\right\} = BFQN : \left\{\begin{matrix}BFGA\\ bfga\end{matrix}\right\}$$

$$\text{Quadr. d. Geſchw. in } a : \left\{\begin{matrix}\text{Quadr. d. Geſchw. in } n\\ \text{Quadr. d. Geſchw. in } m\end{matrix}\right\} = bfga : bfqn$$

$$\text{mithin Quadr. d. Geſchw. in } M : \text{Quadr. d. Geſchw. in } m = BFQN : bfqn.$$

Da nun die zwey Glieder des zweyten Verhältnißes einander gleich ſind; ſo ſind in gleichen Diſtanzen SM, sm die Geſchwindigkeiten der krummlinigten Bewegungen einander gleich. Man ziehe an die Punkte M. m die Tangenten MT, mt und ziehe SP, SD, sp, sd auf MT, AC, mt, ac ſenkrecht; ſo verhält ſich (§. 272.)

$$\text{Die Geſchw. in } M : \text{Geſchw. in } A = SD : SP$$

$$\left.\begin{matrix}\text{Geſchw. in } a\\ \text{Geſchw. in } A\end{matrix}\right\} : \text{Geſchw. in } m = sp : \left\{\begin{matrix}sd\\ SD\end{matrix}\right\};$$

folglich Geschw. in M : Geschw. in $m = sp : SP$.

Die Geschwindigkeiten in M und m sind aber einander gleich; folglich muß $sp = SP$, und $smt = SMT$ seyn.

Demnach ist noch der rein geometrische Satz zu beweisen, daß, wenn $SA = sa$, $SAC = sac$, und auch an jeden anderen gleich weit von S und s entfernten Punkten M, m der krummen Linien AM, am die Winkel SMT, smt, oder die Perpendickel SP, sp einander gleich sind, auch die Winkel ASM, asm einander gleich seyen. Man nehme auf der SA einen Punkt E nach Belieben, mache $se = SE$, und beschreibe aus S und s als Mittelpunkten mit den Halbmessern $\left\{\begin{matrix} SE \\ se \end{matrix}\right\}$ die Kreisbogen EL, el, welche den geraden Linien SM, sm in L und l begegnen. An die Punkte L und l ziehe man die Tangenten LK, lk und verlängere sie bis an die wo nöthig verlängerte Tangenten MT, mt nach O und o. Man denke sich die krummen Linie $\left\{\begin{matrix} AM \\ am \end{matrix}\right\}$ durch die Bewegung eines Punkts beschrieben, welcher auf der geraden Linie $\left\{\begin{matrix} SM, \\ sm \end{matrix}\right\}$ sich bewegt, indem zugleich die $\left\{\begin{matrix} SM \\ sm \end{matrix}\right\}$ sich um $\left\{\begin{matrix} S \\ s \end{matrix}\right\}$ dreht; so wird man die Geschwindigkeit von $\left\{\begin{matrix} M \\ m \end{matrix}\right\}$ als aus den Geschwindigkeiten $\left\{\begin{matrix} ML \\ ml \end{matrix}\right\}$ und $\left\{\begin{matrix} LO \\ lo \end{matrix}\right\}$ zusammengesetzt betrachten können, und es werden sich die Geschwindigkeiten nach den Richtungen MT, MS und LK verhalten wie MO, ML und LO. Da nun in gleichen Distanzen SM, sm beständig $SMT = smt$ ist, und man $\left\{\begin{matrix} se \\ sl \end{matrix}\right\} = \left\{\begin{matrix} SE \\ SL \end{matrix}\right\}$ genommen hat; so sind die Dreyecke MLO und mlo einander gleich, so daß, wenn man die Geschwindigkeiten, mit welchen die Punkte L und l sich im Kreis bewegen, einander gleich nimmt, die Geschwindigkeiten von M und m nach den Richtungen ML und ml in den zwey krummen Linien beständig einander gleich sind. Mithin ändern sich die Distanzen SM, sm in gleichen Zeiten, während welcher die Punkte L und l gleiche Winkel oder Bogen beschreiben, um gleich viel (§. 238.), und da in den Punkten A und a die SA der sa gleich war; so wird für $SM = sm$ auch $ASM = asm$ seyn. Eben dieses gilt von allen übrigen Punkten der krummen Linien AM und am; folglich wird, wenn man die Figur asm auf die ASM so legt, daß as auf die AS und ad auf die AD zu liegen kommt, der Bogen am auf den Bogen AM fallen. Demnach kann ein Körper, welcher von einem gegebenen Punkt A nach einer gegebenen Richtung AD mit einer gegebenen Geschwindigkeit AG ausgeht, und gegen einen gegebenen Punkt S hin durch eine gegebene und nach einem gegebenen Gesetz von den Distanzen SA, SM abhängende Kraft getrieben wird, nur

Eine krumme Linie beſchreiben, und wenn man eine krumme Linie gefunden hat, welche ein Körper unter dieſen Bedingungen beſchreiben kann; ſo muß er dieſe krumme Linie beſchreiben.

§. 282. Die Centripetalkraft ſey umgekehrt dem Quadrat der Entfernung von dem Mittelpunkt S (Fig. 112. 113. 114.) proportional, und ein Körper gehe von dem gegebenen Punkt M nach der gegebenen Richtung MT mit der gegebenen Geſchwindigkeit $\left\{\begin{matrix} MV \\ v \end{matrix}\right\}$ aus. In der gegebenen Diſtanz $\left\{\begin{matrix} SM \\ z \end{matrix}\right\}$ ſey die Centripetalkraft $= \left\{\begin{matrix} MG \\ k \end{matrix}\right\}$, d. h. es ſey MG die Geſchwindigkeit, welche die Centripetalkraft, wenn ſie mit derjenigen Stärke, welche ſie in M hat, fortwirkte, in derſelben Zeit erzeugen würde, in welcher der Körper mit ſeiner anfänglichen Geſchwindigkeit den Weg MV gleichförmig zurücklegen würde. Man ſucht die krumme Linie, welche der Körper beſchreibt.

Es ſey 1.) $v < 2kz$ oder $\overline{MV}^2 < 2GM.MS$ (Fig. 112.). Auf dem Radius Vector SM errichte man in ſeinem Endpunkt M das Perpendickel $ML = MV$, ziehe SL, und LE auf SL in L ſenkrecht, welche der verlängerten SM in E begegnen wird; ſo iſt $EM.MS = \overline{ML}^2 = \overline{MV}^2 < 2GM.MS$ (Vorausſ.), mithin $ME < 2GM$. Man trage von E gegen S die $EK = 2GM$; ſo fällt K auf die Verlängerung von EM. Man ziehe KL, und LQ auf KL in L ſenkrecht, welche die verlängerte SM in Q ſchneiden wird.

Da $SM : ML = ML : ME$
und $ML : MQ = MK : ML$
ſo iſt $SM : MQ = MK : ME$
$SM : SQ = MK : \left\{\begin{matrix} EK \\ 2GM \end{matrix}\right.$
$= SM.MK : 2GM.MS$
$= 2GM.MS - EM.MS : 2GM.MS$
$= 2GM.MS - \overline{ML}^2 : 2GM.MS$
oder $z : SQ = 2kz - v^2 : 2kz$

mithin $SQ = \frac{2kz^2}{2kz - v^2} =$ der großen Axe der Ellipſe (§. 280. n. 6). Man fälle von Q das Perpendickel QR auf die wo nöthig verlängerte TM, verlängere es ſo nach F, daß $RF = RQ$, ziehe durch S und F die gerade Linie SF, halbire SF in C, nehme $CP = CA = \frac{1}{2} SQ$, und beſchreibe um die Brennpunkte S, F eine Ellipſe, deren große Axe $= AP$ oder $= SQ$ ſey.

Da $FR = RQ$ und $MRF = R$; ſo iſt $FM = MQ$, und $SM + MF = SM + MQ = SQ$, mithin M ein Punkt der Ellipſe. Und weil $QMR = RMF$; ſo berührt die gerade Linie MT die Ellipſe in M (Kegelſchn. 11, 12.). Die Centripetalkraft

ist, weil der Brennpunkt S der Mittelpunkt der Kraft ist, umgekehrt dem Quadrat der Distanz proportional (§. 279.). Um noch zu zeigen, daß in der gegebenen Distanz SM die Centripetalkraft $= GM$ sey, ziehe man die halbe kleine Axe CD der Ellipse, und fälle das Perpendickel Sr auf die Tangente MT; so verhält sich, wie §. 279 gezeigt worden ist,

$$SM : \begin{Bmatrix} FM \\ MQ \end{Bmatrix} = \overline{Sr}^2 : \overline{CD}^2$$

mithin auch $\overline{SM}^2 : SM.MQ = \overline{Sr}^2 : \overline{CD}^2$

und es ist $\overline{CD}^2 . \overline{SM}^2 = SM.MQ.\overline{Sr}^2$. Folglich verhält sich, wenn man die §. 279. gebrauchte Benennungen beybehält

$$b^2z^2 : c^2h^2 = SM.MQ.\overline{Sr}^2 : \begin{Bmatrix} c^2h^2 \\ v2.\overline{Sr}^2 \end{Bmatrix} *)$$
$$= SM.MQ : v^2.$$

Aber vermöge des oben bewiesenen verhält sich

$$\left.\begin{matrix} SQ : 2GM \\ 2AC : 2GM \\ AC : GM \end{matrix}\right\} = SM : MK$$

$$= SM.MQ : \begin{Bmatrix} QM.MK \\ ML^2 \\ v^2 \end{Bmatrix};$$

folglich ist $b^2z^2 : c^2h^2 = \binom{AC}{a} : GM$. Mithin ist nach §. 280. n. 1. die Centripetalkraft an dem Punkt $M = GM$, und daher kann der Körper die gefundene Ellipse beschreiben. Vermöge §. 281. kann er aber keine andere krumme Linie beschreiben; folglich muß der Körper eben diese Ellipse beschreiben.

Es sey 2.) $v = 2kz$ (Fig. 113.), mithin $ME = 2GM$. Die Punkte M und K fallen jetzt zusammen, und die Bahn des Körpers ist eine Parabel. Man ziehe SR auf MT senkrecht, verlängere SR nach N so, daß $RN = SR$, ziehe MN, und mit dieser durch S die Parallele SO. Man fälle aus R das Perpendickel RP auf SO, und beschreibe um den Punkt S als Brennpunkt eine Parabel, deren Axe SO, und deren Parameter $= 4SP$ sey.

Man ziehe durch N die Parallele NO mit RP; so ist $OP = PS$, weil $NR = RS$ (Constr.), und daher NO die Directrix dieser Parabel. Weil ferner $RN = RS$ und $NRM = R$; so ist $SM = MN$, und die Parabel geht durch den Punkt M. Endlich weil $SMR = RMN$; so berührt MT die Parabel in M (Kegelschn. I, 7.).

Da der Brennpunkt S der Mittelpunkt der Kraft ist; so ist (§. 279.) die Centripetalkraft umgekehrt dem Quadrat der Entfernung proportional. Daß diese Kraft in dem Punkt M

*) Weil $c : v = Sr : \binom{SP}{k}$ (§. 272.)

der Parabel $= MG$ ſey, kann ſo gezeigt werden. Es iſt $SM.ME = 2SM.GM$, weil $ME = 2GM$ (Vorausſ.), und $c^2 : v^2 = z : h$ (§. 280. n. 5.)

$= z^2 : hz$

$c^2 : z^2 = v^2 : hz$

$= 2GM.z : hz$

$= 2GM : h$

$\frac{1}{2}c^2 : z^2 = GM : h.$

Folglich iſt nach §. 280. n. 2. die Centripetalkraft in dem Punkt M der Parabel $= GM$.

Es ſey 3.) $v^2 > 2kz$, oder $\overline{MV}^2 > 2GM.MS$ (Fig. 114.). Man beſtimme ME wie in n. 1. und nehme auf der ES von E an gegen S die $EK = 2GM$. Da $EM.MS = \overline{ML}^2 = \overline{MV}^2 > 2GM.MS$ (Vorausſ.); ſo iſt $EM > 2GM$, und der Punkt K fällt zwiſchen E und M. Man ziehe KL, und die LQ auf LK in L ſenkrecht, welche der über M hinaus verlängerten KM in Q begegnen wird. Von Q fälle man das Perpendickel QR auf MT und verlängere es ſo nach F, daß $RF = RQ$. Man ziehe SF, halbire dieſe in C, nehme $CP = CA = \frac{1}{2}SQ$, und beſchreibe mit der Querare AP oder SQ um den Punkt S als Brennpunkt eine Hyperbel, ſo daß F der Brennpunkt der entgegengeſetzten Hyperbel ſey.

Wegen der gleichen Dreyecke QMR und FMR iſt $MF = MQ = MS + SQ$; folglich $MF - MS = SQ = AP$, und daher M ein Punkt dieſer Hyperbel. Und weil $QMR = FMT$; ſo berührt die gerade Linie MT die Hyperbel in M (Kegelſchn. III, 39.). Endlich iſt die Centripetalkraft umgekehrt dem Quadrat der Entfernung proportional (§. 279.), und man beweißt wie in n. 1. daß in der Entfernung SM die Centripetalkraft $= GM$ ſey.

Wenn der Winkel SMT ein rechter (Fig. 115.) und $v^2 < 2kz$, oder $\overline{MV}^2 < 2GM.MS$ iſt; ſo beſchreibt der Körper eine Ellipſe, welche den Punkt M zu einem ihrer Scheitel der großen Are hat, und zwar iſt der Punkt M der von dem Brennpunkt S entfernteſte oder ihm am nächſten liegende Scheitel, je nachdem v^2 kleiner oder größer als kz iſt. Es ſey $v^2 < kz$, oder $\overline{MV}^2 < GM.MS$, und ME ſey wie in n. 1. die dritte geometriſche Proportionallinie zu SM und MV; ſo iſt $EM.MS = \overline{MV}^2 < GM.MS$, und $EM < GM$. Man nehme wie in n. 1. $EK = 2GM$. Da $2EM < \left\{\begin{matrix} 2GM \\ EK \end{matrix}\right\} < EM + MK$; ſo iſt $EM < MK$, und MQ wird kleiner als MS. Und da vermöge n. 1. die große Are der Ellipſe $= SQ$ iſt; ſo wird, wenn man $MF = MQ$ macht, der Punkt F der andere Brennpunkt dieſer Ellipſe ſeyn, welche nun beſchrieben werden kann. Es ſey m der der andere

Scheitelpunkt der großen Axe; alſo $Sm = MQ$. Ich behaupte, daß der Körper, wenn er von dem Punkt m nach der auf Sm ſenkrechten Richtung mt mit derjenigen Geſchwindigkeit ausgegangen wäre, welche er bey ſeiner Bewegung in der Ellipſe an eben dieſem Punkt m erhalten hat, um den Brennpunkt S als Mittelpunkt der Kraft dieſelbe Ellipſe beſchrieben haben würde. Es ſey nemlich mv die Geſchwindigkeit des Körpers in m, und mg ſey die Centripetalkraft an eben dieſem Punkt; ſo verhält ſich (S. d. Bew. von n. 1.)

$$\begin{aligned} SM : SQ &= MK : EK \\ &= QM.MK : QM.EK \\ &= \overline{MV}^2 : \begin{pmatrix} QM.EK \\ 2Sm.MG \end{pmatrix} \end{aligned}$$

ferner $\overline{Sm}^2 : \overline{SM}^2 = \begin{pmatrix} MG : mg \\ 2MG : 2mg \end{pmatrix}$ vermöge des Geſetzes der Centrip. Kraft

und $\overline{SM}^2 : \overline{Sm}^2 = \overline{mv}^2 : MV^2$ (§. 272.);

folglich $SM : SQ = \overline{mv}^2 : 2gm.Sm$,

und $2SM : SQ = \overline{mv}^2 : gm.Sm$.

Da nun $SM < SQ$; ſo iſt $\overline{mv}^2 < 2gm.Sm$, und es kann mit der Geſchwindigkeit mv eine Ellipſe um den Mittelpunkt S der Kraft als Brennpunkt beſchrieben werden (n. 1.). Und weil $SM > MQ$; ſo iſt $2SM > SQ$, mithin $\overline{mv}^2 > gm.Sm$. Man mache dieſelbe Conſtruktion wie in n. 1.; ſo wird $em > mk$. und $mq > Sm$ werden. (S. den vorhergeh. Bew.). Es verhält ſich aber

$$\begin{aligned} \overline{Sm}^2 : \overline{SM}^2 &= \overline{MV}^2 : \overline{mv}^2 \\ &= QM.MK : Sm.me \\ &= Sm.MK : Sm.me \\ &= MK : me \end{aligned}$$

und

$$\begin{aligned} \overline{Sm}^2 : \overline{SM}^2 &= GM : gm \\ &= 2HM : 2gm \\ &= EK : ek \end{aligned}$$

folglich auch $\overline{Sm}^2 : \overline{SM}^2 = \begin{pmatrix} EK - MK \\ ME \end{pmatrix} : \begin{pmatrix} ek - me \\ mk \end{pmatrix}$

oder $\overline{MV}^2 : \overline{mv}^2 = ME.mq : \begin{pmatrix} mk.mq \\ \overline{mv}^2 \end{pmatrix}$.

Daher iſt $\begin{pmatrix} MV^2 \\ SM.ME \end{pmatrix} = ME.mq$

und $SM = mq$.

Aber $MQ = Sm$ Conſtr.

folglich $\begin{pmatrix} MQ \\ Mm \end{pmatrix} = Sq$.

Wenn alſo der Winkel SMT ein rechter iſt; ſo beſchreibt der Körper eine Ellipſe, und fängt ſeine Bewegung in dem von dem Mittelpunkt der Kraft entfernteſten Scheitel an, ſo lange als $v^2 < kz$ iſt. Wird $v^2 < kz$; ſo iſt noch immer $v^2 < 2kz$, aber

es wird jetzt $EM.MS = MV^2 = GM.MS$ (Voraussſ.), mithin $FM = GM$, $2EM = \left(\frac{2GM}{EK}\right)$, und $MQ.MS$. Folglich geht die Ellipſe in einen Kreis über, deſſen Mittelpunkt S iſt. Wird $v^2 > kz$; ſo beſchreibt der Körper wiederum eine Ellipſe, ſo lange als $v^2 < 2kz$ bleibt, aber die Bewegung nimmt jetzt in dem am nächſten bey dem Mittelpunkt der Kraft liegenden Scheitel ihren Anfang.

Hieraus folgt nun, daß, wenn die Centripetalkraft umgekehrt dem Quadrat der Entfernung proportional iſt, der Körper um den Mittelpunkt der Kraft als Brennpunkt einen Kegelſchnitt beſchreibt, und der Kegelſchnitt

eine Ellipſe iſt, wenn $v^2 < kz$
eine Parabel wenn $v^2 = kz$
eine Hyperbel wenn $v^2 > kz$,

und daß der Kegelſchnitt in einen Kreis übergeht, wenn $v^2 = kz$, und zugleich der Winkel, welchen die anfängliche Richtung der Bewegung mit dem Radius Vector macht, ein rechter iſt.

§. 283. Es iſt jetzt noch die Umlaufszeit eines in einer Ellipſe ſich bewegenden Körpers zu beſtimmen, wenn der Mittelpunkt der Kraft in einen ihrer Brennpunkte fällt; folglich die Centripetalkraft umgekehrt dem Quadrat der Entfernung proportional iſt (§. 277.).

Man ziehe an einem der Scheitel der großen Axe, z. B. an den am nächſten bey dem Mittelpunkt S (Fig. 105.) der Kraft liegenden Scheitel P die Tangente PN, welche auf AP ſenkrecht ſeyn wird, ſetze $SP = h$, die Geſchwindigkeit in $P = c$, die Zeit, in welcher der Sector PSM beſchrieben wird, $= t'$, die halbe große Axe $= a$, und ihren halben Parameter $= l$. Man nehme $PN = ct'$, und ziehe SN. Da ct' der Weg iſt, welchen der Körper mit ſeiner dem Punkt P entſprechenden Geſchwindigkeit in der Zeit t' gleichförmig zurückgelegt haben würde; ſo wird der Sector PSM dem Dreyeck PSN gleich ſeyn (§. 272.). Folglich iſt 2 Sector $PSM = SP.PN = cht'$. Es iſt aber in der Diſtanz z die Centripetalkraft $= \frac{c^2h^2}{lz^2}$ (§. 280. n. 1.); mithin iſt in der Diſtanz $\left(\frac{SP}{h}\right)$ die Centripetalkraft $k' = \frac{c^2}{l}$, und $k'l = c^2$. Ferner verhält ſich

$$\left(\begin{matrix}\text{die Umlaufszeit}\\ \text{oder } t\end{matrix}\right) : \left(\begin{matrix}\text{Zeit von } P \text{ bis } M\\ t'\end{matrix}\right) = \left(\begin{matrix}\text{Fläche der Ellipſe}\\ ab\pi\ ^*)\end{matrix}\right) : \text{Sect. } PSM$$
$$= 2ab\pi : cht';$$

alſo $t2 : t'2 = 4a^2b2\pi^2 : c^2h2t'^2$

*) Kegelſchn. II, 38.

$= 4a^3 ln^2$ *) : $k'l^2k^2t'^2$

Daher iſt 1.) $t^2 = \frac{4a^3\pi^2}{k^2k'}$.

Man ſetze die der Diſtanz $\binom{SM}{z}$ entſprechende Centripetalkraft $= k$; ſo verhält ſich $k : k' = h^2 : z^2$. Folglich iſt $h^2k' = kz^2$, und $t^2 = \frac{4a^3\pi^2}{kz^2}$. Nun hängt die große Axe der Ellipſe allein von der anfänglichen Geſchwindigkeit v des Körpers und ſeiner anfänglichen Diſtanz z von dem Mittelpunkt der Kraft (§. 280. n. 6. oder §. 282 n. 1.) ab, die kleine Axe aber iſt dem Sinus des Winkels SMT oder SMR proportional (§. 280. n. 12.); folglich iſt die Umlaufszeit von der kleinen Axe, mithin auch von der Excentricität der Ellipſe, unabhängig.

Ein zweyter Körper beſchreibe um denſelben Mittelpunkt der Kräfte in der Zeit T eine Ellipſe, deren halbe große Axe $= A$ ſey. Der Abſtand ihres dem Mittelpunkt der Kräfte zunächſt liegenden Scheitels von dieſem Punkt ſey $= H$, und die Centripetalkraft in dieſer Diſtanz ſey $= K'$; ſo wird man vermöge n. 1. haben

$$T^2 = \frac{4A^3\pi^2}{H^2K'}, \text{ und es wird ſich verhalten}$$

2.) $T^2 : t^2 = \frac{A^3}{H^2K'} : \frac{a^3}{k^2k'}$

Vermöge des dritten keplerischen Geſetzes (§. 180.) verhält ſich, wenn A und a die halbe große Axen zweyer Planetenbahnen ſind,

$T^2 : t^2 = A^3 : a^3$;

folglich muß $H^2K' = k^2k'$, oder

3.) $K' : k' = k^2 : H^2$ ſeyn.

Daſſelbe Geſetz der Centripetalkraft, welches für alle Punkte einer elliptiſchen Planetenbahn gilt (§. 279.), erſtrekt ſich alſo auch von einer Planetenbahn auf die andere.

Umgekehrt, wenn die Centripetalkraft umgekehrt den Quadraten der Diſtanzen proportional iſt; ſo verhalten ſich die Quadrate der Umlaufszeiten, wie die Würfel der halben großen Axen oder der mittleren Entfernungen. Denn nun iſt $K' : k' = k^2 : H^2$, $k'k^2 = K'H^2$; folglich nach n. 2.

4.) $T^2 : t^2 = A^3 : a^3$.

Da der Inhalt des Sectors $PSM = \frac{1}{2} cht'$; ſo iſt die Zeit t', in welcher dieſer Sector beſchrieben wird, $= \frac{2\text{Sect.}PSM}{ch}$. Es iſt aber für jeden Kegelſchnitt, wie im Anfang dieſes §. gezeigt worden iſt, und vermöge §. 280. n. 1. und 2. $k'l = c^2$; folglich iſt

*) Weil $a : b = b : l$ (Kegelſchn. II. Erkl. 9.)

5.) $t = \frac{2 \text{ Sec. } PSM}{\sqrt{l} \cdot \sqrt{k' h^2}}$.

Wenn nun die Centripetalkraft allgemein im umgekehrten Verhältniß des Quadrats der Entfernung iſt; ſo iſt, wenn die der Diſtanz z entſprechende Kraft mit k bezeichnet wird, $k' : k = z^2 : h^2$, und $kz^2 = k'h^2 =$ einer conſtanten Größe. Mithin iſt in dieſem Fall

6.) Die Zeit t', in welchem ein gegebener Sector PSM eines Kegelſchnitts beſchrieben wird, im zuſammengeſetzten Verhältniß aus dem directen der beſchriebenen Fläche und aus dem umgekehrten der Quadratwurzeln aus den Parametern der Kegelſchnitte.

Und wenn die Zeiten, in welchen die Sectoren beſchrieben werden, direct den Flächenräumen und umgekehrt den Quadratwurzeln aus den Parametern proportional ſind; ſo muß

7.) $k'h^2 =$ einer conſtanten Größe C, $k' = \frac{C}{h^2}$, mithin die Centripetalkraft umgekehrt dem Quadrat der Entfernung proportional ſeyn.

§. 284. Aus dem zweyten kepleriſchen Geſetz (§. 179.) und aus dem §. 279. bewieſenen Satz folgt alſo, daß der Mittelpunkt der Sonne der gemeinſchaftliche Mittelpunkt der Kräfte iſt, welche die Planeten nöthigen, ihre elliptiſche Bahnen um die Sonne zu beſchreiben. Das erſte kepleriſche Geſetz (§. 178.) zeigt, daß die Centripetalkraft in den verſchiedenen Punkten derſelben Planetenbahn umgekehrt dem Quadrat der Entfernung von dem Mittelpunkt der Sonne proportional iſt (§. 274. und 277.), und aus dem dritten Geſetz (§. 180.) folgt, daß die Centripetalkraft auch wenn man von einer Planetenbahn zu der andern übergeht, im umgekehrten Verhältniß des Quadrats der Entfernung des Planeten von dem Mittelpunkt der Sonne iſt (§. 275. und 283.). Ferner hat man bey der Beſtimmung der Cometenbahnen in dem vierten Capitel des zweyten Buchs die Vorausſetzung gemacht, daß auch hier die von dem Mittelpunkt der Sonne ausgehende Radii Vectores den Zeiten proportionale Flächenräume abſchneiden, und die Bahnen der Cometen Parabeln oder ſehr ablange Ellipſen ſeyen, ſo daß die Sonne ſich in dem Brennpunkt der Parabel oder in einem der Brennpunkte der Ellipſe befindet, und dieſe

Voraussetzung stimmt mit den Beobachtungen überein. Folglich muß der Mittelpunkt der Sonne auch der Mittelpunkt der auf die Cometen wirkenden Centripetalkräfte (§. 272.), und in den verschiedenen Punkten derselben Cometenbahn die Centripetalkraft umgekehrt dem Quadrat der Entfernung des Cometen von der Sonne proportional seyn (§. 279. und 277.). Endlich hat man bey der Bestimmung der Zeit, in welcher ein gegebener Sector einer Cometenbahn beschrieben wird, angenommen, daß diese Zeit direct dem Inhalt des Sectors und umgekehrt der Quadratwurzel aus dem Parameter der Bahn proportional sey (§. 201.), und diese Voraussetzung mit den Beobachtungen übereinstimmend gefunden; folglich ist auch in verschiedenen Cometenbahnen die Centripetalkraft umgekehrt dem Quadrat der Entfernung proportional (§. 283. n. 7.).

Mithin würden alle Planeten und Cometen, wenn man sie anfänglich in Ruhe und in gleichen Entfernungen von der Sonne annimmt, sich selbst überlassen in gleichen Zeiten von gleichen Höhen gegen den Mittelpunkt der Sonne hin fallen, und die Abweichungen der Bewegungen dieser Himmelskörper von einer geraden Linie sind Wirkungen einer und derselben Kraft, deren Richtung durch den Mittelpunkt der Sonne geht, und welche umgekehrt dem Quadrat der Entfernung von diesem Mittelpunkt der Kraft proportional ist *).

Umgekehrt, wenn alle Planeten und Cometen gegen die Sonne durch eine Kraft getrieben werden, welche den Quadraten ihrer Entfernungen von der Sonne umgekehrt proportional ist; so müßen die Flächenräume, welche die Radii Vectores desselben Planeten oder Cometen abschneiden, den Zeiten, in welchen sie beschrieben werden proportional seyn (§. 271.). Ferner müßen die Bahnen Kegelschnitte seyn (§. 282.), und, wenn sie Kreise oder Ellipsen sind, die Quadrate der Umlaufszeiten den Würfeln ihrer mittleren Entfernungen von der Sonne proportional seyn (§. 283. n. 4.).

*) Princ. L. III. *Regula* I. Causas rerum naturalium non plures admitti debere, quam quæ et veræ sint et earum phænomenis explicandis sufficiant. *Regula* II. Ideoque effectuum naturalium ejusdem generis eædem assignandæ sunt causæ, quatenus fieri potest.

Endlich müßen die Zeiten, in welchen verſchiedene Sectoren verſchiedener Planeten- oder Cometen-Bahnen beſchrieben werden, direct den Flächenräumen und umgekehrt den Quadratwurzeln aus den Parametern der Bahnen proportional ſeyn (§. 283. n. 6.) Alſo folgen aus dieſem Geſetz der Kraft die aus den Beobachtungen geſchloſſene kepleriſche Geſetze der Bewegungen der Planeten, und die Geſetze, nach welchen ſich vermöge der Beobachtungen die Cometen um die Sonne bewegen. Es iſt nicht wahrſcheinlich, daß die Cometen wirklich Parabeln um die Sonne beſchreiben, weil, wenn eine Parabel beſchrieben werden ſoll, das Produkt aus der doppelten anfänglichen Entfernung des Cometen von der Sonne in die Geſchwindigkeit, welche die Centripetalkraft mit ihrer dieſer Entfernung entſprechenden Stärke in einer gegebenen Zeit erzeugen würde, genau dem Quadrat der geraden Linie gleich ſeyn müßte, welche der Comet mit ſeiner anfänglichen Geſchwindigkeit in eben dieſer Zeit würde beſchrieben haben (§. 280. und 282. n. 2.). Aber die Bewegung in der Hyperbel iſt wenigſtens ebenſo wahrſcheinlich, als in der Ellipſe, weil immer eine Hyperbel beſchrieben wird, wenn jenes Produkt kleiner iſt, als das Quadrat der anfänglichen Geſchwindigkeit (§. 280. n. 7. und 282. n. 3), ſo wie eine Ellipſe beſchrieben wird, wenn jenes Produkt größer iſt als das Quadrat der anfänglichen Geſchwindigkeit (§. 280. n. 6. und §. 282. n. 1.). Ein Comet, welcher eine Hyperbel beſchreibt, wird aber nur einmal ſichtbar ſeyn, und nach ſeiner Erſcheinung ſich über die Gränzen des Sonnenſyſtems hinaus entfernen. Er wird ſich neuen Sonnen nähern, und ſich hierauf wieder von dieſen entfernen können, und auf dieſe Art verſchiedene in dem unermeßlichen Himmelsraum verbreitete Syſteme durchwandern. Die Erſcheinungen ſolcher Cometen müßen daher ſehr ſelten ſeyn, und wir müßen meiſtens ſolche Cometen beobachten, welche in ſich ſelbſt zurükkehrende Bahnen beſchreiben, und nach gröſſeren oder kleineren Zwiſchenzeiten wieder in die Nähe der Sonne kommen.

§. 285. Die Nebenplaneten beſchreiben um ihre

Hauptplaneten als Mittelpunkte sehr nahe kreisförmige Bahnen, und die Sectoren sind den Zeiten proportional, indem man von denjenigen Ungleichheiten ihrer Bewegungen abstrahirt, welche andere Perioden, als die ihrer Umlaufszeiten haben (II. Buch 5. Cap.). Folglich ist die auf sie wirkende Centripetalkraft gegen den Mittelpunkt ihrer Hauptplaneten gerichtet (§. 272.). Bey einigen ist die elliptische Gestalt der Bahnen merklich, und der Mittelpunkt des Hauptplaneten fällt in einen der Brennpunkte der Ellipse. Folglich muß bey diesen die Centripetalkraft umgekehrt dem Quadrat ihrer Entfernungen von dem Mittelpunkt des Hauptplaneten proportional seyn (§. 275.). Endlich verhalten die Quadrate der Umlaufszeiten aller derjenigen Nebenplaneten, deren Abstände von ihren Hauptplaneten man meßen konnte, wie die Würfel ihrer mittleren Entfernungen von dem Hauptplaneten, um welchen sie sich bewegen (§. 226. 229.), woraus wiederum folgt, daß die auf die Nebenplaneten wirkende Centripetalkraft umgekehrt dem Quadrat der Entfernung der Nebenplaneten von ihrem Hauptplaneten proportional sey (§. 275. u. 283. n 3.). Der Mond beschreibt im Mittel genommen um die Erde eine Ellipse, in deren einen Brennpunkt der Mittelpunkt der Erde fällt, und die von diesem Punkt ausgehende Radii Vectores schneiden den Zeiten proportionale Flächenräume ab (§ 218.). Mithin ist die Erde der Mittelpunkt der auf den Mond wirkenden Centripetalkraft (§. 272.), und diese Kraft ist umgekehrt dem Quadrat der Entfernung des Monds von dem Mittelpunkt der Erde proportional (§. 277.). Da nun die Nebenplaneten mit ihren Hauptplaneten zugleich sich um die Sonne bewegen, und die relative Bewegung der ersteren um die letzteren sehr nahe ebenso erfolgt, als wenn die Hauptplaneten in Ruhe wären; so müßen auch die Nebenplaneten nahe durch dieselbe Kraft gegen die Sonne hin getrieben werden, welche auf ihre Hauptplaneten wirkt.

§. 286. Da die Kraft, welche den Mond gegen den Mittelpunkt der Erde hin treibt vermöge des vorhergehenden §. umgekehrt dem Quadrat seiner Entfernung von dem

Mittelpunkt der Erde proportional seyn muß; so muß diese Kraft an der Oberfläche der Erde in demselben Verhältniß größer seyn, als in der Gegend des Monds, in welchem das Quadrat des Abstands des Monds von der Erde größer ist als das Quadrat des Erdhalbmessers, mithin nahe in dem Verhältniß von 3600 : 1, wenn man nach §. 63. den mittleren Abstand des Monds von der Erde in runder Zahl = 60 Erdhalbmessern setzt. Man setze den mittleren Abstand des Monds von der Erde = a, seine siderische Umlaufszeit in Minuten ausgedrückt = t und das Verhältniß des Kreisumfangs zu seinem Durchmesser wie $\pi : 1$; so wird die Geschwindigkeit k, welche die auf den Mond wirkende Centripetalkraft in einer Minute, wenn sie constant bliebe, erzeugen würde, $= \frac{4a\pi^2}{t^2}$ (§. 273. n. 2. oder §. 283. n. 1.), und die freye Fallhöhe des Monds in der ersten Minute $= \frac{2a\pi^2}{t^2}$ seyn. Es ist aber der Halbmesser des Erdäquators = 3271691 Toiſ. (§. 143.), und die mittlere Horizontalparallaxe des Monds unter dem Aequator = 57′ 1″ (§. 63.), mithin $a = \frac{3271691}{\text{Sin.}(57'1'')}$ Toiſ., und die siderische Umlaufszeit des Monds ist = 27 T. 7 St. 43′ 11″,5 (§. 61.) = 39343,1918 Min.; folglich ist die freye Fallhöhe des Monds in der ersten Minute = 2,515677 Toiſ. = 15,094 pariser Fuß *). In der Nähe der Erdoberfläche würde diese Kraft, mithin auch die freye Fallhöhe in der ersten Minute 3600 mal größer, und in der ersten Sekunde 3600 mal kleiner als in der ersten Minute (§. 253. n. 1.), demnach = 15,094 par. Fuß seyn. Aber die freye Fallhöhe der Körper in der Nähe der Erdoberfläche beträgt in der ersten Sekunde 15,05138 par. Fuß unter dem Aequator und 15,13315 Fuß unter den Polen (§. 270.); folglich wird jene Kraft, durch welche der Mond in seiner Bahn erhalten wird, an der Erd-

*) Man erhält sehr nahe dieselbe Fallhöhe, wenn man den auf den Halbmesser 1 sich beziehenden sinus versus des von dem Mond in einer Minute beschriebenen Bogens, welcher 32″,94 beträgt, oder auch den Ueberschuß der Secante dieses Bogens über den Halbmesser, mit dem mittleren Abstand des Monds von der Erde multiplicirt. Der Grund hievon ergiebt sich aus §. 273. pag. 464.

oberfläche der Schwere sehr nahe gleich, und daher ist sie dieselbe Kraft, welche wir die Schwere nennen (vermöge der ersten und zweyten Newtonschen Regel in der Note zu dem vorhergehenden §.). Denn wäre die Schwere von ihr verschieden; so würden die durch beyde Kräfte zugleich gegen die Erde getriebene Körper zweymal geschwinder fallen, und in einer Stunde einen Raum von 30 pariser Fuß beschreiben, welches der Erfahrung widerspricht.

Nun sind die Bewegungen der Planeten um die Sonne und der Nebenplaneten um ihre Hauptplaneten Erscheinungen von derselben Art, wie die Bewegung des Monds um die Erde, und sie hängen daher von ähnlichen Ursachen ab. Denn die Kräfte, von welchen jene Umlaufsbewegungen abhängen, sind gegen die Mittelpunkte der Sonne, des Jupiters, des Saturns und Uranus gerichtet, und nehmen mit der Entfernung der Planeten von der Sonne und der Nebenplaneten von ihren Hauptplaneten nach demselben Gesetz ab, nach welchem die Kraft der Schwere mit der Entfernung von der Erde abnimmt (§. 284. und §. 285.). Folglich sind alle Planeten gegen die Sonne, und alle Nebenplaneten gegen ihre Hauptplaneten schwer, und die ersteren würden gegen die Sonne, die letzteren gegen ihre Hauptplaneten, wenn sie sich anfänglich in gleichen Entfernungen von denselben befänden, in gleichen Zeiten von gleichen Höhen fallen, wie man es bey dem freyen Fall der Körper beobachtet (§. 270.). Eben dieses Gesetz der Kraft findet auch zwischen den Cometen und der Sonne statt (§. 284.). Da nun diese Kräfte ähnliche Wirkungen wie die Schwere hervorbringen; so müßen sie wie die Schwere auf alle Theilchen der Materie in gleichen Entfernungen mit gleicher Stärke wirken, und der Analogie nach werden auch die Planeten gegen einander schwer seyn *). Die kleinen Abweichungen ihrer

*) Princ. L. III. *Regula* III. Qualitates corporum quæ intendi et remitti nequeunt, quæque corporibus omnibus competunt in quibus experimenta instituere licet, pro qualitatibus corporum universorum habendæ sunt. *Regula* IV. In philosophia experimentali, propositiones ex phænomenis per inductionem collectæ, non obstantibus contrariis hypothesibus, pro veris aut accuratè aut quam proximè haberi debent, donec alia occurrerint phænomena, per quæ accuratiores reddantur aut exceptionibus obnoxiæ.

rer Bewegungen von einer genauen elliptiſchen Bewegung, welche die Beobachtungen zeigen, wenn ein Planet ſich in der Nähe eines anderen Planeten befindet, können wohl eine Folge der gegenſeitigen Gravitation der Planeten ſeyn. Man wird in der Folge ſehen, daß aus der gegenſeitigen Gravitation der Himmelskörper wirklich jene Störungen der elliptiſchen Bewegung folgen. Die Erſcheinungen, welche man in Bewegungen der Himmelskörper beobachtet, führen alſo, wenn man ſie mit den allgemeinen Geſetzen der Bewegung vergleicht auf folgendes große Naturgeſetz: alle Theilchen der Materie äuſſern ein Beſtreben, ſich einander zu nähern, oder ſie ziehen ſich wechſelsweiſe an mit einer Kraft, welche direct den Maſſen und umgekehrt dem Quadrat ihrer Entfernungen proportional iſt. Dieſes Geſetz wird wenigſtens durch die Erfahrung beſtätigt, ſo lange ſich die Körper in meßbaren Diſtanzen von einander befinden, und keine andere Kräfte, Electricität, Magnetismus, u. ſ. w. mit im Spiel ſind, deren Geſetze noch nicht genau beſtimmt ſind. In vielen Fällen ſcheint freylich dieſes wechſelſeitige Beſtreben nach Annäherung nicht ſtatt zu finden. Zwey Körper, die man zu gleicher Zeit von einerley Höhe fallen läßt, ſcheinen ihren Weg ungeſtört nach lotrechten Richtungen fortzuſetzen, ohne ſich durch ihre gegenſeitige Gravitation zu nähern. Allein die weit ſtärkere Gravitation der Körper gegen die Erde als gegen einander macht ihre Annäherung unmerklich. Durch ſchikliche Vorrichtungen kann übrigens auch die gegenſeitige Gravitation ſolcher Körper, welche um ſehr viel kleiner als die Erde ſind, merklich gemacht werden. Hohe Berge lenken das Bleyloth der aſtronomiſchen Werkzeuge von ſeiner vertikalen Richtung ab *), und Cavendiſch hat bey verhältnißmäßig viel kleineren Maſſen eine merkliche gegenſeitige Anziehung gefunden **). Die aſtronomiſchen Pendeluhren leiden eine merkliche Störung, wenn das Uhrgewicht in die Nähe der Pendellinſe kommt, und gehen etwas langſamer, wenn ſich dieſes Gewicht oberhalb, und geſchwinder, wenn es ſich un-

*) Philos. Trans. Vol. LXV. for 1775. n. 48. 49.
**) Philos. Trans. for 1798, Greens Annalen der Physik, II B. 1 St.

terhalb der Pendellinse befindet. Man beobachtet, daß das Uhrgewicht in eine schwingende Bewegung kommt, wenn es sich der Linse gegenüber befindet, selbst wenn man eine Glastafel zwischen das Gewicht und die Linse bringt, und die Bewegungen werden desto merklicher, je größer die auf einander wirkende Massen und je kleiner ihre Entfernungen von einander sind.

§. 287. Schon die Alten waren der Meynung, daß alle Körper ein Bestreben haben, sich einander zu nähern *). Copernikus schrieb die runde Gestalt der Himmelskörper dem Bestreben ihrer Theilchen nach Vereinigung zu **). Kepler erstrekte die Schwere auf den Mond, die Sonne und die Planeten unter einander selbst ***). Eben diese Meynung findet man in einem Brief von Pascal und Roberval an Fermat vom 16. Aug. 1638 †). Noch bestimmter erklärte sich hierüber D. Hook ††). „Ich will, sagt er ein Welsystem erklären, welches in mehreren Rücksichten von allen anderen verschieden ist, aber mit den gewöhnlichen Sätzen der Mechanik vollkommen übereinstimmt. Es gründet sich auf folgende drey Voraussetzungen: 1.) Daß alle Himmelskörper, keinen ausgenommen, eine Attraktion oder Gravitation gegen ihre Mittelpunkte haben, vermöge welcher sie nicht allein ihre Theilchen anziehen, und sie hindern, sich zu entfernen, wie wir es auf der Erde sehen, sondern

*) *Gregory* Elem. astr. phys. et geometr. in præfat.

**) De revolutionibus orb. coel. L. I. Cap. 9.

***) In der Vorrede zu seinem Werk de motibus stellæ Martis sagt er: „Quod gravitas est affectio corporea mutua inter cognata corpora ad unitionem seu conjunctionem. Duo corpora non impedita coirent loco intermedio, quodlibet accedens ad alterum tanto intervallo, quanta est alterius moles in comparatione; adeoque si Luna et Terra non retinerentur, quælibet in suo circuitu, Terra ascenderet ad Lunam quinquagesima quarte parte intervalli, Luna descenderet ad Terram 53 circiter partibus intervalli, ibique jungerentur. Quod Luna prolectat aquas terrestres; unde fit fluxus, ubi sunt latissimi alvei Oceani, aquisque spatiosa reciprocandi libertas. Et si Terra cessaret attrahere ad se aquas suas, aquæ marinæ elevarentur, et in corpus Lunæ influerent. (Vergl. Nova Phys. coel. Introd. pag. 5.).

†) Oeuvres de Pascal. T. IV. pag. 389.

††) An attempt to prove the motion of the Earth, London, 1674. pag. 27. *La Lande* Astron. T. III. pag. 405. n. 3525.

auch die anderen innerhalb ihres Wirkungskreiſes befindlichen Himmelskörper anziehen; 2.) daß alle Körper, welche eine einfache und geradlinigte Bewegung erhalten haben, fortfahren ſich ſo lange in einer geraden Linie zu bewegen, als ſie nicht durch die Wirkung einer anderen Kraft davon abgelenkt, und genöthigt werden, einen Kreis, eine Ellipſe, oder eine andere zuſammengeſetztere krumme Linie zu beſchreiben; 3.) daß die Anziehungskräfte der Körper deſto ſtärker ſind, je näher die Körper, auf welche ſie wirken, ihren Mittelpunkten ſind. Was die Proportion betrift, nach welcher dieſe Kräfte abnehmen, indem die Entfernung wächst, ſo bekenne ich, daß ich dieſelbige noch nicht ausfindig gemacht habe". Die Entdeckung dieſes Geſetzes, und eine daraus abgeleitete auf mathematiſche Demonſtrationen gegründete Erklärung der Erſcheinungen, welche uns die Bewegungen der Himmelskörper darbieten, war Newton vorbehalten. Pemberton, ein Zeitgenoße Newtons erzählt *) die Geſchichte dieſer Entdeckung auf folgende Art. Als Newton im Jahr 1666 durch die Peſt genöthigt war, ſich von Cambridge wegzubegeben, beſchäftigte er ſich an einem gewißen Tage mit tiefen Betrachtungen der Schwere **). Er bemerkte, daß eben deßwegen, daß dieſe Kraft ſich nicht merklich in den gröſten Diſtanzen von der Erde, welche wir erreichen können, z. B. auf den höchſten Bergen, vermindert, der Gedanke natürlich ſey, daß ſie ſich noch viel weiter erſtrecke. Warum, ſagte er bey ſich ſelbſt, ſollte ſie ſich nicht bis zu dem Mond erſtrecken? Und wenn diß ſich ſo verhält; ſo iſt es ſehr wohl möglich, daß der Mond durch eben dieſe Kraft in ſeiner Bahn erhalten wird. Wenn übrigens gleich

*) A view of Sir Isaac Newton's Philosophy, London 1728. Préface. Elémens de la Philosophie Newtonienne par *Mr. Pemberton.* Amsterd. et Leipzig. MDCCLV. Pref. pag. VII et suiv.

**) Voltaire fängt die Erzählung der Geſchichte dieſer Entdeckung ſo an: Un jour en l'année 1666 *Newton* retiré à la campagne, *et voyant tomber des fruits d'un arbre, à ce que m'a conté sa niece* (Madame *Conduit*), se laissa aller à un méditation profonde sur la cause qui entraine ainsi tous le corps dans un ligne, qui. si elle étoit prolongée, passeroit à peu près par le centre de la Terre. *Collection complette des Oeuvres de Mr. de Voltaire. I. édit. T. III. Melang. de philos. III. Partie Chap. III. pag.* 193 *et suiv.*

die Schwere in den kleinen Veränderungen der Distanzen keine merkliche Verminderung zeigt; so kann sie doch in der Entfernung des Monds beträchtlich vermindert seyn. Er dachte, daß, wenn die Schwere den Mond in seiner Bahn erhält, eben diese Kraft allem Anschein nach die Ursache der Umlaufsbewegungen der Hauptplaneten um die Sonne seyn müße. Unter der Voraussetzung, daß die Planeten um die Sonne als Mittelpunkt Kreise beschreiben, und durch eine der Schwere ähnliche Kraft gegen den Mittelpunkt der Sonne getrieben werden, fand er mittelst des dritten keplerischen Gesetzes, daß diese Kraft umgekehrt dem Quadrat der Entfernung von der Sonne proportional seyn müße (§. 275.). Er nahm nun an, daß die Kraft der Schwere mit der Entfernung von der Erde nach demselben Gesetz abnehme, und berechnete, ob diese Kraft hinreichend sey, den Mond in seiner Bahn zu erhalten (S. §. 285.). Weil er keine Bücher bey der Hand hatte; so gieng er bey dieser Berechnung von der gewöhnlichen Voraussetzung aus, daß ein Grad der Breite auf der Oberfläche der Erde 60 englische Meilen enthalte. Da aber diese Voraussetzung nicht richtig ist, und ein Grad ungefähr $60\frac{1}{2}$ englische Meilen enthält; so entsprach die Rechnung nicht seinen Erwartungen, und er schloß hieraus, daß eine andere Ursache verbunden mit der Schwere auf die Bewegung des Monds Einfluß habe. Diese Bemerkung hielt ihn einige Zeit ab, weiter über diesen Gegenstand nachzudenken. Aber nach zehn Jahren ward er durch einen Brief des D. Hook veranlaßt, den Faden seiner Betrachtungen über die Kraft, welche den Mond in seiner Bahn erhält, wieder aufzufassen. Hook forderte ihn auf, die Linie zu suchen, welche eigentlich ein frey fallender Körper beschreibt, wenn man auf die Umdrehung der Erde Rücksicht nimmt (§. 162.). In dieser Zwischenzeit waren von Picard genauere Meßungen zur Bestimmung der Größe der Erde angestellt worden (§. 135.), und Newton fand nun, indem er von diesen genaueren Angaben ausgieng, daß die auf den Mond wirkende Kraft keine andere, als die Schwere, und umgekehrt dem Quadrat der Distanz proportional sey, wie er es lange Zeit vorher vermuthet hatte. Er fand

mittelſt dieſes Princips, daß die Linie, welche ein fallender Körper beſchreibt, eine Ellipſe ſey, welche den einen ihrer Brennpunkte in dem Mittelpunkt der Erde hat, und da die Hauptplaneten ähnliche krumme Linien um die Sonne beſchreiben, ſo hatte er das Vergnügen, zu ſehen, daß dieſe Unterſuchung, welche er aus bloßer Neubegierde unternommen hatte, zu der Auflöſung der wichtigſten Probleme dienen könne. Unmittelbar nachher ſetzte er zwölf auf die Bewegung der Hauptplaneten um die Sonne ſich beziehende Sätze auf, und erſt einige Jahre ſpäter ſchrieb er auf Bitten des D. Halley ſein unſterbliches Werk, welches zuerſt im Jahr 1087 erſchien unter dem Titel: Philosophiæ naturalis principia mathematica, Lond. 4., deſſen gröſten Theil er in einer Zeit von 18 Monaten erfunden und in Ordnung gebracht haben ſoll. Man nennt daher denjenigen Theil der Aſtronomie, welcher ſich mit der Anwendung der Geſetze der Bewegung auf die Bewegung der Himmelskörper und der Theorie der allgemeinen Schwere beſchäftigt, und aus dieſer diejenige Erſcheinungen, welche wir an den Himmelskörpern beobachten, als nothwendige Folgen ableitet, die Newtoniſche Aſtronomie. Sie heißt auch die phyſiſche Aſtronomie, und la Place nennt ſie, weil ſie als ein großes Problem der Mechanik betrachtet werden kann, die Mechanik des Himmels (Mécanique céleste.).

§. 288. Dieſe Theorie der allgemeinen Schwere gründet ſich auf folgende Vorausſetzungen:

1.) Alle Theilchen der Materie gravitiren gegen einander, oder ziehen einander an.

2.) Die Gravitation iſt bey gleichen Entfernungen den Maſſen proportional.

3.) Die Gravitation nimmt in demſelben Verhältniß ab, in welchem das Quadrat der Entfernung wächst, oder ſie iſt umgekehrt dem Quadrat der Entfernungen proportional.

4.) Sie wirkt unter übrigens gleichen Umſtänden mit gleicher Stärke auf ruhende oder ſchon in Bewegung geſetzte Körper, oder ſie iſt eine abſolute Kraft.

5.) Die Himmelskörper bewegen sich in einem Mittel, welches ihnen keinen bemerkbaren Widerstand entgegensetzt.

Hiebey muß man aber niemals vergessen, daß die Worte: Gravitation, Attraction, u. s. w. blos das Phänomen bezeichnen, nicht die physische Ursache desselben, welche uns gänzlich unbekannt ist, angeben sollen *).

Nun wird man aber fragen: findet wohl dasselbe Gesetz der Gravitation zwischen den Himmelskörpern, welche eine so beträchtliche Größe haben, statt, welches man zwischen den einzelnen Theilchen der Materie angenommen hat? Müssen nicht wegen der allgemeinen Gravitation diejenige Körper, um welche sich andere bewegen, selbst auch in Bewegung seyn, und welche Veränderungen werden hieraus in der relativen Bewegung des einen Körpers um den andern entstehen? Kann die relative Bahn eines Planeten um die Sonne, oder eines Nebenplaneten um seinen Hauptplaneten nahe eine Ellipse bleiben, deren einer Brennpunkt in den Mittelpunkt der Sonne, oder in den Mittelpunkt des Hauptplaneten fällt, und werden die Abweichungen von einer genauen elliptischen Bewegung eine Folge der allgemeinen Gravitation seyn, und werden sie dasselbe Gesetz nothwendig befolgen müßen, welches die Beobachtungen zeigen?

Man wird sogleich sehen, daß wegen der sehr großen Entfernung der Himmelskörper von einander in Vergleichung mit ihren Durchmessern das Verhältniß der Abstände der verschiedenen Punkte des einen von denen des andern sehr nahe das Verhältniß der Gleichheit seyn muß, mithin alle Theilchen des einen Himmelskörpers gegen die Theilchen des

*) Princ. L. I. Def. VIII. „Voces *attractionis*, *impulsus*, vel propensionis cujuscunque in centrum, indifferenter et pro se mutuò promiscue usurpo; has vires non physice, sed mathematicè tantum considerando. Unde caveat lector, ne per hujusmodi voces cogitet me speciem vel modum actionis causamve aut rationem physicam alicubi definire, vel centris (quæ sunt puncta mathematica) vires verè et physicè tribuere; si forte aut centra trahere, aut vires centrorum esse dixero. Und L. I. Sect. XI. vor der LVIIsten Prop. sagt Newton:" considerando vires centripetas tanquam attractions, quamvis fortasse, si physicè loquamur, veriùs dicantur impulsus. Ferner L. III. Regula III. Attamen gravitatem corporibus essentialem esse minimè affirmo.

andern nahe gleich ſtark gravitiren müßen, und daher ihre Maſſe als in ihren Schwerpunkten oder in den Mittelpunkten der kugelförmigen Körper, welche ſie bilden, vereinigt gedacht werden kann. Folglich kann das Geſetz der Gravitation dieſer Körper gegen einander nicht beträchtlich von dem angenommenen Geſetz der Gravitation ihrer Theilchen verſchieden ſeyn. Weil ferner die Sonne in Vergleichung mit den Planeten eine ſehr beträchtliche Größe hat; ſo werden die letzteren keinen beträchtlichen Einfluß auf die Bewegung der Sonne haben können, und die Gravitation der Planeten gegen einander wird um vieles geringer ſeyn müſſen, als ihre Gravitation gegen die Sonne, ſo daß ihre Bewegungen nahe daſſelbe Geſetz befolgen müßen, nach welchem ein Körper ſich um einen feſten Punkt bewegt, gegen welchen er im umgekehrten Verhältniß des Quadrats der Entfernung gravitirt. Auf ähnliche Weiſe verhält es ſich mit den Nebenplaneten. Dieſe ſind in Vergleichung mit ihren Hauptplaneten ſehr klein, und bewegen ſich um dieſelbige in Bahnen, welche um vieles kleiner ſind, als die Bahnen der Hauptplaneten. Die Sonne wird alſo auf den Hauptplaneten und auf die ihn umgebende Nebenplaneten nahe mit gleicher Stärke wirken, ſo daß nur die kleine Differenz ihrer Gravitationen gegen die Sonne ihre elliptiſche und beynahe kreisförmige Bewegung ſtören kann. Hieraus wird man ſich zwar im allgemeinen erklären können, warum die Bahnen der Planeten und der um dieſe ſich bewegenden Nebenplaneten im Mittel genommen Ellipſen ſind, welche nach den bisher gefundenen Geſetzen beſchrieben werden, und warum ſich kleine periodiſche von den gegenſeitigen Stellungen dieſer Körper abhängende Abweichungen von einer genauen elliptiſchen Bewegung zeigen müßen. Aber eine vollſtändige Erklärung dieſer Erſcheinungen aus der Theorie der allgemeinen Schwere wird nur mittelſt der Mathematik gegeben werden können, durch welche man eben dieſe Theorie aus den Phänomenen abgeleitet hat. Man wird finden, daß in gewißen Fällen, welche in der Natur entweder genau, oder ſehr nahe, ſtatt finden, die gegenſeitige Gravitation der Körper genau ihren Maſſen und umgekehrt den Quadraten

der Abstände ihrer Schwerpunkte proportional ist, wie groß oder wie klein diese Abstände seyn mögen, und daß, wenn nur zwey Körper vorhanden wären, der Schwerpunkt des einen um den Schwerpunkt des andern einen Kegelschnitt nach demselben Gesetz beschreiben muß, welches man unter der Voraussetzung eines unbeweglichen Mittelpunkts der Kraft gefunden hat. Kommt noch ein dritter hinzu; so wird keine der Bahnen genau ein Kegelschnitt, sondern eine sehr verwickelte krumme Linie seyn, welche man bis jetzt noch nicht genau hat bestimmen können. Die Aufgabe, die relative Bahn eines der drey Körper um einen der zwey übrigen zu bestimmen, z. B. die relative Bahn des Monds um die Erde mit Rücksicht auf die Gravitation dieser zwey Körper gegen die Sonne, heißt das Problem der drey Körper. Aus den vorhin angeführten Gründen kann in unserem Sonnensystem die Abweichung der gesuchten krummen Linie von einem Kegelschnitt niemals sehr beträchtlich, und daher die Aufgabe näherungsweise mit einer Genauigkeit aufgelöst werden, welche der Genauigkeit der Beobachtungen entspricht.

§. 289. Es sey *CD* (Fig. 116.) ein durch die Kegeloberfläche *ACa*, und die sphärische Oberfläche *Aa*, deren Mittelpunkt in der Spitze *C* des Kegeloberfläche sey, begränzter gleichförmig dichter Körper. *Mm* und *Bb* seyen durch eben diese Kegeloberfläche abgeschnittene Stücke von Kugeloberflächen, welche mit der ersteren einerley Mittelpunkt *C* haben; so wird sich unter der Voraussetzung des Newtonschen Gravitationsgesetzes die Gravitation des Punkts *C* gegen den Körper *ACa* zur Gravitation eben dieses Punkts gegen den Körper *BCb* verhalten, wie $CA : CB$. Denn das Verhältniß der Gravitation von *C* gegen die Fläche *Aa* zu der Gravitation von *C* gegen irgend eine mit jener concentrische sphärische Fläche *Mm* ist das zusammengesetzte aus dem Verhältniß des Quadrats von *CM* zu dem Quadrat von *CA*, und, wegen der gleichförmigen Vertheilung der Materie, aus dem Verhältniß der Fläche *Aa* zu der Fläche *Mm*. Das letztere Verhältniß ist aber wegen der Aehnlichkeit der

Flächen dem Verhältniß des Quadrats von CA zu dem Quadrat von CM gleich; folglich ſind dieſe zwey Gravitationen zu einander im zuſammengeſetzten Verhältniß von $\overline{CM}^2 : \overline{CA}^2$ und von $\overline{CA}^2 : \overline{CM}^2$, welches das Verhältniß der Gleichheit iſt. Man ſetze die Gravitation gegen die Fläche $Aa = D$; ſo wird die Gravitation gegen den Körper $CAa = D \times CA$, und gegen den Körper $CBb = D \times CB$ ſeyn, welche ſich zu einander verhalten wie $CA : CB$. Ebenſo iſt die Gravitation gegen den Körper $AMma = D \times AM$.

Auf der ſphäriſchen Fläche Aa ſey irgend eine Figur beſchrieben, und eine beſtändig durch die Spitze C der Kegeloberfläche gehende gerade Linie bewege ſich auf dem Umfang jener Figur herum; ſo wird ſie auf jeder anderen mit der erſteren concentriſchen ſphäriſchen Fläche eine Figur beſchreiben, welche der auf Aa beſchriebenen ähnlich iſt und ähnlich liegt. Mithin wird von den auf ſolche Art beſchriebenen Körpern eben das gelten, was für den kegelförmigen Körper bewieſen worden iſt.

Man ziehe durch C eine gerade Linie Cf unter einem beliebigen Winkel mit Ca, und fälle auf ſie aus a, m, b die Perpendickel af, mp, gb; ſo verhält ſich $\left.\begin{matrix} CA : CM \\ Ca : Cm \end{matrix}\right\} = Cf : Cp$, und $CA : AM = Cf : fp$. Folglich iſt, wenn die Gravitation gegen den Körper $AMma$ (oder gegen den Körper Dd) in zwey andere Kräfte zerfällt wird, deren eine nach der Richtung Cf, die andere auf Cf ſenkrecht wirkt (§. 252.), und die Gravitation gegen die Fläche Aa (oder gegen die auf ihr beſchriebene Fläche) mit D bezeichnet wird,

1.) Der nach der Richtung Cf wirkende Theil der Gravitation von C gegen den Körper $AMma$, (oder gegen den Körper Dd) $= D \times pf$.

Es ſey $MBmE$ (Fig. 117.) ein Schnitt eines gleichförmig dichten Körpers mit einer durch den gegebenen Punkt C gehenden Ebene, und CP, CQ ſeyen in dieſer Ebene liegende und durch C gehende der Lage nach gegebene gerade Linien. Eine durch C gehende gerade Linie CM ſchneide den Umfang der Figur in M und m, und einen aus C als Mittelpunkt mit dem gegebenen Halbmeſſer CA beſchriebenen

Kreis in N. Man ziehe MP, mp auf CP, und NR auf CQ senkrecht, verlängere NR nach K so, daß $KR = Pp$ werde, und es sey $GKkg$ die krumme Linie, welche auf diese Art entsteht, wenn die gerade Linie CM sich um C dreht, und von der Lage CB in die Lage CE kommt, indem man immer jede andere Ordinate rk nach eben diesem Gesetz bestimmt, und $rk = P'p'$ nimmt. Wenn nun eine andere durch die gerade Linie CQ gelegte Ebene eben diesen Körper schneidet; so wird der nach Richtung CA wirkende Theil der Gravitation von C gegen das zwischen den zwey schneidenden Ebenen begriffene Stük des Körpers desto genauer direct der Fläche $GKkg$ und umgekehrt der geraden Linie CA proportional seyn, je kleiner der Winkel wird, unter welchem sich die zwey Ebenen schneiden. Denn es schneide eine andere gerade Linie CM den Umfang der Figur in M' und m', und den Kreis in n. Ferner seyen MZ, mr senkrecht auf CQ, die, wo nöthig verlängerte CM' begegne einem aus C als Mittelpunkt mit dem Halbmesser CM in der Ebene QCM beschriebene Kreisbogen in o, und Mx, ou seyen auf der anderen schneidenden Ebene senkrecht, von welcher man annimmt, daß sie durch x und u gehe. Da der Körper gleichförmig dicht ist; so wird die Gravitation gegen die Fläche Mu dieser Fläche direkt und umgekehrt dem Quadrat von CM proportional seyn, und durch $\frac{Mo \times Mx}{CM^2}$ können ausgedrückt werden. Demnach wird seyn die auf die Richtung CA reducirte Gravitation von C gegen den Körper $m'mMu = Pp \times \frac{Mo \times Mx}{CM^2}$ (n. 1.). Es verhalte sich der Neigungswinkel der zwey Ebenen zu dem Winkel, welcher durch einen mit dem Halbmesser eines Kreises gleiche Länge habenden Bogens gemeßen wird, wie $i : 1$; so wird Mx desto genauer $= i.MZ$ seyn, je kleiner der Neigungswinkel i ist. Weil nun

$$\begin{aligned} Mo : Nn &= CM : CN \\ MZ : NR &= CM : CN \\ Mx : MZ &= i \quad : 1 \end{aligned}$$

so ist $Mo \times Mx : Nn.NR = i.\overline{CM}^2 : \left(\frac{\overline{CN}^2}{\overline{CA}^2}\right.$

und, wenn man an den Punkt N des Kreises eine Tangente

Nt zieht, welche der verlängerten rn in t begegnet,

$Mo \times Mx : Nt \times NR < i.\overline{CM}^2 : \overline{CA}^2$ (weil $Nt > Nn$).

aber $Nt : Rr = \binom{CN}{CA} : NR$;

folglich $Mo \times Mx : Rr \times NR < i.\overline{CM}^2 : CA \times NR$,

und $\frac{Mo \times Mx}{\overline{CM}^2} < \frac{i.Rr}{CA}$.

Da nun $Pp = KR$ (Conſtr.);

ſo iſt $Pp \times \frac{Mo \times Mx}{\overline{CM}^2} < \frac{i.KR \times Rr}{CA}$.

Wenn nun, wie im Fall der Figur, Mm, mithin auch Pp oder die ihr gleiche Ordinate RK abnimmt, indem der Winkel QCM wächst; ſo iſt die Gravitation gegen den Theil $m'mM'$ des Körpers kleiner als gegen den Körper mMu, und um ſo mehr kleiner als $\frac{i.KR \times Rr}{CA}$. Folglich iſt, wenn die Summe der um die Figur RKg beſchriebenen Rechtecke mit S bezeichnet wird, die Gravitation gegen das ganze Stück mME kleiner als $\frac{i.S}{CA}$. Ebenſo wird gezeigt, daß, wenn man auf ähnliche Art pyramidaliſche Stücke in den Körper beſchreibt, und die Summe der in die Figur RKg beſchriebenen Rechtecke $= S'$ ſetzt, die Gravitation gegen mME größer ſey als $\frac{i.S'}{CA}$. Da nun der Ueberſchuß von S über S' durch die Verminderung des Winkels MCM' kleiner als jeder gegebene Raum gemacht werden kann (§. 246.); ſo iſt die auf die Richtung CA reducirte Gravitation von C gegen das Stück mME des Körpers, welches durch die zwey unter dem Winkel i ſich ſchneidende Ebenen, die durch CM und Mx gelegte Ebene, und die krumme Oberfläche des Körpers begränzt wird, $= \frac{i \times \text{Fläche } RKg}{CA}$. Ebenſo wird der Beweiß geführt, wenn Mm mit dem Winkel QCM zugleich wächst. Demnach iſt

2.) der nach der Richtung CA wirkende Theil der Gravitation von C gegen das durch die zwey ſchneidende Ebenen und die Oberfläche des Körpers begränzte Stück von B bis $E = \frac{i \times \text{Fläche } GKg}{CA}$.

Wenn alle Durchschnitte des Körpers mit einer durch die gerade Linie CQ gelegten Ebene einander gleich sind, oder der Körper durch die Umdrehung der Figur $mBME$ um die Axe CQ beschrieben wird; so wächst die Gravitation gegen den so entstehenden Körper dem Winkel oder Bogen i proportional. Mithin ist, wenn die Umdrehungsaxe CQ ganz ausserhalb der Figur fällt, und $\pi : 1$ das Verhältniß des Umfangs zum Durchmesser ist,

3.) die auf die Richtung CA reducirte Gravitation von C gegen den ganzen ringförmigen Körper, welcher entsteht, wenn die Figur BE eine Umdrehung macht,

$= \frac{2\pi . \text{Fläche } GKg}{CA}$.

Und wenn die gerade Linie CA mit der Umdrehungsaxe CQ zusammenfällt; so heben sich die auf CA senkrechten Gravitationen gegen einander auf, und die Richtung der Gravitation gegen den ganzen Körper fällt mit der Umdrehungsaxe zusammen.

Wenn 4.) die Umdrehungsaxe CQ die Figur schneidet (Fig. 118.), aber die auf der Umdrehungsaxe senkrechte Chorden der Figur nicht halbirt; so beschreiben die zwey Segmente bey einer ganzen Umdrehung zwey verschiedene Körper, und jedem der Segmente entspricht eine eigene krumme Linie $AGKg$. Man erhält sodenn die Gravitation gegen den einen oder den andern Körper nach n. 3.

Endlich wenn 5.) die Umdrehungsaxe alle auf ihr senkrechte Chorden der Figur halbirt; so werden die jeder Hälfte der Figur entsprechende krumme Linien $AGKg$ einander gleich, und die Gravitation in der Richtung der Umdrehungsaxe gegen den ganzen Körper, welcher durch eine volle Umdrehung einer der Hälften der Figur beschrieben wird, ist wie in n. 3. $= \frac{2\pi . \text{Fläche } AGKg}{CA}$.

§. 290. Das Theilchen C (Fig. 118.) gravitire nun gegen eine gleichförmig dichte Kugel, welche durch die Umdrehung des Halbzirkels BEH um die Axe CQ beschrieben wird. Es sey A der Mittelpunkt der Kugel, und eine aus C gezogene gerade Linie CM schneide den Halbzirkel in M

und m, und einen aus C als Mittelpunkt mit dem Halbmeſſer CA beſchriebenen Kreisbogen Af in N. Man ziehe MP, mp, NR auf CQ ſenkrecht, und verlängere RN ſo nach K daß $RK = Pp$ werde. Es ſey GKg die krumme Linie, welche durch die Endpunkte aller nach dieſem Geſetz beſtimmten Ordinaten durchgeht; ſo wird die dem Punkt A entſprechende Ordinate $AG = BH$ ſeyn, und die krumme Linie wird den Durchmeſſer BH in dem Punkt g ſchneiden, welcher gefunden wird, wenn man durch C eine Tangente CEf an den Halbzirkel zieht, und aus dem Punkt f, in welchem ſie dem Kreisbogen AN begegnet, ein Perpendickel fg auf BH fällt, oder auch $Cg = CE$ nimmt. Die Gravitation gegen den ringförmigen Körper, welcher durch die Umdrehung des Kreisabſchnitts mEM um die Axe CQ beſchrieben wird, iſt alſo $= \frac{2\pi.\text{Fläche } gKR}{CA}$ (§. 289. n. 3.), und die Gravitation gegen die Kugel $= \frac{2\pi.\text{Fläche } gKGA}{CA}$ (n. 5.). Um nun den Inhalt der Fläche $gKGA$ zu finden, fälle man aus dem Mittelpunkt A der Kugel das Perpendickel AD auf Mm; ſo iſt $MD = Dm$ (III, 3.), und $\overline{mD}^2 = \overline{CD}^2 - MC \times Cm$ (II, 6.) $= CR^2 - BC \times CH$ (III, 36. und weil $CD = CR$). Es wachſe die Hälfte mD der Chorde mM um Do, wenn die CR um Rr wächst; ſo wird $(mD + Do)^2 = (CR + Rr)^2 - BC \times CH$, oder

$$\overline{mD}^2 + 2mD \times Do + \overline{Do}^2 = \overline{CR}^2 + 2CR \times Rr + \overline{Rr}^2 - BC \times CH.$$

Aber $\overline{mD}^2 = CR^2 - BC \times CH$;

folglich $2mD \times Do + \overline{Do}^2 = 2CR \times Rr + \overline{Rr}^2$.

Alſo verhält ſich $Rr : Do = 2mD + Do : 2CR + Rr$,

und es iſt $Rr : Do$ deſto genauer $= \left\{\begin{matrix} 2mD : 2CR \\ mD : CR \end{matrix}\right\}$, je kleiner Rr und Do werden.

Da nun $\left\{\begin{matrix} Pp \\ KR \end{matrix}\right\} : \left\{\begin{matrix} Mm \\ 2mD \end{matrix}\right\} = CR : \left\{\begin{matrix} CN \\ CA \end{matrix}\right\}$;

ſo iſt $KR \times Rr : 2mD \times Do$ deſto genauer $= mD : CA$,

und $KR \times Rr$ deſto genauer $= 2. \frac{\overline{mD}^2 \times Do}{CA}$, je kleiner Rr wird.

Ferner iſt $(mD + Do)^3 - \overline{mD}^3 = 3\overline{mD}^2 \times Do + 3mD \times \overline{Do}^2 + \overline{Do}^3$; folglich nähert ſich die Zunahme des Wür-

fels von mD, wenn diese Linie um Do wächst, desto mehr der Größe $3\overline{mD}^2 \times Do$, je kleiner Do, mithin auch Rr wird, und zugleich nähert sich der Inhalt $KR \times Rr$ des in die Figur $AGKg$ beschriebenen Rechtecks Kr der gleichzeitigen Zunahme der Fläche $gKRg$. Demnach verhält sich die Geschwindigkeit, mit welcher die Fläche $gKRg$ wächst, zu der Geschwindigkeit, mit welcher $\frac{\overline{mD}^3}{CA}$ wächst, $= 2 : 3$, oder es ist die erstere Geschwindigkeit beständig $= \frac{2}{3}$ der letztern, und daher ist die Fläche $gKRg = \frac{2}{3}\frac{\overline{MD}^3}{CA}$ (§. 238. und 239., weil die Fläche $gKRg$ und die Chorde mM zugleich verschwinden), und die Fläche $gKGA = \frac{2}{3}\frac{\overline{AB}^3}{CA}$. Hieraus folgt also die Gravitation von C gegen den Körper, welchen der Abschnitt mEM beschreibt $= \frac{4}{3}\pi\frac{\overline{mD}^3}{\overline{CA}^2}$, und gegen die ganze Kugel $\frac{4}{3}\pi\frac{\overline{AB}^3}{\overline{CA}^2}$.

Es ist aber der Inhalt der Kugel $= \frac{4}{3}\pi.\overline{AB}^3$; folglich ist die Gravitation des ausserhalb der Kugel befindlichen Theilchens C gegen diese Kugel direct ihrem Inhalt oder ihrer Masse, und umgekehrt dem Quadrat der Entfernung des Theilchens von dem Mittelpunkt der Kugel proportional *).

§. 291. Da vermöge des vorhergehenden §. die Gravitation eines ausserhalb einer Kugel BD (Fig. 119.) befindlichen Theilchens C gegen diese Kugel direct ihrer Masse und umgekehrt dem Quadrat der Distanz CA proportional ist; so wird sich die Gravitation von C gegen die Kugel BD zu der Gravitation gegen eine mit der ersteren concentrische Kugel bd verhalten wie die Masse der Kugel BD zu der Masse der Kugel bd, und der Ueberschuß der ersteren Gravitation über die letztere, d. i. die Gravitation von C gegen die Kugelschale $BbdD$, wird sich verhalten zu der Gravitation gegen die Kugel BD, wie die Masse jenes holen kugelförmigen

*) Princ. L. I. prop. LXXIV. Cor. 2.

Körpers zu der Maſſe der Kugel *BD* ſich verhält. Folglich iſt auch die Gravitation gegen einen gleichförmig dichten holen durch zwey concentriſche Kugeloberflächen begränzten Körper direct der Maſſe des Körpers und umgekehrt dem Quadrat des Abſtands eines auſſerhalb deſſelben befindlichen Theilchens von dem gemeinſchaftlichen Mittelpunkt der Kugeloberflächen proportional, woraus folgt, daß die Gravitation auch gegen eine ungleichförmig dichte Kugel umgekehrt dem Quadrat der Entfernung von dem Mittelpunkt der Kugel proportional bleibt, wenn die Dichtigkeit in gleichen Abſtänden von dem Mittelpunkt der Kugel dieſelbe iſt *).

Es ſeyen *BD*, *EF* zwey gleichförmig dichte, oder in gleichen Entfernungen von dem Mittelpunkt gleich dichte Kugeln; ſo iſt die Gravitation eines jeden Theilchens *e* der der Kugel *EF* gegen die Kugel *BD* umgekehrt dem Quadrat der Diſtanz *eA* deſſelben von dem Mittelpunkt *A* der Kugel *BD* proportional, und daher dieſelbe, als wenn die ganze Maſſe der Kugel *BD* in ihrem Mittelpunkt *A* vereinigt wäre. Da nun die Gravitation eines jeden Theilchens *e* der Kugel *EF* gegen den Punkt *A* umgekehrt dem Quadrat ſeines Abſtands von dieſem Punkt proportional iſt; ſo iſt vermöge des oben bewieſenen die Gravitation der ganzen Kugel *EF* gegen den Punkt *A*, d. i. gegen die Kugel *BD*, umgekehrt dem Quadrat des Abſtands *CA* ihres Mittelpunkts *C* von dem Mittelpunkt *A* der Kugel *BD* proportional **).

Hieraus folgt, daß, wenn eine der zwey Kugeln, z. B. die *BD*, unbeweglich wäre, und der andern Kugel *EF* nach einer von der Richtung der geraden Linie *CA* verſchiedenen Richtung irgend eine Geſchwindigkeit mitgetheilt worden wäre, der Mittelpunkt *C* der letzteren um den Mittelpunkt *A* der erſteren als Brennpunkt einen Kegelſchnitt beſchreiben würde (§. 282.).

§. 292. Es giebt noch einen Fall, in welchem Kugeln einander ebenſo anziehen, als wenn ihre Maſſen in ih-

*) Princ. L. I. prop. LXXVI.
**) Princ. L. I. prop. LXXV.

ren Mittelpunkten vereinigt wären. Wenn nemlich die Anziehungskraft der einzelnen Theile direct ihren Entfernungen von einander proportional ist; so findet man auf ähnliche Art, wie in §. 289. und 90, daß die Kraft, mit welcher eine gleichförmig dichte oder in gleichen Distanzen von ihrem Mittelpunkt gleich dichte Kugel ein ausserhalb ihr befindliches Theilchen anzieht, im zusammengesetzten Verhältniß aus der Masse der Kugel und dem Abstand des angezogenen Theilchens von dem Mittelpunkt der Kugel ist*); woraus dasselbe Attractionsgesetz zwischen zwey gleichartigen Kugeln folgt. Hieraus ergiebt es sich ferner, daß, wenn die Anziehungskraft aus zwey Theilen bestände, wovon der eine umgekehrt dem Quadrat der Entfernung, der andere direct der Entfernung selbst proportional wäre, zwey Kugeln einander nach demselben Gesetz anziehen würden, so daß man ihre Massen als in ihren Mittelpunkten vereinigt annehmen könnte. La Place hat den umgekehrten Satz bewiesen, daß, wenn die Kraft, mit welcher eine Kugel ein ausserhalb ihr befindliches Theilchen anzieht, eben so mit dem Abstand von der Kugel Mittelpunkt sich verändern soll, wie sich die Anziehungskraft der einzelnen Theilchen mit ihren Entfernungen von einander verändert, die anziehende Kraft entweder der Entfernung, oder umgekehrt dem Quadrat der Entfernung, oder zum Theil der Entfernung und zum Theil dem Quadrat der Entfernung proportional seyn müsse**). Folglich ist unter allen Attractionsgesetzen, nach welchen die Attraction mit der Zunahme der Entfernung abnimmt, das wirklich in der Natur statt findende Attractionsgesetz das einzige, bey welchem kugelförmige Körper ebenso aufeinander wirken, als wenn ihre Massen in ihren Mittelpunkten vereinigt wären. Dieses Gesetz ist ebenfalls das einzige, bey welchem ein innerhalb eines durch zwey concentrische Kugeloberflächen begränzten Körpers liegender Punkt nach allen Richtungen mit gleicher Stärke angezogen wird, mithin die entgegengesetzten Attraktionen sich gegen einander aufheben, und die Gravitation dieses Punkts gegen den ganzen Körper verschwindet.

*) Princ. L. I. prop. LXXVII.
**) Mécanique cél. T. I. pag. 140. et suiv.

§. 293. Wenn zwey Körper A und B (Fig. 120., 121. und 122.) ſich gleichförmig und geradlinigt nach den Richtungen AD und BE mit den Geſchwindigkeiten Aa und Bb bewegen; ſo ruht entweder ihr Schwerpunkt C, oder er bewegt ſich geradlinigt und gleichförmig.

Es ſeyen erſtlich (Fig. 120.) die Richtungen AD, BE der Bewegungen einander parallel, $Aa : Bb = AC : CB$, und a, b auf verſchiedene Seiten der geraden Linie AB. Man ziehe aC, Cb. Da $Aa : Bb = AC : CB$; ſo iſt $Aa : AC = Bb : CB$, mithin $ACa = BCb$. Folglich ſind a, C, b in einer geraden Linie. Und weil Aa, Bb in gleichen Zeiten zurückgelegte Wege ſind; ſo iſt ab die gerade Linie, welche die zwey Körper mit einander verbindet, wenn der eine in a der andere in b angekommen iſt. Es verhält ſich aber auch $aC : Cb = AC : CB$; folglich fällt der Schwerpunkt der Körper, wenn ſie a und b ſind, in den Punkt C. Zieht man durch einen beliebigen anderen Punkt d der AD und durch den Schwerpunkt C eine gerade Linie dC, welche der wo nöthig verlängerten BE in e begegnet; ſo verhält ſich $Ad : Be = Aa : Bb$. Folglich ſind d und e die gleichzeitigen Orte der zwey Körper, und weil $dC : Ce = AC : CB$; ſo iſt wiederum C ihr Schwerpunkt, welcher alſo in dieſem Fall ruht.

Es ſeyen zweytens (Fig. 121. 122.) die Richtungen AD, BE der Bewegungen einander nicht parallel, und in einerley oder in verſchiedenen Ebenen. Man ziehe die gerade Linie ab, und theile ſie in dem Punkt c ſo, daß $ac : cb = AC : CB$; ſo wird der Schwerpunkt in c ſeyn, wenn die Körper in a und b ſind. Auf einer der Richtungen, z. B. auf AD nehme man einen Punkt d nach Belieben, und auf der anderen AE den Punkt e ſo, daß $Be : eb = Ad : da$; ſo ſind d und e gleichzeitige Orte der zwey Körper, und ihr Schwerpunkt muß auf der geraden Linie de liegen. Man ziehe durch a die Parallelen af, ag mit AB, Bb welche den durch C und d, e und c gezogenen geraden Linien in f und g begegnen. Da $af : AC = ad : dA$

$= be : eB$ (Conſtr.);

ſo iſt $af : be = AC : eB$.

Aber $be : ag = bc : ca$
$= CB : CA$ (Conſtr.)

folglich $af : ag = CB : eB$,
oder $af : CB = ag : eB$.

Wenn nun $af = CB$; ſo iſt $ag = eB$, und daher ſind fC und aB, ge und aB, mithin auch fC und ge (XI, 9.) parallel, und fC, ge, de, cC in Einer Ebene. Sind aber af und CB ungleich; ſo werden fC und eB ſich ſchneiden. Es geſchehe in h, und es ſey he gezogen. Da

$ha : hB = af : CB$
$= ag : eB$ (Bew.);

ſo liegen g, e, h Einer geraden Linie; folglich liegen fg, gh, mithin wiederum fC, ge, de, Cc in Einer Ebene. Es ſchneide Cc die de in i. Man ziehe Cek, welche der durch den Punkt b mit AB parallel gezogenen bk in k begegne.

Da $bk : CB = be : eB$
$= ad : dA$ (Conſtr.)
$= af : CA$
ſo iſt $bk : af = CB : CA$
$= cb : ca$ (Conſtr.)

Folglich liegen f, c, k in einer geraden Linie. Und weil

$ke : eC = be : eB$
$= ad : dA$ (Conſtr.)
$= fd : dC$;

ſo ſind (VI, 2.) fk und ed mit einander parallel. Folglich verhält ſich auch $di : ie = fc : ck$
$= ac : cb$
$= AC : CB$,

und der Punkt i iſt der Ort des Schwerpunkts der zwey Körper, wenn ſie in d und e angekommen ſind.

Endlich verhält ſich wegen der Parallelen fc, di, AC,

$Ci : ic = Cd : df$
$= Ad : da = Be : eb$;

folglich iſt die Bewegung des Schwerpunkts i ſo wie die Bewegung der Körper A und B gleichförmig, und geradlinigt.

§. 294. Wenn die zwey Körper A und B im directen Verhältniß ihrer Maſſen m und m', und nach irgend ei-

nem von ihrem Abſtand AB abhängenden Geſetz einander anziehen, und keine äuſſere Kräfte auf ſie wirken; ſo ruht entweder ihr Schwerpunkt, oder er bewegt ſich geradlinigt und gleichförmig.

Wären die zwey Körper anfänglich in Ruhe in den Punkten A und B (Fig. 123.); ſo nehme man $Aa : Bb = m' : m$. Alsdenn wird, wenn Bb der Raum iſt, durch welchen der Körper B gegen den Körper A, deſſen Maſſe $= m$ iſt, in einer gewißen Zeit fallen würde, Aa der Raum ſeyn, durch welchen der Körper A gegen den Körper B, deſſen Maſſe $= m'$ iſt, in derſelben Zeit fallen würde, ſo daß am Ende dieſer Zeit die zwey Körper in a und b ſeyn werden. Man theile die gerade Linie in dem Punkt C ſo, daß $AC : CB = m' : m$; ſo wird C der anfängliche Ort des Schwerpunkts der zwey Körper ſeyn.

Da nun $Aa : Bb = m' : m$
und $AC : Cb = m' : m$
ſo iſt auch $\left\{\begin{matrix} aC - Aa \\ aC \end{matrix}\right\} : \left\{\begin{matrix} CB - Bb \\ Cb \end{matrix}\right\} = m' : m$;

folglich iſt der Punkt C auch der Schwerpunkt der Körper A und B, wenn ſie in a und b angekommen ſind, welcher alſo in dieſem Fall ruht. Demnach würden die zwey Körper in einer geraden Linie ſich einander nähern, und in ihrem Schwerpunkt C einander begegnen.

Wenn die Körper in A und B (Fig. 120.) mit den Geſchwindigkeiten Aa und Bb nach parallelen Richtungen ankommen, welche ſich wie ihre Abſtände AC und CB von ihrem Schwerpunkt C verhalten, ſo daß a und b auf verſchiedenen Seiten von AB liegen, und in dem Augenblick, da ſie in A und B ankommen, durch die Wirkung ihrer gegenſeitigen Gravitation die Geſchwindigkeiten Ah und Bg bekommen; ſo vollende man die Parallelogramme ha, bg und ziehe ihre Diagonalen Aa, Bb', welche nun die in gleichen Zeiten von den zwey Körpern beſchriebene Wege ſeyn werden. Man ziehe Ca' und Cb'.

Da $\left\{\begin{matrix} Ah \\ aa' \end{matrix}\right\} : \left\{\begin{matrix} Bg \\ bb' \end{matrix}\right\} = m' : m$
$= CA : CB$

$= Ca : Cb$ (erster Fall des vorhergeh. §.), und $a'aC = b'bC$ (I, 29.); so ist $aCa' = bCb'$ (VI, 6.). Mithin liegen $a'C$ und Cb' in einer geraden Linie. Und weil $a'C : Cb' = aC : Cb = AC : CB = m' : m$; so ist, wenn die Körper nach a' und b' gekommen sind, ihr Schwerpunkt wiederum in C, welcher also auch in diesem Fall ruht. Aus eben dieser Proportion folgt die Aehnlichkeit der Dreyecke ACa' und BCb'. Mithin würden die zwey Körper, wenn sie stoßweise durch die Wirkung ihrer gegenseitigen Attraction gegen einander getrieben würden, um ihren Schwerpunkt in gleichen Zeiten ähnliche Vielecke nach demselben Gesetz beschreiben, nach welchem sie diese Vielecke um den Punkt C beschreiben würden, wenn sie gegen diesen hin durch die Wirkung einer Kraft getrieben würden. Folglich werden hier alle diejenigen Sätze ihre Anwendung finden, welche in dem Anfang dieses Capitels von den Centralbewegungen sind bewiesen worden, und wenn die Anziehungskraft stetig wirkt; so werden die Vielecke in ähnliche krumme Linien übergehen, welche um den Schwerpunkt C als Mittelpunkt der Kräfte beschrieben werden.

Wenn aber der Schwerpunkt sich bewegt (Fig. 121. und 122.), und die Körper in dem Augenblick, da sie in A und B ankommen, die Geschwindigkeiten Ap und Bq, durch ihre Einwirkung auseinander erhalten; so ziehe man durch a und b die Parallelen aa' und bb' mit AB und mache $aa' = Ap, bb' = Bq$. Alsdenn werden die Körper in derselben Zeit in a' und b' angekommen seyn, in welcher sie nach a und b gekommen seyn würden, wenn die Attraction nicht gewirkt hätte. Man ziehe ca' und cb'. Da nun

$\left.\begin{matrix} Ap \\ aa' \end{matrix}\right\} : \left\{\begin{matrix} Bq \\ bb' \end{matrix}\right\} = \left\{\begin{matrix} m' : m \\ ca : cb \end{matrix}\right.$; so sind die Dreyecke aca' und bcb' ähnlich, mithin a', c, b' in einer geraden Linie, und $a'c : cb' = ac : cb$. Folglich fällt der Schwerpunkt, wenn die zwey Körper in a' und b' angekommen sind, in den Punkt c, und seine Bewegung wird durch die gegenseitige Einwirkung der Körper nicht geändert. Der Schwerpunkt bewegt sich also geradlinigt und gleichförmig. Es komme ein dritter Körper hinzu, welcher auf die zwey ersteren nicht wirke, und entwe-

der in Ruhe ſey, oder ſich nach dem Geſetz der Trägheit gleichförmig und geradlinigt bewege. Da der Schwerpunkt der zwey erſteren entweder ruht oder ſich geradlinigt und gleichförmig bewegt; ſo wird auch der gemeinſchaftliche Schwerpunkt aller drey Körper entweder ruhen oder ſich geradlinigt und gleichförmig bewegen. Man laſſe nun den dritten Körper auf die zwey übrigen wirken; ſo wird dadurch der Zuſtand der Ruhe oder der Bewegung der Schwerpunkte dieſes Körpers und eines jeden der zwey übrigen nicht geändert. Folglich wird der gemeinſchaftliche Schwerpunkt aller drey Körper entweder ruhen, oder ſich geradlinigt und gleichförmig bewegen. Wenn alſo irgend eine Anzahl von Körpern auf einander wirken; ſo entſteht aus dieſen Wirkungen keine andere Bewegung ihres gemeinſchaftlichen Schwerpunkts, als diejenige, welche er ſchon vorher hatte, oder er bewegt ſich geradlinigt und gleichförmig *).

§. 295. Da zwey einander anziehende Körper zugleich in Bewegung ſind, und nur ihr gemeinſchaftlicher Schwerpunkt ruht oder ſich geradlinigt und gleichförmig bewegt; ſo wird man dieſen Punkt als den eigentlichen Mittelpunkt der Kräfte zu betrachten haben. Wenn der Schwerpunkt ruht; ſo beſchreiben die zwey Körper um dieſen unbeweglichen Punkt als Mittelpunkt der Kräfte einander ähnliche krumme Linien (§. 294.). Wenn aber der Schwerpunkt C der Körper A und B (Fig 124.) ſich bewegt, und, wenn A nach a, B nach b gekommen iſt, ſich in c befindet; ſo werden a, c, b in einer geraden Linie liegen, und es wird $ac : cb = AC : CB$ ſeyn. Man ziehe durch C die Parallele $a'b'$ mit ab und durch a und b die Parallelen aa', bb' mit der geraden Linie Cc, welche der Schwerpunkt beſchreibt. Noch ziehe man Aa', Bb'. Da $\left\{\begin{matrix} ac \\ a'C \end{matrix}\right\} : \left\{\begin{matrix} cb \\ Cb' \end{matrix}\right\} = AC : CB$; ſo ſind die Dreyecke ACa' und BCb' ähnlich, und die Punkte a', b' werden um den unbeweglichen Punkt C einander ähnliche Vielecke oder ähnliche krumme Linien beſchreiben, je nach dem die Anziehungskraft ſtoßweiſe oder ſtetig wirkt.

*) Princ. L. I. Lex. III. Cor. IV.

Man lasse sich die durch AB und $a'b'$ gelegte Ebene, in welcher die Punkte a' und b' ihre Vielecke oder krumme Linien beschreiben, mit sich selbst parallel so fortbewegen, daß der Punkt C die gerade Linie Cc mit derselben Geschwindigkeit beschreibe, mit welcher sich der Schwerpunkt der Körper A und B bewegt; so werden, wenn der Punkt C nach c gekommen ist, a' auf a und b' auf b fallen, mithin die zwey Körper in dieser sich fortbewegenden Ebene dieselbe krumme Linie beschreiben, welche sie um den Schwerpunkt C beschrieben haben würden, wenn er in Ruhe geblieben wäre. Da nun durch die Wirkung der Körper auf einander die Bewegung ihres Schwerpunkts nicht geändert wird, und die Gravitation auf ruhende oder schon bewegte Körper mit gleicher Stärke wirkt; so werden die zwey Körper, wenn man ihnen in Beziehung auf die nach der Richtung und mit Geschwindigkeit der Bewegung des Schwerpunkts sich selbst parallel fortrückende Ebene die relative Geschwindigkeiten Aa' und Bb' mittheilt, in dieser beweglichen Ebene um den mit dieser zugleich sich bewegenden Punkt C dieselbe Linie beschreiben, welche sie um eben diesen Punkt beschrieben haben würden, wenn er in Ruhe geblieben wäre. Die relative Bewegung der Körper gegen einander und um ihren Schwerpunkt als Mittelpunkt der Kräfte wird also durch die Bewegung des Schwerpunkts nicht geändert.

Wenn die relative Bewegung der Körper in Beziehung auf die bewegliche Ebene und die Bewegung des Schwerpunkts gegeben sind; so ist ihre absolute Bewegung gegeben. Es sey Cc der von dem Schwerpunkt in einer gegebenen von dem Augenblick an, da er in C und die Körper in A und B waren, verfloßenen Zeit beschriebene Weg, welcher durch die Richtung und Geschwindigkeit dieser Bewegung gegeben ist. Da man die relative Bewegung der Körper kennt; so kann man den Ort b' des Körpers B in Beziehung auf die bewegliche aber als ruhend vorausgesetzte Ebene bestimmen. Man vollende das Parallelogramm $cCb'b$; so wird der Körper B in demselben Augenblick in b angekommen seyn, in welchem der Schwerpunkt in c ist.

§. 296. Die Bahnen AN und PM (Fig. 125.), welche zwey Körper A und P um ihren gemeinschaftlichen Schwerpunkt S beschreiben, sind so wohl unter sich, als der Bahn AQ ähnlich, welche einer derselben A um den anderen P beschreibt.

Es seyen nemlich AN und PM in gleichen Zeiten um den in S ruhenden Schwerpunkt beschriebenen Bogen; so geht die gerade Linie MN, welche die gleichzeitigen Oerter der zwey Körper mit einander verbindet, durch den Schwerpunkt S, und es verhält sich

sowohl $PS : SA$ / als $MS : SN$ } Masse von A : Masse von P.

Da nun die in gleichen Zeiten um den Schwerpunkt S beschriebene Winkel ASN und PSM gleich sind (I, 15.); und die Radii Vectores ein gegebenes Verhältniß zu einander haben; so sind die Linien AN und PM einander ähnlich.

Man ziehe durch P die Parallele PQ mit SN, und nehme $PQ = MN$.

Da $PS : SA = MS : SN$

so ist $PA : SA = \left\{\begin{matrix} MN \\ PQ \end{matrix}\right\} : SN$.

Folglich haben die Radii Vectores PQ und SN ein gegebenes Verhältniß zu einander. Es sind aber auch die Winkel APQ und ASN gleich (I, 29.); mithin ist die relative Bahn AQ, welcher Körper A in Beziehung auf den Körper P beschreibt, der Bahn AN, also auch der Bahn PM ähnlich.

Wenn aber der Schwerpunkt S sich bewegt; so werden die Bahnen, welche die zwey Körper in einer mit der Geschwindigkeit und nach der Richtung der Bewegung des Schwerpunkts sich selbst parallel fortrückenden Ebene beschreiben, den Bahnen gleich und ähnlich seyn, welche sie im Fall der Ruhe des Schwerpunkts in einer ruhenden Ebene beschrieben haben würden (§. 295). Folglich werden auch die um den sich bewegenden Schwerpunkt beschriebene Bahnen unter sich und der Bahn ähnlich seyn, welche einer der Körper um den anderen beschreibt *).

*) Princ. L. I. prop. LVII.

fels von mD, wenn diese Linie um Do wächst, desto mehr der Größe $3\overline{mD}^2 \times Do$, je kleiner Do, mithin auch Rr wird, und zugleich nähert sich der Inhalt $KR \times Rr$ des in die Figur $AGKg$ beschriebenen Rechtecks Kr der gleichzeitigen Zunahme der Fläche $gKRg$. Demnach verhält sich die Geschwindigkeit, mit welcher die Fläche $gKRg$ wächst, zu der Geschwindigkeit, mit welcher $\frac{\overline{mD}^3}{CA}$ wächst, $= 2 : 3$, oder es ist die erstere Geschwindigkeit beständig $= \frac{2}{3}$ der letztern, und daher ist die Fläche $gKRg = \frac{2}{3}\frac{\overline{MD}^3}{CA}$ (§. 238. und 239., weil die Fläche $gKRg$ und die Chorde mM zugleich verschwinden), und die Fläche $gKGA = \frac{2}{3}\frac{\overline{AB}^3}{CA}$. Hieraus folgt also die Gravitation von C gegen den Körper, welchen der Abschnitt mEM beschreibt $= \frac{4}{3}\pi\frac{\overline{mD}^3}{\overline{CA}^2}$, und gegen die ganze Kugel $\frac{4}{3}\pi\frac{\overline{AB}^3}{\overline{CA}^2}$.

Es ist aber der Inhalt der Kugel $= \frac{4}{3}\pi.\overline{AB}^3$; folglich ist die Gravitation des ausserhalb der Kugel befindlichen Theilchens C gegen diese Kugel direct ihrem Inhalt oder ihrer Masse, und umgekehrt dem Quadrat der Entfernung des Theilchens von dem Mittelpunkt der Kugel proportional *).

§. 291. Da vermöge des vorhergehenden §. die Gravitation eines ausserhalb einer Kugel BD (Fig. 119.) befindlichen Theilchens C gegen diese Kugel direct ihrer Masse und umgekehrt dem Quadrat der Distanz CA proportional ist; so wird sich die Gravitation von C gegen die Kugel BD zu der Gravitation gegen eine mit der ersteren concentrische Kugel bd verhalten wie die Masse der Kugel BD zu der Masse der Kugel bd, und der Ueberschuß der ersteren Gravitation über die letztere, d. i. die Gravitation von C gegen die Kugelschale $BbdD$, wird sich verhalten zu der Gravitation gegen die Kugel BD, wie die Masse jenes holen kugelförmigen

*) Princ. L. I. prop. LXXIV. Cor. 2.

Körpers zu der Maſſe der Kugel *BD* ſich verhält. Folglich iſt auch die Gravitation gegen einen gleichförmig dichten holen durch zwey concentriſche Kugeloberflächen begränzten Körper direct der Maſſe des Körpers und umgekehrt dem Quadrat des Abſtands eines auſſerhalb deſſelben befindlichen Theilchens von dem gemeinſchaftlichen Mittelpunkt der Kugeloberflächen proportional, woraus folgt, daß die Gravitation auch gegen eine ungleichförmig dichte Kugel umgekehrt dem Quadrat der Entfernung von dem Mittelpunkt der Kugel proportional bleibt, wenn die Dichtigkeit in gleichen Abſtänden von dem Mittelpunkt der Kugel dieſelbe iſt *).

Es ſeyen *BD*, *EF* zwey gleichförmig dichte, oder in gleichen Entfernungen von dem Mittelpunkt gleich dichte Kugeln; ſo iſt die Gravitation eines jeden Theilchens *e* der der Kugel *EF* gegen die Kugel *BD* umgekehrt dem Quadrat der Diſtanz *eA* deſſelben von dem Mittelpunkt *A* der Kugel *BD* proportional, und daher dieſelbe, als wenn die ganze Maſſe der Kugel *BD* in ihrem Mittelpunkt *A* vereinigt wäre. Da nun die Gravitation eines jeden Theilchens *e* der Kugel *EF* gegen den Punkt *A* umgekehrt dem Quadrat ſeines Abſtands von dieſem Punkt proportional iſt; ſo iſt vermöge des oben bewieſenen die Gravitation der ganzen Kugel *EF* gegen den Punkt *A*, d. i. gegen die Kugel *BD*, umgekehrt dem Quadrat des Abſtands *CA* ihres Mittelpunkts *C* von dem Mittelpunkt *A* der Kugel *BD* proportional **).

Hieraus folgt, daß, wenn eine der zwey Kugeln, z. B. die *BD*, unbeweglich wäre, und der andern Kugel *EF* nach einer von der Richtung der geraden Linie *CA* verſchiedenen Richtung irgend eine Geſchwindigkeit mitgetheilt worden wäre, der Mittelpunkt *C* der letzteren um den Mittelpunkt *A* der erſteren als Brennpunkt einen Kegelſchnitt beſchreiben würde (§. 282.).

§. 292. Es giebt noch einen Fall, in welchem Kugeln einander ebenſo anziehen, als wenn ihre Maſſen in ih-

*) Princ. L. I. prop. LXXVI.
**) Princ. L. I. prop. LXXV.

ren Mittelpunkten vereinigt wären. Wenn nemlich die Anziehungskraft der einzelnen Theile direct ihren Entfernungen von einander proportional ist; so findet man auf ähnliche Art, wie in §. 289. und 90, daß die Kraft, mit welcher eine gleichförmig dichte oder in gleichen Distanzen von ihrem Mittelpunkt gleich dichte Kugel ein ausserhalb ihr befindliches Theilchen anzieht, im zusammengesetzten Verhältniß aus der Masse der Kugel und dem Abstand des angezogenen Theilchens von dem Mittelpunkt der Kugel ist*); woraus dasselbe Attractionsgesetz zwischen zwey gleichartigen Kugeln folgt. Hieraus ergiebt es sich ferner, daß, wenn die Anziehungskraft aus zwey Theilen bestände, wovon der eine umgekehrt dem Quadrat der Entfernung, der andere direct der Entfernung selbst proportional wäre, zwey Kugeln einander nach demselben Gesetz anziehen würden, so daß man ihre Massen als in ihren Mittelpunkten vereinigt annehmen könnte. La Place hat den umgekehrten Satz bewiesen, daß, wenn die Kraft, mit welcher eine Kugel ein ausserhalb ihr befindliches Theilchen anzieht, eben so mit dem Abstand von der Kugel Mittelpunkt sich verändern soll, wie sich die Anziehungskraft der einzelnen Theilchen mit ihren Entfernungen von einander verändert, die anziehende Kraft entweder der Entfernung, oder umgekehrt dem Quadrat der Entfernung, oder zum Theil der Entfernung und zum Theil dem Quadrat der Entfernung proportional seyn müsse**). Folglich ist unter allen Attractionsgesetzen, nach welchen die Attraction mit der Zunahme der Entfernung abnimmt, das wirklich in der Natur statt findende Attractionsgesetz das einzige, bey welchem kugelförmige Körper ebenso aufeinander wirken, als wenn ihre Massen in ihren Mittelpunkten vereinigt wären. Dieses Gesetz ist ebenfalls das einzige, bey welchem ein innerhalb eines durch zwey concentrische Kugeloberflächen begränzten Körpers liegender Punkt nach allen Richtungen mit gleicher Stärke angezogen wird, mithin die entgegengesetzten Attraktionen sich gegen einander aufheben, und die Gravitation dieses Punkts gegen den ganzen Körper verschwindet.

*) Princ. L. I. prop. LXXVII.
**) Mécanique cél. T. I. pag. 140. et suiv.

§. 293. Wenn zwey Körper A und B (Fig. 120., 121. und 122.) ſich gleichförmig und geradlinigt nach den Richtungen AD und BE mit den Geſchwindigkeiten Aa und Bb bewegen; ſo ruht entweder ihr Schwerpunkt C, oder er bewegt ſich geradlinigt und gleichförmig.

Es ſeyen erſtlich (Fig. 120.) die Richtungen AD, BE der Bewegungen einander parallel, $Aa : Bb = AC : CB$, und a, b auf verſchiedene Seiten der geraden Linie AB. Man ziehe aC, Cb. Da $Aa : Bb = AC : CB$; ſo iſt $Aa : AC = Bb : CB$, mithin $ACa = BCb$. Folglich ſind a, C, b in einer geraden Linie. Und weil Aa, Bb in gleichen Zeiten zurückgelegte Wege ſind; ſo iſt ab die gerade Linie, welche die zwey Körper mit einander verbindet, wenn der eine in a der andere in b angekommen iſt. Es verhält ſich aber auch $aC : Cb = AC : CB$; folglich fällt der Schwerpunkt der Körper, wenn ſie a und b ſind, in den Punkt C. Zieht man durch einen beliebigen anderen Punkt d der AD und durch den Schwerpunkt C eine gerade Linie dC, welche der wo nöthig verlängerten BE in e begegnet; ſo verhält ſich $Ad : Be = Aa : Bb$. Folglich ſind d und e die gleichzeitigen Orte der zwey Körper, und weil $dC : Ce = AC : CB$; ſo iſt wiederum C ihr Schwerpunkt, welcher alſo in dieſem Fall ruht.

Es ſeyen zweytens (Fig. 121. 122.) die Richtungen AD, BE der Bewegungen einander nicht parallel, und in einerley oder in verſchiedenen Ebenen. Man ziehe die gerade Linie ab, und theile ſie in dem Punkt c ſo, daß $ac : cb = AC : CB$; ſo wird der Schwerpunkt in c ſeyn, wenn die Körper in a und b ſind. Auf einer der Richtungen, z. B. auf AD nehme man einen Punkt d nach Belieben, und auf der anderen AE den Punkt e ſo, daß $Be : eb = Ad : da$; ſo ſind d und e gleichzeitige Orte der zwey Körper, und ihr Schwerpunkt muß auf der geraden Linie de liegen. Man ziehe durch a die Parallelen af, ag mit AB, Bb welche den durch C und d, e und c gezogenen geraden Linien in f und g begegnen. Da $af : AC = ad : dA$

$= be : eB$ (Conſtr.);

ſo iſt $af : be = AC : eB$.

ihren gemeinschaftlichen Schwerpunkt als auch jeder um den andern als Brennpunkt in gleichen Zeiten ähnliche Kegelschnitte *). Endlich verhält sich die Umlaufszeit zweyer um ihren gemeinschaftlichen Schwerpunkt sich bewegender Körper zu der Zeit t' in welcher einer derselben A um den anderen P, wenn dieser unbeweglich wäre, eine der relativen Bahn von A um den beweglichen Körper P gleiche und ähnliche Bahn beschreibt, wie Quadratwurzel aus der Masse m von P zu der Quadratwurzel aus der Summe $m+m'$ der Massen von A und P **).

Denn vermöge §. 297. verhalten sich die Zeiten, in welchen ähnliche Bogen AN, an (Fig. 125. 126.) beschrieben werden, wie die Quadratwurzel aus pa oder AP, d. i. (weil $SA : SP = m : m'$, $SA : AP = m : m+m'$), wie $\sqrt{m} : \sqrt{m+m'}$. Folglich verhält sich auch (V, 12.) die Summe aller ersteren Zeiten, oder t, zur Summe aller zweyten, oder zu t', wie $\sqrt{m} : \sqrt{m+m}$.

Wenn nun die anziehende Kraft umgekehrt dem Quadrat der Entfernung proportional ist; so wird der Körper a um den unbeweglichen Körper p einen Kegelschnitt beschreiben (S. d. Ende des 291. §.), mithin wird, wenn dieser eine Ellipse ist, und um denselben Körper p ein dem a ähnlicher und gleicher Körper ebenfalls eine Ellipse beschreibt, deren halbe große Axe sich zu der halben großen Axe der ersteren wie $a'' : a'$ verhält, das Quadrat der Umlaufszeit t'' in dieser zweyten Ellipse zum Quadrat der Umlaufszeit t' in der ersteren sich verhalten wie $a''^3 : a'^3$ (§. 283. n. 4.). Soll aber die Umlaufszeit in der Ellipse, deren halbe große Axe $= a''$ ist, der Umlaufszeit t gleich werden; so muß sich verhalten $t'^2 : t^2 = t'^2 : t''^2$

mithin $m+m' : m = a'^3 : a''^3$.

Es sey q die erste zweyer mittleren geometrischen Proportionalgrößen zwischen $m+m'$ und m; so wird sich verhalten $\overline{m+m'}^3 : q^3 = m+m' : m$

$= a'^3 : a''^3$,

*) Princ. L. I. prop. LVIII. cor. 2.
**) Princ. L. I. prop. L. IX.

und $m+m' : q = a' : a''$.

Aber die Bahn an ist der Bahn AQ gleich und ähnlich (§. 297.); folglich verhält sich die halbe große Axe der Ellipse, welche der Körper A um den Körper P beschreibt zu der halben großen Axe der Ellipse, welche eben dieser Körper in derselben Zeit um den ruhenden Körper P beschreiben würde, wie $m+m' : q$ oder wie $\sqrt[3]{m+m'} : \sqrt[3]{m}$ *).

Wenn also um einen großen Körper, dessen Masse $= M$ ist, mehrere kleine Körper, deren Massen m, m' sind, Ellipsen beschreiben (in so fern man nemlich die Wirkungen der kleineren Körper auf einander vernachläßigt); so würden, wenn M unbeweglich wäre, die Würfel der halben großen Axen sich verhalten wie die Quadrate der Umlaufszeiten. Wenn aber M ebenfalls beweglich ist; so wird man diese halbe große Axen in dem Verhältniß von $\sqrt[3]{M+m} : \sqrt[3]{M}$ und von $\sqrt[3]{M+m'} : \sqrt[3]{M}$ beziehungsweise vergrößern müssen, um die halbe große Axen A und A' der Ellipsen zu erhalten, welche die Körper m und m' in den Zeiten T und T' um den beweglichen Körper M beschreiben **), so daß man die Proportionen haben wird

$$A^3 : A'^3 = (M+m)\,T^2 : (M+m')\,T'^2,$$

und $$\frac{A^3}{M+m} : \frac{A'^3}{M+m'} = T^2 : T'^2.$$

Das dritte keplerische Gesetz leidet also durch die gegenseitige Attraction der Planeten und der Sonne eine kleine Aenderung. Es sind nemlich die Quadrate der Umlaufszeiten im zusammengesetzten Verhältniß aus dem directen der Würfel der halben großen Axen, und dem umgekehrten der Summen der Sonnenmasse und der Masse eines jeden der Planeten. Das letztere dieser Verhältniße wird sich aber desto mehr dem Verhältniß der Gleichheit nähern, je größer die Sonnenmasse in Vergleichung mit der Masse der Planeten ist. Man wird in der Folge sehen, daß wirklich die Planeten eine in Vergleichung mit der Sonne geringe Masse

*) Princ. L. I. prop. LX.
**) Princ. L. III. prop. XV.

haben, und daher mit den Beobachtungen übereinstimmend das dritte keplerische Gesetz sehr nahe statt finden muß.

§. 300. Was in dem vorhergehenden §. von den Umlaufszeiten gezeigt worden ist, ergiebt sich auch aus §. 283. n. 1. Es verhält sich (Fig. 125.) $\overline{AP}^2 : \overline{MN}^2 = AS^2 : SN^2$, und daher ist, wenn die Gravitation des Körper A gegen den Körper P umgekehrt dem Quadrat der Entfernung proportional ist, auch die Kraft, mit welcher der Körper A gegen den Schwerpunkt S getrieben wird, umgekehrt dem Quadrat der Entfernung von diesem Punkt proportional. Mithin kann der Körper A eine Ellipse um den Schwerpunkt S als Brennpunkt beschrieben. Es sey A der diesem Brennpunkt zunächst liegende Scheitel dieser Ellipse, $AS = h$, und die Gravitation von A gegen P in der Entfernung AP sey $= k'$; so ist eben diese der beständig gegen den Schwerpunkt S gerichteten Centripetalkraft in der Entfernung h gleich, und, wenn man die halbe große Axe der Ellipse, welche der Körper A um S beschreibt, mit a, die Umlaufszeit mit t bezeichnet,

$$t^2 = \frac{4a^3\pi^2}{h^2k'} \text{ (§. 283. n. 1.).}$$

Aber, wenn man die Massen der Körper P und A beziehungsweise gleich M und m, und $PA = h'$ setzt, verhält sich $h : h' = M : M+m$, und es ist PA oder h' der Abstand des dem Körper P als Brennpunkt zunächst liegenden Scheitels der Ellipse, welche der Körper A um den P beschreibt, von diesem Brennpunkt, weil die letztere Ellipse der ersteren ähnlich ist und ähnlich ligt (§. 296). Folglich ist, wenn man die halbe große Axe der letzteren Ellipse $= A$ setzt,

$$\left.\begin{matrix}\text{so wohl } h : h' \\ \text{als } a : A\end{matrix}\right\} = M : M+m,$$

und daher $\frac{a^3}{h^2} = \frac{M}{M+m} \cdot \frac{A^3}{h'^2}$.

Da nun die Umlaufszeiten in diesen zwey Ellipsen einander gleich sind; so ist das Quadrat der Umlaufszeit T des Körpers A um den Körper P

$$T^2 = t^2 = \frac{4a^3\pi^2}{h^2k'} = \frac{M}{M+m} \cdot \frac{4A^3\pi^2}{h'^2k'}.$$

Ebenso ist, wenn ein anderer Körper, dessen Masse $= m'$ ist, in der Zeit T' um den Körper P als Brennpunkt eine Ellipse beschreibt, deren halbe große $= A'$ ist, und deren dem Körper P zunächst liegender Scheitel von diesem Körper den Abstand H' hat, und wenn man überdiß die Gravitation der Masse m' gegen M in der Distanz $H' = K'$ setzt,

$$T'^2 = \frac{M}{M+m'} \cdot \frac{4A'^3\pi^2}{H'^2K'}.$$

Aber die Gravitation der Massen m und m' gegen die Masse M ist independent von der Größe dieser Massen; folglich ist $H'^2 : h'^2 = k' : K'$, und $H'^2K' = h'^2k'$, mithin

$$T'^2 = \frac{M}{M+m'} \cdot \frac{4A'^3\pi^2}{h'^2k'}.$$

Also verhält sich $T^2 : T'^2 = \frac{A^3}{M+m} : \frac{A'^3}{M+m'}$, wie man in dem vorhergehenden §. gefunden hat.

Oder auch so: weil die Gravitation von m gegen M zu der Gravitation von M gegen m sich verhält wie $M : m$; so verhält ihre Summe zu der Gravitation von m gegen M wie $M+m : M$. Folglich wird sich die Annäherung der zwey Massen, wenn beyde beweglich sind, zu ihrer Annäherung in derselben Zeit, wenn M unbeweglich wäre, verhalten wie $M+m : M$. Mithin ist, wenn beyde Massen beweglich sind, die relative Gravitation von m gegen M in dem Verhältniß von $M+m$ zu M größer, als wenn M unbeweglich wäre. Aber vermöge §. 283. n. 1. ist unter übrigens gleichen Umständen das Quadrat der Umlaufszeit umgekehrt der Centripetalkraft proportional; folglich ist das Quadrat der Umlaufszeit eines Körpers um einen andern unbeweglichen in demselben Verhältniß größer, als das Quadrat seiner der Umlaufszeit um eben diesen Körper, wenn er beweglich ist, in welchem die Summe der zwey Massen größer ist als die Masse des letzteren Körpers, woraus sich wiederum die obige Proportion ergiebt.

Die Zeit T, in welcher ein um den beweglichen Körper in einem Kegelschnitt, dessen Parameter $= 2l'$ ist, umlaufender Körper einen gegebenen Sector APQ beschreibt, findet man nach §. 283. n. 5. Sey der Parameter des ähnlichen um den Schwerpunkt S beschriebenen Kegelschnitts $= 2l$; so verhält sich

$$\begin{aligned} l' : l &= k' : k \\ \sqrt{l} : \sqrt{l'} &= \sqrt{k} : \sqrt{k'} \\ &= \sqrt{M} : \sqrt{M+m} \end{aligned}$$

Sect. ASN : Sect. $APQ = k^2 : k'^2$

folglich Sect. $ASN\sqrt{l'}$: Sect. $APQ\sqrt{l} = k\sqrt{M} : k'\sqrt{M+m}$.

Daher ist $\frac{2\text{Sect. } ASN}{k\sqrt{l}} = \frac{2\text{Sect. } APQ\sqrt{M}}{k'\sqrt{l'k'}} \cdot \frac{1}{M+m}$.

Aber das erste Glied ist der Ausdruck der Zeit t, in welcher der Sector ASN beschrieben wird (§. 283. n. 5.), und t ist $= T$; folglich ist

$T = 3\frac{2\text{Sect. } APQ}{k\sqrt{p}} V\frac{M+m}{M+m}$, und diß ist der Satz, von welchem man §. 204. n. 9. S. 328. Gebrauch gemacht hat.

§. 301. Die Masse der Himmelskörper beurtheilt man nach der Stärke der Anziehungskraft, mit welcher sie auf einen ausserhalb ihrer Oberfläche befindlichen Körper in einer gegebenen Entfernung wirken, und diese Kraft ist es, welche man kennen muß, um die Einwirkungen der Himmelskörper auf einander berechnen zu können. Da man nun die Kräfte durch die Geschwindigkeiten mißt, welche sie in einer gegebenen Zeit entweder wirklich erzeugen, oder erzeugen würden, wenn sie während dieser Zeit constant blieben (§. 243.); so wird es bey der Bestimmung des Verhältnißes der Masse der Sonne zu der Masse eines Planeten darauf ankommen, fürs erste die Geschwindigkeit zu bestimmen, welche die Sonne diesem Planeten in einer gegebenen Entfernung von ihr in einer gegebenen Zeit mitgetheilt haben würde, und zweytens die Geschwindigkeit zu bestimmen, welche der Planet einem ausserhalb seiner Oberfläche befindlichen Körper in einer eben so großen Zeit und in derselben gegebenen Entfernung mitgetheilt haben würde.

Die erste ergiebt sich aus der siderischen Umlaufszeit des Planeten, aus seiner mittleren Entfernung von der Sonne, und aus dem gegebenen Gesetz, nach welchem sich die Anziehungskraft mit der Entfernung ändert. Wenn nemlich der Planet statt einer Ellipse einen ihre große Axe zum Durchmesser habenden Kreis um die Sonne als Mittelpunkt beschriebe; so würde seine Umlaufszeit dieselbe seyn (§. 283.), und man wird, wenn man den mittleren Abstand des Planeten von der Sonne $= A$, seine siderische Umlaufszeit $= T$, und die Geschwindigkeit, welche die Sonne dem Planeten in der Distanz A während der Zeiteinheit, durch welche T ausgedrückt ist, mitgetheilt haben würde, $= K$ setzt, nach §. 273. n. 2. haben $K = \frac{4A\pi^2}{T^2}$. Weil aber der Planet auch die Sonne anzieht; so ist dieser Werth von K die Summe der durch den Planeten und die Sonne erzeugten Geschwindigkeiten, und man muß denselben in dem

Ver-

Verhältniß der Maße der Sonne zu der Summe der Maſſen der Sonne und des Planeten vermindern, um diejenige Geſchwindigkeit zu finden, welche die Sonne, wenn ſie unbeweglich wäre, dem Planeten mittheilen würde, ſo daß der verbeſſerte Werth von K ſeyn wird $= \frac{M}{M+m} \cdot \frac{4A^3\pi^2}{T^2}$. Setzt man nun die Geſchwindigkeit, welche die Sonne dem Planeten in der gegebenen Diſtanz r mittheilen würde, $= k''$; ſo wird ſich vermöge des Geſetzes der Gravitation verhalten $A^2 : r^2 :: k'' : K$, und man wird haben

1.) $k'' = \frac{M}{M+m} \cdot \frac{4A^3\pi^2}{r^2T^2}$.

Eben dieſer Ausdruck ergiebt ſich auch aus der §. 299. oder §. 300. gefundenen Umlaufszeit in der Ellipſe, welche ein Körper um einen anderen ebenfalls beweglichen Körper beſchreibt, wenn man ſtatt h'^2k' die ihr gleiche Größe $r^2 \cdot k''$ ſetzt.

Die Geſchwindigkeit, welche der Planet einem auſſerhalb ſeiner Oberfläche und in der Diſtanz r von ſeinem Mittelpunkt befindlichen Körper in derſelben Zeiteinheit mitgetheilt haben würde, ergiebt ſich, wenn der Planet einen Trabanten hat, aus der Umlaufszeit und dem Abſtand des Trabanten von dem Mittelpunkt des Planeten. Man findet nemlich hieraus die Fallhöhe der Körper in der Nähe ſeiner Oberfläche, wie §. 286. bey dem Mond gezeigt worden iſt.

Es ſey dieſe Fallhöhe $= g$, mithin die erzeugte Geſchwindigkeit $= 2g$, und in n. 1. ſey r dem Halbmeſſer des Planeten, deſſen Maſſe man mit der Sonnenmaſſe vergleichen will, gleich genommen; ſo wird ſich verhalten

die Maſſe der Sonne oder M : Maſſe des Planeten m $= k'' : 2g$

Aber $M+m : M = \frac{4A^3\pi^2}{r^2T^2} : k''$ (n. 1.);

folglich iſt 2.) $M+m : m = \frac{4A^3\pi^2}{r^2T^2} : 2g$

woraus man erhält $\frac{M}{m} = \frac{2A^3\pi^2}{gr^2T^2} - 1$.

Es ſey die ſideriſche Umlaufszeit des Trabanten $= t$,

sein mittlerer Abstand von seinem Hauptplaneten $= a$, und die Masse des Trabanten verhalte sich zu der Masse des Planeten $= \mu : m$; so wird man haben $2g = \frac{m}{m+\mu} \cdot \frac{4a^3\pi^2}{r^2t^2}$, und daher

$$M+m : m = \frac{A^3}{T^2} : \frac{m}{m+\mu} \cdot \frac{a^3}{t^2},$$

oder 3.) $M+m : m+\mu = \frac{A^3}{T^2} : \frac{a^3}{t^2}$.

Man kann aber die Masse des Trabanten in Vergleichung mit der Masse des Planeten vernachläßigen, und alsdenn ist nahe

4.) $M+m : m = A^3t^2 : a^3T^2$

oder $\frac{M}{m} = \frac{A^3}{a^3} \cdot \frac{t^2}{T^2} - 1$.

Heißen die Massen zweyer Planeten m und m', ihre mittleren Abstände von der Sonne A und A', und ihre siderischen Umlaufszeiten T und T'; so verhält sich

$A^3 : A'^3 = (M+m)\,T^2 : (M+m')\,T'^2$ (§. 299. oder 300.)

und daher 5.) $A^3T'^2 : A'^3T^2 = M+m : M+m' = \frac{M}{m} + 1 : \frac{M}{m} + \frac{m'}{m}$.

Wenn also die siderischen Umlaufszeiten zweyer Planeten, ihre mittlere Entfernungen von der Sonne, und das Verhältniß der Masse m eines derselben zu der Sonnenmasse M gegeben sind; so findet man durch diese Proportion $\frac{M}{m} + \frac{m'}{m}$, mithin auch $\frac{m'}{m}$, oder das Verhältniß der Massen m und m'. Man wird sich aber aus dem dritten Capitel des zweyten Buchs erinnern, daß die genaue Bestimmung der großen Axen der elliptischen Planetenbahnen aus den geocentrischen Längen und Breiten der Planeten mit vielen Schwierigkeiten verbunden ist. Da sich nun vermöge des dritten keplerischen Gesetzes die Quadrate der siderischen Umlaufszeiten sehr nahe wie die Würfel der mittleren Entfernungen der Planeten von der Sonne verhalten; so ist das Verhältniß von $M+m : M+m'$ nahe das Verhältniß der Gleichheit, und ein kleiner in der Bestimmung der mittleren Entfernungen begangener Fehler wird, wenn M in Vergleichung mit m und m' sehr groß ist, einen sehr beträchtlichen Einfluß auf die Werthe der Massen haben.

In den Proportionen n. 2, 3. und 4. hingegen ist der Einfluß der in den mittleren Distanzen liegender Fehler auf die Verhältniße der Massen geringe, weil die Vorderglieder der Verhältniße beträchtlich größer als die Hinterglieder sind. Man kann also auch die nach dem dritten keplerischen Gesetz aus den Umlaufszeiten geschlossene mittlere Entfernungen der Planeten von der Sonne in jene Proportionen setzen. Da vermöge dieses Gesetzes nahe $A^3 : A'^3 = T^2 : T'^2$; so folgt hieraus und aus n. 4. nahe

6.) $M + m : m = A'^3 t^2 : a^3 T'^2$

oder $\frac{M}{m} = \left(\frac{A'}{a}\right)^3 \left(\frac{t}{T'}\right)^2 - 1$,

d. i. man kann statt der Umlaufszeit und der mittleren Entfernung des Planeten, dessen Masse man sucht, die Entfernung und Umlaufszeit eines anderen Planeten setzen.

§. 302. Man setze den Winkel, unter welchem in einer der mittleren Entfernung eines Planeten von der Sonne gleichen Distanz der Halbmesser der Bahn eines seiner Trabanten erscheint, $= \epsilon$; so verhält sich $A : a = 1 : \text{Sin. } \epsilon$, und es ist nach §. 301. n. 4.

$$\frac{M}{m} = \left(\frac{t}{T}\right)^2 \overline{\text{Cosec. } \epsilon^3} - 1,$$

$$\frac{m}{M} = \frac{1}{\left(\frac{t}{T}\right)^2 \overline{\text{Cosec. } \epsilon^3} - 1}, \text{ welcher Bruch die Masse des Pla-}$$

neten ausdrückt, wenn man die Masse der Sonne der Einheit gleich setzt.

Es ist z. B. die siderische Umlaufszeit des Jupiters $= 4332{,}5963$ Tagen (§. 191.), der in der mittleren Entfernung des Jupiters von der Erde oder der Sonne gesehene scheinbare Halbmesser der Bahn seines vierten Trabanten $= 8' 16''$ (§. 110.), und die siderische Umlaufszeit dieses Trabanten $= 16{,}689019$ Tagen (§. 104.); also ist hier

C. Lg. Sin. ϵ / Lg. Cosec. ϵ	$= 2{,}6189439$	
3. Lg. Cosec. ϵ	$= 7{,}8568317$	
2. Lg. t	$= 2\,4448704$	
	$10{,}3017021$	
2. Lg. T	$= 7{,}2731964$	
	$3{,}0282057$;	$1067{,}101$,
mithin $\frac{M}{m}$	$= 1066{,}101$,	

oder die Masse des Jupiters ist $\frac{1}{1066,101}$ der Masse der Sonne.

Für den Saturn hat man $T = 10758,96984$ Tagen (§. 191.), die Umlaufszeit t seines sechsten Trabanten $= 15,9453$ T. (§. 117.) und nach den von Pound mit einer 123 Fuß langen Fernröhre angestellten Beobachtungen $e = 2' 58'',2$ *), woraus die Masse des Saturns $= \frac{1}{3405,25}$ der Sonnenmasse folgt.

Für den Uranus ist $T = 30688,713$ T. und in Beziehung auf seinen vierten Trabanten $t = 13,4559$ T., $e = 44'',23$ nach Herschel; mithin die Masse des Uranus $= \frac{1}{19498}$ der Sonnenmasse.

Die Masse der Erde kann, weil die freye Fallhöhe der Körper in der Nähe der Erdoberfläche durch die Beobachtungen gegeben ist, mittelst der Proportion §. 301. n. 2. gefunden werden.

Wegen der geringen Abweichung der Erde von der Kugelgestalt wird die Gravitation gegen die Erde sehr nahe der Gravitation gegen eine Kugel gleich seyn, welche mit der Erde einerley körperlichen Inhalt hat. Der Halbmesser dieser Kugel ist sehr nahe einem Halbmesser des ellptischen Erdsphäroids unter einer Breite gleich, welche $\frac{1}{3}$ des Sinus totus zum Quadrat ihres Sinus hat; folglich wird man die freye Fallhöhe der Körper unter dieser Breite zu nehmen haben, welche nach §. 270. in einer Sekunde 15,07864 pariser Fuß beträgt. Wegen der durch die Arendrehung der Erde entstehenden Schwungkraft ist aber diese aus den Pendellängen geschlossene Fallhöhe kleiner, als die Höhe, von welcher unter der erwähnten Breite ein Körper aus der Ruhe in einer Sekunde fallen würde. Sey $a =$ dem Halbmesser des Erdäquators, t die in Sekunden mittlerer Sonnenzeit ausgedrükte Umdrehungszeit der Erde um ihre Axe; so ist die Schwungkraft $= \frac{v^2}{2ag}$ (§. 273. n. 3.) $= \frac{2a\pi^2}{gt^2}$, weil $v = \frac{2a\pi}{t}$. Demnach ist, weil $t = 23$ St. 56 M. 4,091 Sek. (§. 44.), $a = 3271691$ Toiss. (§. 145.) $= 19630146$ par. Fuß, und unter dem Aequator die freye Fallhöhe in der ersten Sekunde $= 15,05138$ par. Fuß ist (§. 270.), die Schwungkraft unter dem Aequator $= \frac{1}{288,385}$ der beobachteten (um die Schwungkraft verminderten) Schwere unter dem Aequator, und $\frac{1}{288,989}$ der beobachteten Schwere unter der Breite, deren Quadrat des Sinus $= \frac{1}{3}$ ist. Um die Verminderung der Schwere durch die Schwungkraft für irgend einen Parallelkreis des Aequators zu finden, sey ca (Fig. 127.) der Halbmesser des Aequators obiger Kugel, pp' ihre Umdrehungsaxe, und cm ein gegen den Aequator geneigter Halbmesser. Man ziehe mq auf pp' senkrecht. Die Schwungkraft wirkt immer in

*) *La Lande* Astronomie. T. III. n. 3070. pag. 207.

der Ebene der Kreiſe, welche die Körper beſchreiben, und iſt bey einerley Umlaufzeit den Halbmeſſern der Kreiſe proportional (§. 273. n. 2.), ſo daß, wenn die Schwungkraft unter dem Aequator $= ab$ iſt, die Schwungkraft mn unter der Breite acm ſich zu ab verhalten wird $=$ wie $mq : ac$. Man zerfälle die Kraft mn in die Kräfte nr und ns, wovon die erſtere auf cm ſenkrecht, die letztere mit cm parallel ſey; ſo wird ns oder mr die durch die Schwungkraft bewirkte Verminderung der Schwere ſeyn, und es wird ſich verhalten

$$mn : mr = \left\{\begin{matrix} cm \\ ac \end{matrix}\right\} : mq.$$

Aber $ab : mn = ac : mq$;

folglich iſt $ab : mr = \overline{ac}^2 : \overline{mq}^2$

Da nun $\overline{cm}^2 : \overline{cq}^2 = 3 : 1$; ſo iſt $\left\{\begin{matrix} \overline{cm}^2 \\ \overline{ac}^2 \end{matrix}\right\} : \left\{\begin{matrix} \overline{cm}^2 - \overline{cq}^2 \\ \overline{mq}^2 \end{matrix}\right\} = 3 : 2$, mithin die Verminderung der Schwere in $m = \frac{2}{3}$ der Schwungkraft unter dem Aequator $= \frac{2}{3} . \frac{1}{289,905} = \frac{1}{433,363}$ der beobachteten Schwere in m. Demnach muß man die obige Fallhöhe um den 433,363ſten Theil ihre Größe vermehren, um die freye Fallhöhe eines anfänglich ruhenden Körpers unter der Breite zu erhalten, deren Quadrat des Sinus $= \frac{1}{3}$ iſt. Alſo iſt die verbeſſerte Fallhöhe $= 15,11343$ par. Fuß. Das Verhältniß von A zu r, welches in der Proportion n. 2. §. 301. noch vorkommt, ergiebt ſich mittelſt der Horizontalparallaxe der Sonne, weil $A : r = 1 :$ Sin. $8''$, (§ 50.). Ferner iſt $T = 365$ T. 6 St. 9 M. 11,53 Sek. (§. 191.), welche Zeit, weil die oben berechnete Fallhöhe einer Sekunde zugehört, ebenfalls in Sekunden ausgedrückt werden muß. Endlich iſt der verbeſſerte Werth von $g = 15,11343$, und $r = 3268111$ Toiſ. (§. 143. Halbmeſſer einer mit der Erde gleichen Inhalt habenden Kugel) $= 19608666$ par. Fuß. Hieraus findet ſich $\frac{M}{m} = \frac{2\pi r^2}{g.\text{Sin. } 8'',8^3 T^2} - 1 = 331144,3$, oder die Maſſe der Erde iſt $\frac{1}{331144}$ der Maſſe der Sonne. Nimmt man mit La Place die Sonnenparallaxe $= 27$ Decimalſekunden $= 8,748$ Sexageſimalſekunden an; ſo findet man $\frac{1}{337084,7}$.

§ 303. Die folgende Tafel enthält die Angaben der Maſſen der ſieben älteren Planeten nach La Place *). In der erſten Columne iſt die Maſſe der Sonne, in der zweyten die Erdmaſſe zur Einheit angenommen.

Merkur . . .	$\frac{1}{3025810}$ | 0,1663956
Venus . . .	$\frac{1}{356632}$ | 0,9451928

*) Expsition du Système du Monde. pag. 208.

Erde	$\frac{1}{337086}$	1,0000000
Mars	$\frac{1}{3546320}$	0,1323816
Jupiter . . .	$\frac{1}{1067,09}$	315,7152
Saturn . . .	$\frac{1}{3534,08}$	95,37871
Uranus . . .	$\frac{1}{19504}$	17,28292

Sonnenmasse = 337086 mal die Erdmasse.

Die Verhältniße der Massen, welche die Zahlen dieser Tafel angeben, sind also eigentlich die Verhältniße der Geschwindigkeiten, welche diese Himmelskörper einem ausserhalb ihrer Oberfläche in einer gegebenen Distanz von ihren Mittelpunkten befindlichen mit ihnen gleichartigen Körper in einer gegebenen Zeit mittheilen würden. Nun zeigen aber die Versuche, daß auch ungleichartige Körper in gleichen Zeiten von gleichen Höhen fallen (§. 270.), mithin gleiche Geschwindigkeiten erlangen; folglich findet entweder kein Unterschied zwischen der Stärke der Anziehungskraft der Theilchen ungleichartiger Materien statt, oder es müßen, wenn es hierin einen Unterschied giebt, die verschiedenen Materien so durch die ganze Erde verbreitet seyn, daß die Summe ihrer Anziehungskräfte, d. i. die Anziehungskraft der ganzen Erde für alle Körper dieselbe bleibt *). Im ersteren Fall würde, wenn man sich die Körper weit genug von einander entfernt gedenkt, so daß die Verschiedenheit der Entfernungen der Punkte des einen von den Punkten des andern keinen merklichen Einfluß auf die Aenderung der Stärke der Anziehung hat, oder die Körper kugelförmig annimmt, die Anziehungskraft der Menge der materiellen Theile proportional seyn, im letzteren Fall aber nicht. Man kann also aus der Stärke der Anziehungskraft eben so wenig auf die Menge der materiellen Theile des anziehenden Körpers schließen, als man in der Physik von einem Körper, welcher bey einerley Volumen ein noch einmal so großes Gewicht hat als ein anderer, behaupten kann, er enthalte noch einmal so viel Materie als der andere. So wie man aber in der Physik den ersteren Körper noch einmal so dicht nennt, als den zweyten, oder allgemein die Dichtigkeit der

*) *J. T. Mayer* de adfinitate chemica corporum coelestium. Comment. Societatis Reg. scient. Gotting. 1804-1808. Vol. XVI.

Körper direct ihren Gewichten und umgekehrt den Räumen, welche sie einnehmen, proportional seßt, und aus den nach dieser Regel bestimmten Dichtigkeiten zweyer Körper richtig schließt daß ihre Gewichte im zusammengesetzten Verhältniß der Räume und der Dichtigkeiten seyen, so kann man auch in der Astronomie die Dichtigkeit der Himmelskörper direct der Stärke ihrer Anziehungskräfte in einer gegebenen Entfernung, und umgekehrt den Räumen, welche sie einnehmen, proportional seßen, und dabey die Frage über die Menge der materiellen Theile, welche sie enthalten, unentschieden lassen. Wenn man also von zwey gleich großen Himmelskörpern sagt, daß der eine noch einmal so dicht sey, als der andere; so heißt diß so viel: der erstere wird einem ausserhalb seiner Oberfläche und in einer gegebenen Entfernung von seinem Mittelpunkt befindlichen Körper in einer gegebenen Zeit, z. B. in einer Sekunde, eine noch einmal so große Geschwindigkeit mittheilen, als diejenige ist, welche der zweyte demselben in einer gleich großen Entfernung von ihm befindlichen Körper in einer Sekunde mittheilen würde. Allgemein, wenn zwey Körper A und B von einerley Volumen einem dritten C in einer gegebenen Entfernung und in einer gegebenen Zeit Geschwindigkeiten mittheilen, welche sich wie $a : b$ verhalten, sagt man, die Dichtigkeit von A verhalte sich zu der Dichtigkeit von B, wie $a : b$. Es seyen A' und B' zwey andere mit den ersteren gleich große Körper, welche dem Körper C in derselben Entfernung und in gleichen Zeiten Geschwindigkeiten mittheilen, die sich ebenfalls wie $a : b$ verhalten. Beständen nun diese zwey Körper aus einerley Materie; so würde sich die Menge der Materie von A' zu der Menge der Materie von B' verhalten müßen wie $a : b$. Man nennt alsdenn die Dichtigkeiten von A' und B' die mittleren Dichtigkeiten von A und B. Wäre der Körper C unbeweglich, und befänden sich die vier übrigen in gleichen Entfernungen von diesem; so würden sie gegen den leßteren in gleichen Zeiten von gleichen Höhen fallen, und die Gewichte von A und B würde den Gewichten von A' und B' beziehungsweise gleich seyn. Aber das Gewicht von A' verhält sich zu dem Gewicht von B' wie die

Menge der Materie von A' zu der Menge der Materie von $B = a : b$. Folglich verhält sich auch das Gewicht von A zu dem Gewicht von $B = a : b$. So wie man nun die Massen der Erdkörper ihren Gewichten proportional setzt, setzt man die Massen der Himmelskörper den Geschwindigkeiten, welche sie erzeugen, mithin auch den Gewichten proportional, welche sie haben würden, wenn sie gegen einen unbeweglichen Körper gravitirten, und gleich weit von diesem entfernt wären, und es ist nur von ihrer mittleren Dichtigkeit die Rede, wenn man die Massen der Menge der materiellen Theile proportional setzt.

§. 304. Das Verhältniß der Halbmesser der Sonne und der Planeten kennt man aus §. 302. oder 303. Da nun wegen ihrer beynahe kugelförmigen Gestalt ihre Volumina den Würfeln ihrer Halbmesser proportional sind; so sind ihre mittleren Dichtigkeiten im zusammengesetzten Verhältniß aus dem directen der Massen, und aus dem umgekehrten der Würfel der Halbmesser. Mehrerer Genauigkeit halber muß man bey denjenigen Himmelskörpern, deren Abplattung man kennt, die Halbmesser der Kugeln gebrauchen, welche mit jenen einerley Inhalt haben, und nach §. 142. S. 208. u. 209. können berechnet werden. Seyen r und r' diese Halbmesser, m und m' die Massen, d und d' die Dichtigkeiten; so wird sich verhalten

1.) $d : d' = \frac{m}{r^3} : \frac{m'}{r'^3} = 1 : \frac{m'}{m}\left(\frac{r}{r'}\right)^3$.

Weil ferner die anziehende Kraft direct den Massen und umgekehrt den Quadraten der Entfernungen proportional ist; so verhalten sich die freyen Fallhöhen der Körper in der Nähe der Oberflächen der Sonne und der Planeten direct wie ihre Massen und umgekehrt wie die Quadrate ihrer Halbmesser. Nennt man g und g' die Fallhöhen in der ersten Sekunde; so verhält sich

2.) $g : g' = \frac{m}{r^2} : \frac{m'}{r'^2} = 1 : \frac{m'}{m}\left(\frac{r}{r'}\right)^2$,

oder auch $= rd : r'd'$ (n. 1.) $= 1 : \frac{d'}{d} \cdot \frac{r'}{r}$.

Nimmt man die Dichtigkeit von m zur Einheit an; so ist die Dichtigkeit von $m' = \frac{m'}{m}\left(\frac{r}{r'}\right)^3$, und, wenn die freye Fallhöhe in der ersten Sekunde auf dem Körper $m = g$ ist; so ist sie auf dem Körper $m' = \frac{m'}{m}\left(\frac{r}{r'}\right)^2 g$, vorausgesetzt, daß sie keine Axendrehung haben. Hienach kann man diese Fallhöhen mittelst der bekannten Höhe des freyen Falls der Körper in der Nähe der Oberfläche der Erde berechnen. Man kann ferner, wie man in dem 302ten § gesehen hat, mittelst der bekannten Zeit der Axendrehung die von der Schwungkraft herrührende Verminderung der Schwere finden, also die Höhen angeben, von welchen in der Nähe der Oberfläche der Sonne und der Planeten die Körper wirklich fallen.

Es verhält sich z. B. die Sonnenmasse zu der Erdmasse = 331144 : 1 (§. 302.), und ihr Halbmesser verhält sich zum Halbmesser der Erde = 109,25 : 1 (§. 146.); folglich verhält sich die Dichtigkeit der Sonne zur Dichtigkeit der Erde = $331144 : \sqrt[3]{109{,}25} = 0{,}25395 : 1$, oder wie 1 : 3,93774. Ferner ist die freye Fallhöhe der Erdkörper in der ersten Sekunde unter der Breite, deren Quadrat des Sinus = $\frac{1}{3}$ ist, = 15,11343 par. Fuß. (§. 302.); folglich beträgt diese freye Fallhöhe der Körper an der Oberfläche der Sonne in der ersten Sekunde $\frac{331144}{(109{,}25)^2} \cdot 15{,}11343$, oder 419,312 pariser Fuß.

Der Halbmesser des Aequators des Jupiters verhält sich zu dem Halbmesser des Erdäquators = 11,3 : 1 (§. 146.), und das Axenverhältniß des Jupiters ist = 13 : 14 (§. 109.); folglich ist $r' : r = 11{,}3\sqrt[3]{\frac{13}{14}} : \sqrt[3]{\frac{304}{305}}$ (§. 142.). Und nach §. 302. verhält sich die Jupitersmasse : Sonnenmasse = 1 : 1065,05, und die Sonnenmasse : Erdmasse = 331144 : 1; folglich die Masse des Jupiters zur Masse der Erde = 331144 : 1065,05. Mithin verhält sich die Dichtigkeit des Jupiters zur Dichtigkeit der Erde = 0,231297 : 1, und zur Dichtigkeit der Sonne = 0,910788 : 1. Die Fallhöhe der Körper auf seiner Oberfläche beträgt 38,5797 par. Fuß in

einer Sekunde. Unter dem Aequator des Jupiters wird diese Fallhöhe durch die Schwungkraft ungefähr um den neunten Theil ihrer Größe vermindert.

Setzt man nach La Place das Verhältniß der Sonnenmasse zur Masse des Saturns = 3534,08 : 1 (§. 303); so erhält man mittelst des §. 146. angegebenen Verhältnißes der Halbmesser das Verhältniß der Dichtigkeit des Saturns zur Dichtigkeit der Sonne = 0,424955 : 1.

Die Dichtigkeit des Uranus verhält sich zur Dichtigkeit der Sonne $= \frac{1}{19\frac{1}{3}04} \cdot \left(\frac{109,25}{4,25}\right)^3 : 1 = 0,870911 : 1$.

Vergleicht man die Dichtigkeiten der Erde, des Jupiters und des Saturns, welche man am genauesten kennt, miteinander; so findet man, daß sie mit der Entfernung dieser Planeten von der Sonne abnehmen, und nahe umgekehrt ihren mittleren Entfernungen von der Sonne proportional sind. Der Uranus, dessen Dichtigkeit die des Saturns zu übertreffen, und der Dichtigkeit des Jupiters nahe zu kommen scheint, entfernt sich von dieser Regel, von welcher man übrigens keinen physikalischen Grund angeben kann. Indessen hat La Place nach dieser Regel die §. 303. angegebene Masse des Merkurs bestimmt. Die daselbst angegebenen Massen des Mars und der Venus sind aus den Störungen der elliptischen Bahn der Erde um die Sonne geschlossen, welche berechnet und mit den Beobachtungen verglichen wurden. Es ergiebt sich daraus das Verhältniß der Dichtigkeit des Mars zur Dichtigkeit der Sonne = 3,86048 : 1, und das Verhältniß der Dichtigkeit der Venus zur Dichtigkeit der Sonne = 4,54564 : 1.

§. 305. Wäre das Verhältniß der Gravitation eines Körpers gegen einen anderen von einer gegebenen specifischen Schwere zu seiner Gravitation gegen die Erde gegeben; so könnte man hieraus nach dem vorhergehenden §. das Verhältniß ihrer Dichtigkeiten, mithin die mittlere Dichtigkeit und specifische Schwere der Erde selbst finden. Die Ablenkungen des Bleylots von seiner vertikalen Richtung, welche man in der Nähe hoher Berge beobachtet (§. 286.),

ſchienen zu ſolchen Unterſuchungen tauglich zu ſeyn. Maſkelyne ſtellte zu dem Ende im Sommer 1774 *) auf der Nord- und Süd-Seite des Bergs Shehallien in Pertshire genaue Beobachtungen über die Abſtände einiger Fixſterne vom Scheitel an. Weil dieſer Berg hoch iſt, einzeln ſteht, ſich weit von Abend gegen Morgen erſtrekt, dagegen aber eine ſchmale Grundfläche hat, und daher an dem nördlichen und ſüdlichen Abhang ſteil iſt; ſo mußte die Ablenkung des Bleylots eines zu Höhenmeſſungen eingerichteten Werkzeugs auf beyden Seiten des Bergs merklich werden, und den Unterſchied der an den zwey Standpunkten beobachteten Scheitelabſtände deſſelben Sterns größer geben, als er ohne die Ablenkung des Bleylots würde gefunden worden ſeyn. Der letztere ergab ſich aus der durch geometriſche Meſſungen beſtimmten Entfernung der Beobachtungsorte und aus der bekannten Größe eines Grads des Meridians in dieſer Gegend = 42,94 Sek. Aus 40 mit einander verglichenen Beobachtungen der Fixſterne fand ſich aber der Unterſchied der ſcheinbaren Scheitelpunkte der zwey Orte, oder der Winkel, welchen die Richtungen des Bleylots mit einander machten = 54,6 Sek., welcher um 11,66 Sek. größer iſt, als er hätte ſeyn ſollen. Aus dieſen Ablenkungen, den Abmeſſungen und der Dichtigkeit des aus einem gleichförmigen Granit beſtehenden Bergs fand Hutton **) die mittlere Dichtigkeit der Erde $4\frac{1}{2}$ größer als die des Waſſers. Die Ungewißheit, welche über die mittlere Dichtigkeit des Bergs und ſeine Abmeßungen noch übrig bleibt, machen dieſes Reſultat etwas unſicher. Indeſſen ſtimmen damit die §. 286. angeführten von Cavendish angeſtellten genaueren Verſuche ſo nahe überein, als es ſich bey dergleichen mit vielen Schwierigkeiten verbundenen Unterſuchungen erwarten läßt. Cavendish findet unter der Vorausſetzung, daß kein ſpecifiſcher Unterſchied in der Stärke der Attraction der Theilchen ungleichartiger Materien ſtatt finde, die mittlere Dichtigkeit der Erde 5.48 mal ſo groß als die des Waſſers. Vielleicht ließe ſich, wenn es einen ſolchen Unterſchied giebt, derſelbe mittelſt ei-

*) Philos. Trans. Vol. LXV. for. 1775. n. 48. 49.
**) Philos. Trans. Vol. LXVIII. for. 1778. n. 33.

nes dem Cavendish gebrauchten ähnlichen Apparats, wenn man ungleichartige Körper auf einander wirken ließe, entdecken.

Nun wird man berechnen können, um wie viel ein an einem Faden aufgehängter ruhender Körper von der anfänglichen vertikalen Richtung abgelenkt wird, wenn man ihm einen anderen Körper von einer gegebenen Figur und Masse nähert. Sey *a* (Fig. 128.) ein kleiner Körper, welchem eine Kugel, deren Halbmesser = *cb* ist genähert werde, so daß der Körper und der Mittelpunkt *c* der Kugel in einer Horizontallinie liegen. Auf der geraden Linie *ca* und der durch *a* gezogenen Vertikallinie *ah* nehme man von *a* aus die *ad* und *ap* so, daß die Gravitation von *a* gegen die Kugel *c* zur Gravitation von *a* gegen die Erde sich verhalte wie *ad* zu *ap*, und vollende das Parallelogramm *adfp*; so muß, wenn der Körper *a* ruhen soll, die verlängerte Diagonale *af* durch den Aufhängungspunkt *e* gehen. Da nun die Gravitation im zusammengesetzten Verhältniß der Massen und dem umgekehrten der Quadrate der Entfernungen ist; so wird, wenn die Kugel mit der Erde einerley Dichtigkeit hätte, und der Körper *a* mit der Kugel nahe in Berührung wäre, sich verhalten *ad* : *ap* = der Halbmesser *r'* der Kugel zu dem Halbmesser *r* der Erde. Man setze nun die Kugel sey von Bley, so wird man haben *ad* : *ap* = 11,32. *r'* : 5,48. *r*, oder, wenn man *r'* = 1 Fuß und *r* dem Halbmesser einer Kugel gleich setzt, welche mit der Erde einerley Inhalt hat, = 1 : 9492534. Es verhält sich aber, wenn man durch den Aufhängungspunkt die Vertikallinie *eg* zieht, welche der verlängerten *cb* in *k* begegnet, $ap : \left\{\begin{matrix} fp \\ ad \end{matrix}\right\} = ek : ak$, und daher müßte *ek*, und um so mehr die Länge *ea* des Bleylots mehr als 659 Fuß betragen, wenn die Ablenkung *ak* nur $\frac{1}{100}$ einer pariser Linie betragen sollte, woraus man sieht, daß dergleichen Anziehungen wegen der sehr viel größeren Anziehung der Erde nicht bemerkt werden können.

Viertes Capitel.

Von den Störungen der elliptiſchen Bewegungen durch die gegenſeitige Gravitation der Himmelskörper.

§. 306. Wenn die Planeten nur gegen die Sonne gravitirten; ſo würde jeder derſelben nach dem erſten keplerſchen Geſetz um den Mittelpunkt der Sonne als Brennpunkt eine Ellipſe beſchreiben, und die Sectoren, welche die aus dem Mittelpunkt der Sonne gezogene Radii Vectores abſchneiden, würden übereinſtimmend mit dem zweyten keplerſchen Geſetz der Zeit proportional wachſen, endlich würden die Quadrate ihrer ſideriſchen Umlaufszeiten um die Sonne im zuſammengeſetzten Verhältniß aus dem directen der Würfel ihrer mittleren Entfernungen von der Sonne und aus dem umgekehrten der Summen der Sonnenmaſſe und der Maſſe eines jeden der Planeten ſeyn, wie in dem 299ſten §. gezeigt worden iſt. Wegen der in Vergleichung mit der Sonnenmaſſe ſehr kleinen Maſſe der Planeten (§. 302. und 303.) kommt das Verhältniß der Quadrate der Umlaufszeiten dem Verhältniß der Würfel der mittleren Entfernungen ſo nahe, daß man wenigſtens wegen der unvermeidlichen Fehler, welchen man bey der Beſtimmung der mittleren Entfernungen der Planeten von der Sonne nach den im dritten Capitel des zweyten Buchs gezeigten Methoden ausgeſetzt iſt, die von der Maſſe der Planeten herrührende Unterſchiede zwiſchen den nach dem dritten keplerſchen Geſetz und den nach obiger Proportion berechneten mittleren Entfernungen der Planeten kaum würde haben bemerken können, indem die Combinationen verſchiedener Beobachtungen mit einander größere Unterſchiede würde gegeben haben. Man zieht daher in der neueren Aſtronomie mit Recht die aus den ſideriſchen Umlaufszeiten und den Maſſen der Planeten nach §. 299. berechneten Verhältniße ihrer mittleren Entfernungen von der Sonne den aus den geocentriſchen Längen und Breiten mittelſt der als bekannt angenommenen Elemente der Erdbahn nach dem dritten Capitel des zweyten

Buchs gefundenen vor, und die §. 191. angegebenen mittleren Entfernungen sind wirklich nach dem dritten, aber wegen der Massen der Planeten berichtigten, keplerischen Gesetz berechnet.

Eben so würden die Nebenplaneten, wenn sie nur gegen ihre Hauptplaneten gravitirten, sich um diese nach den keplerischen Gesetzen bewegen, wenn sie zugleich beständig von der Sonne mit derselben Kraft und nach derselben Richtung angezogen würden, mit welcher die Sonne auf ihre Hauptplaneten wirkt. Denn in diesem Fall würde die Attraction der Sonne weder die Gravitation des Trabanten gegen seinen Planeten noch seine relative Geschwindigkeit in Beziehung auf denselben ändern, und die Bewegung des Trabanten würde ebenso erfolgen, als wenn der Hauptplanet ruhte.

§. 307. Wenn aber, wie es schon der Analogie nach sehr wahrscheinlich ist, auch die Planeten selbst gegen einander gravitiren; so müßen hieraus kleine Störungen oder Perturbationen ihrer elliptischen Bewegungen entstehen, und es muß nicht allein für die fernere Bestätigung der Theorie der allgemeinen Schwere, sondern auch für die praktische Astronomie, welcher diese Störungen nicht entgangen sind, wichtig seyn, die Größe und die Gesetze derselben mittelst jener Theorie zu bestimmen.

Was die Nebenplaneten betrifft; so sind zwar ihre Bahnen in Vergleichung mit den Bahnen ihrer Hauptplaneten so klein, daß sich ihre Entfernung von der Sonne während eines Umlaufs um ihre Hauptplaneten nicht beträchtlich ändert, und daher die Sonne nahe mit gleicher Stärke und nach beynahe parallelen Richtungen auf den Planeten und auf seine Trabanten wirkt. Allein wegen der großen Masse der Sonne kann dennoch so wohl der von einer kleinen Ungleichheit der Distanzen, als auch der von einer geringen Neigung der Richtungen der anziehenden Kraft, welche die Sonne auf einen Planeten und auf seine Trabanten ausübt, herrührende Unterschied der Abtractionen merklich werden. Man beobachtet aber wirklich, wie man in dem

fünften Capitel des zweyten Buchs gesehen hat, solche Perturbationen der elliptischen Bewegung des Nebenplaneten, und besonders sind die Bewegungen des Monds großen Ungleichheiten unterworfen, welche zum Theil schon von den älteren Astronomen bemerkt wurden, und eine Folge der allgemeinen Gravitation sind. Die Ungleichheiten der Bewegungen dieses Trabanten der Erde sollen nun näher betrachtet werden.

Setzt man die mittlere Horizontalparallaxe des Monds unter dem Aequator = 57' 1" (§. 93.), und die der Sonne = 8",8 (§. 50.); so verhält sich die mittlere Entfernung des Monds von der Erde zu der mittleren Entfernung der Sonne von der Erde wie 1 : 388,732. Es ist aber das Verhältniß der Gravitation der Erde gegen die Sonne zu der Gravitation des Monds gegen die Erde das zusammengesetzte aus dem Verhältniß der Masse der Sonne zur Masse der Erde, und aus dem umgekehrten Verhältniß der Quadrate der Entfernungen der Sonne und des Monds von der Erde, mithin, wenn man die Sonnenmasse nach §. 302. annimmt, das zusammengesetzte aus den Verhältnißen von 331144 : 1, und von $1 : \overline{388,732}^2$, welches dem Verhältniß von $331144 : \overline{388,732}^2$, oder nahe dem von 331144 : 150336 gleich ist. Folglich zieht die Sonne die Erde über noch einmal so stark an, als diese den Mond, und es müßte in den Neumonden, wenn die Sonne nicht auch auf den Mond wirkte, die relative Gravitation des Monds gegen die Erde mehr als das dreyfache von derjenigen betragen, welche zwischen dem Mond und der Erde allein statt finden würde, in den Vollmonden aber die Centripetalkraft sich scheinbar in eine abstoßende Kraft verwandeln, wobey die beynahe kreisförmige Bahn des Monds um die Erd nicht würde haben bestehen können. Der Mond muß also auch so wie die Erde von der Sonne angezogen werden, und wenn beyde mit gleicher Stärke und nach parallelen Richtungen von ihr angezogen würden; so würde dadurch die Bahn des Monds um die Erde nicht gestört werden. Demnach ist es eigentlich nicht der Mittelpunkt der Erde, sondern der ge-

meinschaftliche Schwerpunkt der Erde und des Monds, welcher um die Sonne als Brennpunkt eine Ellipse beschreibt. Es sey *s* (Fig. 129.) der Mittelpunkt der Sonne, *e* und *l* die Mittelpunkte der Erde und des Monds, und es sey die *el* in *c* so getheilt, daß *ec* : *cl* sich verhalte wie die Masse des Monds zur Masse der Erde; so beschreibt der Schwerpunkt *c* der Erde und des Monds, in welchem man ihre Massen als vereinigt annehmen kann, um die Sonne *s* nach den keplerischen Gesetzen eine Ellipse. Man ziehe den Radius Vector *sc* dieser Ellipse; so wird dieser den Zeiten proportionale Flächenräume abschneiden, und ein Beobachter in dem Mittelpunkt der Sonne würde den Mittelpunkt der Erde nach der Richtung *se* sehen, wenn der nach den keplerischen Gesetzen sich bewegende Schwerpunkt in *c* ist. In den Neu- und Vollmonden werden *se* und *sc* auf einander fallen, in den Quadraturen aber werden sie den größten Winkel mit einander machen. Folglich müßte dieser Beobachter eine periodische Abweichung der Bewegung der Erde von der genauen elliptischen Bewegung bemerken, welche nach Verfluß eines synodischen Monats in derselben Ordnung wiederkehrte. Eben diese Ungleichheit muß aber auch der Beobachter auf der Erde bemerken, welcher alle auf ihrer Oberfläche angestellte Beobachtungen auf ihren Mittelpunkt reducirt. Die Beobachtungen zeigen wirklich eine solche Ungleichheit in der scheinbaren Bewegungen der Sonne um die Erde, welche auf 7″,5 steigt, und dem Sinus des Ueberschußes der Länge des Monds über die Länge der Sonne proportional ist. Man ziehe *cd* auf *es* senkrecht; so ist diese Ungleichheit dem Winkel *dsc* gleich, unter welchem die Linie *cd* aus dem Mittelpunkt der Sonne gesehen erscheint, und welcher seiner Kleinheit halber sehr nahe diesem Perpendickel *cd* oder dem Sinus des Winkels *sel* proportional sich verändert. Da der aus der Sonne gesehene scheinbare Halbmesser der Erde der Horizontalparallaxe der Sonne, oder 8″,8 gleich ist, jene Ungleichheit aber nur auf 7″,5 steigt, so muß der Schwerpunkt der Erde und des Monds noch innerhalb der Erdkugel liegen, und weil bey so kleinen Winkeln die wahren Größen sehr nahe den scheinbaren Größen, oder den

Win-

keln, unter welchen erſcheinen, proportional ſind (§. 49. n. 6.); ſo verhält ſich

$ec : eb = 7{,}5 : 8{,}8$, weil für $ese = 7''{,}5$, der Winkel $sel = 90°$, und $cd = se$ iſt.
Aber $eb : el = 1 : 60{,}2965$ (§. 63.);
folglich $ec : el = 7{,}5 : 530{,}609$
und $ec : el = 7{,}5 : 523{,}109$
$= 1 : 69{,}75$.

Demnach verhält ſich die Maſſe des Monds zur Maſſe der Erde $= 1 : 69{,}75$.

§. 308. Es ſey nun die Sonne in S (Fig. 130.), die Erde in E, um welche ſich der Mond in ſeiner beynahe kreisförmigen Bahn nach der Richtung AMH bewege. Befindet ſich der Mond in A in Conjunktion mit der Sonne; ſo iſt er der Sonne näher als die Erde, und er wird daher von der erſteren ſtärker angezogen als die Erde, und wenn er in B mit der Sonne in Oppoſition iſt; ſo iſt die Erde näher bey der Sonne als der Mond, und dieſer wird jetzt von der Sonne ſchwächer angezogen, als die Erde. Folglich wird in den Syzygien die Schwere des Monds gegen die Erde durch die Attraction der Sonne vermindert. Man ſetze die Geſchwindigkeit, welche eine zur Einheit angenommene Maſſe einem in der gegebenen Diſtanz a von ihr befindlichen Körper in einer gegebenen Zeit mittheilen würde, $= k$, die Maſſe der Sonne $= M$, und die Summe der Maſſen der Erde und des Monds $= m$, welche hier als eine in dem gemeinſchaftlichen Schwerpunkt dieſer zwey Körper vereinigte um die Sonne ſich bewegende Maſſe kann betrachtet werden; ſo wird die Schwere der Erde gegen die Sonne $= \frac{(M+m)kk}{\overline{SE}^2}$ ſeyn.

In den Conjunktionen verhält ſich aber

die Gravitation der Erde gegen die Sonne : Gravit. des Monds gegen die Sonne $= \overline{SA}^2 : \overline{SE}^2$;

folglich der Ueberſchuß der zweyten über die erſte : Gravit. der Erde gegen die Sonne $= \overline{SE}^2 - \overline{SA}^2 : \overline{SA}^2$

$= (SE + SA)\,AE : \overline{SA}^2$

nahe $= 2AE : SE$, weil AE kleiner als $\frac{1}{358}\,SE$.

In den Oppoſitionen verhält ſich

der Ueberschuß der Gravit. der Erde gegen die Sonne über die Gravit. des Monds gegen die Sonne } : { Gravit. der Erde gegen die Sonne } = { $\overline{SB}^2 - \overline{SE}^2$ / $(SB+SE)BE$ } : $\overline{SB}^2$

wiederum nahe $= 2AE : SE$.

Folglich ist in beyden Fällen die Verminderung der Schwere des Monds gegen die Erde durch die Attraction der Sonne nahe dieselbe, und in dem Verhältniß des Durchmessers der Mondsbahn zum Halbmesser der Erdbahn kleiner als die Schwere der Erde gegen die Sonne. Man setze statt der letzteren ihren oben gegebenen Ausdruck; so ist die Verminderung der Schwere des Monds in den Syzygien $= \frac{2(M+m)ka^2 . AE}{\overline{SE}^3}$.

Wenn der Mond in einer seiner Quadraturen in H ist; so sey die nach der Sonne S gerichtete Kraft HO, mit welcher die letztere den Mond anzieht, in die Kräfte HJ und JK zerfällt, von welchen die eine HJ auf dem Radius Vector EH senkrecht sey, die andere HK in der Richtung desselben wirke; so verhält sich $HO : HK = SH : \{ \frac{HE}{AE} \}$. Aber SH und SE sind in diesem Fall sehr nahe einander gleich, und daher ist die Kraft HO nahe der Kraft gleich, mit welcher die Erde E von der Sonne angezogen wird. Folglich verhält sich die Vergrößerung der Schwere des Monds gegen die Erde durch die Anziehungskraft der Sonne zu der Schwere der Erde gegen die Sonne in den Quadraturen nahe $= AE : SH$, oder nahe wie $AE : SE$. Mithin beträgt diese Vergrößerung nur die Hälfte der Verminderung, welche die Schwere des Monds in den Syzygien leidet. Es ergiebt sich aus allen Wirkungen der Sonne auf den Mond während seines synodischen Umlaufs eine mittlere in der Richtung des Radius Vector des Monds wirkende Kraft, welche seine Schwere gegen die Erde vermindert, und dem vierten Theil der größten Verminderung in den Syzygien, mithin der Kraft $\frac{\frac{1}{2}(M+m)ka^2 . AE}{\overline{SE}^3}$ gleich ist. Nun ist aber die Kraft, mit welcher die Erde den Mond in der Distanz AE anzieht, $= \frac{mka^2}{\overline{AE}^2}$; folglich verhält sich die mittlere Verminderung der

Schwere des Monds gegen die Erde durch die Anziehung der Sonne zu seiner Schwere gegen die Erde

$$= \frac{\frac{1}{2}(M+m)\,ta^2.AE}{SE^3} : \frac{mka^2}{AE^2} = \frac{\frac{1}{2}(M+m)}{SE^3} : \frac{m}{AE^3} = \frac{1}{2}t^2 : T^2$$

(§. 301. n. 4., wenn man die sideriſche Umlaufszeit des Monds $= t$, und die sideriſche Umlaufszeit der Erde oder das sideriſche Jahr T ſetzt.). Und da nach §. 61 und 191. ſich verhält $t^2 : T^2 = 1 : 178{,}723$; ſo iſt die Schwere des Monds gegen die Erde im Mittel genommen um ihren 357,446ten Theil kleiner als ſie ohne die Wirkung der Sonne ſeyn würde, oder die aus der Umlaufszeit und der Entfernung des Monds von der Erde nach §. 286. berechnete Schwere des Monds gegen die Erde verhält ſich zu der Kraft, mit welcher die Erde allein den Mond anziehen würde $= 357{,}446 : 358{,}446$.

§. 309. Nun wird man im Stande ſeyn, eine genauere Vergleichung der Kraft der Schwere mit der Kraft, welche den Mond in ſeiner Bahn erhält, anzuſtellen, als es in dem 286ſten §. geſchehen iſt. Man hat daſelbſt unter der Vorausſetzung der mittleren Horizontalparallaxe des Monds unter dem Aequator $= 57' 1''$ die Höhe, von welcher der Mond in ſeiner mittleren Diſtanz von der Erde gegen dieſe hin in einer Minute fallen würde $= 2{,}515677$ Toiſ. gefunden, welche wegen der durch die Attraction der Sonne bewirkten Verminderung um ihren 357,446ten Theil, oder um 0.007038 Toiſ. zu klein iſt. Man vermehre ſie alſo um dieſe Größe; ſo erhält man 2,522715 Toiſ. Dieſe aus der relativen Bahn des Monds um die Erde abgeleitete Fallhöhe iſt aber die Summe der Räume, durch welche der Mond gegen die Erde und die Erde gegen den Mond in einer Minute fallen würden, und die letzteren zwey Fallhöhen ſind den Maſſen der Erde und des Monds proportional; folglich verhält ſich, wenn man das §. 307. gefundene Verhältniß dieſer Maſſen gebraucht, die Fallhöhe des Monds gegen die Erde zur Fallhöhe der Erde gegen den Mond $=$ 69,75 : 1, und ihre Summe, d. i. 2,522715 verhält ſich

zur Fallhöhe des Monds gegen die Erde = 70,75 : 69,75. Mithin ist die freye Fallhöhe des Monds gegen die Erde in der ersten Minute und wenn er in seiner mittleren Distanz von der Erde sich befindet = 2,487058 Toiſ. An der Oberfläche der Erde und unter dem Parallelkreis, dessen Quadrat des Sinus der Breite = $\frac{1}{3}$ ist, würde diese Fallhöhe in dem Verhältniß des Quadrats der mittleren Entfernung des Monds von der Erde zu dem Quadrat des jener Breite entsprechenden Erdhalbmessers größer seyn. Es verhält sich aber jene Entfernung zu dem Halbmesser des Aequators, wie 1 : Sin. (57′ 1″), und der Halbmesser des Aequators zu dem Erdhalbmesser unter der erwähnten Breite = 3271691 : 3268111 (§. 143); folglich würde unter dieser Breite die freye Fallhöhe des Monds in der ersten Minute betragen $2{,}487058 \times \left(\frac{3271691}{3268111 . \text{Sin.}(57' 1'')}\right)^2$ Toiſ., und in der ersten Sekunde $\frac{2{,}487058}{3600} \times \left(\frac{3271691}{3268111 \text{ Sin.}(57' 1'')}\right)^2$ Toiſ., d. i. 2,517205 Toiſ. oder 15,10323 par. Fuß. Diese Fallhöhe ist von der aus den Pendellängen geschloßenen und wegen der Schwungkraft verbesserten Fallhöhe der Körper unter eben dieser Breite, welche nach §. 302. = 15,11343 pariſer Fuß ist, nur um 0,0102 par. Fuß., oder um weniger als 1 $\frac{1}{2}$ par. Linien verschieden. Eine Verminderung der Horizontalparallaxe des Monds um 0,75 Sekunden ist hinreichend, um diesen Unterschied verschwinden zu machen, welcher also innerhalb der Gränzen der Beobachtungsfehler liegt.

§. 310. Man setze das Verhältniß der Erdmasse zu der Masse des Monds $= m : m'$, die Horizontalparallaxe des Monds unter dem Aequator $= p$, den Halbmesser des Aequators $= r$, den Halbmesser einer Kugel, welche mit der Erde einerley Inhalt hat $= r'$, und die sideriſche in Sekunden ausgedrückte Umlaufszeit des Monds $= t$; so ist die mittlere Entfernung des Monds von der Erde $= \frac{r}{\text{Sin. } p}$, und in dieser Distanz seine doppelte Fallhöhe in der ersten Sekunde $= \frac{4r\pi^2}{t^2 \text{Sin. } p}$ (§. 273. n. 2. oder §. 283. n. 1.), welche wegen der durch die Sonne bewirkten Verminderung in dem Verhältniß von 358,446 : 357,446, oder von 1,00279 : 1

zu vermehren, und wegen der Maſſe des Monds in dem Verhältniß von $m : m + m'$ zu vermindern iſt, um die verbeſſerte doppelte Fallhöhe zu erhalten, welche nun $= \frac{4r\pi^2}{t^2 \text{Sin.} p} \cdot 1{,}002798 \cdot \frac{m}{m+m'}$ ſeyn wird. In der Diſtanz r' von der dem Mittelpunkt der Erde iſt dieſe doppelte Fallhöhe größer als in der Entfernung $\frac{r}{\text{Sin.} p}$ in dem Verhältniß von $\left(\frac{r}{\text{Sin.} p}\right)^2 : r'^2$, und daher $= \frac{4r^3\pi^2}{t^2 \text{Sin.} p^3} \cdot \frac{1{,}002798}{r'^2} \cdot \frac{m}{m+m'}$. Mithin iſt die Geſchwindigkeit, welche die Erde dem Mond in einer Sekunde, wenn er ſich an ihrer Oberfläche unter dem Parallelkreis befände, deſſen Quadrat des Sinus der Breite $= \frac{1}{3}$ des Sinus totus iſt, $= \frac{4r\pi^2}{t^2 \text{Sin.} p^3} \cdot 1{,}002798 \left(\frac{r}{r'}\right)^2 \cdot \frac{m}{m+m'}$. Unter eben dieſer Breite ſey die Länge des einfachen Sekundenpendels $= l$; ſo iſt die doppelte Fallhöhe in der erſten Sekunde $= \pi^2 l$ (§. 259. n. 2.), welche wegen der Schwungkraft um $\frac{1}{433{,}36}$ zu vergrößern iſt; ſo daß, wenn man $\left(1 + \frac{1}{433{,}36}\right) l = l'$ ſetzt, die Geſchwindigkeit, welche die Erde unter jenem Parallelkreis einem Körper in einer Sekunde mittheilt $= \pi^2 \cdot l'$ wird. Wenn nun die Schwere der Erdkörper einerley iſt mit der Kraft, welche auf den Mond wirkt; ſo muß man die Gleichung haben $l' = \frac{4r}{t^2 \text{Sin.} p^3} \cdot 1{,}002798 \cdot \left(\frac{r}{r'}\right)^2 \cdot \frac{m}{m+m'}$, oder, weil für das Axenverhältniß 304 : 305 der Quotient $\frac{r}{r'} = \sqrt[3]{\frac{305}{304}}$ wird (§. 142. S. 208.), $l' = \frac{4r}{t^2 \text{Sin.} p^3} \cdot 1{,}004993 \cdot \frac{m}{m+m'}$.

Hieraus folgt umgekehrt $\text{Sin.} p^3 = \frac{4r}{t^2 l'} 1{,}004993 \cdot \frac{m}{m+m'}$. Da nun $l = 0{,}5092616$ Tois. (§. 269.) mithin $l' = 0{,}5104367$ Tois. und $r = 3271691$ (§. 143.); ſo findet ſich, wenn man $m : m' = 69{,}75 : 1$ ſetzt (§. 307.), die Horizontalparallaxe des Monds unter dem Aequator in ſeiner mittleren Entfernung von der Erde $= 57'0'',25$, nur um $0'',75$ kleiner, als ſie Bürg aus den Beobachtungen abgeleitet hat (§. 63.).

§. 311. Es befinde ſich jetzt der Mond in *M* (Fig. 130.) zwiſchen der Conjunktion und dem erſten Viertel, und ſein Mittelpunkt ſo wie die Mittelpunkte der Erde und der Sonne ſeyen durch gerade Linien mit einander verbunden.

Man nehme auf den geraden Linien MS und SE die MG und ED den Kräften proportional, mit welchen die Sonne auf den Mond und auf die Erde wirkt, ziehe durch M die Parallele ML mit ES, durch G die Parallele GL mit ME und vollende das Parallelogramm $MLGQ$; so zerfällt die Kraft MG in die zwey Kräfte ML und MQ. Von der ML sey $LF = DE$ abgeschnitten, so ist der Rest MF der Kraft proportional, mit welcher die Sonne den Mond nach einer mit SE parallelen Richtung von der Erde zu entfernen strebt. Der andere Theil MQ wirkt in der Richtung des Radius Vector des Monds, und vergrößert die Kraft, welche den Mond nach dem Mittelpunkt der Erde hin treibt. Es verhält sich aber

$$GM : ML = SM : SE$$
$$\text{und } GM : MQ = SM : ME;$$

folglich ist $ML = \frac{GM.SE}{SM} = \frac{M.a^2k.SE}{SM^3}$

$$\text{und } MQ = \frac{GM.ME}{SM} = \frac{M.a^2k.ME}{SM^3},$$

weil die Kraft, mit welcher die Sonne den Mond in der Distanz SM anzieht $= \frac{Ma^2k}{SM^2}$ ist (§. 308.). Ferner ist

$\left.\begin{matrix} DE \\ FL \end{matrix}\right\} = \frac{M.a^2k}{SE^2}$ weil $M+m$ nahe $= M$; folglich ist

1.) Die Kraft $MF = Ma^2k\left(\frac{SE}{SM^3} - \frac{1}{SE^2}\right)$

Man zerfälle noch die Kraft MF in die zwey Kräfte Mp und Mq, von welchen die erste auf den Radius Vector des Monds senkrecht, die andere in der Richtung desselben wirke, und ziehe MP auf SE senkrecht; so verhält sich

$$MF : Mq = ME : EP$$
$$\text{und } MF : Mp = ME : MP;$$

daher ist $Mq = \frac{MF.EP}{ME}$,

$$\text{und } Mp = \frac{MF.MP}{ME}.$$

Mithin ist 2.) $Mq - MQ = Ma^2k\left(\frac{SE}{SM^3} - \frac{1}{SE^2}\right)\frac{EP}{ME} - \frac{Ma^2k.ME}{SM^3}$,

und 3.) $MP = Ma^2k\left(\frac{SE}{\overline{SM}^3} - \frac{1}{\overline{SE}^2}\right)\frac{MP}{ME}$.

Die Kraft n. 2. verändert die Centripetalkraft des Monds, und verkleinert oder vergrößert sie, je nachdem Mq größer oder kleiner als MQ ist. Die Kraft n. 3. verzögert oder beschleunigt überdiß die Bewegung des Monds, je nachdem Mp und MT auf verschiedenen oder auf einerley Seite des Radius Vector des Monds liegen.

§. 312. Man setze den Radius Vector SE der Erde $= R$, den Radius Vector EM des Monds $= r$, und den Winkel $SEM = D$; so sind

$PM = r$ Sin. D

$EP = r$ Cos. D, und $SP = R - r$ Cos. $D = R\left(1 - \frac{r}{R}\text{ Cos. }D\right)$.

Da nun R im Mittel genommen 388,7 mal so groß ist als r (§. 307.); so ist $\frac{r}{R}$ ein kleiner Bruch, dessen Quadrat man ohne einen sehr merklichen Fehler vernachläßigen kann, und SM ist nahe $= SP$ folglich ist nahe

$\overline{SM}^3 = R^3\left(1 - \frac{3r}{R}\text{ Cos. }D\right)$, und $\frac{SE}{\overline{SM}^3} = \frac{1}{R^2}\left(1 + \frac{3r}{R}\text{ Cos.}D\right)$, mithin

$\frac{SE}{\overline{SM}^3} - \frac{1}{\overline{SE}^2} = \frac{3r}{R^3}$ Cos. D. Demnach ist nach n. 1. des vorhergehenden §.

1.) Die Kraft $MF = \frac{3Ma^2kr\text{ Cos. }D}{R^3}$.

Sodenn ist, weil $\frac{EP}{ME} = $ Cos. D, vermöge §. 311. n. 2. $Mq - MQ = Ma^2k.\ \frac{3r}{R^3}\ \overline{\text{Cos. }D}^2 - \frac{Ma^2kr}{R^3}$, $= \frac{Ma^2kr}{R^3}\left(\frac{3}{2} + \frac{3}{2}\text{ Cos. }2D - 1\right)$; folglich ist

2.) $Mq - MQ = \frac{1}{2}\cdot\frac{Ma^2kr}{R^3} + \frac{3}{2}\cdot\frac{Ma^2kr}{R^3}$ Cos. $2D$.

Endlich weil $\frac{MP}{ME} = $ Sin. D; so ist vermöge §. 311. n. 3. $Mp = \frac{3Ma^2kr}{R^3}$ Cos. D Sin. D, oder

3.) $Mp = \frac{3}{2}\cdot\frac{Ma^2kr}{R^3}$ Sin. $2D$.

Die Kraft, mit welcher die Sonne die relative Bewegung des

Monds um die Erde stört, zerfällt also in zwey perturbirende Kräfte n. 2. und 3., von welchen die letztere in einer durch die Mittelpunkte der Sonne, der Erde und des Monds gelegten Ebene senkrecht auf den Radius Vector des Monds wirkt, die erstere aber seine Centripetalkraft verändert. Diese Veränderung der Centripetalkraft besteht aus zwey Theilen, nemlich aus einem blos von den Radiis Vectoribus der Erde und des Monds abhängenden sich nicht beträchtlich verändernden Theil, dessen mittleren Werth man erhält, wenn man statt R und r die mittleren Entfernungen der Sonne und des Monds von der Erde setzt, und aus einem periodischen Theil, welcher dem Cos. $2D$ proportional ist, und nach Verfluß eines halben synodischen Monats in derselben Ordnung wiederkehrt. Man bezeichne den mittleren Werth des ersten Theils durch $\frac{1}{2}c$; so würde, wenn die Abstände der Sonne und des Monds von der Erde beständig ihren mittleren Abständen gleich wären, die Veränderung der Centripetalkraft des Monds $= \frac{1}{2}c + \frac{1}{2}c$ Cos. $2D$ seyn. In den Conjunktionen und Oppositionen ist, wenn man die Neigung der Mondsbahn vernachläßigt, Cos. $2D = 1$; folglich die Verminderung der Schwere des Monds gegen die Erde $= \frac{1}{2}c + \frac{1}{2}c = 2c$, und daher wird durch die Attraction der Sonne die Schwere des Monds gegen die Erde im Mittel genommen um den vierten Theil der grösten Verminderung in den Syzygien vermindert, wie §. 308. bemerkt worden ist. In den Quadraturen wird Cos. $2D = -1$, mithin die Veränderung der Centripetalkraft $= \frac{1}{2}c - \frac{1}{2}c = -c$, oder die Centripetalkraft des Monds wird in diesem Fall durch die Attraction der Sonne um die Hälfte der grösten Verminderung in den Syzygien vergrößert, übereinstimmend mit §. 308.

§. 313. Von den zwey Kräften MF und MQ (*Fig.* 130.), in welche man die perturbirende Kraft der Sonne zuerst zerfällt hat (§. 311.), wirkt die erste in der Richtung des Radius Vector des Monds, und bringt daher keine Veränderung in der Lage der Ebene der Mondsbahn hervor. Die andere MF hingegen, welche mit der in der Ebene der Erdbahn oder der Ekliptik liegenden SE parallel wirkt, fällt nur alsdenn in die Ebene der Mondsbahn, wenn sich der Mond in einem seiner Knoten befindet, oder auch wenn die verlängerte Knotenlinie durch die Sonne geht. In den übrigen Fällen wird der Mond durch diese Kraft von der Richtung seiner Bewegung abgelenkt werden, und die Lage der Ebene seiner Bahn wird sich verändern müssen. Es sey KMK' die Mondsbahn, welche die Ebene KAK' der Eklip-

tik in der geraden Linie KK' ſchneide. Die Sonne ſey in S, und der Mond in M zwiſchen ſeinem aufſteigenden Knoten K und dem niederſteigenden K', und zwar ſeye er dem letzten Knoten näher als dem erſten. In der Ebene der hier als kreisförmig vorausgeſetzten Mondsbahn ſey eine gerade Linie Mt gezogen, welche ſie in M berühre; ſo wird dieſe die Richtung bezeichnen, nach welcher der Mond ſich fortbewegen würde, wenn keine Kräfte auf ihn wirkten. Sie begegne der Knotenlinie KK' in N. Die in der Richtung des Radius Vector wirkenden Kräfte lenken den Mond von der Tangente Mt ab, und nöthigen ihn, eine in der Ebene EMN liegende krumme Linie zu beſchreiben, aber die mit SE parallel wirkende perturbirende Kraft MF (§. 311. und 312.) wird ihn von der Ebene EMN ablenken. Es ſey Mt der Weg, welchen der Mond mit ſeiner Geſchwindigkeit in M in derſelben Zeit gleichförmig zurückgelegt haben würde, in welcher ihm die mit SE parallel wirkende Kraft die Geſchwindigkeit MF würde mitgetheilt haben, und Mf ſey die durch eben dieſe Kraft während des Zeittheilchens z erzeugte Geſchwindigkeit. Man vollende das Parallelogramm $fMtk$, und ziehe in der erweiterten Ebene deſſelben durch den Punkt N die Parallele Nn mit Mf, welche der verlängerten Diagonale Mk in n begegne. Da ſo wohl Nn als SE mit Mf parallel ſind; ſo ſind SE und Nn parallel (XI, 9.), mithin liegen beyde in einer Ebene, nemlich in der Ebene der Ekliptik. Man errichte auf der Knotenlinie KN in ihrem Endpunkt N und in der Ebene der Ekliptik das Perperdickel Nh, welches von der verlängerten En in h geſchnitten werde, und ziehe AR auf KK' ſenkrecht. Der Mond würde ſich alſo, wenn die Kraft MF aufhörte zu wirken, in der Ebene EMn fortbewegen, welche die Ebene der Ekliptik in der geraden Linie En ſchneidet, und die Knotenlinie würde während des Zeittheilchens z ſich um den Winkel NEn nach einer Richtung bewegt haben, welche der Richtung der Bewegung des Monds entgegengeſetzt iſt. In jedem folgenden Zeittheilchen wird durch die Wirkung der Kraft MF eine neue Bewegung der Knotenlinie hervorgebracht werden, deren Lage alſo einer beſtändigen Veränderung unterworfen ſeyn wird.

Nimmt man nun die Zeit durch Mt zur Einheit an; so ist die in dem Zeittheilchen z durch die Kraft MF erzeugte Geschwindigkeit $Mf = z.MF$. Man ziehe MH auf KN senkrecht; so verhält sich

$$z.\begin{Bmatrix} Mf \\ MF \end{Bmatrix} : Mt = Nn : MN$$
$$HM : ME = MN : NE$$
$$AR : \begin{Bmatrix} AE \\ ME \end{Bmatrix} = Nh : Nn$$

folglich $z.MF.HM.AR : \overline{ME}^2.Mt = Nh : NE$.

Da nun wegen des rechten Winkels ENh die gerade Linie Nh von einem aus E als Mittelpunkt mit dem Halbmesser EN in der Ebene der Ekliptik beschriebenen Kreis in dem Punkt berührt wird; so ist Nh der Weg, welchen der Punkt mit der Geschwindigkeit, welche er in N hat, gleichförmig in dem Zeittheilchen z beschrieben haben würde. Man setze die Länge eines aus E als Mittelpunkt mit dem Halbmesser 1 beschriebenen Kreisbogens, welchen die Knotenlinie EN bey ihrer Bewegung von N gegen n in der Zeiteinheit abgeschnitten haben würde, wenn sie sich während derselben gleichförmig mit ihrer Winkelgeschwindigkeit in N fortbewegt hätte, $= u$; so wird der in dem Zeittheilchen z von ihr beschriebene Bogen $= uz$, und die Länge eines diesem ähnlichen mit dem Halbmesser NE beschriebenen Bogens $= uz.NE =$ dem Weg Nh seyn, welchen der Punkt gleichförmig mit seiner Geschwindigkeit in N während der Zeit z würde zurückgelegt haben. Folglich wird sich verhalten

$$z.MF.HM.AR : \overline{ME}^2.Mt = uz.NE : NE,$$
$$= uz : 1,$$

und $MF.HM.AR : \overline{ME}^2.Mt = u : 1$.

Also ist die Winkelgeschwindigkeit der Knotenlinie

$u = \frac{MF}{Mt} \cdot \frac{HM}{\overline{ME}} \cdot \frac{AR}{ME}$, wenn sie nemlich durch die Länge eines mit dem Halbmesser 1 beschriebenen Kreisbogens gemessen wird. Die Knotenlinie wird sich rükwarts (gegen die Ordnung der Zeichen) oder vorwarts bewegen, je nachdem u positiv oder negativ ist, und sie wird ruhen, wenn MF, oder HM, oder $AR = o$ sind; also in den Quadraturen, oder

wenn der Mond in einem seiner Knoten ist, oder wenn die Länge der Sonne der Länge eines der Knoten gleich ist. Ungeachtet nun die Knotenlinie des Monds sich bald vor, bald rükwarts bewegt; so wird doch, wie hernach gezeigt werden soll, während eines Jahrs die Summe der directen Bewegungen von der Summe der retrograden übertroffen, so daß die Knotenlinie der Mondsbahn im Ganzen betrachtet sich gegen die Ordnung der Zeichen bewegt.

§. 314. Man setze die Längen der Sonne, des Monds, und des aufsteigenden Knotens des Monds beziehungsweise $= s$, l, und n; so sind für den Halbmesser 1

$$\frac{HM}{ME} = \text{Sin. } KEM = \text{Sin. } (l-n),$$

$$\frac{AE}{ME} = \text{Sin. } KEA = \text{Sin. } (s-n);$$

also ist $\frac{HM}{ME} \cdot \frac{AR}{ME} = \text{Sin. } (l-n) \text{ Sin. } (s-n)$,

$$= \tfrac{1}{2} \text{Cos. } (l-s) - \tfrac{1}{2} \text{Cos. } (l+s-2n).$$

Und weil $AEM = D$ (§. 312.), nahe $= l-s$; so ist (§. 312. n. 1.) $MF = \frac{3Ma^2kr}{R^3} \text{ Cos. } (l-s)$,

und daher $u = \frac{3Ma^2kr}{R^3 . Mt} (\tfrac{1}{2} \text{Cos. } (l-s)^2 - \tfrac{1}{2} \text{Cos. } (l-s) \text{ Cos. } (l+s-2n))$.

Aber $\text{Cos. } (l-s)^2 = \tfrac{1}{2} + \tfrac{1}{2} \text{ Cos. } 2(l-s)$,

und $\text{Cos. } (l-s) \text{ Cos. } (l+s-2n) = \tfrac{1}{2} \text{Cos. } (2l-2n) + \tfrac{1}{2} \text{Cos. } (2s-2n)$; folglich ist

$$u = \tfrac{3}{4} \frac{Ma^2kr}{R^3 . Mt} (1 + \text{Cos. } 2(l-s) - \text{Cos. } 2(l-n) - \text{Cos. } 2(s-n)).$$

Der Coefficient in dem Ausdruck von u hängt von den Abständen des Monds und der Sonne von der Erde und von der Geschwindigkeit des Monds ab, und ist daher bald etwas grösser, bald kleiner als derjenige Werth desselben, welchen man erhält, wenn man statt der wahren Distanzen die mittleren setzt. Folglich besteht die Winkelgeschwindigkeit u der Bewegung der Knotenlinie aus einem constanten Theil, welchen man erhält, wenn man statt r, R, und Mt die mittleren Werthe dieser Grösen setzt, und aus mehreren periodischen Theilen, und daher ist die Bewegung der Mondsknoten aus einer der Zeit proportionalen retrograden Bewegung, und aus mehreren ungleichförmigen bald retrograden bald directen Bewegungen zusammengesetzt (§. 239. und 237.), wie man durch die Beobachtungen gefunden hat §. 65. und 66.). Um die Grösse dieser Bewegungen berechnen

zu können, muß der Coefficient in dem Ausdruck von u durch Zahlen ausgedrückt werden. Man setze die siderischen Umlaufszeiten des Monds und der Sonne $= t$ und T, und die Distanz a, in welcher die zur Einheit angenommene Masse einem Körper die Geschwindigkeit k mitgetheilt haben würde, sey dem mittleren Abstand der Erde von der Sonne gleich; so wird Mk die Geschwindigkeit seyn, welche die Anziehungskraft der Sonne einem in der Distanz a von ihr befindlichen Körper in der Zeiteinheit mitgetheilt haben würde, so daß man haben wird $Mk = \frac{4aa\pi^2}{T^2}$ (§. 273. n. 2. oder 283. n. 1.). Sey der mittlere Abstand des Monds von der Erde $= a'$; so ist seine mittlere Geschwindigkeit $= \frac{2a'\pi}{t}$, mithin wird, wenn man diese statt der wahren Mt setzt, obiger Coefficient $= \frac{3}{2}\left(\frac{a}{R}\right)^3 \cdot \frac{r}{a'} \cdot \frac{\pi t}{T^2}$, dessen mittlerer Werth, wenn man statt der wahren Distanzen R und r die mittleren a und a' setzt, gleich $\frac{3}{2}\frac{\pi t}{T^2}$ gefunden wird. In einem siderischen Jahr wäre hienach die mittlere siderische retrograde Bewegung der Mondsknoten $= \frac{3}{2} \cdot \frac{\pi t}{T^2} \cdot T = \frac{3}{2}\pi \frac{t}{T} = 270 \cdot \frac{t}{T}$ Graden $= 20^\circ\ 11'\ 47''$. Nach den Beobachtungen ist sie $= 19^\circ\ 21'\ 22''$ oder um $50'\ 25''$ kleiner, welcher Unterschied von den bey dieser Berechnung vernachläßigten Größen herrührt. Newton fand durch eine genauere Berechnung $19^\circ\ 18'\ 1''\ 23'''$ *).

Um noch die periodische Ungleichheiten der Bewegung der Mondsknoten zu finden, meße man alle in dem Ausdruck von u vorkommende Winkel durch Bogen eines Kreises, dessen Halbmesser der Einheit gleich ist (S. §. 237.), und drücke die Zeiten in Tagen aus; so findet man den Coefficienten $\frac{3}{2}\pi \cdot \frac{t}{T^2} = 0{,}0009650564$, welchen man zur Abkürzung mit c bezeichne. Ferner seyen a, a', a'' die mittleren Längen der Sonne, des Monds und seines aufsteigenden Knotens für eine gewiße Epoche, und m, m', m'' ihre siderische mittlere tägliche Bewegungen; so werden die mittleren Längen der Sonne, des Monds und seines aufsteigenden Knotens nach Verfluß von t Tagen von jener Epoche an gerechnet beziehungsweise $a + mt$, $a' + m't$, und $a'' - m''t$ seyn. Setzt man nun in dem Ausdruck von u die mittleren Längen statt der wahren; so wird

$$u = c + c.\text{Cos.}\,2(a' - a + (m' - m)t) - c.\text{Cos.}\,2(a' - a'' + (m' + m'')t) - c.\text{Cos.}\,2(a - a'' + (m + m'')t),$$

mithin nach §. 239. n. 1. die retrograde Bewegung des Knoten in t Tagen

*) Princ. L. III. prop. XXXII.

$$= et + \frac{e}{2(m'-m)} \text{Sin. } 2(a'-a+(m'-m)t)$$

$$- \frac{e}{2(m'+m'')} \text{Sin. } 2(a'-a''+(m'+m'')t)$$

$$- \frac{e}{2(m+m'')} \text{Sin. } 2(a-a''+(m+m'')t),$$

wo das erſte Glied die ſchon berechnete mittlere der Zeit proportionale Bewegung des Knotens ausdrückt, ſo daß, wenn man zur Abkürzung die im Anfang dieſes §. gebrauchten Benennungen der Längen wieder in dieſen Ausdruck ſetzt, die wahre Länge des aufſteigenden Knotens nach t Tagen von der Epoche an gerechnet ſeyn wird

$$a''-et - \frac{e}{2(m'+m)} \text{Sin. } 2(l-s)$$

$$+ \frac{e}{2(m'+m'')} \text{Sin. } 2(l-n)$$

$$+ \frac{e}{2(m+m'')} \text{Sin. } 2(s-n)$$

Es iſt aber die mittlere tägliche ſideriſche Bewegung

der Sonne	= 3548″,19; alſo in Theilen des Halbmeſſers	m = 0,0172021
des Monds	= 47434,99	m' = 0,2299713
des Mondsknot.	= 190,78	m'' = 0,0009249.

Folglich iſt $\frac{e}{2(m'+m)}$ = 0,0019522, welcher Bogen, wie man §. 135. geſehen hat, mit 206264,806 multiplicirt werden muß, um ihn in Sekunden ausgedrückt zu erhalten. Man wird 402,66 Sek. finden. Ebenſo finden ſich die zwey übrigen Coefficienten in Sekunden ausgedrückt = 431″,05 und 5490″,93. Die Gleichungen für die Länge des Mondsknotens, welche man nach ihren Zeichen zu ſeiner mittleren Länge hinzufügen muß, um die wahre Länge zu erhalten, wären hienach

$$-(6'43'') \text{Sin. } 2(l-s)+(7'31'') \text{Sin. } 2(l-n)+(1^\circ 31'31'') \text{Sin. } 2(s-n).$$

Die letzte dieſer Ungleichheiten iſt die beträchtlichſte, und diejenige, welche ſchon von den älteren Aſtronomen, namentlich von Tycho, bemerkt wurde (§. 66.). Sie iſt nach den Beobachtungen = 1° 30′ 26″, von welcher die berechnete nur um 1′ 5″ verſchieden iſt *).

Ungeachtet in dem Ausdruck der Winkelgeſchwindigkeit z der Knotenlinie alle Glieder einerley Coefficienten hatten; ſo ſind dennoch die Ungleichheiten ihrer Bewegungen beträchtlich verſchieden ausgefallen. Die Ungleichheiten einer Bewegung hängen

*) Newton fand dieſe Ungleichheit nach der Theorie = 1° 30′. Princ. L. III. prop. XXXIII. Cor.

nemlich nicht allein von den Veränderungen der Geschwindigkeiten, sondern auch von der Zeit ab, während welcher die Geschwindigkeit beständig wächst, oder beständig abnimmt. Die von dem Ueberschuß der Länge der Sonne über die Länge des Knoten herrührende Ungleichheit kam am gröſten heraus, weil die Bewegungen der Sonne und des Knotens langsamer als die Bewegung des Monds sind, also der Winkel $2(s-n)$, sich langsamer als die übrigen ändert. Man hat daher nicht nur auf die Gröſe der perturbirenden Kräfte, sondern auch auf die Perioden zu sehen, während welcher sie nach einerley Richtung wirken. Wenn also z. B. in dem Ausdruck der Geschwindigkeit ein Glied von der Form $b\,\mathrm{Cos.}(a+mt)$ vorkommt; so kann bey einem kleinen Werth von b die von diesem Glied herrührende Ungleichheit sehr beträchtlich werden, wenn zugleich m sehr klein ist, also der Winkel $a+mt$ sich langsam ändert. Eben dieses zeigt die Berechnung nach §. 239. Denn es folgt hieraus die Ungleichheit der Bewegung $\frac{b}{m}\,\mathrm{Sin.}(a+mt)$, welche bey einerley Werth von b desto gröſer wird, je kleiner m ist. Daher werden die von kleineren Perioden abhängende Ungleichheiten verhältnißmäßig genauer gefunden, als diejenige, welche gröſere Perioden haben, und die durch die perturbirenden Kräfte hervorgebrachte der Zeit proportional wachsende Bewegungen, wie z. B die mittlere Bewegung der Mondsknoten, werden durch kleine vernachläßigte Gröſen merklich von den wahren verschieden gemacht werden können. So ist oben die Ungleichheit der Bewegung der Mondsknoten ziemlich nahe mit der beobachteten übereinstimmend gefunden worden, ungeachtet ihre mittlere Bewegung noch merklich von derjenigen abweicht, welche man aus einer langen Reihe von Beobachtungen abgeleitet hat.

§. 315. Man fälle noch in der Ebene der Mondsbahn das Perpendickel MH (Fig. 131.) aus dem Ort des Monds in seiner Bahn auf die Knotenlinie KN, und errichte auf dieser in dem Punkt H und in der Ebene der Ekliptik das Perpendickel Hm, welches der hE in G begegne. Man ziehe GM; so verhält sich

$$GH : HM = \mathrm{Sin.}\,GMH : \left(\begin{matrix}\mathrm{Sin.}\,HGM\\ \mathrm{Sin.}\,MGm.\end{matrix}\right.$$

Und weil $Nh : GH = NE : HE$
$HE : HE = 1 : \mathrm{Cotg.}\,HEM$
$\mathrm{Tg.}\,NEn : 1 = Nh : NE$;

so ist $\mathrm{Tg.}\,NEn : 1 = \mathrm{Sin.}\,GMH : \mathrm{Sin.}\,MGm.\,\mathrm{Cotg.}\,HEM$,
oder $\mathrm{Tg.}\,NEn : \mathrm{Sin.}\,GMH = 1 : \mathrm{Sin.}\,(MHm+GMH).\,\mathrm{Cotg.}\,HEM$.

Es ist aber der Winkel MHm dem Neigungswinkel i der Mondsbahn gegen die Ekliptik gleich (XI. Def. 6.), und der Winkel MGm würde die durch die Kraft MF geänderte Neigung der

Mondsbahn meßen, wenn mG auf nE ſenkrecht wäre. Je kleiner man aber den Winkel NEn nimmt, deſto mehr nähert ſich der Winkel MGm dem Neigungswinkel der Ebene nEM gegen die Ebene der Ekliptik, und der Winkel GMH der Veränderung der Neigung der Mondsbahn. Bey dieſer Verminderung des Winkels NEn wird auch der Winkel GMH immer kleiner und kleiner, der Winkel $MHm + GMH$ nähert ſich dem Winkel MHm oder i, und das Verhältniß von Tg. NEn : Sin. GMH dem Verhältniß von $NEn : GMH$. Da nun NEn und GMH in einerley Zeit beſchriebene Winkel ſind; ſo verhält ſich, wenn man die Geſchwindigkeit, mit welcher ſich die Neigung ändert, $= u'$, und die Winkelgeſchwindigkeit der Knotenlinie wie vorhin $= u$ ſetzt,

$$u : u' = 1 : \text{Sin. } i \text{ Cotg. } HEM,$$

mithin iſt $u' = u \text{ Sin. } i \text{ Cotg. } HEM = -u \text{ Sin. } i \text{ Cotg. } (l-n)$

Da nun $u = \frac{3Ma^2kr}{R^3 Mt} \text{ Sin. } (l-n) \text{ Sin. } (s-n) \text{ Cos. } (l-s)$ (§. 314.);

ſo iſt $u' = -\frac{3Ma^2kr}{R^3 Mt} \text{ Sin. } i \text{ Cos. } (l-n) \text{ Sin. } (s-n) \text{ Cos. } (l-s)$.

Aber Cos. $(l-n)$ Sin. $(s-n) = \frac{1}{2}$Sin. $(l+s-2n) - \frac{1}{2}$Sin. $(l-s)$,

Cos. $(l-n)$Sin. $(s-n)$Cos. $(l-s) = \frac{1}{2}$Sin. $(l+s-2n)$Cos. $(s-s)$ $\frac{1}{2}$Sin. $(l-s)$ Cos. $(l-s)$

$= \frac{1}{4}$ Sin. $2(l-n) + \frac{1}{4}$ Sin. $2(s-n) - \frac{1}{4}$ Sin. $2(l-s)$,

und der mittlere Werth des Coefficienten des Sin. i iſt nach dem vorhergeh. §. $= 0{,}000650564 = c$; folglich iſt

$u' = -c$. Sin. i (Sin. $2(l-n)$ + Sin. $2(s-n)$ - Sin. $2(l-s)$).

Die Neigung der Mondsbahn gegen die Ekliptik iſt alſo blos periodiſchen Veränderungen unterworfen, welche wegen des kleinen Werths von c und der kurzen Perioden von $2(l-n)$, $2(s-n)$, $2(l-s)$ nicht ſehr beträchtlich werden können. Man kann alſo in dem Ausdruck von u ohne merklichen Fehler ſtatt des veränderlichen Neigungswinkels i ſeinen mittleren Werth J ſetzen, und man wird auf ähnliche Art, wie in dem vorhergehenden §. die Bewegung der Knoten berechnet worden iſt, und mit Beybehaltung der daſelbſt gebrauchten Benennungen nach § 239. n. 2. aus der Geſchwindigkeit u', mit welcher ſich die Neigung verändert, die Veränderung der Neigung ſelbſt finden

$$= \frac{c}{2(m'+m'')} \text{ Sin. } i \text{ Cos. } 2(l-n) + \frac{c}{2(m'+m'')} \text{ Sin. } i \text{ Cos. } 2(s-n)$$

$$- \frac{c}{2(m'+m)} \text{ Sin. } i \text{ Cos. } 2(l-s).$$ Setzt man nach §. 65. die mittlere Neigung der Mondsbahn $= 5° 8' 47''$; ſo erhält man durch die Multiplication der Coefficienten der Sinus in dem Ausdruck der Ungleichheiten des Knotens mit dem Sinus dieſer Neigung folgende Coefficienten für die Veränderung der Neigung: $36''$; $8'$

12″; 39″, so daß die Neigung $i = 5° 8' 47'' + 36'' \text{Cos.}\, 2(l-n) + (8' 12'') \text{Cos.}\, 2(s-n) - 39'' \text{Cos.}\, 2(l-s)$ wird.

Die von dem Cosinus des doppelten Abstands der Sonne vom Mondsknoten abhängende Veränderung der Neigung ist die von Tycho bemerkte, welche er auf 9′ 30″ setzte. Die neueren Beobachtungen geben 8′ 47″, nur 35″ mehr, als nach obiger Berechnung.

§. 316. Der Mond muß sich also mit den Beobachtungen übereinstimmend in einer Ebene bewegen, deren Durchschnittslinie mit der Ebene der Ekliptik sich rückwarts bewegt, und deren Neigungswinkel gegen die letztere kleinen periodischen Veränderungen unterworfen ist, von welchen die gröste dem Cosinus des doppelten Abstands der Sonne vom Mondsknoten proportional ist. In dieser Ebene beschreibt der Mond vermöge der Beobachtungen im Mittel genommen eine Ellipse, deren große Axe aber nicht sich beständig parallel bleibt (§. 68 und 218.), wie es seyn sollte, wenn die auf den Mond wirkende Centripetalkraft umgekehrt dem Quadrat der Entfernung proportional wäre. Da aber seine Schwere gegen die Erde durch die Attraction der Sonne verändert wird, so daß die ganze auf ihn wirkende aus den Attractionen der Erde und der Sonne zusammengesetzte Centralkraft nicht mehr genau im umgekehrten Verhältniß des Quadrats seines Radius Vector ist; so fragt es sich, ob sich hieraus die Bewegung seiner Apsidenlinie erklären lasse.

Um dieses zu untersuchen, sey *am* (Fig. 132.) eine beliebige krumme Linie, welche ein Körper durch eine gegen den gegebenen Punkt *c* gerichtete Centripetalkraft zu beschreiben genöthigt sey; so sind die Geschwindigkeiten *at*, *ms* nach den Richtungen der Tangenten an den Punkten *a* und *m* umgekehrt den aus dem Mittelpunkt *c* der Kraft auf die Tangenten gefällten Perpendickeln *cpcq* proportional (§ 272.). Man zerfälle jede dieser Geschwindigkeiten in zwey andere *ad* und *ab*, *mo* und *mn*, so daß *ad*, *mo* auf *ca*, *cm*, senkrecht seyen, *ab*, *mn* aber mit den Richtungen *ca*, *cm* zusammenfallen. Da nun

at : *ms* = *cq* : *cp*, und wegen der Aehnlichkeit der Dreyecke *mso* u. *cmq*, *ms* : *mo* = *cm* : *cq* *atd* u. *cap*, *ad* :

$ad : as = cp : ca$

so ist 1.) $ad : mo = cm : ca$.

Aber, wenn der Körper in einem um c als Mittelpunkt mit dem Halbmesser ca beschriebenen Kreis mit der Geschwindigkeit ad sich bewegte; so müßte die Centripetalkraft $x' = \frac{\overline{mo}^2}{cm}$, mithin $x : x' = \overline{ad}^2 . cm : \overline{mo}^2 . ca$, oder vermöge der Proportion n. 1. $x : x' = \overline{cm}^3 : \overline{ca}^3$ seyn. Folglich ist

2.) Die Kraft, mit welcher der Körper in dem Abstand mc von dem Mittelpunkt der Kraft um diesen Punkt als Mittelpunkt einen Kreis mit derjenigen Geschwindigkeit beschreiben könnte, welche er in m nach einer auf dem Radius Vector cm senkrechten Richtung hat, umgekehrt dem Würfel dieses Radius Vector proportional.

Ein Körper m (Fig. 133.) beschreibe nun um den gegebenen Punkt s als Mittelpunkt der Kräfte die krumme Linie $amnp$, und sa sey eine in ihrer Ebene liegende der Lage nach gegebene gerade Linie. Es sey eine andere krumme Linie $am'n'q$ in der Ebene der ersteren so verzeichnet, daß für gleiche Distanzen sm, sm' das Verhältniß des Winkels asm zu dem Winkel asm' einem gegebenen Verhältniß $f : g$ gleich sey; so wird, wenn die aus s als Mittelpunkt mit den Halbmessern sm, sn beschriebenen Kreise der Bahn amn in m und n, und der Bahn $am'n'q$ in m' und n' begegnen,

$$\left.\begin{matrix}\text{so wohl } asn : asn' \\ \text{als } asm : asm'\end{matrix}\right\} = f : g,$$

$$\text{mithin auch } \left\{\begin{matrix}asn - asm \\ nsm\end{matrix}\right\} : \left\{\begin{matrix}asn' - asm' \\ n'sm'\end{matrix}\right\} = f : g \text{ seyn.}$$

Aber den Winkeln nsm, $n'sm'$ sind so wohl die in, als die um die Figuren $amns$, $am'n's$ beschriebenen Kreissectoren nsr, $n'sr'$, osm, $o'sm'$ proportional; folglich verhält sich die Summe aller $\left\{\begin{matrix}\text{in} \\ \text{um}\end{matrix}\right\}$ die Figur asn beschriebenen Kreissectoren zu der Summe aller $\left\{\begin{matrix}\text{in} \\ \text{um}\end{matrix}\right\}$ die Figur asn' beschriebenen, wie $f : g$ (V, 12.), und daher auch der Sector ans zu dem Sector $an's = f : g$. Da nun die Sectoren ams, ans der Zeit proportional wachsen (§. 271.); so wachsen auch die Sectoren $am's$, $an's$ der Zeit proportional, und die krumme

Linie $am'n'q$ kann mit einer gegen den gegebenen Punkt s gerichteten Centripetalkraft beschrieben werden.

Man lege an den Punkt s der Linie sm, und auf derjenigen Seite derselben, auf welcher sa in Beziehung auf sm liegt, den Winkel $m'sa' = msa$, mache $sa' = sa$, und beschreibe an der geraden Linie sa' die krumme Linie $a'm'p'$, welche der amp gleich und ähnlich sey; so wird diese durch den Punkt m' der krummen Linie $am'q$ gehen. Wenn also ein zweyter Körper m' den Umfang der Figur $a'm'p'$ so durchlauft, daß er den Bogen $a'm'$ in derselben Zeit beschreibt, in welcher der Körper m von a nach m gekommen ist und zugleich die Figur in der erweiterten Ebene der ersteren sich um den Punkt s so dreht, daß $asm' : \left\{\begin{matrix} asm \\ a'sm' \end{matrix}\right\} = g : f$ ist; so wird er in der unbeweglichen Ebene der Bogen am' der Bahn $am'q$ in derselben Zeit beschreiben, in welcher er mit seiner relativen Bewegung in der sich drehenden Ebene den Bogen $a'm'$, und der Körper m den gleichen und ähnlichen Bogen am der ruhenden Bahn beschrieben hat.

Um nun die Centripetalkraft zu finden, mit welcher der Körper m' die bewegliche Bahn $a'm'p'$ beschreiben kann, suche man die Centripetalkraft, mit welcher von eben diesem Körper die krumme Linie $am'q$ in einer unbeweglichen Ebene kann beschrieben werden. Es seyen asm und asm' in gleichen Zeiten von den zwey Körpern m und m' in der unbeweglichen Ebene beschriebene Winkel, und asn, asn' seyen ebenfalls in einerley Zeit beschrieben. Da so wohl $asm : asm'$, als asn zu asn' sich wie $f : g$ verhält; so ist $msn : m'sn' = f : g$, mithin auch die Geschwindigkeit von m nach einer auf sm senkrechten Richtung zu der Geschwindigkeit von m' nach einer auf sm' senkrechten Richtung $= f : g$. Folglich wird die Centripetalkraft, vermöge welcher der Körper m um s als Mittelpunkt einen Kreis in der Distanz sm beschreiben könnte, zu der Centripetalkraft, mit welcher der Körper m' in eben diesem Kreis sich bewegen könnte, sich verhalten wie das Quadrat der ersteren Geschwindigkeit zu dem Quadrat der letzteren (§ 273 n. 1.), d. i. wie $f^2 : g^2$, und eben dieses Verhältniß werden die diesen Kräften entgegengesetzte

Kräfte, d. i. die Schwungkräfte der zwey Kreisbewegungen zu einander haben. Wenn nun der Körper m ſich dem Mittelpunkt der Kraft während der Beſchreibung des Winkels msn nähert; ſo muß die Centripetalkraft, welche ihn die krumme Linie amn beſchreiben macht, von m bis n größer als die Schwungkraft, oder größer als die zur Beſchreibung des Kreisbogens mo erforderliche Kraft ſeyn. Weil aber $sn' = su$ ſeyn, mithin der Körper m', während er den Winkel $m'sn'$, und der Körper m den Winkel msn beſchreibt, ſich dem Mittelpunkt der Kraft um eben ſo viel nähern ſoll, als der Körper m; ſo muß in gleichen Entfernungen von dem Mittelpunkt der Kraft die Differenz der Schwungkräfte der Differenz der Centripetalkräfte gleich ſeyn. Ebenſo verhält es ſich, wenn der Körper m' ſich von dem Mittelpunkt der Kraft entfernt. Man bezeichne die Schwungkräfte der Bewegung von m' in den Diſtanzen sm' und sa mit x' und x, und die Schwungkräfte der Bewegung von m in den beziehungsweiſe gleichen Diſtanzen sm und sa mit k' und k; ſo verhält ſich

$$x' : x = \overline{sa}^3 : \overline{sm'}^3 \text{ (n. 2.)}$$
$$= \overline{sa}^3 : \overline{sm}^3$$
$$= k' : k \text{ (n. 2.)}$$

mithin $x' - k' : x - k = \overline{sa}^3 : \overline{sm'}^3$.

Da nun $x : k =$ Quadr. der Geſch. von m' : Quadr. der Geſchw. von m (§. 273. n. 1.);

$$= g^2 : f^2;$$

ſo iſt $x - k : k = g^2 - f^2 : f^2$, und daher

3.) $x' - k' : k = (g^2 - f^2)\,\overline{sa}^3 : f^2 . \overline{sm}^3$, oder es iſt die Differenz der Schwungkräfte, mithin auch die Differenz der Centripetalkräfte, mit welchen gleiche und ähnliche Bahnen in gleichen Zeiten, die eine in einer ruhenden, die andere in einer um den Mittelpunkt der Kräfte ſich drehenden Ebene beſchrieben werden können, umgekehrt dem Würfel der Entfernung von dem Mittelpunkt der Kräfte proportional *). Wenn $g > f$ iſt; ſo iſt $x' > k'$, alſo die Centripetalkraft in der ruhenden Bahn kleiner als in der beweglichen, welche

*) Princ. L. I. prop. XLIV.

sich in diesem Fall nach derselben Richtung dreht, nach welcher der Körper m' in derselben umlauft. Umgekehrt verhält es sich, wenn $g < f$ ist. Man hat alsdenn die Proportion

$$k' - x' : = (f^2 - g^2)\,\overline{sa}^3 : f^2.\overline{sm}^3.$$

Wenn die Körper sich von dem Mittelpunkt der Kräfte entfernen; so muß in beyden Bahnen der Ueberschuß der Schwungkraft über die Centripetalkraft in gleichen Entfernungen von dem Mittelpunkt der Kraft gleich groß seyn, und der Beweis wird wie vorhin geführt.

Wenn sich die Ebene, in welcher der Körper m sich bewegt, sich selbst parallel so fortbewegt, daß der Mittelpunkt s der Kräfte gleichförmig eine gerade Linie beschreibt; so wird dadurch seine Bahn in dieser beweglichen Ebene nicht geändert (§. 296.). Folglich bleibt auch die Bahn $am'q$ des Körpers m' in dieser Ebene, und seine Bahn in einer um den Punkt s sich drehenden, und mit diesem Punkt zugleich fortrückenden Ebene dieselbe wie vorhin. Man wird daher in der Folge die Ebene, in welcher sich ein Körper bewegt, als ruhend betrachten, wenn sie keine drehende Bewegung hat.

§. 317. Der Körper m beschreibe um s als Brennpunkt eine Ellipse, deren große Axe $= ap$, Parameter $= L$, und von dem Brennpunkt s entferntester Scheitel a sey. In diesem Fall ist die Centripetalkraft in der ruhenden Ellipse umgekehrt dem Quadrat der Entfernung proportional (§. 274. 277.), und in dem Scheitel a der Kraft gleich, vermöge welcher mit derjenigen Geschwindigkeit, welche der in der Ellipse sich bewegende Körper in a hat, ein Kreis könnte beschrieben werden, dessen Halbmesser $= L$ ist, weil dieser Kreis mit der Ellipse in a einerley Krümmung hat (Kegelschn. II, 35. Zus. 1.), und die Centripetalkraft in diesem Kreis der Centripetalkraft in der Ellipse an dem Punkt a gleich ist (§. 276. u. 6.). Man setze die der Entfernung sa entsprechende Centripetalkraft in der unbeweglichen Ellipse $= mk.\frac{a^2}{\overline{sa}^2}$, so daß sie in der Entfernung $a = m.k$, und in der Ent-

fernung $sm = m.k.\frac{a^2}{sm^2}$ werde, und es werde, wie in dem vorhergehenden §. diejenige Kraft mit h bezeichnet, vermöge welcher um s als Mittelpunkt in der Entfernung sa ein Kreis mit derjenigen Geschwindigkeit könnte beschrieben werden, welche der in der Ellipse umlaufende Körper in a hat; so wird sich verhalten

$$h : m.k.\frac{a^2}{sa^2} = L : sa \text{ (§. 273. n. 1.)},$$

Aber $x' - h' : h = (g^2 - f^2)sa^3 : f^2.\overline{sm'}^3$ (n. 316. n. 3.);

folglich $x' - h' : m.k.a^2 = (g^2 - f^2)L : f^2.\overline{sm'}^3$,

und daher ist der Ueberschuß der Centripetalkraft in der beweglichen Ellipse über die Centripetalkraft in der unbeweglichen in der Distanz sm' oder sm

$$= m.k.\frac{g^2 - f^2}{f^2} \cdot \frac{a^2.L}{sm^3}.$$

Die Centripetalkraft in der unbeweglichen Ellipse ist aber in eben dieser Distanz $= m.k.\frac{a^2}{sm^2}$; folglich ist die ganze Centripetalkraft, vermöge welcher die bewegliche Ellipse, oder in einer unbeweglichen Ebene die krumme Linie $am'n'q$ kann beschrieben werden, in der Entfernung sm' von dem Mittelpunkt der Kräfte

$$= m.k.a^2\left(\frac{1}{sm^2} + \frac{g^2 - f^2}{f^2} \cdot \frac{L}{sm^3}\right),$$

welche also aus zwey Theilen besteht, von welchen der eine umgekehrt dem Quadrat, der andere umgekehrt dem Würfel der Entfernung proportional ist. Der zweyte Theil ist positiv, wenn $g > f$, und die Apsidenlinie mit dem Körper nach einerley Richtung sich bewegt, aber negativ, wenn $g < f$ ist, und die Richtung der Bewegung der Apsidenlinie der Richtung der Bewegung des Körpers entgegengesetzt ist.

§. 318. Es sey die halbe große Axe der beweglichen Ellipse $= a'$, und der Radius Vector $\left.\frac{sm'}{r}\right\} = a'(1 + x)$, wo x eine veränderliche von dem Winkel des Radius Vector

mit der großen Axe abhängende Zahl bezeichnet, welche positiv oder negativ ist, je nachdem $r >$ oder $<$ als a' ist; so wird $sm'^2 = a'^3(1+x)^3 = a'^3(1+3x+3x^2+x^3)$, und $\frac{1}{sm'^3} = \frac{1}{a'^3}(1-3x+6x^2-$ &c.). Wenn nun die Ellipse wenig von einem Kreis abweicht; so ist x ein kleiner Bruch, dessen Quadrate und höhere Potenzen in Vergleichung mit dem Werth des Bruchs x selbst sehr klein seyn werden. Folglich ist in diesem Fall die Veränderung des zweyten Theils der Centripetalkraft, welcher die Bewegung der Apsidenlinie hervorbringt, sehr nahe der Veränderung der Radius Vector proportional. Ebenso findet sich $\frac{1}{sm'^4} = \frac{1}{a'^4}(1-4x+10x^2-$ &c.), und es ist wiederum, wenn x ein kleiner Bruch ist die Veränderung eine Centripetalkraft, welche umgekehrt der vierten Potenz des Radius Vector proportional ist, den kleinen Veränderungen des Radius Vector proportional. Hieraus folgt, daß, wenn zu einer Centripetalkraft, welche umgekehrt dem Quadrat der Entfernung proportional ist, eine neue nach einem anderen Gesetz sich richtende Kraft hinznkommt, und die vermöge der ersteren beschriebene Ellipse wenig von einem Kreis verschieden ist, die mit der zusammengesetzten Centripetalkraft beschriebene krumme Linie einer beweglichen Ellipse sich nähern werde. Nun nimmt aber der zweyte umgekehrt dem Würfel der Entfernung proportionale Theil der zur Beschreibung einer beweglichen Ellipse erforderlichen Centripetalkraft ab, wenn die Entfernung wächst; folglich wird sich die Apsidenlinie vor oder rückwarts bewegen, je nachdem der zweyte Theil der Centripetalkraft mit der Zunahme der Entfernung abnimmt oder wächst.

Um wieder auf die Bahn des Monds um die Erde, welche Veranlassung zu dieser Untersuchung gegeben hat, zurückzukommen; so ist diese im Mittel genommen eine wenig excentrische Ellipse, auf welche das, was so eben bemerkt worden ist, kann angewendet werden. Durch die Attraction der Sonne wird die Schwere des Monds gegen die Erde in den Syzygien bald vermindert, und in den Quadraturen

vergrößert (§. 308. 312.); folglich muß ſich die Apſidenlinie der Mondsbahn im erſten Fall vorwarts, im letzteren rückwarts bewegen. Da aber die Verminderung der Schwere des Monds in den Syzygien das doppelte der Vermehrung in den Quadraturen, und die Summe aller Verminderungen größer als die Summe aller Vermehrungen während eines halben ſynodiſchen Monats iſt; ſo muß auch die Summe aller directen Bewegungen der Apſidenlinie größer ſeyn, als die Summe der retrograden, und daher die Apſidenlinie der Mondsbahn mit den Beobachtungen übereinſtimmend im Ganzen eine directe Bewegung haben, oder die Punkte, in welchen der Mond ſeine gröſte und kleinſte Geſchwindigkeit hat, werden nach und nach anderen nach derjenigen Seite hin liegenden Fixſternen entſprechen, nach welcher ſich der Mond um die Erde bewegt. Der Mond wird zwar, weil die von der Sonne herrührende Veränderung der auf ihn wirkenden Centripetalkraft nicht umgekehrt dem Würfel ſeiner Entfernung von der Erde proportional iſt, nicht genau eine ſich drehende Ellipſe beſchreiben, ſondern es werden ſich auch von dieſer Abweichungen zeigen müſſen, welches ebenfalls mit den Beobachtungen übereinſtimmt, vermöge welcher die bewegliche Ellipſe nur das Mittel hält zwiſchen den übrigen kleineren Ungleichheiten der Bewegungen des Monds (§. 213.).

§. 319. Die Schwere des Monds gegen die Erde wird durch die Attraction der Sonne vermindert um $\frac{1}{2}.\frac{M.a^2kr}{R^3}+\frac{3}{2}.\frac{M.a^2kr}{R^3}\text{Cos.}2D$ (§. 312. n. 2.), in welchem Ausdruck M die Maſſe der Sonne, oder genauer die Summe dieſer und der Erdmaſſe (§. 308.), a die mittlere Entfernung der Erde von der Sonne, r und R die wahren Entfernungen des Monds und der Sonne von von der Erde, $M.k$ die Kraft, mit welcher die Sonne und die Erde in der Diſtanz a einander anziehen, und D den Winkel SEM (Fig. 130.) bezeichnet, welchen der Radius Vector der Erde mit dem des Monds einſchließt. Wird wie bisher die Erdmaſſe oder genauer, die Summe dieſer und der Maſſe des Monds $= m$ geſetzt; ſo iſt die Kraft, mit welcher der Mond und die Erde in der Diſtanz r einander anziehen, $= \frac{ma^2k}{r^2}$, und daher

die ganze Centripetalkraft in der relativen Bahn des Monds um die Erde

$$= \frac{ma^2k}{r^2} - \tfrac{1}{2}\frac{Ma^2kr}{R^3} - \tfrac{3}{2}\frac{Ma^2kr}{R^3}\,\text{Cos. } 2D$$

$$= \frac{ma^2k}{r^2}\left(1 - \tfrac{1}{2}\frac{M}{m}\frac{r}{R^3} - \tfrac{3}{2}\frac{M}{m}\frac{r}{R^3}\,\text{Cos. } 2D\right).$$

Das dritte Glied bringt eine periodiſche nach einem halben ſynodiſchen Monat in derſelben Ordnung wiederkehrende Veränderung dieſer Kraft hervor, und die von r und R allein abhängende Veränderung iſt

$$\frac{ma^2k}{r^2}\left(1 - \tfrac{1}{2}\frac{M}{m}\frac{r}{R^3}\right), \text{ oder } \frac{ma^2k}{r^3}\left(r - \tfrac{1}{2}\frac{M}{m}\frac{r^4}{R^3}\right).$$

Wäre die Bahn des Monds eine nach dem §. 317. angegebenen Geſetz ſich drehende Ellipſe; ſo müßte die Centripetalkraft ſeyn

$$\frac{ma^2k}{r^2}\left(1 + \frac{g^2-f^2}{f^2}\frac{L}{r}\right) \text{ (§. 317.) oder } \frac{ma^2k}{r^3}\left(r + \frac{g^2-f^2}{f^2}L\right).$$

Die Centripetalkräfte in dieſen zwey Bahnen verhalten ſich alſo in einerley Diſtanz r zu einander wie $r - \frac{1}{2}\frac{M}{m}\frac{r^4}{R^3} : r + \frac{g^2-f^2}{f^2}L$, oder, wenn man $r = a(1+x)$ ſetzt, und wegen der Kleinheit der Zahl x ihre Quadrate und höhere Potenzen wegläßt, wie $a' + a'x - \frac{1}{2}\frac{M}{m}\frac{a'^4}{R^3} - 2\frac{M}{m}\frac{a'^3x}{R^3} : a' + a'x + \frac{g^2-f^2}{f^2}L$, welches Verhältniß, wenn der Mond in ſeiner mittleren Entfernung a' von der Erde ſich befindet, alſo $x = 0$ iſt, dem Verhältniß von $a' - \frac{1}{2}\frac{M}{m}\frac{a'^4}{R^3} : a' + \frac{g^2-f^2}{f^2}L$, oder von $1 - \frac{1}{2}\frac{M}{m}\left(\frac{a'}{R}\right)^3 : 1 + \frac{g^2-f^2}{f^2}\frac{L}{a'}$ gleich wird. Sollen nun die zwey Bahnen einander ähnlich ſeyn; ſo muß auch in den übrigen Punkten das Verhältniß der Centripetalkräfte daſſelbe bleiben, und daher das Verhältniß ihrer gleich großen Veränderungen der Diſtanzen entſprechenden Zu- und Abnahmen eben dieſem Verhältniß gleich ſeyn. Folglich wird, wenn man zur Abkürzung die Größe $\frac{M}{m}\left(\frac{a'}{R}\right)^3 = Q$ ſetzt, ſich verhalten müßen

$$1 - \tfrac{1}{2}Q : 1 + \frac{g^2-f^2}{f^2}\frac{L}{a'} = a'x - 2Qa'x : a'x$$

$$= 1 - 2Q : 1,$$

oder, weil der halbe Parameter L der Mondsbahn nahe der halben großen Axe derſelben gleich iſt,

$$1 - \tfrac{1}{2}Q : \frac{g^2}{f^2} = 1 - 2Q : 1,$$

$1 - \frac{1}{2}Q : 1 - 2Q = g^2 : f^2$.

Es iſt aber, wenn man die ſideriſchen Umlaufszeiten der Erde und des Monds mit T und t bezeichnet, vermöge der Proportion §. 308. der mittlere Werth von $Q = \frac{t^2}{T^2} = \frac{1}{178,723}$, weil in dem Ausdruck von Q die Größe M eigentlich die Summe der Maſſen der Sonne und der Erde iſt; folglich iſt $g^2 > f^2$, und die Apſidenlinie des Monds hat eine vorwärts gehende Bewegung (§. 316.). Und da nach eben dieſem §. der Winkel asm' (Fig. 133.), welchen der Mond in einer unbeweglichen Ebene beſchreibt, ſich zu dem Winkel asm oder $a'sm'$ wie $g : f$ verhält; ſo verhält ſich $asm' : asa' = g : g - f$, und es iſt die mittlere ſideriſche Bewegung der Apſidenlinie in einem ſideriſchen Monat $= \frac{g-f}{g}$ 360 Graden, und in einem Sternjahr $= \frac{g-f}{g} \cdot \frac{T}{t}$ 360 Grade. Weil nun $g^2 : f^2 = 1 - \frac{1}{2}Q : 1 - 2Q = 1 : (1 - 2Q)(1 + \frac{1}{2}Q + \frac{1}{4}Q^2 + \&c.) = 1 : 1 - \frac{3}{2}Q(1 + \frac{1}{2}Q)$, alſo nahe $g : f = 1 : 1 - \frac{3}{4}Q(1 + \frac{7}{8}Q)$, und $g : g - f = 1 : \frac{3}{4}Q(1 + \frac{7}{8}Q)$; $= 1 : \frac{3}{4}\frac{t^2}{T^2}\left(1 + \frac{7}{8}\frac{t^2}{T^2}\right)$; ſo iſt die mittlere ſideriſche Bewegung der Apſidenlinie des Monds in einem ſideriſchen Jahr $= 270 \cdot \frac{t}{T}\left(1 + \frac{7}{8}\frac{t^2}{T^2}\right)$ Graden $= 20° 17' 43''$, welche nach den Beobachtungen $40° 40' 38'',6$, mithin mehr als noch einmal ſo viel beträgt.

§. 320. Vermöge der Newtoniſchen Theorie der allgemeinen Schwere muß alſo die Apſidenlinie der Mondsbahn eine vorwärts gehende Bewegung haben, wie man durch die Beobachtungen gefunden hat. Allein Newton*) ſelbſt, und nach ihm Clairaut **), Euler und d'Alembert fanden aus der Theorie dieſe Bewegung nur ungefähr halb ſo groß, als ſie nach den Beobachtungen iſt. Clairaut ſchloß hieraus, daß die Anziehung im directen Verhältniß der Maſſen und im umgekehrten der Quadrate der Entfernungen nicht die Urſache aller derjenigen Bewegungen ſeyn könne, welche wir an den Himmelskörpern beobachten. Auf der andern Seite ſchien es ihm wegen der genauen Uebereinſtimmung der auf dieſes Attractions-Geſetz ſich gründenden Theorie mit einer großen Anzahl anderer Erſcheinungen ſchwer zu

*) Princ. L. I. prop. XLV. Cor. 2.

**) Mém. de l'Acad. Roy. d. Sc. 1745.

seyn, sie zu verwerfen. Er nahm also an, daß die Attraction in der Natur zwar statt finde, aber ein anderes als das von Newton aufgestellte Gesetz befolge, und aus zwey Theilen, einem umgekehrt dem Quadrat der Distanz proportionalen, und einem mit der Abnahme der Distanz in einem größeren Verhältniß wachsenden Theil bestehe, als das Quadrat der Entfernung abnehme, welcher letztere in den grossen Abständen der Planeten von der Sonne unmerklich sey, und nur in kleineren Distanzen, wie z. B. in der Entfernung des Monds von der Erde bemerkbar werde. Diesen zweyten Theil kann man so bestimmen, daß die Bewegung der Apsidenlinie des Monds mit den Beobachtungen übereinstimmend herauskommt, und er zugleich in der Entfernung der Planeten von der Sonne so klein wird, daß kein Unterschied zwischen den das einfache Newtonische Gesetz der Attraction erfordernden keplerischen Regeln und der mittelst dieses zusammengesetzten Attractionsgesetzes berechneten Bewegungen der Planeten beobachtet werden kann. Zugleich müßte das neue Attractionsgesetz, welches an die Stelle des Newtonischen gesetzt werden soll, so beschaffen seyn, daß die Attraction in sehr kleinen Distanzen nicht zu groß, und besonders die Schwere an der Oberfläche der Erde nicht zu groß wird in Beziehung auf diejenige, welche der Mond gegen die Erde hat.

Ein Jahr später fand Clairaut, daß er bey seiner ersten Berechnung nicht aufmerksam genug auf diejenigen Gröss sen war, welche zwar wegen ihrer Kleinheit ohne merklichen Fehler scheinen vernachläßigt werden zu können, aber bey der weiteren Ausführung des Calculs einen beträchtlichen Einfluß auf die Endresultate haben *), und machte die wichtige Bemerkung, daß eine genauer geführte Berechnung die Bewegung der Apsidenlinie des Monds vollkommen mit den Beobachtungen übereinstimmend gebe **). Euler ***) und d'Alembert fanden dasselbe, und die von La Place nach der

*) S. §. 314. pag. 557. u. 558.

**) Mem. de l'Acad. de scienc. 1748. De l'orbite de la Lune par *M. Clairaut*. Dep. à l'Acad. le 21. Janv. et lu le 15. Mars. 1752.

***) Theoria motus Lunæ Auctore *L. Eulero*. Petrop. 1753. Cap. VIII. §. 138.

Newtoniſchen Theorie der allgemeinen Schwere berechnete Bewegung jener Apſidenlinie iſt von der beobachteten nur um den vierhundert und vierzigſten Theil der letzteren verſchieden *).

§. 321. Es iſt in dem 308ten und 312ten §. gezeigt worden, daß die Schwere des Monds gegen die Erde durch die Attraction der Sonne im Mittel genommen um ihren 358 Theil vermindert wird. In derjenigen Diſtanz, in welcher er ſich wirklich um die Erde bewegt, iſt ſeine Schwungkraft bald kleiner, bald größer, als ſeine verminderte Schwere gegen die Erde, weswegen er ſich im erſten Fall der Erde nähert, im letzten ſich wieder von ihr entfernt, und ohne auf die übrigen Störungen Rückſicht zu nehmen, eine Ellipſe beſchreibt, deren halbe große Axe dem Halbmeſſer eines Kreiſes gleich iſt, welchen er mit ſeiner mittleren Geſchwindigkeit vermöge jener verminderten Schwere gegen die Erde beſchreiben könnte. Ohne dieſe Verminderung würde er ſich in einer kleineren Diſtanz um die Erde bewegen müßen, weil nun der Ueberſchuß ſeiner Schwere gegen die Erde über die Schwungkraft ſeiner mittleren kreisförmigen Bewegung eine Annäherung gegen die Erde zur Folge haben würde. Der Mond lauft alſo in einer größeren Diſtanz um die Erde, als diejenige iſt, welche ſeiner Schwere gegen die Erde allein entſprechen würde. Da aber die perturbirende Kraft der Sonne, von welcher hier die Rede iſt, in der Richtung des Radius Vector des Monds wirkt; ſo wird dadurch der Inhalt des in einer gegebenen Zeit beſchriebenen Sectors nicht geändert (§. 271.). Folglich muß, damit die in gleichen Zeiten beſchriebenen Sectoren ſeiner wirklichen Bahn, und derjenigen, welche er ohne die Einwirkung der Sonne beſchrieben haben würde, einander gleich werden, der Bogen des erſteren ſich zu dem Bogen des letzteren verhalten, wie ſein verminderter mittlerer Abſtand r' von der Erde zu ſeinem wirklichen mittleren Abſtand r von der Erde, oder, weil dieſen in gleichen Zeit beſchriebenen Bogen die Geſchwindigkeiten, mit welchen ſie beſchrieben werden, proportional

*) Mécan. cél. T. III. Livre VII. Chap. I. n. 16. pag. 236.

ſind (§. 231.), wird ſeine wirkliche mittlere Geſchwindigkeit v ſich zu der mittleren Geſchwindigkeit v' ſeiner Bewegung, welche er ohne die Einwirkung der Sonne haben würde, verhalten wie $r' : r$. Die zu dieſen Bewegungen erforderlichen Centripetalkräfte ſind aber (§. 273 n. 1.) im zuſammengeſetzten Verhältniß aus dem directen der Quadrate der Geſchwindigkeiten, mithin hier aus dem Verhältniß von $r'^2 : r^2$, und aus dem umgekehrten der Halbmeſſer; folglich verhält ſich die verminderte Schwere des Monds gegen die Erde in der Diſtanz r zu ſeiner unverminderten Schwere gegen die Erde in der Diſtanz r' wie $r'^3 : r^3$. Aber vermöge des Newtoniſchen Gravitationsgeſetzes verhält ſich die unverminderte Schwere gegen die Erde in der Diſtanz r' zur unverminderten Schwere in der Diſtanz r wie $r^2 : r'^2$; folglich verhält ſich die durch die Attraction der Sonne verminderte Schwere des Monds gegen die Erde in der Diſtanz r zu ſeiner Schwere, welche er ohne die Einwirkung der Sonne in eben dieſer Diſtanz gegen die Erde haben würde $= r : r$. Da nun in den mittleren Entfernungen der Sonne und des Monds von der Erde das erſtere Verhältniß dem von 357,446 : 358,446 gleich iſt (§. 308.); ſo verhält ſich der wirkliche Abſtand des Monds von der Erde zu demjenigen, welchen er ohne die Attraction der Sonne haben würde, wie 358,446 : 357,446, und ſeine mittlere Geſchwindigkeit v verhält ſich zu ſeiner mittleren Geſchwindigkeit v' mit welcher er ſich ohne die Attraction der Sonne um die Erde würde bewegt haben, wie 357,446 : 358,446, weil vermöge des oben bewieſenen dieſes Verhältniß dem von $r' : r$ gleich iſt. Endlich weil ſeine Winkelgeſchwindigkeit in demſelben Verhältniß kleiner wird, in welchem ſein Abſtand von der Erde wächst; ſo verhält ſich die mittlere Winkelgeſchwindigkeit u des Monds zu derjenigen Winkelgeſchwindigkeit u', welche er ohne die Einwirkung der Sonne gehabt haben würde im Mittel wie $(357{,}446)^2 : (358{,}446)^2$ Alſo iſt durch die Attraction der Sonne der mittlere Abſtand des Monds von der Erde um ſeinen 358,446ten Theil vergrößert, und ſeine mittlere Winkelgeſchwindigkeit um $(\frac{358}{357},\frac{446}{446})^2 - 1$ ihrer Größe, d. i. nahe um ihren 178,723ten Theil vermin-

dert, weil $(\frac{358,446}{357,446})^2 = (1 + \frac{1}{357,446})^2$ nahe $= 1 + \frac{2}{357,446} = 1 + \frac{1}{178,723}$ iſt.

Nun iſt aber die Verminderung der Schwere des Monds gegen die Erde durch die Attraction der Sonne umgekehrt dem Würfel des Abſtands der Sonne von der Erde proportional (§. 308. oder 312.); folglich verändern ſich die ſo eben angegebene Zahlen 178,723 und 358,446 mit dem Würfel dieſes Abſtands, und zugleich die Entfernung des Monds von der Erde und ſeine Winkelgeſchwindigkeit, ſo daß die Bahn des Monds ſich erweitert, wenn die Erde ſich der Sonne nähert, und ſich wiederum zuſammenzieht, wenn der Abſtand der Erde von der Sonne größer als der mittlere wird, und im erſten Fall die Winkelgeſchwindigkeit des Monds abnimmt, im letzteren aber wächst, woraus diejenige Ungleichheit der Mondsbewegung entſteht, welche man die jährliche Gleichung nennt (§. 69.). Das in dem angeführten §. angegebene Geſetz dieſer Ungleichheit ergiebt ſich ſo. Die Veränderung der Geſchwindigkeit des Monds, welche durch die Attraction der Sonne hervorgebracht wird, iſt, wie man ſo eben geſehen hat, dem Würfel der Entfernung der Sonne von der Erde umgekehrt proportional. Die Geſchwindigkeiten der Erde in ihrer Bahn nach den auf den Radius *ca*, *cm* (Fig. 132.) ſenkrechten Richtungen *ad* und *mo* verhalten ſich umgekehrt wie die Radii Vectores (Siehe den Bew. von n. 1. §. 316.), und daher ſind die Winkelgeſchwindigkeiten der Bewegung der Erde um die Sonne, oder die Winkelgeſchwindigkeiten der ſcheinbaren Bewegung der Sonne, umgekehrt den Quadraten der Abſtände der Sonne von der Erde proportional. Seyen die Winkelgeſchwindigkeiten der Sonne in ihrer mittleren zur Einheit angenommenen Entfernung von der Erde, und den Entfernungen R, $R+x$, beziehungsweiſe C, U, U'; ſo wird man haben $U = \frac{C}{R^2}$; $U' = \frac{C}{(R+x)^2}$, und $U - U' = \frac{Cx\,(2R+x)}{R^2(R+x)^2}$

$= \frac{2Cx}{R^3} \cdot \frac{1 + \frac{x}{2R}}{\left(1+\frac{x}{R}\right)^3}$, welche Veränderung ſich der Größe $\frac{2Cx}{E}$

desto mehr nähert, je kleiner x in Vergleichung mit R wird. Diese Winkelgeschwindigkeit der Sonne verändert sich stetig, und die augenblickliche Veränderung derselben ist umgekehrt dem Würfel der Entfernung der Sonne von der Erde proportional. In eben diesem Verhältniß verändert sich aber auch die Winkelgeschwindigkeit des Monds; folglich ist die jährliche Gleichung des Monds der Mittelpunktsgleichung der Sonne proportional.

Die Größe dieser Ungleichheit der Mondsbewegung kann auf folgende Art näherungsweise bestimmt werden. Der kleinste Abstand der Sonne von der Erde ist um 0,01679435 oder nahe um $\frac{1}{60}$ kleiner als der mittlere zur Einheit angenommene (§. 191.); folglich ist der Würfel des kleinsten Abstands nahe um $\frac{3}{60}$ oder $\frac{1}{20}$ kleiner als der Würfel des mittleren, und daher, wenn die Erde im Perihelio ist, die Verminderung der Winkelgeschwindigkeit des Monds um $\frac{1}{20}$ größer, als in der mittleren Distanz, wo diese Verminderung $\frac{1}{178,723}$ der mittleren Winkelgeschwindigkeit des Monds ausmacht. Mithin ist, wenn sich die Erde im Perihelio befindet, die Winkelgeschwindigkeit des Monds um $\frac{1}{3574,46}$ kleiner als die mittlere. Und da die Winkelgeschwindigkeiten der Erde oder der Sonne in ihrem kleinsten und mittleren Abstand von einander umgekehrt den Quadraten dieser Abstände, oder den Zahlen 1 und $1-\frac{1}{30}$ proportional sind; so ist die Winkelgeschwindigkeit der Sonne, wenn sie der Erde am nächsten ist, um $\frac{1}{30}$ größer als in ihrer mittleren Entfernung. Also verhält sich die Zunahme an Geschwindigkeit, welche die Sonne in ihrem kleinsten Abstand von der Erde erhält zu der gleichzeitigen Abnahme der mittleren Geschwindigkeit des Monds wie $\frac{1}{30}$ der mittleren Bewegung der Sonne zu $\frac{1}{3574,46}$ der mittleren Bewegung des Monds, oder wie 118,27 : 13,27 = 1 : 0,1122. Hienach verhielte sich die größte Mittelpunktsgleichung der Sonne (1° 55′ 32″ nach §. 167.) zu der jährlichen Gleichung des Monds wie 1 : 0,1122, und der größte Werth der letzteren wäre = 12′ 57″,8, nur um 1′ 46″ größer, als man aus den Beobachtungen gefunden hat, welcher Unter-

schied von den bey dieser Rechnung vernachläßigten Größen herrührt *).

§. 322. Die Secularglеichung (§. 70.) des Monds hat mit seiner jährlichen Gleichung eine ähnliche Ursache. Halley bemerkte zuerst diese Ungleichheit der Bewegung des Monds, und Dunthorn und Mayer haben sie durch eine genauere Untersuchung der älteren und neueren Beobachtungen bestätigt. Sie suchten dieselbe dadurch darzustellen, daß sie zu der mittleren Länge des Monds eine dem Quadrat der Anzahl der vor oder nach dem Jahr 1700 verfloßene Jahrhunderte proportionale Größe addirten. Nach Dunthorn ist diese Größe = 10″, Mayer setzte sie in seinen ersten Mondstafeln auf 7″, und in seinen neuen auf 9″. La Lande erhielt mit Dunthorn einerley Resultat. Zu der Erklärung dieser Ungleichheit schien die allgemeine Schwere nicht hinreichend zu seyn, und es zeigte sich hier eine ähnliche Schwierigkeit, wie bey der Bewegung der Apsidenlinie der Mondsbahn, welche ebenfalls durch die Theorie anfänglich nicht mit den Beobachtungen übereinstimmend gefunden wurde (§. 320.). Die Mathematiker haben sich viel mit diesem Gegenstand beschäftigt, aber ihre Bemühungen den Grund der Secularglеichung des Monds in den Wirkungen der Sonne und der Planeten auf den Mond, oder in der Abweichung der Gestalt der Erde und des Monds von einer genauen Kugel zu finden, blieben fruchtlos. Einige verwarfen diese Ungleichheit der Mondsbewegung, andere nahmen, um sie zu erklären zu verschiedenen Mitteln, z. B. zu den Wirkungen der Cometen, dem Widerstand des Mediums, in welchem sie die Himmelskörper sich bewegen ließen, oder zu der Hypothese ihre Zuflucht, daß die Schwere auf schon in Bewegung befindliche Körper nicht mehr mit derjenigen Stärke, wie auf ruhende Körper wirke. Indessen ist die Uebereinstimmung der anderen Phänomene der Himmelskörper mit der Theorie der allgemeinen Schwere so vollkommen, daß man nicht ohne Verdruß die Secularglеichung des Monds allein eine Ausnahme von einem allgemeinen und einfachen

*) La Place Exposit. du Système du Monde. pag. 222 et 223.

Geſetz kann machen ſehen, deſſen Entdeckung durch die Größe und Mannigfaltigkeit der Gegenſtände, welche es umfaßt, dem menſchlichen Geiſt ſo viele Ehre macht. Durch dieſe Betrachtung bewogen, unterſuchte La Place dieſes Phänomen aufs neue, und nach einigen Verſuchen glükte es ihm, die Urſache davon zu entdecken*). Die Secularglеichung des Monds hat ihren Grund in der Wirkung der Sonne auf dieſen Nebenplaneten, verbunden mit der Secularveränderung der Excentricität der Erdbahn. Daß die Excentricität der Erdbahn durch die Einwirkung der Planeten geändert werde, hatte man ſchon früher gefunden; folglich iſt auch die Secularglеichung des Monds eine Folge der allgemeinen Gravitation.

§. 323. Um nun zu zeigen, wie die Beſchleunigung der Bewegung des Monds mit der Abnahme der Excentricität der Erdbahn zuſammenhänge, wird man von dem §. 321. bewieſenen Satz ausgehen müſſen, daß die Wirkung der Sonne auf den Mond ſeine Winkelgeſchwindigkeit um ihren 179ſten Theil vermindert, und dieſe Verminderung umgekehrt dem Würfel des Abſtands der Erde von der Sonne proportional iſt. Setzt man die mittlere Entfernung der Erde von der Sonne $= a$, die der mittleren Anomalie A entſprechende Entfernung $= R$, und die Excentricität der Erdbahn $= e$; ſo findet ſich $\left(\frac{a}{R}\right)^3 = 1 + \frac{3}{2}e^2 + 3e\,\text{Cos.}\,A + \frac{9}{2}e^2\,\text{Cos.}\,2A + \text{\&c.}$ **). Folglich enthält der Ausdruck für die Verminderung der Winkelgeſchwindigkeit des Monds ein Glied, welches dem Produkt des 179 Theils dieſer Geſchwin-

*) Mém. de l'Acad. de Paris pour 1786. Erſchienen im Jahr 1788. Die erſte Nachricht von dieſer Entdeckung gab La Place der Akademie am 19ten Dec. 1787.

**) Durch die Entwicklung der Gleichung n. 1. §. 185. in eine Reihe findet man u, und Cos. u ausgedrückt durch e, $e2$ &c. und die Cosinus von m, $2m$, &c. woraus man mittelſt der Gleichung n. 2. erhält $\frac{r}{a} = 1 + \frac{1}{2}e^2 - (e - \frac{3}{4}e^3 - \text{\&c.})\,\text{Cos.}\,m - (\frac{1}{2}e^2 - \frac{1}{3}e^4 + \text{\&:})\,\text{Cos.}\,2m - (\frac{3}{8}e^3 - \text{\&c.})\,\text{Cos.}\,3m - \text{\&c.}$ Durch die Erhebung dieſer Reihe auf die Potenz -3 erhält man die oben angegebene Reihe für $\left(\frac{a}{r}\right)^3$.

schwindigkeit in $\frac{3}{2}e^2$ gleich ist. Von den übrigen Gliedern obiger Reihe hängt die §. 321. betrachtete jährliche Gleichung ab. Wäre e constant; so würde jenes Glied eine constante Verminderung der Winkelgeschwindigkeit des Monds geben, welche sich mit seiner mittleren Bewegung vermengen würde, so daß die mittlere Bewegung des Monds beständig von gleicher Größe müßte gefunden werden. Aber die sehr kleine Veränderung von e hat mit der Länge der Zeit einen sehr merklichen Einfluß auf die Bewegung des Monds, und man sieht, daß, wenn e abnimmt, die Geschwindigkeit des Monds um weniger vermindert, mithin seine Bewegung in Beziehung auf diejenige, welche er bey einem größeren Werth von e hatte, beschleunigt wird, welches von den uns bekannten Beobachtungen der Alten an bis auf gegenwärtige Zeit statt findet. Diese Beschleunigung wird in eine Verzögerung übergehen, wenn die Excentricität der Erdbahn ihr Minimum erreicht haben, und wieder zu wachsen anfangen wird.

Sey t die Anzahl der auf das Jahr 1800 folgenden Jahrhunderte; so ist nach §. 191. S. 300. die dem Jahr $1800+100t$ entsprechende Excentricität der Erdbahn unter der Voraussetzung, daß sie der Zeit proportional abnehme, $= 0{,}01679435 - 0{,}000041632t$, und die Abnahme ihres Quadrats in t Jahrhunderten $= 0{,}00000139836t - 0{,}000000001733222t^2$, welche ebenfalls wegen des kleinen Coefficienten von t^2 nahe der Zeit proportional ist. Folglich erhält die mittlere Winkelgeschwindigkeit des Monds in t Jahrhunderten einen Zuwachs, welcher dem Produkt des 179 Theils der mittleren Secularbewegung des Monds in $\frac{3}{2}.0{,}00000139836t$ gleich ist. Da nun nach Burg's Mondstafeln der Mond in 100 Julianischen Jahren oder in 36525 Tagen in Beziehung auf die Aequinoktialpunkte 1336 Umläufe und noch $10^3.7^\circ\,52'\,43'',7$ darüber, mithin in Beziehung auf die Fixsterne $1^\circ\,23'\,30''$ weniger (§. 38.), oder 1330 Uml. $+\,10^3.6^\circ\,29'\,13'',7$, d. i. 1732559353″,7 macht; so erhält die mittlere Winkelgeschwindigkeit des Monds in t Jahrhunderten einen Zuwachs von $20'',289829t$. Weil nun diese Geschwindigkeit der Zeit proportional wächst; so

ist nach den Gesetzen der gleichförmig beschleunigten Bewegung (§. 234.) der Zuwachs der mittleren Bewegung des Monds in t Jahrhunderten $= \frac{20'',289829}{2} t^2 = 10'',144914\, t^2$, welcher die Seculargleichung des Monds ist. La Place setzt die Abnahme des Quadrats der Excentricität der Erdbahn vom Jahr 1750 bis zum Jahr 1850 = 0,00000140595 *), und hienach wäre die Seculargleichung des Monds in dieser Zwischenzeit in dem Verhältniß von 140595 : 139836 größer, als die oben gefundene, mithin = 10'',199979.

So lange als man die Abnahme des Quadrats der Excentricität der Erdbahn der Zeit proportional wird voraussetzen können, wird die Seculargleichung des Monds nahe dem Quadrat der Zeit proportional wachsen. Aber die Excentricität der Erdbahn ändert sich nicht gleichförmig, so daß in dem Ausdruck der Abnahme des Quadrats der Excentricität der Coefficient von t^2 ebenfalls positiv wird. Hieraus entsteht das §. 70. angegebene zweyte dem Würfel der Zeit proportionale Glied der Seculargleichung, worauf man Rücksicht nehmen muß, wenn t groß ist.

Die Bewegungen der Knoten und der Apsidenlinie der Mondsbahn hängen ebenfalls von der Wirkung der Sonne auf den Mond ab, und ihre mittlere Bewegungen ändern sich aus einem ähnlichen Grund mit der Abnahme der Excentricität der Erdbahn. Hieraus entstehen die von La Place gefundenen Seculargleichungen der Länge des Knotens und der Erdnähe des Monds (§. 70.). Uebrigens sind alle diese Ungleichheiten, so wie die Veränderungen der Excentricität der Erdbahn, von welchen sie abhängen, periodisch, kommen aber erst nach Millionen von Jahren in derselben Ordnung wieder. Die Seculargleichung der Erdnähe des Monds, welche La Place durch die Theorie gefunden hat, wird, wie Bouvard und Bürg gefunden haben, durch die Beobachtungen bestätigt.

§. 324. Es ist merkwürdig, daß die Abnahme der Excentricität der Erdbahn in den Bewegungen des Monds

*) Expos. du Système du Monde, pag. 224.

viel merklicher ist, als in der Bewegung der Erde oder der scheinbaren Bewegung der Sonne. Diese Abnahme, welche von der ältesten uns bekannt gewordenen Finsterniß an die Mittelpunktsgleichung der Sonne nicht um 8 Minuten verändert hat, hat eine Veränderung von 1° 48′ in der Länge des Monds und von 7° in seiner mittleren Anomalie hervorgebracht. Wir sehen hier ein Beyspiel von der Art, wie die Phänomene, indem sie sich entwickeln, uns über ihre wahren Ursachen aufklären. Wäre allein die Beschleunigung der mittleren Bewegung des Monds bekannt; so könnte man sie dem Widerstand des Mittels, oder der successiven Fortpflanzung der Schwere zuschreiben. Aber die Analyse zeigt uns, daß diese zwey Ursachen keine merkliche Veränderung in den mittleren Bewegungen der Knoten und der Erdnähe des Monds hervorbringen können, und diß allein würde hinreichend seyn, um sie auszuschließen, selbst wenn die wahre Ursache der beobachteten Veränderungen jener Bewegungen noch unbekannt wäre. Die Uebereinstimmung der Theorie mit den Beobachtungen zeigt uns, daß, wenn die mittlere Bewegungen des Monds durch andere Ursachen als die allgemeine Gravitation verändert werden, ihr Einfluß sehr gering, und bis jetzt unmerklich ist.

Diese Uebereinstimmung beweist die Unveränderlichkeit der Dauer des mittleren astronomischen Tags, dieses wesentlichen Elements aller astronomischen Theorien. Wäre die Dauer eines Tags gegenwärtig um $\frac{1}{100}$ einer Sekunde größer, als zur Zeit des Hipparchs; so würden jetzt 36525 Tage oder 100 julianische Jahre um 365,25 Sekunden länger dauern, als zu jener Zeit. In 365,25 Sek. beschreibt aber der Mond einen Bogen von 200″,5; folglich würde dadurch die gegenwärtige Secularbewegung des Monds um 200″,5 vergrößert erscheinen. Nun ist nach dem vorhergehenden §. die Seculargleichung für 130 Jahre vor unserer Zeitrechnung $= 10'',1449.\overline{19,3}^2$, und für 30 Jahre vor dieser Epoche $= 10'',1449.\overline{18,3}^2$; folglich ist die Secularbewegung des Monds gegenwärtig um $10'',1449\,(\overline{19,3}^2 - \overline{18,3}^2)$ oder um $37,0 \times 10'',1449$ größer, als 130 Jahre vor C.

desto mehr nähert, je kleiner x in Vergleichung mit R wird. Diese Winkelgeschwindigkeit der Sonne verändert sich stetig, und die augenblickliche Veränderung derselben ist umgekehrt dem Würfel der Entfernung der Sonne von der Erde proportional. In eben diesem Verhältniß verändert sich aber auch die Winkelgeschwindigkeit des Monds; folglich ist die jährliche Gleichung des Monds der Mittelpunktsgleichung der Sonne proportional.

Die Größe dieser Ungleichheit der Mondsbewegung kann auf folgende Art näherungsweise bestimmt werden. Der kleinste Abstand der Sonne von der Erde ist um 0,01679435 oder nahe um $\frac{1}{60}$ kleiner als der mittlere zur Einheit angenommene (§. 191.); folglich ist der Würfel des kleinsten Abstands nahe um $\frac{3}{60}$ oder $\frac{1}{20}$ kleiner als der Würfel des mittleren, und daher, wenn die Erde im Perihelio ist, die Verminderung der Winkelgeschwindigkeit des Monds um $\frac{1}{20}$ größer, als in der mittleren Distanz, wo diese Verminderung $\frac{1}{178,723}$ der mittleren Winkelgeschwindigkeit des Monds ausmacht. Mithin ist, wenn sich die Erde im Perihelio befindet, die Winkelgeschwindigkeit des Monds um $\frac{1}{3574,46}$ kleiner als die mittlere. Und da die Winkelgeschwindigkeiten der Erde oder der Sonne in ihrem kleinsten und mittleren Abstand von einander umgekehrt den Quadraten dieser Abstände, oder den Zahlen 1 und $1 - \frac{1}{30}$ proportional sind; so ist die Winkelgeschwindigkeit der Sonne, wenn sie der Erde am nächsten ist, um $\frac{1}{30}$ größer als in ihrer mittleren Entfernung. Also verhält sich die Zunahme an Geschwindigkeit, welche die Sonne in ihrem kleinsten Abstand von der Erde erhält zu der gleichzeitigen Abnahme der mittleren Geschwindigkeit des Monds wie $\frac{1}{30}$ der mittleren Bewegung der Sonne zu $\frac{1}{3574,46}$ der mittleren Bewegung des Monds, oder wie 118,27 : 13,27 = 1 : 0,1122. Hienach verhielte sich die gröste Mittelpunktsgleichung der Sonne (1° 55′ 32″ nach §. 167.) zu der jährlichen Gleichung des Monds wie 1 : 0,1122, und der größte Werth der letzteren wäre = 12′ 57″,8, nur um 1′ 46″ größer, als man aus den Beobachtungen gefunden hat, welcher Unter-

ſchied von den bey dieſer Rechnung vernachläßigten Größen herrührt *).

§. 322. Die Seculargleichung (§. 70.) des Monds hat mit ſeiner jährlichen Gleichung eine ähnliche Urſache. Halley bemerkte zuerſt dieſe Ungleichheit der Bewegung des Monds, und Dunthorn und Mayer haben ſie durch eine genauere Unterſuchung der älteren und neueren Beobachtungen beſtätigt. Sie ſuchten dieſelbe dadurch darzuſtellen, daß ſie zu der mittleren Länge des Monds eine dem Quadrat der Anzahl der vor oder nach dem Jahr 1700 verfloßene Jahrhunderte proportionale Größe addirten. Nach Dunthorn iſt dieſe Größe = 10″, Mayer ſetzte ſie in ſeinen erſten Mondstafeln auf 7″, und in ſeinen neuen auf 9″. La Lande erhielt mit Dunthorn einerley Reſultat. Zu der Erklärung dieſer Ungleichheit ſchien die allgemeine Schwere nicht hinreichend zu ſeyn, und es zeigte ſich hier eine ähnliche Schwierigkeit, wie bey der Bewegung der Apſidenlinie der Mondsbahn, welche ebenfalls durch die Theorie anfänglich nicht mit den Beobachtungen übereinſtimmend gefunden wurde (§. 320.). Die Mathematiker haben ſich viel mit dieſem Gegenſtand beſchäftigt, aber ihre Bemühungen den Grund der Seculargleichung des Monds in den Wirkungen der Sonne und der Planeten auf den Mond, oder in der Abweichung der Geſtalt der Erde und des Monds von einer genauen Kugel zu finden, blieben fruchtlos. Einige verwarfen dieſe Ungleichheit der Mondsbewegung, andere nahmen, um ſie zu erklären zu verſchiedenen Mitteln, z. B. zu den Wirkungen der Cometen, dem Widerſtand des Mediums, in welchem ſie die Himmelskörper ſich bewegen ließen, oder zu der Hypotheſe ihre Zuflucht, daß die Schwere auf ſchon in Bewegung befindliche Körper nicht mehr mit derjenigen Stärke, wie auf ruhende Körper wirke. Indeſſen iſt die Uebereinſtimmung der anderen Phänomene der Himmelskörper mit der Theorie der allgemeinen Schwere ſo vollkommen, daß man nicht ohne Verdruß die Seculargleichung des Monds allein eine Ausnahme von einem allgemeinen und einfachen

*) La Place Exposit. du Système du Monde. pag. 222 et 223.

Gesetz kann machen sehen, dessen Entdeckung durch die Größe und Mannigfaltigkeit der Gegenstände, welche es umfaßt, dem menschlichen Geist so viele Ehre macht. Durch diese Betrachtung bewogen, untersuchte La Place dieses Phänomen aufs neue, und nach einigen Versuchen glükte es ihm, die Ursache davon zu entdecken *). Die Seculargleichung des Monds hat ihren Grund in der Wirkung der Sonne auf diesen Nebenplaneten, verbunden mit der Secularveränderung der Excentricität der Erdbahn. Daß die Excentricität der Erdbahn durch die Einwirkung der Planeten geändert werde, hatte man schon früher gefunden; folglich ist auch die Seculargleichung des Monds eine Folge der allgemeinen Gravitation.

§. 323. Um nun zu zeigen, wie die Beschleunigung der Bewegung des Monds mit der Abnahme der Excentricität der Erdbahn zusammenhänge, wird man von dem §. 321. bewiesenen Satz ausgehen müssen, daß die Wirkung der Sonne auf den Mond seine Winkelgeschwindigkeit um ihren 179sten Theil vermindert, und diese Verminderung umgekehrt dem Würfel des Abstands der Erde von der Sonne proportional ist. Setzt man die mittlere Entfernung der Erde von der Sonne $= a$, die der mittleren Anomalie A entsprechende Entfernung $= R$, und die Excentricität der Erdbahn $= e$; so findet sich $\left(\frac{a}{E}\right)^3 = 1 + \frac{3}{2}e^2 + 3e\,\text{Cos.}\,A + \frac{9}{2}e^2\,\text{Cos.}\,2A + \text{\&c.}$ **). Folglich enthält der Ausdruck für die Verminderung der Winkelgeschwindigkeit des Monds ein Glied, welches dem Produkt des 179 Theils dieser Geschwin-

*) Mém. de l'Acad. de Paris pour 1786. Erschienen im Jahr 1788. Die erste Nachricht von dieser Entdeckung gab La Place der Akademie am 19ten Dec. 1787.

**) Durch die Entwicklung der Gleichung n. 1. §. 185. in eine Reihe findet man u, und Cos. u ausgedrückt durch e, $e2$ &c. und die Cosinus von m, $2m$, &c. woraus man mittelst der Gleichung n. 2. erhält $\frac{r}{a} = 1 + \frac{1}{2}e^2 - (e - \frac{3}{8}e^3 - \text{\&c.})\,\text{Cos.}\,m - (\frac{1}{2}e^2 - \frac{1}{3}e^4 + \text{\&c.})\,\text{Cos.}\,2m - (\frac{3}{8}e^3 - \text{\&c.})\,\text{Cos.}\,3m - \text{\&c.}$ Durch die Erhebung dieser Reihe auf die Potenz -3 erhält man die oben angegebene Reihe für $\left(\frac{a}{r}\right)^3$.

ſchwindigkeit in $\frac{3}{2}e^2$ gleich iſt. Von den übrigen Gliedern obiger Reihe hängt die §. 321. betrachtete jährliche Gleichung ab. Wäre e conſtant; ſo würde jenes Glied eine conſtante Verminderung der Winkelgeſchwindigkeit des Monds geben, welche ſich mit ſeiner mittleren Bewegung vermengen würde, ſo daß die mittlere Bewegung des Monds beſtändig von gleicher Größe müßte gefunden werden. Aber die ſehr kleine Veränderung von e hat mit der Länge der Zeit einen ſehr merklichen Einfluß auf die Bewegung des Monds, und man ſieht, daß, wenn e abnimmt, die Geſchwindigkeit des Monds um weniger vermindert, mithin ſeine Bewegung in Beziehung auf diejenige, welche er bey einem größeren Werth von e hatte, beſchleunigt wird, welches von den uns bekannten Beobachtungen der Alten an bis auf gegenwärtige Zeit ſtatt findet. Dieſe Beſchleunigung wird in eine Verzögerung übergehen, wenn die Excentricität der Erdbahn ihr Minimum erreicht haben, und wieder zu wachſen anfangen wird.

Sey t die Anzahl der auf das Jahr 1800 folgenden Jahrhunderte; ſo iſt nach §. 191. S. 300. die dem Jahr $1800+100t$ entſprechende Excentricität der Erdbahn unter der Vorausſetzung, daß ſie der Zeit proportional abnehme, $= 0{,}01679435 - 0{,}00004163 2t$, und die Abnahme ihres Quadrats in t Jahrhunderten $= 0{,}00000139836t - 0{,}00000000173322t^2$, welche ebenfalls wegen des kleinen Coefficienten von t^2 nahe der Zeit proportional iſt. Folglich erhält die mittlere Winkelgeſchwindigkeit des Monds in t Jahrhunderten einen Zuwachs, welcher dem Produkt des 179 Theils der mittleren Secularbewegung des Monds in $\frac{1}{2}.0{,}00000139836t$ gleich iſt. Da nun nach Burg's Mondstafeln der Mond in 100 Julianiſchen Jahren oder in 36525 Tagen in Beziehung auf die Aequinoktialpunkte 1336 Umläufe und noch $10^3.7^\circ\,52'\,43'',7$ darüber, mithin in Beziehung auf die Fixſterne $1^\circ\,23'\,30''$ weniger (§. 38.), oder 1330 Uml. $+ 10^3.6^\circ\,29'\,13'',7$, d. i. 1732559353",7 macht; ſo erhält die mittlere Winkelgeſchwindigkeit des Monds in t Jahrhunderten einen Zuwachs von $20'',289829t$. Weil nun dieſe Geſchwindigkeit der Zeit proportional wächst; ſo

ist nach den Gesetzen der gleichförmig beschleunigten Bewegung (§. 234.) der Zuwachs der mittleren Bewegung des Monds in t Jahrhunderten $= \frac{20'',289829}{2} t^2 = 10'',144914 t^2$, welcher die Seculargleichung des Monds ist. La Place setzt die Abnahme des Quadrats der Excentricität der Erdbahn vom Jahr 1750 bis zum Jahr 1850 = 0,00000140595 *), und hienach wäre die Seculargleichung des Monds in dieser Zwischenzeit in dem Verhältniß von 140595 : 139836 größer, als die oben gefundene, mithin = 10'',199979.

So lange als man die Abnahme des Quadrats der Excentricität der Erdbahn der Zeit proportional wird voraussetzen können, wird die Seculargleichung des Monds nahe dem Quadrat der Zeit proportional wachsen. Aber die Excentricität der Erdbahn ändert sich nicht gleichförmig, so daß in dem Ausdruck der Abnahme des Quadrats der Excentricität der Coefficient von t^2 ebenfalls positiv wird. Hieraus entsteht das §. 70. angegebene zweyte dem Würfel der Zeit proportionale Glied der Seculargleichung, worauf man Rücksicht nehmen muß, wenn t groß ist.

Die Bewegungen der Knoten und der Apsidenlinie der Mondsbahn hängen ebenfalls von der Wirkung der Sonne auf den Mond ab, und ihre mittlere Bewegungen ändern sich aus einem ähnlichen Grund mit der Abnahme der Excentricität der Erdbahn. Hieraus entstehen die von La Place gefundenen Seculargleichungen der Länge des Knotens und der Erdnähe des Monds (§. 70.). Uebrigens sind alle diese Ungleichheiten, so wie die Veränderungen der Excentricität der Erdbahn, von welchen sie abhängen, periodisch, kommen aber erst nach Millionen von Jahren in derselben Ordnung wieder. Die Seculargleichung der Erdnähe des Monds, welche La Place durch die Theorie gefunden hat, wird, wie Bouvard und Bürg gefunden haben, durch die Beobachtungen bestätigt.

§. 324. Es ist merkwürdig, daß die Abnahme der Excentricität der Erdbahn in den Bewegungen des Monds

*) Expos. du Système du Monde, pag. 224.

viel merklicher iſt, als in der Bewegung der Erde oder der ſcheinbaren Bewegung der Sonne. Dieſe Abnahme, welche von der älteſten uns bekannt gewordenen Finſterniß an die Mittelpunktsgleichung der Sonne nicht um 8 Minuten verändert hat, hat eine Veränderung von 1° 48′ in der Länge des Monds und von 7° in ſeiner mittleren Anomalie hervorgebracht. Wir ſehen hier ein Beyſpiel von der Art, wie die Phänomene, indem ſie ſich entwickeln, uns über ihre wahren Urſachen aufklären. Wäre allein die Beſchleunigung der mittleren Bewegung des Monds bekannt; ſo könnte man ſie dem Widerſtand des Mittels, oder der ſucceſſiven Fortpflanzung der Schwere zuſchreiben. Aber die Analyſe zeigt uns, daß dieſe zwey Urſachen keine merkliche Veränderung in den mittleren Bewegungen der Knoten und der Erdnähe des Monds hervorbringen können, und diß allein würde hinreichend ſeyn, um ſie auszuſchließen, ſelbſt wenn die wahre Urſache der beobachteten Veränderungen jener Bewegungen noch unbekannt wäre. Die Uebereinſtimmung der Theorie mit den Beobachtungen zeigt uns, daß, wenn die mittlere Bewegungen des Monds durch andere Urſachen als die allgemeine Gravitation verändert werden, ihr Einfluß ſehr gering, und bis jetzt unmerklich iſt.

Dieſe Uebereinſtimmung beweist die Unveränderlichkeit der Dauer des mittleren aſtronomiſchen Tags, dieſes weſentlichen Elements aller aſtronomiſchen Theorien. Wäre die Dauer eines Tags gegenwärtig um $\frac{1}{100}$ einer Sekunde größer, als zur Zeit des Hipparchs; ſo würden jetzt 36525 Tage oder 100 julianiſche Jahre um 365,25 Sekunden länger dauern, als zu jener Zeit. In 365,25 Sek. beſchreibt aber der Mond einen Bogen von 200″,5; folglich würde dadurch die gegenwärtige Secularbewegung des Monds um 200″,5 vergrößert erſcheinen. Nun iſt nach dem vorhergehenden §. die Secularglеichung für 130 Jahre vor unſerer Zeitrechnung $= 10'',1449 . \overline{19,3}^2$, und für 30 Jahre vor dieſer Epoche $= 10'',1449 . \overline{18,3}^2$; folglich iſt die Secularbewegung des Monds gegenwärtig um $10'',1449 (\overline{19,3}^2 - \overline{18,3}^2)$ oder um $37,0 \times 10'',1449$ größer, als 130 Jahre vor C.

G. Soll dieſe um 200″,5 größer herauskommen, als nach dieſem Ausdruck; ſo muß man die Seculargleichung ſo vergrößern, daß 37,6 mal dieſe Vergrößerung = 200″,5, mithin die Vergrößerung ſelbſt = 5″,33 wird. Demnach müßte in gegenwärtigem Jahrhundert die Seculargleichung des Monds um 5″,33 größer als nach der Theorie gefunden werden, wenn die Dauer des Tags in 1332 Jahren um den hundertſten Theil einer Sekunde abgenommen hätte. Man hat aber in dem 312ſten §. geſehen, daß die verſchiedenen Angaben der Seculargleichung des Monds um nicht mehr als 3 Sekunden von einander abweichen, und vermöge der neueren auf eine größere Anzahl von Beobachtungen ſich gründenden Unterſuchungen kann ſie um nicht mehr als 1½ Sek. von der aus der Theorie gefundenen verſchieden ſeyn; folglich kann ſich die Dauer des Tags ſeit Hipparchs Zeiten nicht um den hundertſten Theil einer Sekunde geändert haben, wodurch das beſtätigt wird, was La Place durch eine ſorgfältige Unterſuchung aller derjenigen Urſachen, welche die Umdrehungsbewegung der Erde um ihre Axe ſtören können, gefunden hat, daß nemlich die Dauer ihrer Umdrehung ſich nicht merklich ändern könne, ohne weit größere Veränderungen in der Conſtitution der Erde vorauszuſetzen, als diejenige ſind, welche wir kennen *).

§. 325. Was in dem 32ſten §. von der jährlichen Gleichung des Monds bewieſen worden iſt, läßt ſich auch auf die Bewegungen der Knoten und der Apſidenlinie des Monds anwenden. Die Geſchwindigkeiten dieſer Bewegungen ändern ſich mit dem Abſtand der Erde von der Sonne, und hieraus entſtehen die von der mittleren Anomalie der Sonne abhängende Ungleichheiten dieſer Bewegungen. Man hat aber in dem 311ten und 312ten §. geſehen, daß der in der Richtung des Radius Vector des Monds wirkende Theil der perturbirenden Kraft der Sonne aus zwey Theilen beſteht, wovon der eine beſtändig die Schwere des Monds gegen die Erde vermindert, der andere aber ſie bald vergrößert, bald vermindert. Dieſer Theil hängt von der Lage des Monds

*) Méc. cél. T. II. L. V. n. 12.

gegen die Sonne und die Erde, oder von ſeinem Abſtand von den Syzygien ab, und iſt vermöge §. 312. n. 2. dem Co ſinus des doppelten Ueberſchußes der Länge des Monds über die Länge der Sonne proportional. Mithin muß ſich mit dieſer Veränderung der Centripetalkraft auch die Winkelgeſchwindigkeit des Monds verändern (§. 321.). Dieſe ändert ſich aber auch mit dem Abſtand des Monds von dem Punkt der Erdnähe, oder mit ſeiner Anomalie; folglich entſteht aus beyden Veränderungen eine von dem doppelten Abſtand des Monds von der Sonne und von ſeiner Anomalie zugleich abhängende Ungleichheit, welche man die Evection nennt (§. 69.). Sie wird wegen der kleinen Zahl, mit welcher man dividiren muß, wenn man aus der Geſchwindigkeit den beſchriebenen Winkel ableitet, ſo beträchtlich (S. die Bemerkungen des 314ten §.).

Endlich hat man bey den bisherigen Unterſuchungen nicht auf denjenigen Theil der perturbirenden Kräfte Rückſicht genommen, welcher auf den Radius Vector ſenkrecht wirkt (§. 311. n. 3. und 312. n. 3.). Dieſe Kraft verändert unmittelbar die Winkelgeſchwindigkeit des Monds, verſchwindet in den Syzygien und Quadraturen, und wird in den Octanten am gröſten *). Sie vermindert die Winkelgeſchwindigkeit des Monds in dem erſten Octanten, d. i. wenn der Ueberſchuß der Länge des Monds über die der Sonne zwiſchen 0 und 45° fällt, und vergrößert ſie von 315° bis 360° oder 0; folglich wird, wenn man nur auf dieſe Kraft Rückſicht nimmt, der Mond in ſeinen Conjunktionen mit ſeiner gröſten Winkelgeſchwindigkeit ankommen (Vergl. §. 166.), welche von dieſem Punkt an bis zu 45° ebenſo vermindert wird, wie ſie in dem vorhergehenden Octanten vergrößert wurde. Der Mond wird alſo bey dem 45ſten Grad wieder ſeine mittlere Winkelgeſchwindigkeit haben, und auf ähnliche Art wird man finden, daß dieſer Fall auch in den übrigen von den Quadraturen und den Syzygien gleich weit entfernten Punkten der Mondsbahn eintritt. Da nun

*) Nemlich der Sinus von $2D$ verſchwindet, wenn $D = 0; 90; 180; 270$; und er wird dem Sinus totus gleich, wenn $D = 45; 135; 225; 315$ Graden.

von 0 bis 45° die Winkelgeschwindigkeit beständig größer als die mittlere ist; so wird bey 45° der Mond seinem mittleren Ort am meisten vorgeeilt, und die von dieser Kraft abhängende Gleichung der Mondslänge am größten seyn. Setzt man diese Schlüße weiter fort; so findet man, daß diese Ungleichheit die unter dem Namen der Variation bekannte Mondsgleichung ist (§. 69.), welche in den Syzygien und Quadraturen verschwindet, und in den Octanten am größten ist.

§. 326. Wir haben bisher die Kräfte, welche die Bewegungen des Monds stören, einzeln betrachtet, und daraus die größeren Mondsgleichungen abgeleitet. Die genauere Berechnung dieser und der kleineren Gleichungen wird dadurch verwickelter gemacht, daß man die Wirkungen von Erde, Sonne, und Mond aufeinander zugleich betrachten muß. So ändert z. B. die auf den Radius Vector des Monds senkrecht wirkende Kraft unmittelbar die Winkelgeschwindigkeit des Monds, mit dieser Veränderung ist aber auch eine Veränderung des Abstands des Monds von der Erde verbunden, welcher wächst oder abnimmt, je nachdem die Winkelgeschwindigkeit des Monds wächst oder abnimmt, wodurch wiederum die Winkelgeschwindigkeit des Monds geändert wird. Um die zwey perturbirenden Kräfte S und P, von welchen die erstere in der Richtung des Radius Vector des Monds, die andere auf denselben senkrecht wird, und deren Ausdrücke in dem 312ten §. n. 2. und 3. gefunden worden sind, zugleich in Rechnung zu nehmen, kann man auf folgende Art verfahren.

Man setze den Radius Vector der Erde $= R$, den des Monds $= r$, den mittleren Abstand der Erde von der Sonne $= a$, den mittleren Abstand des Monds von der Erde $= a'$, die mittlere Winkelgeschwindigkeit des Monds $= w$, die Excentricität der Erdbahn $= e$, und die Excentricität der Mondsbahn $= e'$; so ist in der als elliptisch betrachteten Mondsbahn die wahre Winkelgeschwindigkeit umgekehrt dem Quadrat des Radius Vector proportional. Die mittlere Winkelgeschwindigkeit entspricht demjenigen Punkt der als elliptisch betrachteten Mondsbahn, in welchem der Radius Vector die mittlere geometrische Proportionallinie zwischen der halben großen und halben kleinen Axe (§. 187.), mithin sein Quadrat $= a'^2\sqrt{1-e'^2}$ ist. Demnach wäre in der Ellipse die wahre Winkelgeschwindigkeit $= w\left(\frac{a'}{r}\right)^2\sqrt{1-e'^2}$, und das Produkt dieser Winkelgeschwindigkeit in das Quadrat des Radius Vector des Monds $= a'^2 w\sqrt{1-e'^2}$.

Der Ausdruck §. 312. n. 3. der auf dem Radius Vector senkrecht wirkenden Kraft ist der Ausdruck der Geschwindigkeit, welche diese Kraft als constant betrachtet in einer gegebenen Zeit erzeugen würde, oder das Produkt aus der Winkelgeschwindigkeit, welche sie erzeugen würde, in den Radius Vector; folglich wird, wenn diese Kraft P heißt, das Produkt aus dem Quadrat des Radius Vector in die erzeugte Geschwindigkeit $= r.P$ seyn. Wenn man nun das Gesetz kennt, nach welchem r und P von der Zeit abhängen; so kann man dadurch nach den im ersten Capitel dieses Buchs gegebenen Regeln das Produkt aus dem Quadrat des Radius Vector in die während einer gegebenen Zeit durch die veränderliche Kraft wirklich erzeugte Winkelgeschwindigkeit finden. Der Umstand, daß P klein ist in Vergleichung mit der auf den Mond wirkenden Centripetalkraft erleichtert die Bestimmung dieser Größe, weil man bey einer ersten Annäherung in dem Ausdruck $r.P$ den elliptischen Radius Vector des Monds statt seines wahren setzen kann. Es sey P' dem Zuwachs gleich, welchen die ungleichförmig wachsende Größe $r.P$ während der bey dem Maaß der Winkelgeschwindigkeit zum Grund gelegten Zeiteinheit wirklich erhält; so wird diese Größe zu dem vorhin gefundenen Produkt aus dem Quadrat des Radius Vector in die elliptische Winkelgeschwindigkeit hinzugefügt werden müßen, um das Produkt aus r^2 in diejenige Winkelgeschwindigkeit zu finden, welche in der gestörten Bahn dem Radius Vector r entspricht. Man setze sie $= u$; so wird man unter der Voraussetzung, daß die Kraft P nach der Richtung der Bewegung wirke, haben

1.) $r^2.u = a'2w\sqrt{1-e'^2} + P'$,

oder $u = \left(\frac{a'}{r}\right)^2 w\sqrt{1-e'^2} + \frac{P'}{r^2}$.

Wirkt die Kraft P der Richtung der Bewegung entgegen; so setzt man sie bey der Berechnung von P' negativ, und wenn auch P negativ wird, so erhält es das Zeichen —.

Zu der Bestimmung des Radius Vector r der gestörten Bahn dient der Satz, daß r abnimmt oder wächst, je nachdem die Summe der gegen den Mittelpunkt der Kräfte hin wirkenden Centripetalkräfte größer oder kleiner ist, als die Kraft, vermöge welcher mit der dem Radius Vector r entsprechenden und in senkrechter Richtung auf ihn genommenen Geschwindigkeit ein Kreis von dem Halbmesser r könnte beschrieben werden. Da nun die dem Halbmesser r entsprechende Winkelgeschwindigkeit $= u$ ist; so ist die wahre Geschwindigkeit nach der auf dem Radius Vector senkrechten Richtung $= r.u$, und die zu dieser Kreisbewegung erforderliche Kraft $= \frac{r^2.u^2}{r}$ (§. 273. n. 1.) $= r.u^2$. Die von der Schwere des Monds gegen die Erde allein herrührende

Centripetalkraft ist $= \frac{ma^2k}{r^2}$, und die in der Richtung des Radius Vector wirkende perturbirende Kraft hat man oben mit S bezeichnet, folglich ist die Summe der Centripetalkräfte $= \frac{ma^2k}{r^2} + S$, wo man S negatio setzt, wenn diese Kraft die Schwere des Monds gegen die Erde vermindert.
Mithin ist 2.) die Kraft, welche den Radius Vector zu vermindern sich bestrebt $=$

$$\frac{ma^2k}{r^2} + S - rw^2 =$$

$$\frac{ma^2k}{r^2} + S - r\left(\left(\frac{a'}{r}\right)^2 w\sqrt{1-e'^2} + \frac{P'}{r^2}\right)^2.$$

Die Bahn des Monds würde also ein Kreis seyn, wenn dieser Ausdruck beständig $= 0$ wäre; eine Ellipse, wenn S und $P = 0$; eine bewegliche Ellipse, wenn $P = 0$, und S umgekehrt dem Würfel der Entfernung des Monds von der Erde proportional wäre (§. 317.). Aus dem Gesetz der Kraft, welche den Radius Vector zu ändern strebt findet sich die Geschwindigkeit dieser Veränderung, und hieraus die Veränderung selbst. Hat man so einen genäherten Werth des Radius Vector gefunden; so wird durch die Substitution dieses Werths die Größe P', und mittelst dieser nach n. 2. der Radius Vector genauer gefunden. Sodenn erhält man, wenn der genauere Werth von r in die Gleichung n. 1. gesetzt wird, die Winkelgeschwindigkeit u, woraus sich der in einer gegebenen Zeit von dem Radius Vector beschriebene Winkel; mithin der Unterschied der wahren und mittleren Länge ergiebt. Clairaut hatte bey seiner ersten Approximation den elliptischen Radius Vector gebraucht, und bey dieser die Bewegung der Apsidenlinie des Monds nur halb so groß gefunden, als die beobachtete. Bey der zweyten nahm er auf die Störungen des elliptischen Radius Vector Rücksicht, und allein dasjenige Glied, von welchem die Evection abhängt, verdoppelte beynahe jene Bewegung, so daß sie mit den Beobachtungen nahe übereinstimmend herauskam. Die übrigen Glieder hatten keinen sehr beträchtlichen Einfluß mehr auf die Bewegung der Apsidenlinie.

§. 327. Es ist hier nicht der Ort, die Berechnung der Ungleichheiten in den Bewegungen des Monds weiter auszuführen. Sie gründet sich auf die Gleichungen n. 1. und 3. des vorhergehenden §., aus welchen man mittelst einiger bekannten Sätze der analytische Trigonometrie und der Sätze n. 1. u. 2. §. 239. die Peturbationen des Radius Vector und der Winkelbewegung finden kann. Einige Schwierigkeit macht noch die veränderliche Neigung der Mondsbahn gegen die Ekliptik, welche man am be-

quemſten beſeitigt, wenn man ſtatt der Bahn des Monds ſelbſt ihre Projection auf die Ebene der Ekliptik ſucht. Die Rechnung wird beträchtlich vereinfacht, wenn man die mittlere Länge des Monds durch die wahre, ſtatt die letztere durch die erſtere ausdrückt, welches Verfahrens Clairaut *) und La Place **) ſich bedienten. Tobias Mayer wählte einen andern Weg, indem er ſo wohl die wahre als die mittlere Länge des Monds mittelſt eines Winkels beſtimmte, welcher nahe der wahren Anomalie in der elliptiſchen Bahn gleich iſt. Aus dieſen Ausdrücken leitete er ſodenn die Gleichungen her, mittelſt welcher aus den mittleren Bewegungen die wahre Länge, Breite, und Parallaxe des Monds unmittelbar können gefunden werden ***). Dieſen Gleichungen gab er dadurch eine zur Berechnung noch bequemere Form, daß er die Correctionen nach und nach anbrachte †). Die Gleichungen, welche er nach der Theorie gefunden hatte, verbeſſerte er ſodenn durch eine groſſe Anzahl dem gröſten Theil nach von ihm ſelbſt auf der Göttinger Sternwarte angeſtellter Beobachtungen, und machte ſeine erſten Mondstafeln im Jahr 1753 in den Göttinger Commentarien bekannt, welche alle vorhergehenden weit an Genauigkeit übertrafen. Mit der Verbeſſerung dieſer Tafeln beſchäftigte er ſich bis an ſeinen am 20. Febr. 1762 erfolgten Tod, und ſeine Wittwe überſendete im Jahr 1763 dieſe verbeſſerten Mondstafeln der Längen-Commiſſion in London, für welche ſie eine Belohnung von 3000 Pfund Sterling erhielt. Sie erſchienen zu London ſammt der Mayeriſchen Mondstheorie im Jahr 1767. Eben dieſe Tafeln ſtehen in der Berliner Sammlung aſtronomiſcher Tafeln. Maſon verbeſſerte dieſe Tafeln durch eine gröſsere Reihe von Beobachtungen und durch die Aufnahme von 8 kleineren Gleichungen, welche Mayer nach der Theorie gefunden, aber der Kürze der Berechnung wegen weggelaſſen hatte. Man findet dieſe Tafeln in der dritten Ausgabe der Aſtronomie von La Lande, in der Connoiss. des tems für 1790, und in den Wiener Ephemeriden. Die neueſten Mondstafeln ſind von Prof. Bürg in Wien berechnet worden. Einige neue von La Place durch die Theorie gefundene Gleichungen und eine gröſsere Reihe genauer Beobachtungen des Monds, als diejenige, welche Mayer zu Gebott ſtand, gab dieſen Tafeln eine noch gröſsere Genauigkeit. Bürg hat die Form der Mayeriſchen Tafeln beybehalten, und es ſcheint Mayer nicht allein die erſten genauen Mondstafeln geliefert, ſondern auch die zum Rechnen bequemſte Form derſelben gefunden zu haben. Die Gleichungen

*) Mém. de l'Acad. de Paris. 1745 et 1748. Theorie de la Lune par *M. Clairaut.*

**) Mécan. cél. T. III. Livre VII.

***) Theoria Lunæ juxta systema Newtonianum. Auctore *Tobia Mayer.* Londini. MDCCLXVII.

†) A. a. O. §. 49.

des Monds ſich nach **Bürg** folgende *), welchen zur Vergleichung die **Mayeriſchen** aus ſeiner Theoria Lunæ, ſo wie er ſie durch die Beobachtungen verbeſſert hat, beygefügt ſind.

Man ſetze die mittlere Anomalie der Sonne $= a$
— — — des Monds $= A$
die wahre Länge der Sonne $= \odot$
die mittlere Länge des Monds $= \mathfrak{D}$
die mittlere Länge des aufſteigenden Mondsknotens $= \Omega$
$\mathfrak{D} - \odot = D$
Supplement der Länge des Knotens, oder $360° - \Omega = N$
$\mathfrak{D} + N = d$,

wo unter der mittleren Länge des Monds und ſeines Knotens und unter ſeiner mittleren Anomalie diejenige verſtanden werden, welche durch die Seculargleichungen ſchon verbeſſert ſind. Dieſe Seculargleichungen findet man in dem 70ſten §. Zu der Seculargleichung des Monds kommt noch eine von **La Place** durch die Theorie gefundene Gleichung hinzu, deren gröſten Werth **Bürg** aus den Beobachtungen $= 14$ Sek. gefunden hat. Sie hat eine Periode von ungefähr 184 Jahren, und iſt

$= + 14''$ Sin. $(2\Omega +$ perig. $\mathfrak{D} - 3$ perig. $\odot)$,
$= - 14''$ Sin. $(A - \mathfrak{D} + 2N + 3$ perig. $\odot)$.

Eben dieſe Gleichung wird mit demſelben Zeichen an der mittleren Anomalie des Monds und der Länge ſeines Knotens, mithin an dem Supplement der Knotenlänge mit entgegengeſetztem Zeichen angebracht. Die übrigen Gleichungen der Länge des Monds ſind:

	nach Bürg	nach Mayer
I.	$-671'',8$ Sin. a	$674''$
	$-6,0$ Sin. $2a$	4
II.	$+11,5$ Sin. $(D+a)$	21,1 *
III.	$+4,9$ Sin. $(D-a)$	3,2 *
IV.	$-2,6$ Sin. $(D+A)$	2,6 *
	$-4,6$ Sin. $2(D+A)$	25,6 *
V.	$-21,4$ Sin. $(D-A)$	16
	$-58,6$ Sin. $(D-A)$	60
VI.	$+4829,5$ Sin. $(2D-A)$	4836
	$+35,4$ Sin. $2(2D-A)$	26
VII.	$-57,8$ Sin. $(2D+A)$	49
VIII.	$-2,1$ Sin. $(2D-3A)$	22,5 *
IX.	$+39,3$ Sin. $(A-a)$	28
X.	$+53,9$ Sin. $(2D+a)$	56
XI.	$+76,5$ Sin. $(2D-a)$	66
XII.	$+1,1$ Sin. $(D-A+a)$	
XIII.	$+124,6$ Sin. $(2D-A+a)$	120

*) Tables astronomiques publ. par le bureau des longitudes de France. I, P. A Paris. 1806.

	nach Bürg	nach Mayer
XIV.	+ 47″,6 Sin. (2D − A − a)	47
XV.	+ 2,2 Sin. (2D + A + a)	8,7 *
XVI.	+ 1,3 Sin. (2D + A − a)	6,3 *
XVII.	− 6,8 Sin. N	4 *
XVIII.	− 62,5 Sin. 2 (☉ + N)	51
XIX.	− 6,4 Sin. (☽ + N − A)	
XX.	− 10,6 Sin. (4D − A)	9,1 *
XXI.	+ 1,1 Sin. (4D − 3A)	12,1 *
XXII.	+ 1,2 Sin. (2A − 2D − a)	
XXIII.	− 6,9 Sin. (2D − A − 2a)	
XXIV.	− 8,8 Sin. (2D + A − 2a)	

Die mit einem Stern bezeichneten Gleichungen sind diejenigen, welche Mayer durch die Theorie gefunden, aber nicht in seine Tafeln aufgenommen hat.

Man addire die Summe dieser 24 Gleichungen zu der mittleren Anomalie des Monds, und noch überdiß die Gleichung

nach Bürg	nach Mayer
− 1337″ Sin. a	− 1326″ Sin. a
− 11 Sin. 2a	− 15 Sin. 2a,

so hat man die verbesserte mittlere Anomalie A' des Monds, und zu dem Supplement des Knoten addire man

nach Bürg	nach Mayer
+ 540″ Sin. a	553″ Sin. a
+ 4″ Sin. 2a	+ 5 Sin. 2a,

um das verbesserte Supplement N' des Knoten zu erhalten.

Alsdenn ist die Mittelpunktsgleichung des Monds

	nach Bürg	nach Mayer
XV.	+ 6° 18′ 12″,2 Sin. A'	+ 6° 18′ 11″
	+ 12 56,4 Sin. $2A'$	12 52
	+ 37,3 Sin. $3A'$	37
	+ 1,9 Sin. $4A'$	
	+ 0,1 Sin. $5A'$	

Die 24 Gleichungen und die Gleichung des Mittelpunkts zu der mittleren Mondslänge addirt, geben die zum ersten mal verbesserte Länge ☽′ des Monds, und mit dem Argument $D' = D +$ die 25 vorhergehende Gleichungen erhält man

	n. B.	n. M.
XXVI.	− 128″,1 Sin. D'	− 115″
	+ 2141,7 Sin. $2D'$	+ 2147
	+ 3,3 Sin. $3D'$	+ 2
	+ 7,3 Sin. $4D'$	+ 14,

welche Gleichung zu der verbesserten Mondslänge addirt die zum zweytenmal verbesserte Länge ☽″ des Monds giebt. Hieraus findet sich

$d' = ☽'' + N'$, und

	n. B.	n. M.
XXVII.	− 84″,4 Sin. $(2d' - A')$	− 86″.

Die durch diese Gleichung verbesserte Mondslänge ☽‴ ist die

wahre Länge des Monds in seiner Bahn von dem mittleren Aequinoktialpunkt an gerechnet. Bringt man noch die Reduction auf die Ekliptik an, welche mit dem Argument $☽''' + N'$ gefunden wird, und

XXVIII.

n. B.	n. M.
$- 406'',8 \text{ Sin.} (☽''' + N')$	$+ 411''$
$+ 2,1 \text{ Sin.} 2(☽''' + N')$	

ist; so hat man die vom mittleren Aequinoktialpunkt an gerechnete wahre Länge des Monds in der Ekliptik, zu welcher man noch die unter dem Namen der Nutation bekannte Gleichung des Aequinoktialpunkts (§. 160.) hinzufügen muß, um die wahre Mondslänge in der Ekliptik von dem scheinbaren Aequinoktialpunkt an gerechnet zu erhalten. Diese Gleichung ist $+ 18'',0 \text{ Sin. } N$.

Bezeichnet man die Argumente der Breite mit I, II, u. s. w. so ist das erste Argument der Breite gleich dem acht und zwanzigsten der Länge $= ☽''' + N'$. Man mache $D'' = ☾''' - ☉$; so ist das IIte $= 2D'' - I$; III $= I - a$; IV $= I - A$; V $= IV - A$; VI $= V - A$; VII $= II + a$; VIII $= II - a$; IX $= II + A$; X $= II - A$; XI $= X - A$; XII $= ☽'''$; und die Breite des Monds

	nach La Place.	Bürg.	Mayer.
$=$	$+ 18520'',8 \text{ Sin. I.}$	$18520'',8$	$18510''$
	$- 5,7 \text{ Sin. } 3 \text{ I.}$	$5,0$	$6,5$
	$+ 526,9 \text{ Sin. II.}$	$528,4$	529
	$- 1,5 \text{ Sin. III.}$	$3,1$	2
	$+ 17,8 \text{ Sin. IV.}$	$17,6$	$17,4$
	$- 26,2 \text{ Sin. V.}$	$25,1$	$24,1$
	$- 2,9 \text{ Sin. VI.}$	$1,9$	$2,7$
	$+ 8,3 \text{ Sin. VII.}$	$9,0$	$8,3$
	$+ 4,0 \text{ Sin. VIII.}$	$3,7$	$3,7$
	$+ 2,6 \text{ Sin. IX.}$	$2,2$	$2,2$
	$- 15,6 \text{ Sin. X.}$	$15,9$	$15,0$
	$- 6,1 \text{ Sin. XI.}$	$5,2$	$6,0$
	$- 8,0 \text{ Sin. XII.}$	$8,0$	

Die Horizontalparallaxe des Monds unter dem Aequator wird mittelst der vorhin angegebenen Argumente der Länge gefunden, und ist

nach La Place.	Bürg.	Mayer.
$= - 0'',4 \text{ Cos. I.}$	$- 0'',3$	$0'',3$
$0,0 \text{ Cos. V.}$	$+ 0,2$	
$+ 1,8 \text{ Cos. } 2 \text{ V.}$	$+ 2,0$	$2,2$
$+ 37,3 \text{ Cos. VI.}$	$+ 37,3$	$37,3$
$+ 0,4 \text{ Cos. } 2 \text{ VI.}$	$+ 0,3$	$0,3$
$- 0,0 \text{ Cos. VII.}$	$- 0,1$	$0,1$
$+ 0,2 \text{ Cos. IX.}$	$+ 0,2$	$0,2$
$+ 0,7 \text{ Cos. X.}$	$+ 0,7$	$0,7$
$+ 0,8 \text{ Cos. XI.}$	$+ 0,8$	$0,8$
$+ 0,9 \text{ Cos. XIII.}$	$+ 1,0$	$1,0$
$+ 0,3 \text{ Cos. XIV.}$	$+ 0,6$	$0,6$
$- 0,1 \text{ Cos. XVIII.}$	$+ 0,4$	$0,4$

La Place	Bürg.	Mayer.
+ 57′ 0″,0	57″ 1″,0	57′ 11,0
+ 186.9 Cos. XXV.	+ 187,3	187,7
+ 10,2 Cos. 2XXV.	+ 10,0	10,0
+ 0,6 Cos. 3XXV.	+ 0,2	0,3
- 1,0 Cos. XXVI.	- 1,0	1,0
+ 26,4 Cos. 2XXVI.	+ 26,0	27,2
+ 0,3 Cos. 3XXVI.	+ 0,2	
- 0,8 Cos. XXVII.	- 0,8	0,8
+ 0,1 Cos. XXVIII.		

§. 328. Die gröſte Abweichung der von Mayer nach der Theorie gefundenen Gleichungen der Länge des Monds von denjenigen, welche er aus den Beobachtungen abgeleitet hat, ſteigt nicht über 35 Sek. *). Die Gleichungen der Mondsbreite und der Parallaxe ſind ſo klein, daß ſie durch die Theorie genauer als durch die Beobachtungen können gefunden werden. Mayer hat ſie auch wirklich mit den Beobachtungen ſo genau übereinſtimmend gefunden, daß er keine Veränderung für nöthig hielt, und nur die mittlere Neigung der Mondsbahn, welche nicht durch die Theorie gefunden werden kann, um 4 Sek. gröſſer machte, als er ſie anfänglich vorausgeſetzt hatte **).

La Place hat in ſeiner Mechanik des Himmels die Genauigkeit in der Berechnung der Ungleichheiten der Mondsbewegungen noch weiter getrieben, und ſeine nach der Theorie gefundenen Gleichungen der Länge des Monds weichen von denjenigen, welche er aus Bürgs allein aus den Beobachtungen abgeleiteten Gleichungen erhielt, niemals über 9 Sek. ab ***). Die genaue Uebereinſtimmung ſeiner Theorie mit den Beobachtungen in Anſehung der Breite und Parallaxe des Monds ſieht man aus den vorhin angegebenen Gleichungen. Aus dem oben angeführten Grund werden dieſe nach der Theorie gefundenen Gleichungen den aus den Beobachtungen abgeleiteten vorzuziehen ſeyn. Man würde durch noch weiter getriebene Approximationen ohne Zweifel auch jene kleinen Unterſchiede der berechneten und beobachteten Ungleichheiten der Mondsbewegung in der Länge vollends können verſchwinden machen, aber ſchon dieſe Vergleichung der Theorie mit den Beobachtungen iſt hinreichend, um unwiderſprechlich darzuthun, daß die allgemeine Schwere die einzige Urſache aller Ungleichheiten des Monds iſt.

Unter den Gleichungen der Mondslänge ſind zwey beſonders merkwürdig. Die erſte iſt diejenige, welche dem Sinus des Abſtands des Monds von der Sonne proportional iſt, und das erſte Glied der 26ten Gleichung ausmacht. Sie hängt von der Son-

*) Theoria Lunæ. pag. 52.
**) A. a. O. pag. 57.
***) Méc. cél. T. III. L. VII. pag. 281.

nenparallaxe ab, und heißt daher die parallactische Ungleichheit. Schon Mayer hatte aus dieser die Sonnenparallaxe mit einer größeren Genauigkeit bestimmt, als man sie vorher kannte, und von 10″,8 auf 7″,8 herunter gesetzt *). La Place fand durch genauere Berechnung aus dem von Bürg durch die Beobachtungen bestimmten Coefficienten 2′ 2″,1 dieser Gleichung die Sonnenparallaxe = 8″,6; also nahe dieselbe, welche mehrere Astronomen aus dem letzten Durchgang der Venus vor der Sonne geschlossen haben. Die zweyte Ungleichheit ist diejenige, welche von der Länge des Mondsknotens abhängt, und nach Bürg = 6″,8 Sin. ☊ = - 6″,8 Sin. *N* ist. Mayer hatte diese Gleichung nur durch die Beobachtungen gefunden **), welcher sie auf 4″ setzte. Mason fand sie = 7″,7. La Place zeigte zuerst, daß nach der Theorie eine solche Ungleichheit der Mondsbewegung Statt finde, und daß sie von der abgeplatteten Gestalt der Erde abhänge. Es ergiebt sich aus der von Bürg nach den Beobachtungen gefundenen Größe dieser Ungleichheit die Abplattung der Erde = $\frac{1}{305,05}$ ***). Wäre die Abplattung der Erde = $\frac{1}{230}$; so müßte diese Ungleichheit = 11″,5 seyn.

Die zwölfte Ungleichheit der Breite des Monds ist von La Place entdeckt worden, und hängt wie die vorhergehende von der Gestalt der Erde ab. Bürg fand sie aus einer großen Anzahl in Greenwich angestellter Beobachtungen = - 8″.0 Sin. der wahren Mondslänge, woraus La Place die Abplattung der Erde = $\frac{1}{304,6}$ fand †). Wäre die Abplattung der Erde = $\frac{1}{230}$; so müßte diese Ungleichheit = 13″,5 seyn. Es ist sehr merkwürdig, daß diese zwey von der Gestalt der Erde abhängende durch die Beobachtungen gefundene Ungleichheiten nahe einerley Abplattung, und zugleich dieselbe geben, durch welche die verschiedenen Gradmeßungen mit den kleinst möglichen Abweichungen dargestellt werden (§. 140.). Die beständig kreisförmige Gestalt des Erdschattens auf dem Mond bey seinen Verfinsterungen zeigte den ersten Astronomen die nahe kugelförmige Gestalt der Erde, und die vollkommenere Mondstheorie giebt eines der sichersten Mittel, ihre Abweichung von der genauen Kugelgestalt durch die Beobachtung der Ungleichheiten der Mondsbewegungen zu bestimmen, denn sie haben vor den Gradmeßungen den Vorzug, daß sie die Abplattung der Erde auf eine weniger von den Irregularitäten ihrer Figur abhängende Art geben.

Die Theorie verbunden mit den Versuchen über die Länge des Pendels und den Gradmeßungen giebt, wie man in dem 309ten und 310ten §. gesehen hat, die Parallaxe des Monds sehr nahe

*) Theor. Lunæ. §. 51. pag. 53.
**) A. a O. pag. 52.
***) Méc. cél. T. III. pag. 282.
†) Méc. cél. T. III. pag. 285.

mit den Beobachtungen übereinſtimmend, ſo daß man umgekehrt aus der Länge des Sekundenpendels und aus der Parallaxe des Monds die Größe der Erde ſchließen könnte. Die Parallaxe kann durch die Beobachtungen des Monds in verſchiedenen Höhen über dem Horizont, ohne daß es nöthig wäre, den Beobachtungsort zu verändern, gefunden werden. Folglich hätte ein Aſtronom ohne aus ſeiner Sternwarte herauszugehen, allein durch die Vergleichung ſeiner Beobachtungen mit der Theorie, die Größe und Abplattung der Erde, und ihren Abſtand von der Sonne und dem Mond beſtimmen können, welche Größen man erſt durch weite und beſchwerliche Reiſen auf den zwey Halbkugeln hat kennen gelernt. Die Uebereinſtimmung der durch dieſe zwey Methoden erhaltenen Reſultate iſt einer der auffallendſten Beweiſe für die allgemeine Schwere *).

§. 329. Nach dieſer ausführlicheren Betrachtung der Perturbationen des Monds durch die Attraction der Sonne wird man ſich leicht einen Begriff davon machen können, wie man bey der Berechnung derjenigen Perturbationen verfahren müße, welche ein Planet durch die Attraction eines oder mehrerer anderer Planeten leidet. Die Beobachtungen zeigten ſolche Perturbationen der elliptiſchen Bewegungen, ehe man ſie zu berechnen wußte. Die genaue Auflöſung der Aufgabe, dieſe Störungen zu berechnen, überſteigt, wie ſchon oben bemerkt worden iſt, die gegenwärtigen Hülfsmittel der Analyſe. Glüklicherweiſe wird durch die Kleinheit der Planetenmaſſen in Vergleichung mit der Maſſe der Sonne, und durch die geringe Excentricität und gegenſeitige Neigung der meiſten ihrer Bahnen dieſe Unterſuchung ſehr erleichtert. Nichts deſto weniger bleibt ſie noch immer ſehr verwickelt, und die feinſte Analyſe iſt unentbehrlich, unter der unendlichen Anzahl von Ungleichheiten, welchen die Planeten unterworfen ſind, diejenige, welche bemerkt werden können, zu entdecken, und ihre Werthe anzugeben. Newton hat in ſeinen Principien die Perturbationen der Planeten nur kurz berührt **), Euler und Clairaut haben insbeſondere die Perturbationen des Jupiters und Saturns genauer berechnet. La Grange und La Place haben die langſamen Veränderungen unterſucht; welche die Elemente der

*) Expos. du Système du Monde. pag. 219.
**) Princ. L. III. prop. XIII.

Planetenbahnen durch die gegenſeitige Attraction der Planeten leiden. Die Perturbationen der elliptiſchen Bewegung der Planeten können nemlich in zwey ſehr von einander verſchiedene Claſſen eingetheilt werden; einige betreffen die Elemente der elliptiſchen Bewegung, und wachſen äuſſerſt langſam, weswegen man ſie Secular-Ungleichheiten nennt. Andere hängen von der Lage der Planeten ſo wohl unter ſich, als in Beziehung auf ihre Knoten und Perihelien ab, und kommen mit dieſen Configurationen in derſelben Ordnung wieder. Man nennt ſie periodiſche Ungleichheiten, um ſie von den Secularungleichheiten zu unterſcheiden, welche ebenfalls periodiſch, aber deren ungleich längere Perioden von der gegenſeitigen Stellung der Planeten unabhängig ſind. Nach La Place *), welcher die Perturbationen der Planeten am genaueſten beſtimmt hat, beſteht die einfachſte Art dieſe verſchiedenen Perturbationen darzuſtellen, darinn, daß man ſich vorſtellt, ein Planet bewege ſich den Geſetzen der elliptiſchen Bewegung gemäß in einer Ellipſe, deren Elemente ſich ſtetig verändern, und um dieſen erdichteten Planeten oſcillire der wahre Planet in einer ſehr kleinen Bahn hin und her, deren Natur von ſeinen periodiſchen Störungen abhängt.

§. 330. Unter den Secular-Ungleichheiten, welche nach Jahrhunderten merklich werden, und mit der Länge der Zeit die Geſtalt und Lage aller Planetenbahnen verändern müſſen, iſt diejenige die wichtigſte, welche auf die mittleren Bewegungen der Planeten Einfluß haben kann. Vergleicht man die ſeit dem 13ten Jahrhundert angeſtellten Beobachtungen mit einander; ſo ſcheint die Bewegung des Jupiters geſchwinder, und die des Saturns langſamer, als man ſie durch die Vergleichung eben dieſer Beobachtungen mit denen des Hipparchs und Ptolemäus findet. Die Aſtronomen folgerten hieraus, daß die erſtere jener Bewegungen ſich beſchleunige, indem die letztere von einem Jahrhundert zum anderen ſich verzögere, und führten in die Tafeln dieſer Planeten zwey dem Quadrat der Zeit proportional wachſende Seculargleichungen, eine additive für die mittlere Bewegung

des

*) Expos. du Système du Monde. L. IV. Ch. II.

des Jupiters und eine subtractive für die mittlere Bewegung des Saturns ein. Nach Halley ist die Seculargleichung des Jupiters = 34″,4 für das erste auf 1700 folgende Jahrhundert, und die correspondirende Gleichung für den Saturn = 83″,5. Es war natürlich die Ursache hievon in der Wirkung dieser beträchtlichen Planeten unseres Sonnensystems aufeinander zu suchen. Euler, welcher sich zuerst mit dieser Untersuchung beschäftigte, fand für beyde Planeten gleiche und zu ihren mittleren Bewegungen additive Seculargleichung, welches den Beobachtungen widerspricht. Nach diesem erhielt La Grange mehr mit den Beobachtungen übereinstimmende Resultate: andere Geometer erhielten andere Gleichungen. La Place, welchem diese Verschiedenheiten auffielen, prüfte diesen Gegenstand aufs neue, und es gelang ihm, indem er die gröste Sorgfalt auf diese Untersuchung verwendete, den wahren analytischen Ausdruck der Secularbewegung der Planeten zu finden, welcher, als er die numerischen Werthe der auf den Jupiter und Saturn sich beziehenden Größen in denselben setzte, sich gegen seine Erwartung auf Null reducirte. Er vermuthete, daß dieß nicht ein besonderer nur bey diesen zwey Planeten eintretender Fall sey, und daß, wenn man jenen Ausdruck mittelst der gegenseitigen Beziehungen der darinn enthaltenen verschiedenen Größen auf seine einfachste Form brächte, alle Glieder desselben sich gegen einander aufheben würden. Der Calcul bestätigte diese Vermuthung, und zeigte ihm, daß allgemein die mittleren Bewegungen der Planeten und ihre mittleren Entfernungen von der Sonne unveränderlich sind, wenigstens wenn man die vierten Potenzen der Excentricitäten und der Neigungen der Bahnen, und die Quadrate der perturbirenden Massen oder Kräfte vernachläßigt, welches für das gegenwärtige Bedürfniß der Astronomie mehr als hinreichend ist. La Grange *) hat dieses Resultat bestätigt, und allgemein gezeigt, daß der Ausdruck der großen Axe der Planetenbahnen niemals ein der Zeit proportionales Glied enthalten kann, wie weit man auch die Approximation in Beziehung auf die Excentricitäten und Neigungen der Bah-

*) Mém. de l'Acad. de Berlin. 1776.

nen treiben mag. Folglich hängen die beobachteten Veränderungen der mittleren Bewegungen des Jupiters und Saturns nicht von ihren Secularungleichheiten ab.

§. 331. Die Unveränderlichkeit der mittleren Bewegungen der Planeten ist eines der merkwürdigsten Phänomene des Weltsystems. Alle anderen Elemente der Ellipsen, welche die Planeten beschreiben, sind veränderlich. Diese Ellipsen nähern sich durch unmerkliche Stufen der kreisförmigen Gestalt, und entfernen sich wieder von derselben, ihre Neigungen gegen eine unveränderliche Ebene und gegen die Ebene der Ekliptik nehmen zu und ab, ihre Perihelien und Knoten sind in Bewegung, wie man durch die Vergleichung weit von einander entfernter Beobachtungen gefunden hat. So hat z. B. das Perihelium der Erdbahn gegenwärtig eine jährliche siderische directe Bewegung von 11″,8 (§. 191.), und die Neigung der Ebene ihrer Bahn gegen die Ebene des Erdäquators nimmt in 100 Jahren um 52″,1 ab (§. 39.). Euler *) fand zuerst in der allgemeinen Schwere die Ursache dieser Verminderung, welche gegenwärtig die vereinigte Wirkung aller Planeten vermöge der Lage ihrer Bahnen gegen einander hervorzubringen strebt. Seine Rechnungen gaben ihm die Secularabnahme der Schiefe der Ekliptik nahe mit den Beobachtungen übereinstimmend = 49″. La Place fand mittelst der §. 303. angegebenen Planetenmassen die Abnahme der Schiefe der Ekliptik in t von dem Jahr 1750 an verfloßenen Jahren $= 0'' 521428\,t - 0'',000007196\,t^2$ **). Eine Vergleichung der von den Alten beobachteten Schiefen der Ekliptik mit den nach der Theorie von La Place berechneten findet man in der Connaiss des tems pour 1811., woraus sich ergiebt, daß die Differenz zwischen der Theorie und den Beobachtungen für jene gröbere Beobachtungen ganz unbedeutend ist. Indessen scheint nach den neueren Beobachtungen die Abnahme der Schiefe der Ekliptik geringer zu seyn. Bradley und de la Caille fanden die Schiefe der Ekliptik für das Jahr 1750 = 23° 28′ 18″, und 23° 28′

*) Mém. de Berl. pour 1754.
**) Méc. cél. T. III. pag. 157.

19″; alſo im Mittel = 23° 28′ 18″,5. Nach de Lambre, Maskelyne und Piazzi *) iſt für 1800 im Mittel = 23° 27′ 56″,6 (§. 39.), mithin die Abnahme in 50 Jahren = 21″,9, und in 100 Jahren = 43″,8. Mayer fand für das Jahr 1756 die Schiefe der Ekliptik = 23° 28′ 16″, und Maskelyne für 1769 = 23° 28′ 9″,7. Reducirt man dieſe Beobachtungen mittelſt der Secularabnahme 43″,8 auf den Anfang des Jahrs 1800; ſo findet man

nach Bradley	23°	27′ 56″,1	}	aus der Schiefe
de la Caille	23	27 57,1	}	für 1750
Mayer	23	27 56,7		a. d. Sch. f. 1756.
Maskelyne	23	27 56.1		— — 1769.
de Lambre	23	27 57,0	}	Schiefe für 1800.
Maskelyne	23	27 56,6		
Piazzi	23	27 56,3		
Schiefe f. 1800 im Mittel	= 23	27 56,557		

Dieſe von ſehr genauen Beobachtern und mit ausgeſuchten Inſtrumenten angeſtellten Meſſungen ſtimmen alſo ſehr genau miteinander überein, da man hingegen Unterſchiede von 3 bis 4 Sek. findet, wenn man die Secularabnahme der Schiefe der Ekliptik = 52″,1 ſetzt **).

Vermöge der Secularbewegung der Apſidenlinie der Erdbahn fiel der Punkt der Erdnähe der Sonne mit dem Punkt der Frühlingsnachtgleiche zuſammen im Jahr 4089 vor unſerer Zeitrechnung ***). Es iſt merkwürdig, daß dieſe aſtronomiſche Epoche nahe diejenige iſt, auf welche die meiſten Chronologen die Schöpfung der Welt ſetzen. Um das Jahr 1248 machte die große Axe der Erdbahn mit der Linie der Nachtgleichen einen rechten Winkel.

Die alten Beobachtungen ſind zu wenig genau, und die neueren liegen zu nahe bey einander, als daß man mit Genauigkeit die größeren Veränderungen der Planetenbahnen feſtſetzen könnte, übrigens vereinigen ſie ſich darin, daß ſie das Daſeyn dieſer Veränderungen und einen mit dem Geſetz der allgemeinen Schwere übereinſtimmenden Gang derſelben beweiſen. Man würde alſo durch die Theorie den Beobach-

*) Tables astron. publ. por le bureau des long. l. P. feuille e. pag. 2.
**) Vergl. Monatl. Corresp. May. 1810. pag. 429. u. f.
***) Méc. cél. T. III. pag. 158.

tungen zuvorkommen, und die wahren Werthe der Secularungleichheiten der Planeten angeben können, wenn ihre Massen genau bekannt wären, und umgekehrt wird die Vergleichung der Theorie mit den Beobachtungen eines der sichersten Mittel seyn, diese Massen zu bestimmen, wenn jene Veränderungen durch die Länge der Zeit werden merklicher geworden seyn. Alsdenn wird man in Gedanken auf die Veränderungen zurückgehen können, welche das Planetensystem erlitten hat; man wird diejenigen vorhersehen können, welche die zukünftigen Jahrhunderte den Beobachtern darbieten werden, und der Mathematiker wird in seinen Formeln mit einem Blick alle vergangene und zukünftige Zustände dieses Systems übersehen. Diejenigen Secularveränderungen, welche La Place mittelst des §. 303. angegebenen Massen berechnet hat, findet man in dem 191sten §.

§. 332. La Place wirft nun folgende interessante Fragen auf *): Waren die Planetenbahnen beständig dem Kreis nahe kommende Ellipsen, und werden sie beständig nahe kreisförmig seyn? Waren nicht einige der Planeten ursprünglich Cometen, deren Bahnen sich durch die Anziehung der anderen Planeten nach und nach dem Kreis genähert haben? Wird die Schiefe der Ekliptik so lange abnehmen, bis die Ekliptik mit dem Aequator zusammenfällt, welches eine beständige Tag- und Nacht-Gleiche auf der ganzen Erde hervorbringen würde? Die Analyse beantwortet diese Fragen auf eine genügende Art. La Place hat bewiesen **), daß, welche Werthe die Massen der Planeten auch haben mögen, allein wegen ihrer Bewegung nach einerley Richtung, und in wenig excentrischen um kleine Winkel gegen einander geneigten Bahnen ihre Secularungleichheiten periodisch und in enge Gränzen eingeschlossen sind, so daß das Planetensystem nur um einen gewissen mittleren Zustand hin und her oscillirt, von welchem es sich niemals über eine sehr kleine Größe entfernen kann. Die Ellipsen der Planeten waren also beständig nahe kreisförmig, und werden es beständig seyn; wor-

*) Expos. du Syst. du M. pag. 197.
**) Méc. cél. T. I. L. II. Ch. VII.

aus folgt, daß kein Planet urſprünglich ein Comet kann geweſen ſeyn, wenigſtens wenn man nur auf die gegenſeitige Wirkung der Körper des Planetenſyſtems Rückſicht nimmt. Die Ekliptik wird niemals mit dem Aequator zuſammenfallen, und die gröſte Veränderung ihrer Neigung kann ſich nicht über zwey und dreyviertel Grade erſtrecken.

§. 333. Wegen dieſer Bewegungen der Planetenbahnen und der eigenen Bewegung der Fixſterne werden die Aſtronomen in Verlegenheit kommen, wenn ſie genaue durch einen großen Zeitraum von einander getrennte Beobachtungen mit einander werden vergleichen wollen. Schon jetzt fangt dieſe Verlegenheit an merklich zu werden, und es iſt daher intereſſant, mitten unter allen dieſen Veränderungen eine unveränderliche oder beſtändig eine parallele Lage beybehaltende Ebene zu finden, auf welche man die Bewegungen der Himmelskörper beziehen kann. La Place hat ein einfaches Mittel angegeben, eine ſolche Ebene in demjenigen Fall zu finden, wo ein ganzes Syſtem von Körpern nur den Einwirkungen dieſer Körper auf einander, und keinen fremden Kräften ausgeſetzt iſt. Die Anwendung dieſes Mittels auf das Sonnenſyſtem giebt folgende Regel zur Beſtimmung der Lage einer ſich beſtändig parallel bleibenden Ebene *):

Man denke ſich in irgend einem Augenblick durch den Mittelpunkt der Sonne eine Ebene nach Belieben gelegt, und in der angenommenen Ebene ſeyen aus dem Mittelpunkt der Sonne gerade Linien an die aufſteigenden Knoten der Planetenbahnen gezogen, welche ſie mit der angenommenen Ebene bilden. Auf dieſen geraden Linien ſeyen von dem Mittelpunkt der Sonne an Stücke abgeſchnitten, welche den Tangenten der Neigungen der Planetenbahnen gegen die angenommene Ebene für einen beliebigen angenommenen Halbmeſſer gleich ſeyen. Man denke ſich an den Endpunkten dieſer Abſchnitte Maſſen, welche den Produkten der ihnen entſprechenden Maſſen der Planeten durch die Quadratwurzeln aus den Parametern ihrer Bahnen und durch die Coſinus ihrer Neigungen gegen die angenommene Ebene proportional ſeyen, und beſtimme den Schwerpunkt dieſes neuen Syſtems von Maſſen. Alsdenn wird die von dieſem Punkt an den Mittelpunkt der Sonne gezogene gerade Linie die Tangente der Neigung der unveränderlichen Ebene gegen die angenommene Ebene ſeyn, und die Verlängerung dieſer geraden Linie wird an dem Himmel auf derſelben Seite der Sonne, auf welcher jener Schwerpunkt liegt, die Lage des aufſteigenden Knotens bezeichnen, welchen die unveränderliche Ebene mit der angenommenen bildet.

Welche Veränderungen auch die Planetenbahnen, und die

*) Expos. pag. 198.

wahre Länge des Monds in seiner Bahn von dem mittleren Aequinoktialpunkt an gerechnet. Bringt man noch die Reduction auf die Ekliptik an, welche mit dem Argument $☽''' + N'$ gefunden wird, und

XXVIII.

n. B.	n. M.
- 406″,8 Sin. $(☽''' + N')$	+ 411″
+ 2,1 Sin. $2(☽''' + N')$	

ist; so hat man die vom mittleren Aequinoktialpunkt an gerechnete wahre Länge des Monds in der Ekliptik, zu welcher man noch die unter dem Namen der Nutation bekannte Gleichung des Aequinoktialpunkts (§. 160.) hinzufügen muß, um die wahre Mondslänge in der Ekliptik von dem scheinbaren Aequinoktialpunkt an gerechnet zu erhalten. Diese Gleichung ist + 18″,0 Sin. N.

Bezeichnet man die Argumente der Breite mit I, II, u. s. w. so ist das erste Argument der Breite gleich dem acht und zwanzigsten der Länge $= ☽''' + N'$. Man mache $D'' = ☾''' - ☉$; so ist das IIte $= 2D'' - I$; III $= I - a$; IV $= I - A$; V $= IV - A$; VI $= V - A$; VII $= II + a$; VIII $= II - a$; IX $= II + A$; X $= II - A$; XI $= X - A$; XII $= ☽'''$; und die Breite des Monds

	nach La Place.	Bürg.	Mayer.
=	+ 18520″,8 Sin. I.	18520″,8	18510″
	- 5,7 Sin. 3 I.	5,0	6,5
	+ 526,9 Sin. II.	528,4	529
	- 1,5 Sin. III.	3,1	2
	+ 17,8 Sin. IV.	17,6	17,4
	- 26,2 Sin. V.	25,1	24,1
	- 2,9 Sin. VI.	1,9	2,7
	+ 8,3 Sin. VII.	9,0	8,3
	+ 4,0 Sin. VIII.	3,7	3,7
	+ 2,6 Sin. IX.	2,2	2,2
	- 15,6 Sin. X.	15,9	15,0
	- 6,1 Sin. XI.	5,2	6,0
	- 8,0 Sin. XII.	8,0	

Die Horizontalparallaxe des Monds unter dem Aequator wird mittelst der vorhin angegebenen Argumente der Länge gefunden, und ist

nach La Place.	Bürg.	Mayer.
= - 0″,4 Cos. I.	- 0″,3	0″,3
0,0 Cos. V.	+ 0,2	
+ 1,8 Cos. 2V.	+ 2,0	2,2
+ 37,3 Cos. VI.	+ 37,3	37,3
+ 0,4 Cos. 2VI.	+ 0,3	0,3
- 0,0 Cos. VII.	- 0,1	0,1
+ 0,2 Cos. IX.	+ 0,2	0,2
+ 0,7 Cos. X.	+ 0,7	0,7
+ 0,8 Cos. XI.	+ 0,8	0,8
+ 0,9 Cos. XIII.	+ 1,0	1,0
+ 0,3 Cos. XIV.	+ 0,6	0,6
- 0,1 Cos. XVIII.	+ 0,4	0,4

La Place	Bürg.	Mayer.
+ 57′ 0″,0	57″ 1″,0	57′ 11,0
+ 186,9 Cos. XXV.	+ 187,3	187,7
+ 10,2 Cos. 2XXV.	+ 10,0	10,0
+ 0,6 Cos. 3XXV.	+ 0,2	0,3
- 1,0 Cos. XXVI.	- 1,0	1,0
+ 26,4 Cos. 2XXVI.	+ 26,0	27,2
+ 0,3 Cos. 3XXVI.	+ 0,2	
- 0,8 Cos. XXVII.	- 0,8	0,8
+ 0,1 Cos. XXVIII.		

§. 328. Die gröſte Abweichung der von Mayer nach der Theorie gefundenen Gleichungen der Länge des Monds von denjenigen, welche er aus den Beobachtungen abgeleitet hat, ſteigt nicht über 35 Sek. *). Die Gleichungen der Mondsbreite und der Parallaxe ſind ſo klein, daß ſie durch die Theorie genauer als durch die Beobachtungen können gefunden werden. Mayer hat ſie auch wirklich mit den Beobachtungen ſo genau übereinſtimmend gefunden, daß er keine Veränderung für nöthig hielt, und nur die mittlere Neigung der Mondsbahn, welche nicht durch die Theorie gefunden werden kann, um 4 Sek. gröſſer machte, als er ſie anfänglich vorausgeſetzt hatte **).

La Place hat in ſeiner Mechanik des Himmels die Genauigkeit in der Berechnung der Ungleichheiten der Mondsbewegungen noch weiter getrieben, und ſeine nach der Theorie gefundenen Gleichungen der Länge des Monds weichen von denjenigen, welche er aus Bürgs allein aus den Beobachtungen abgeleiteten Gleichungen erhielt, niemals über 9 Sek. ab ***). Die genaue Uebereinſtimmung ſeiner Theorie mit den Beobachtungen in Anſehung der Breite und Parallaxe des Monds ſieht man aus den vorhin angegebenen Gleichungen. Aus dem oben angeführten Grund werden dieſe nach der Theorie gefundenen Gleichungen den aus den Beobachtungen abgeleiteten vorzuziehen ſeyn. Man würde durch noch weiter getriebene Approximationen ohne Zweifel auch jene kleinen Unterſchiede der berechneten und beobachteten Ungleichheiten der Mondsbewegung in der Länge vollends können verſchwinden machen, aber ſchon dieſe Vergleichung der Theorie mit den Beobachtungen iſt hinreichend, um unwiderſprechlich darzuthun, daß die allgemeine Schwere die einzige Urſache aller Ungleichheiten des Monds iſt.

Unter den Gleichungen der Mondslänge ſind zwey beſonders merkwürdig. Die erſte iſt diejenige, welche dem Sinus des Abſtands des Monds von der Sonne proportional iſt, und das erſte Glied der 26ten Gleichung ausmacht. Sie hängt von der Son-

*) Theoria Lunæ. pag. 52.
**) A. a. O. pag. 57.
***) Méc. cél. T. III. L. VII. pag. 281.

des Jupiters und Saturns independente Urſachen ihre Bewegungen verändert haben möchten. Indem aber La Place weiter hierüber nachdachte; ſo fand er den Gang der in den Bewegungen dieſer zwey Planeten beobachteten Veränderungen ſo gut mit demjenigen, welcher ſich aus ihrer wechſelſeitigen Anziehung ergeben mußte, übereinſtimmend, daß er keinen Anſtand nahm, die Hypotheſe einer fremden Einwirkung aufzugeben. Es ergiebt ſich nemlich aus der Wirkung der Planeten aufeinander, wenn man nur auf die Ungleichheiten von ſehr langen Perioden Rückſicht nimmt, dieſes merkwürdige Reſultat *), daß die Summe der Quotienten, welche man erhält, wenn man die Maſſe eines jeden Planeten mit der großen Axe ſeiner als eine veränderliche Ellipſe betrachteten Bahn dividirt, ſehr nahe einer beſtändigen Größe gleich iſt. Da nun die mittleren Bewegungen in einer gegebenen Zeit umgekehrt den Umlaufszeiten, mithin umgekehrt den Würfeln dieſer Axen (§. 180.) proportional ſind; ſo muß, wenn die Bewegung des Saturns durch die Wirkung des Jupiters ſich verzögert, die des Jupiters durch die Wirkung des Saturns ſich beſchleunigen, welches mit den Beobachtungen übereinſtimmt. La Place ſahe überdiß, daß das Verhältniß dieſer Veränderungen daſſelbe war, welches die Beobachtungen zeigten. Setzt man mit Halley die Verzögerung des Saturns im erſten von 1700 an gerechneten Jahrhundert = 83″,5; ſo würde die correſpondirende Beſchleunigung des Jupiters ſeyn = 34″,1, nahe = 34″,4, wie Halley durch die Beobachtungen gefunden hatte. Er hielt es daher für ſehr wahrſcheinlich, daß die beobachteten Veränderungen der mittleren Bewegungen des Jupiters und Saturns eine Folge ihrer gegenſeitigen Attraction ſeyen, und da er ſchon gefunden hatte, daß dieſe in den mittleren Bewegungen keine, weder beſtändig wachſende, noch periodiſche Ungleichheiten, welche von der Configuration dieſer Planeten independent wären, hervorbringen könne (§. 330.), und daß ſie nur von dieſer Configuration abhängende Irregularitäten verurſache; ſo vermuthete er eine beträchtliche Ungleichheit

*) Méc. cél. T. III. L. VI. Chap. XV. n. 39. pag. 147. u. T. I. pag. 333.

von dieſer Art, und von einer ſehr langen Periode, woraus die beobachteten Veränderungen entſtehen könnten.

§. 335. Weil die Umlaufszeiten des Jupiters und des Saturns nahe unter ſich commenſurabel ſind, und fünfmal die mittlere Bewegung des Saturns ſehr nahe der doppelten mittleren Bewegung des Jupiters gleich iſt *); ſo ſchloß La Place, daß, wenn unter den Ausdrücken der auf dieſe zwey Planeten wirkenden perturbirenden Kräfte Glieder vorkämen, welche den Ueberſchuß der fünffachen Länge des Saturns über die doppelte Länge des Jupiters zu Argumenten hätten, daraus ſehr beträchtliche Ungleichheiten in den Bewegungen dieſer Planeten entſtehen könnten (S. §. 314. pag. 557. u. 558.), und er betrachtete daher dieſe Glieder als eine ſehr wahrſcheinliche Urſache der in den mittleren Bewegungen des Jupiters und des Saturns beobachteten Veränderungen. Die Wahrſcheinlichkeit dieſer Urſache und die Wichtigkeit des Gegenſtands beſtimmten ihn, die beſchwerliche Rechnung zu unternehmen, welche nöthig war, um ſich davon zu verſichern. Das Reſultat dieſer Rechnung beſtätigte vollkommen ſeine Vermuthung, und zeigte ihm erſtlich, daß die Bewegung des Saturns einer großen Ungleichheit unterworfen iſt, welche auf 49′ 12″ ſteigt, eine Periode von 929 $\frac{1}{2}$ Jahren hat, und zu der mittleren Länge des Saturns hinzugefügt werden muß, zweytens, daß die Bewegung des Jupiters eine ähnliche correſpondirende Ungleichheit von einer ſehr nahe ebenſo großen Periode hat, welche aber der Ungleichheit des Saturns entgegengeſetzt iſt, und nur auf 20′ 14″ ſteigt **). Die Größe der Coefficienten dieſer Ungleichheiten und die Dauer ihrer Perioden verändern ſich mit den Secularveränderungen der Elemente der Bahnen, von welchen ſie abhängen. La Place hat ſowohl die Größe dieſer Coefficienten als ihre Secularverminderung mit einer beſonderen Sorgfalt beſtimmt. Obige Angaben

*) Nach §. 191. pag. 301. iſt 5 mal die ſid. Bewegung des Saturns in 365 Tagen weniger 2 mal die correſpondierende ſid. Bew. des Jupiters $= 0^{\circ}\ 24'\ 31'',87965$.

**) La Place gab der Pariſer Akademie am 10. May 1786 Nachricht von dieſer Entdeckung.

beziehen sich auf das Jahr 1750. Im Mittel genommen findet sich die Periode dieser Ungleichheiten aus den §. 191. angegebenen mittleren Bewegungen des Jupiters und Saturns = 879,9 julianischen Jahren.

Seyen J, S und U die mittleren heliocentrischen Längen des Jupiters, Saturns und Uranus von dem als unbeweglich angenommenen Punkt der Frühlingsnachtgleiche für den ersten Januar 1750 an gerechnet, und t die Anzahl der von der Mitternacht des ersten Januars 1750 an verfloßenen julianischen Jahre von $365\frac{1}{4}$ Tagen; so sind (Méc. cél. T. IV. L. X. Chap. VIII. pag. 337 et suiv.)

$J = 3^\circ\ 45'\ 47'',51 + (30^\circ\ 20'\ 56'',3964)\,t,$
$S = 231\ 21\ 53\ 90 + (12^\circ\ 13'\ 17'',1167)\,t,$
$U = 318\ 34\ 14\ 8 + (4^\circ\ 17'\ 4'',7)\,t,$

die große Gleichung für die Länge des Jupiters

$= +(1205'',397 - 0'',03018t + 0'',0000349t^2) \times$
$\text{Sin.}\,(5J - 2S + 4^\circ\ 30'\ 30' - 78'',489t + 0'',01227t^2)$
$- 13'',174\,\text{Sin.}\,2(5J - 2S + 4^\circ\ 30'\ 30'' - 78'',489t + 0'',01227t^2);$

für die Länge des Saturns

$= -(2952'',097 - 0,08871t + 0'',0000821t^2) \times$
$\text{Sin.}\,(5J - 2S + 4^\circ\ 32'\ 45'' - 77'',062t + 0'',01178t^2)$
$+(30'',689 - 0'',0017171t) \times$
$\text{Sin.}\,2(5J - 2S + 4^\circ\ 32'\ 45'' - 77'',062t + 0'',01178t^2),$

zu welcher noch eine von der Einwirkung des Uranus abhängende Ungleichheit kommt, welche im Mittel eine Periode von 569 Jahren hat, und

$= +31'',03\,\text{Sin.}\,(3U - S - 85^\circ\ 34'\ 12')$ ist.

§. 335. Diesen großen vorher unbekannten Ungleichheiten muß man die scheinbare Verzögerung des Saturns und die scheinbare Beschleunigung des Jupiters zuschreiben. Um das Jahr 1560 hatten sie ihr Maximum erreicht, und von dieser Epoche an näherten sich die scheinbaren Bewegungen dieser zwey Planeten den wahren, welchen sie um das Jahr 1792 gleich waren. Daher kommt es, daß Halley bey der Vergleichung der neueren Beobachtungen mit den alten die mittlere Bewegung des Saturns langsamer und die des Jupiters geschwinder fand als bey der Vergleichung der neueren Beobachtungen unter sich, anstatt daß die letzteren Lambert eine Beschleunigung in der Bewegung des Saturns und eine Verzögerung in der des Jupiters anzeigten, und es ist merkwürdig, daß die Größen dieser von Halley und Lambert allein aus den Beobachtungen abgeleiteten Un-

gleichheiten ſehr nahe dieſelben ſind, welche ſich aus den von La Place nach der Theorie gefundenen Gleichungen ergeben. Wäre die Aſtronomie vier und ein halbes Jahrhundert ſpäter wieder hergeſtellt worden; ſo würden die Beobachtungen die entgegengeſetzten Phänomene gezeigt haben. Die mittleren Bewegungen, welche die Aſtronomie eines Volks dem Jupiter und Saturn zuſchreibt, können uns alſo über die Zeit ihrer Gründung Aufſchluß geben. Man findet hienach, daß die Indier die mittleren Bewegungen dieſer Planeten in demjenigen Theil der Periode jener Ungleichheiten beſtimmt haben, wo die ſcheinbare Bewegung des Saturns am langſamſten, und die des Jupiters am geſchwindeſten war. Zwey ihrer Hauptepochen, deren eine auf das Jahr 3102 vor der chriſtlichen Zeitrechnung, die andere auf das Jahr 1491 fällt, erfüllen ungefähr dieſe Bedingung *).

Von dem beynahe commenſurablen Verhältniß der Bewegungen des Jupiters und Saturns kommen noch andere ſehr merkliche Ungleichheiten her. Die beträchtlichſte betrifft die Bewegung des Saturns, welche ſich mit der Gleichung des Mittelpunkts vermengen würde, wenn die fünffache Bewegung dieſes Planeten genau der doppelten Bewegung des Jupiters gleich wäre, und ſie hat hauptſächlich in dem letzten Jahrhundert die von La Lande in den Bewegungen des Saturns bemerkten Ungleichheiten hervorgebracht. Allgemein, ſagt La Place **), „als ich dieſe verſchiedenen Ungleichheiten gefunden, und diejenige, welche man ſchon vorher in Rechnung genommen hatte, mit einer größeren Sorgfalt, als es vorher geſchehen war, beſtimmt hatte; ſo ſahe ich alle in den Bewegungen dieſer zwey Planeten beobachteten Phänomene von ſelbſt an die Theorie ſich anfügen: ſie ſchienen vorher eine Ausnahme von dem Geſetz der allgemeinen Schwere zu machen, und jetzt ſind ſie einer der auffallendenſten Beweiſe für daſſelbe. Dieß war das Loos dieſer glänzenden Entdeckung, daß jede ſich erhebende Schwierigkeit für ſie der Gegenſtand eines neuen Triumphes war, welches das ſicherſte Kennzeichen des wahren Naturſyſtems iſt.

*) Expos. du Syst. du M. pag. 201.
**) A. a. O. pag. 202.

Die Ausdrücke, welche ich für die Bewegungen des Jupiters und Saturns erhielt, leisten mit einer merkwürdigen Genauigkeit den 111 letzten Oppositionen dieser Planeten, welche von den geschiktesten Astronomen mittelst der besten Mittagsferuröhren und der grösten Quadranten beobachtet worden sind, Genüge; der Fehler hat niemals 13 Sekunden erreicht, und es sind noch keine zwanzig Jahre, daß die Fehler der besten Tafeln zuweilen 1300 Sek. überstiegen. Diese Ausdrücke stellen ferner, mit der Genauigkeit der Beobachtungen selbst, die Beobachtungen Flamsteed's, der Araber, und die von Ptolemäus angeführten dar. Die große Genauigkeit, mit welcher die zwey grösten Planeten unsers Planetensystems seit den frühesten Zeiten dem Gesetz ihrer wechselseitigen Attraction gehorcht haben, beweißt die Stabilität dieses Systems, weil der Saturn, welcher von der Sonne hundertmal schwächer als die Erde angezogen wird, demungeachtet von Hipparch an bis auf unsere Zeiten keine bemerkbare Einwirkung durch fremde Ursachen erlitten hat."

§. 336. Die Kenntniß der Bewegungen der Erde oder der scheinbaren Bewegungen der Sonne ist, wie man in dem zweyten Buch gesehen hat, für den Astronomen unentbehrlich, um aus den verwickelten scheinbaren Bewegungen der Planeten ihre heliocentrischen Bewegungen ableiten zu können. Es waren daher für die Astronomie genaue Sonnentafeln von der äussersten Wichtigkeit. Man bemerkte bald, daß die elliptische Theorie nicht hinreichte, um die scheinbaren Bewegungen der Sonne genau darzustellen, und daß besonders der Jupiter und die Venus merkliche Störungen in der Bewegung der Erde hervorbrachten, von welcher die scheinbare Bewegung der Sonne abhängt. Ohne die Theorie der allgemeinen Schwere würde es nicht möglich gewesen seyn, die Gesetze und die Größe aller der kleinen Ungleichheiten zu entdecken, welchen die scheinbare Bewegung der Sonne ausgesetzt ist. Mayer nahm in seine Sonnentafeln *) auf-

*) Sie sind der Theoria Lunæ angehängt, und stehen auch in der Sammlung astr. Tafeln. Berlin. 1776.

ſer der in dem 307ten §. betrachteten Mondsgleichung, welche er auf 8″ ſetzte, noch die durch den Jupiter und die Venus hervorgebrachten Störungen auf, deren gröſte Werthe nach dieſen Tafeln beziehungsweiſe 7″,5 und 6″,0 ſind. La Place hat ſo wohl dieſe als auch die von den Wirkungen des Mars und Saturns auf die Erde herrührende Störungen genauer berechnet, und dadurch den Sonnentafeln einen hohen Grad von Genauigkeit verſchaft. Die neueſten ſind diejenigen, welche von Zach *) und Delambre **) ungefähr zu gleicher Zeit, ohne daß der eine von den Berechnungen des andern etwas wußte, berechnet haben. Dieſe Tafeln differiren in der Epoche der mittleren Länge der Sonne für 1800 nur um 0″,9, des Apogäums um 1″,4, in der Gleichung des Mittelpunkts um 0″,17, und in der mittleren Bewegung der Sonne in 100 Jahren um 3″, welcher letztere Unterſchied blos daher rührt, daß von Zach und Delambre eine um 3″ verſchiedene Secularbewegung des Aequinoktialpunkts vorausgeſetzt haben. Die Tafeln des letztern gründen ſich auf mehr als 700 Beobachtungen von Bradley, auf ebenſo viele Beobachtungen von Maskelyne und Bouvard endlich auf vier Aequinoktien, deren jedes durch mehr als 300 Beobachtungen beſtimmt iſt, der erſtere hat ſeine im Jahr 1792 herausgegebene Sonnentafeln durch eine groſe Anzahl auf der Seeberger Sternwarte angeſtellter Beobachtungen verbeſſert, und beyde ſtimmen in ihren Angaben der Elemente der Erdbahn ſo genau überein, daß dieſe neuen Sonnentafeln ein gleiches Zutrauen verdienen. Sie ſind zugleich ein Beweis für die Genauigkeit, welche die neuere Aſtronomie erreicht hat.

§. 337. Auch auf die vorher vernachläßigten Störungen der Erde in der Breite hat La Place Rückſicht genommen, welche eine kleine ſcheinbare Bewegung der Sonne in der Richtung der Breite hervorbringen, und auf ihre ſcheinbare Abweichung Einfluß haben. Die von den Planeten herrühren-

*) Tabulæ motuum Solis novæ et iterum correctæ. Auctore *de Zach*. Gothæ 1801. Abgekürzt in Monatl. Corresp. Jan. 1809.

**) Tables astron. publ. par le bureau des longitudes de France. I. P. A Paris. 1806.

den Störungen der Erde in der Breite sind sehr gering, und keine steigt auf $\frac{1}{4}$ Sek. Beträchtlicher ist diejenige, welche von der Einwirkung des Monds abhängt, und daher rührt, daß eigentlich der gemeinschaftliche Schwerpunkt des Monds und der Erde eine Ellipse um die Sonne beschreibt. Man hat in dem 307ten §. die hieraus entstehende Ungleichheit in der scheinbaren Bewegung der Sonne gesehen. Bewegte sich der Mond in der Ebene der Erdbahn; so würde nur eine Ungleichheit in der Richtung der Länge Statt finden. Da aber die Erde in der Ebene der gegen die Ekliptik um einen Winkel $5° 8' 47''$ geneigten Bahn des Monds um den gemeinschaftlichen Schwerpunkt dieser zwey Körper eine der Mondsbahn ähnliche Bahn beschreibt (§. 296.); so muß sich von der Sonne aus gesehen die Erde um jenen Schwerpunkt in einer schmalen Ellipse zu bewegen scheinen, deren halbe große Axe daselbst unter einem Winkel von $7'',5$ erscheinen würde (§. 307.), und deren halbe kleine Axe sich zu der halben großen Axe wie der Sinus totus zu dem Sinus der Neigung der Mondsbahn, oder wie $1 : 0{,}0897$ verhält. Die halbe kleine Axe dieser Ellipse würde also von der Sonne aus unter einem Winkel von $0{,}0897 \times 7{,}5$ oder $0'',67$ erscheinen, mithin die Erde eine südliche heliocentrische Breite von $0'',67$ haben, wenn der Mond eine nördliche Breite von $5° 8' 47''$ hat. Die Sonne wird um ebenso viel nördlich von der Ekliptik abzustehen scheinen, und es wird hieraus eine scheinbare Bewegung der Sonne in der Breite folgen, welche mit der Mondsbreite einerley Zeichen hat, und sich mit derselben nach einerley Gesetz, mithin dem Sinus des Abstands des Monds von seinem aufsteigenden Knoten proportional (§. 190. n 2.), verändert. Diese Ungleichheit kann sich mit den übrigen von der Wirkung der Planeten herrührenden auf eine Sekunde belaufen, und, weil ihre Summe bald positiv, bald negativ wird, scheinbare Irregularitäten in den beobachteten Abweichungen der Sonne hervorbringen, welche auf zwey Sekunden steigen, und bey der jetzigen Genauigkeit der Beobachtungen nicht unbemerkt bleiben können.

§. 338. Die Störungen der übrigen älteren Planeten hat La Place in seiner Mechanik des Himmels mit gleicher Sorgfalt berechnet *). Sie sind beträchtlich kleiner als diejenigen, welche durch die Wirkungen des Jupiters und Saturns auf einander hervorgebracht werden. Die gröſsten zeigt folgende Tafel

	in der Länge	in d. Breite
Mercur	8″,5	unmerkl.
Venus	11,4	0″,3
Mars	25,2	0,4
Uranus	149,8	0,9

Zu diesen kommen aber noch viele kleinere Ungleichheiten, welche mit den obigen sich anhäufen, und gröſsere Unterschiede zwischen den elliptischen und den wahren Bewegungen hervorbringen können. Am merklichsten sind die Störungen des Uranus durch den Saturn, von welchen, ungeachtet er noch nicht lange entdeckt ist, dennoch die Beobachtungen unläugbare Kennzeichen angeben. Die Gesetze der elliptischen Bewegung leisten nicht genau seinen beobachteten Stellungen Genüge, und man muſs, um sie darstellen zu können, auf seine Perturbationen Rücksicht nehmen. Ihre Theorie weist ihm mit einer ganz besonderen Uebereinstimmung in den Jahren 1769, 1756 und 1690 dieselben Punkte des Himmels an, in welchen Le Monnier, Mayer und Flamsteed die Stellung dreyer kleinen von ihnen als Fixsterne angesehenen Sterne bestimmt haben, und die man gegenwärtig nicht mehr an dem Himmel findet, welches keinen Zweifel über die Identität dieser Sterne mit dem Uranus übrig läſst (§. 121.).

Die vier neuen in diesem Jahrhundert entdekten Planeten sind wegen ihrer Nähe bey dem Jupiter, und wegen der beträchtlichen Excentricität und Neigung ihrer in einander geschlungenen Bahnen groſsen Ungleichheiten unterworfen, welche über die Theorie der Attractionen der Himmelskörper ein neues Licht verbreiten, und zu ihrer ferneren Vervollkommnung Gelegenheit geben werden. Die Beobachtungen zeigen die Störungen der Ceres, deren elliptische Ele-

*) Mécan. cél. T. III. L. VI.

mente am genaueſten beſtimmt zu ſeyn ſcheinen, ſchon deutlich, und Gauß hat zu der Berechnung derſelben Formeln *) und Tafeln **) geliefert, aus welchen man ſieht, daß die beträchtlichſten auf 231; 492, 37; 598,69 und 437,75 Sekunden ſteigen.

§. 339. Es iſt ſchon oben bemerkt worden, daß die Cometen bisher keine merkliche Peturbationen in dem Planetenſyſtem hervorgebracht haben können, und daher ihre Maſſen in Vergleichung mit den Maſſen der Planeten ſehr klein ſeyn müſſen. Umgekehrt bringen aber die Planeten Ungleichheiten in den Bewegungen der Cometen hervor, welche beſonders in den Zwiſchenzeiten ihrer Wiederkehr zu dem Perihelium merklich ſind. Man wird ſich aus dem 216ten §. erinnern, daß ſchon Halley die Irregularitäten, welche er in den Perioden des Cometen von den Jahren 1531, 1607, 1682 bemerkte, der Einwirkung des Jupiters zugeſchrieben, und Clairaut zuerſt die Perturbationen dieſes Cometen durch durch den Jupiter und Saturn berechnet hat, welche innerhalb der von ihm angegebenen Gränzen mit den Beobachtungen übereinſtimmten. Bey dieſer Gelegenheit machte er die Bemerkung, daß ein Körper, welcher ſo entfernte Regionen durchlaufe, und ſo lange Zwiſchenzeiten hindurch ſich unſern Augen entziehe, gänzlich unbekannten Kräften ausgeſetzt ſeyn könne, z. B. der Wirkung anderer Cometen, oder ſelbſt eines Planeten, deſſen Abſtand von der Sonne beſtändig zu groß wäre, um jemals geſehen werden zu können.

Die Beobachtungen des erſten im Jahr 1770 erſchienenen Cometen haben die Aſtronomen auf ein ſehr ſonderbares Reſultat geleitet. Nachdem ſie vergebens verſucht hatten, dieſelbige wie gewöhnlich durch eine paraboliſche Bahn darzuſtellen, fanden ſie, daß dieſer Comet während ſeiner Sichtbarkeit einen Bogen einer elliptiſchen Bahn beſchrieben habe, in welcher er eine Umlaufszeit von ungefähr 5 ½ Jahren haben würde. Lexell, welcher zuerſt dieſe ſonderbare Bemerkung machte, leiſtete dadurch allen Beobachtungen mit Ausnahme

*) Monatl. Corresp. Nov. 1802.
**) M. C. Mærz. 1803.

nahme derjenigen, wo der Comet der Erde am nächſten war, und am ſtärkſten von ihr perturbirt wurde, Genüge *). Das Nationalinſtitut ſetzte einen Preiß auf eine neue Unterſuchung der Beobachtungen dieſes Cometen, welchen Burkhard davon trug. Er erhielt mit Lexell beynahe einerley Reſultat, worüber alſo jetzt kein Zweifel mehr übrig bleibt. Ein Comet von einer ſo kurzen Umlaufszeit hätte aber öfters erſcheinen ſollen; demungeachtet wurde er weder vor 1770 beobachtet, noch hat man ihn indeſſen wieder geſehen. Um dieſes Phänomen zu erklären, bemerkte Lexell, „daß ſeine Bahn durch die Attraction des Jupiters, welchem er im May 1767 ſehr nahe gekommen iſt, gänzlich könnte verändert worden, und dadurch die im Jahr 1770 beobachtete Bahn entſtanden ſeyn; ferner daß eine zu muthmaßende noch ſtärkere Annäherung zum Jupiter die Bahn dieſes Cometen abermals im Auguſt 1779 ſo ſehr ſtören könne, daß, wenn auch die aus den Beobachtungen vom Jahr 1770 gefundene Umlaufszeit richtig ſey, der Comet dennoch nicht wieder um das Jahr 1781 oder 1782, um welche Zeit er abermals erſcheinen ſollte, zu erwarten ſey." Allein es war noch die Möglichkeit dieſer zwey Wirkungen der Attraction des Jupiters darzuthun, und zu zeigen, daß die Elemente der von dem Cometen beſchriebenen Ellipſe ihr Genüge leiſten können. Dieß zeigte La Place, indem er dieſen Gegenſtand der Analyſe unterwarf, und dadurch wird jene Erklärung ſehr wahrſcheinlich **).

§. 340. Unter allen beobachteten Cometen hat ſich dieſer am meiſten der Erde genähert, welche alſo durch ihn beträchtlich hätte müſſen geſtört worden ſeyn, wenn ſeine Maſſe in Vergleichung mit der Erdmaſſe merklich wäre. La Place findet ***), daß, wenn dieſe zwey Maſſen einander gleich wären, die Dauer des ſideriſchen Jahrs durch die Wirkung des Cometen um 10033 Sek. hätte müſſen verlängert worden ſeyn. Man iſt aber durch die zahlreichen von De-

*) Berliner Ephemerid. für 1781. pag. 25. u. 26. der Samml.
**) Méc. cél. T. IV. L. IX. Chap. II. n. 13.
***) A. a. O. pag. 230.

lambre zum Behuf seiner Sonnentafeln gemachten Vergleichungen der Beobachtungen der Sonne versichert, daß seit dem Jahr 1770 das Sternjahr keinen Zuwachs von $2\frac{1}{2}$ Sek. erhalten hat; folglich beträgt die Masse dieses Cometen nicht $\frac{1}{3000}$ der Erdmasse, und wenn man bedenkt, daß er in den Jahren 1767 und 1779 durch das System der Jupitertrabanten hindurch gegangen ist, ohne in demselben die mindeste Störung hervorzubringen, so wird man sehen, daß sie noch kleiner ist. Die Kleinheit der Cometenmassen wird im Allgemeinen durch ihren unmerklichen Einfluß auf die Bewegungen des Planetensystems angezeigt. Diese Bewegungen werden durch die Wirkungen der Planeten allein auf einander so genau dargestellt, daß man die kleinen Abweichungen der besten astronomischen Tafeln allein den Fehlern der Approximationen und der Beobachtungen zuschreiben kann. Sehr genaue durch mehrere Jahrhunderte fortgesetzte und mit der Theorie verglichene Beobachtungen würden allein über diesen wichtigen Punkt des Weltsystems Aufklärung geben können.

Man sieht hieraus, daß wegen der Kleinheit der Massen der Cometen und wegen ihres schnellen Vorübergangs vor der Erde die Wirkungen ihrer Anziehung nicht zu befürchten sind. Nur wenn sie auf die Erde stießen, könnten sie traurige Verwüstungen auf ihr hervorbringen. Aber wenn gleich dieser Stoß möglich ist, so ist er doch in dem Lauf eines Jahrhunderts sehr unwahrscheinlich. Es würde ein so ausserordentlicher Zufall für das Zusammenstoßen zweyer in Vergleichung mit dem unermeßlichen Raum, in welchem sie sich bewegen, so kleiner Körper erfordert, daß man in dieser Hinsicht keinen Grund haben kann etwas zu befürchten. Uebrigens kann die kleine Wahrscheinlichkeit eines solchen Zusammentreffens in einer langen Reihe von Jahrhunderten sehr groß werden. Man kann sich leicht die Wirkungen dieses Stoßes auf die Erde vorstellen, wenn die Masse des Cometen etwas beträchtlich ist. Die Axe und die Umdrehungsbewegung der Erde würden verändert werden, die Meere würden ihre vorigen Lagen verlassen, um sich gegen den neuen Aequator hin zu stürzen, ein großer Theil der Menschen und Thiere würde in dieser allgemeinen Ueber-

ſchwemmung umkommen; oder durch den heftigen der Erde beygebrachten Stoß zerſtört werden, ganze Gattungen würden zernichtet, alle Monumente der menſchlichen Induſtrie würden umgeſtürzt werden. Man ſieht ferner, warum der Ocean hohe Berge bedeckt hat, auf welchem er unläugbare Spuren ſeines Aufenthalts zurückgelaſſen hat; man ſieht, wie Thiere und Pflanzen der ſüdlichen Länder in den nördlichen Erdſtrichen haben exiſtiren können, wo man ihre Ueberreſte und Abdrücke findet; endlich erklärt man die Neuheit der moraliſchen Welt, deren ſichere Monumente nicht über viertauſend Jahre zurück gehen. Das menſchliche Geſchlecht, auf eine kleine Anzahl von Individuen gebracht und in den kläglichſten Zuſtand verſetzt, ſehr lange einzig und allein mit ſeiner Selbſterhaltung beſchäftigt, hat alle Erinnerung an Wiſſenſchaften und Künſte verlieren müſſen, und wenn die Fortſchritte der Civiliſation die Bedürfniſſe derſelben aufs neue fühlbar gemacht haben; ſo mußte alles von neuem angefangen werden, als wenn die Menſchen erſt wären auf die Erde geſetzt worden. Was es aber auch mit dieſer Urſache, welche einige Philoſophen dieſen Erſcheinungen angewieſen haben, vor eine Bewandtniß haben mag; ſo kann man gegen ein ſo ſchreckliches Ereigniß während der kurzen Lebensdauer vollkommen geſichert ſeyn, um ſo mehr, weil die Maſſen der Cometen äuſſerſt klein zu ſeyn ſcheinen, und daher ihr Stoß nur locale Revolutionen hervorbringen würde *).

§. 341. Die Trabanten des Jupiters, Saturns und Uranus bilden in dem Sonnenſyſtem kleinere Syſteme von Himmelskörpern, welche auf ähnliche Art einander gegenſeitig ſtören, wie die Hauptplaneten des Sonnenſyſtems. Die beynahe unter ſich commenſurablen Umlaufszeiten der Jupiterstrabanten (§. 104.) bringen ſehr merkliche Ungleichheiten in ihren Bewegungen hervor, welche La Place in dem vierten Band ſeiner Mechanik des Himmels unterſucht hat. Neben dieſen Ungleichheiten werden durch die Attraction der

*) Expos. du Syst. du M. pag. 213. et suiv.

Sonne noch andere hervorgebracht, welche den Ungleichheiten der Mondsbewegungen ähnlich sind.

Was fürs erste die Lage der Ebene der Bahnen der vier Jupitersträbanten betrifft; so ist schon in dem 222sten §. die Veränderlichkeit derselben erwähnt worden, deren Gesetze nach La Place folgende sind. Die auf die Jupitersbahn bezogene mittlere Knotenlinie der Bahnen aller vier Trabanten fällt mit der Knotenlinie des Aequators des Jupiters zusammen, welche eine retrograde siderische Secularbewegung von 26″,76 hat. Am ersten Januar 1801 um Mitternacht war die jovicentrische Länge des aufsteigenden Knotens des Aequators des Jupiters in seiner Bahn gerechnet $= 314° 27' 54''$, und die Neigung dieses Aequators gegen die Jupitersbahn $= 3° 5' 31''$, welche in 100 Jahren um 2″,28 zunimmt. Die mittleren Neigungen der vier Bahnen gegen die Bahn des Jupiters sind für den ersten Januar 1801 folgende: I. $3° 5' 24''$; II. $3° 4' 25''$; III. $3° 0' 28''$; IV. $2° 40' 58''$: also gegen den Aequator des Jupiters beziehungsweise $7''$; $1' 6''$; $5' 3''$; und $24' 33''$. Die letzteren Neigungen sind constant, und daher ist die mittlere Lage dieser Bahnen einer mit der Veränderung der Lage des Aequators des Jupiters gemeinschaftlichen Secularveränderung unterworfen, vermöge welcher ihre mittleren Knoten in 100 Jahren um 26″,70 in Beziehung auf die Fixsterne zurückgehen, und ihre mittleren Neigungen in 100 Jahren um 2″,28 wachsen. Die periodischen Veränderungen der Neigungen lassen sich so darstellen. Die Bahn eines jeden Trabanten bewegt sich gleichförmig und mit einer constanten Neigung gegen seine mittlere Bahn, so daß die wahre Lage der Bahn durch ihren Neigungswinkel gegen die mittlere Bahn und durch die Länge ihres auf eben diese Bahn sich beziehenden aufsteigenden Knotens gegeben ist. Diese Neigungen und Knotenlängen sammt den siderischen retrograden Bewegungen der Knoten sind:

Neigungen gegen die mittlere Bahn.	Längen der Ω in der mittl. Bahn. 1. Jan. 1801.	Retrogr. sid. Bew. d. Ω in $365\frac{1}{4}$ T.
I. unmerklich	— — —	— — —
II. 27 49″	12° 52′ 50″	12° 2′ 54″,01
III. 12 20	222 58 43	2 33 13 65
IV. 14 58	70 28 45	0 41 29,17

Hieraus ergeben sich die §. 222. angeführten periodischen Veränderungen der Neigungen. Noch finden einige kleinere Ungleichheiten in der Breite Statt, welche bey dem vierten Trabanten auf 2′ 25″ steigen, bey den übrigen aber kleiner sind, und ohne ihren Einfluß auf die Dauer der Verfinsterungen nicht würden bemerkt werden können.

§. 342. Setzt man die jovicentrische Länge eines Trabanten in seiner Bahn und vom Aequinoktialpunkt der Erde an gerechnet $= v$, die mittlere Neigung seiner Bahn gegen die Bahn des Jupiters $= i$, und die Länge ihres aufsteigenden Knotens in der Ebene der letzteren Bahn gerechnet $= n$; so findet man die mittlere jovicentrische Breite b dieses Trabanten über die Bahn des Jupiters durch die Gleichung $\text{Sin.}\, b = \text{Sin.}\, i\, \text{Sin.}\,(v-n)$ (§. 190. n. 2.). Wenn i klein ist; so ist nahe $b = \text{Sin.}\, b + \frac{1}{6}\,\text{Sin.}\, b^3$, und $\text{Sin.}\, i = i - \frac{1}{6} i^3$. Hieraus findet sich $b = (i - \frac{1}{24} i^3)\, \text{Sin.}\,(v-n) - \frac{1}{24} i^3\, \text{Sin.}\, 3\,(v-n)$. Für $i = 3° 5′$ ist $\frac{1}{24} i^3 = 1″{,}3$; also nahe $b = i\, \text{Sin.}\,(v-n)$. Da die in dem vorhergehenden §. angegebenen Neigungen mittelst dieses Ausdrucks aus den Beobachtungen abgeleitet sind; so sind eigentlich die Neigungen selbst um 1″,3 größer.

Sey t die Anzahl der vom 1. Jan. 1801 an verflossenen julianischen Jahre; so ist die der Zeit t entsprechende Länge der mittlere Knoten der Trabantenbahnen von dem Frühlingspunkt der Erde an gerechnet $= 314° 27′ 54″ - 0″{,}2676.t + 50″{,}1.t = 314° 27′ 54″ + 49″{,}83.t$, und, wenn die Länge des ersten Jupiterstrabanten in seiner Bahn vom Frühlingspunkt der Erde an gerechnet $= v$ gesetzt wird, seine mittlere Breite über der Ebene der Jupitersbahn

$= (3° 5′ 24″)\, \text{Sin.}\,(v - 314° 27′ 54″ - 49″{,}83.t)$.

Ebenso findet sich die mittlere jovicentrische Breite des zweyten Trabanten, wenn seine Länge mit v' bezeichnet wird,

$= (3° 4′ 25″)\, \text{Sin.}\,(v' - 314° 27′ 54″ - 49″{,}83\,t.)$.

Ferner ist die Länge des aufsteigenden Knotens der wahren Bahn des zweyten Trabanten auf seiner mittleren Bahn $= 12° 52′ 50″ - (12° 2′ 54″{,}01).t + 50″{,}1.t = 12° 52′ 50″ - (12° 2′ 3″{,}91).t$; folglich nach §. 223. n. 4. die Verbesserung der mittleren Breite

$= (27′ 49″)\, \text{Sin.}\,(v' - 12° 52′ 50″ + 12° 2′ 3″{,}91.t)$.

Daher sind mit Rücksicht auf die Veränderungen der Lagen der Trabantenbahnen die jovicentrischen Breiten der vier Jupiterstrabanten über der Bahn des Jupiters

I. $3° 5′ 24″\, \text{Sin.}\,(v - 314° 27′ 54″ - 49″{,}83.t)$

II. $\left\{\begin{array}{l} 3° 4′ 24″\, \text{Sin.}\,(v' - 314° 27′ 54″ - 49″{,}83.t) \\ + 27′ 49″\, \text{Sin.}\,(v' - 12° 52′ 50″ + 12° 2′ 3″{,}91.t) \end{array}\right.$

III. $\begin{cases} 3^\circ\ 0'\ 28''\ \text{Sin.}(v''-314^\circ\ 27'\ 54''-49'',83.t) \\ +12'\ 20''\ \text{Sin.}(v''-222^\circ\ 58'\ 43''+2^\circ\ 32'\ 23'',55.t) \end{cases}$

IV. $\begin{cases} 2^\circ\ 40'\ 53''\ \text{Sin.}(v'''-314^\circ\ 27'\ 54''-49'',83.t) \\ +14'\ 58''\ \text{Sin.}(v'''-\ 70^\circ\ 28'\ 45''+4^\circ\ 39''\ 39'',07.t), \end{cases}$

wo t die Anzahl der vom 1. Jan. 1801. an gerechneten julianischen Jahre, und v, v' u. s. w. die wahren jovicentrischen Längen der Trabanten bezeichnen. Hieraus kann man nach §. 223. n. 5. 6. u. 7. die Neigungen der wahren Bahnen gegen die Bahn des Jupiters und ihre auf die letztere sich beziehende aufsteigende Knoten berechnen. Die tropischen Umlaufszeiten der Knoten der wahren Bahnen auf ihren mittleren in Beziehung auf den Aequinoktialpunkt der Erde erhält man durch die Division des Umfangs mit ihren jährlichen tropischen Bewegungen, und sie sind in julianischen Jahren ausgedrückt für den zweyten Trabanten $=29\ 9142$, für den dritten $=141.7393$, für den vierten $=531,35$. Die Neigungen werden am grösten, wenn diese Knoten mit dem aufsteigenden Knoten des Aequators des Jupiters zusammenfallen, und am kleinsten, wenn sie 180 Gr. von demselben entfernt sind, oder jene aufsteigende Knoten in den niedersteigenden des letzteren fallen. Diese Veränderungen haben also zu Perioden die tropischen Umlaufszeiten der erwähnten Knoten in Beziehung auf den Knoten des Aequators des Jupiters, und werden gefunden, wenn man den Umfang mit dem Ueberschuß ihrer jährlichen Bewegungen über die jährliche Bewegung des Knotens des Aequaters des Jupiters dividirt. Sie sind 29,8798; 140,971; 520,712 jul. J. Die Zeiten der grösten Neigungen können aus obigen Gleichungen so gefunden werden. Soll z. B. die Neigung der Bahn des zweyten Trabanten am grösten seyn; so muß seyn $314^\circ 27'\ 54'' + 49'',8.t = 12^\circ\ 52'\ 50'' - (12^\circ\ 2'\ 3'',91).t + r.360^\circ$, wo r irgend eine ganze Zahl bezeichnet, oder $(12^\circ\ 2'\ 53'',74).t = 58^\circ\ 24'\ 56'' + (r-1).360^\circ$, woraus man erhält $t = 4.848 + 29.8798\ r - 1)$ Jahren. Verfährt man ebenso mit den übrigen; so ergeben sich folgende Epochen der grösten Neigungen: 1805 848; 1906,146; 1968.805. Mittelst dieser und der vorhin angegebenen Perioden dieser Veränderungen ist nachstehende Tafel der Epochen der grösten Neigungen des zweyten, dritten und vierten Jupiterstrabanten berechnet:

II.	III.	IV.
1805,848	1906,146	1968.805
1775,968	1765,175	1448,093
1746,088	1624,204	
1716,208		
1686,328		

Maraldi fand die Neigung der Bahn des zweyten Trabanten am grösten zu Anfang der Jahre 1687, 1717, 1747, und

1772 *), die des dritten in den Jahren 1633 und 1765 **). Die Epochen der kleinſten Neigungen werden aus den obigen gefunden, wenn man die Hälfte der Perioden ihrer Veränderungen dazu addirt oder davon ſubtrahirt. Ehe La Place das Geſetz dieſer Veränderungen durch die Theorie gefunden hatte, nahmen die Aſtronomen eine Bewegung der Bahnen des zweyten, dritten, und vierten Trabanten auf der Bahn des erſten an. Da aber jede ſich auf einer eigenen Ebene bewegt; ſo waren dieſe Veränderungen zu verwickelt, als daß es möglich geweſen wäre, ihre Geſetze durch die Beobachtungen allein zu entdecken.

§. 343. Wir kommen nun auf die Ungleichheiten der Bewegungen der Jupiterstrabanten ſelbſt. Von den blos ſcheinbaren Ungleichheiten iſt ſchon in dem 225ſten §. gehandelt worden. Die Perioden und Geſetze der Hauptungleichheiten der drey erſten Trabanten ſind dieſelben. Die Ungleichheit des erſten beſchleunigt oder verzögert ſeine Verfinſterungen um 3′ 13″ in Zeit, wenn ſie am gröſten iſt. Durch die Vergleichung ihres Gangs mit den gegenſeitigen Lagen der zwey erſten Trabanten fand man, daß ſie verſchwand, wenn dieſe Trabanten aus dem Mittelpunkt des Jupiters geſehen mit der Sonne zu gleicher Zeit in Oppoſition waren, daß ſie hernach zunahm, bis der erſte Trabant im Augenblick ſeiner Oppoſition dem zweyten um 45° voraus war, daß ſie, wenn er um 90° voraus war, wieder verſchwand, hierauf mit entgegengeſetztem Zeichen bis zu 135° zunahm, und die Verfinſterungen verzögerte, von da an wieder abnahm und bey einem Abſtand von 180° verſchwand, endlich daß ſie in dem zweyten Halbzirkel daſſelbe Geſetz, wie in dem erſten befolgte. Hieraus folgt eine Ungleichheit in der Bewegung des erſten Trabanten, welche vermöge der gröſten Beſchleunigung oder Verzögerung der Verfinſterungen dieſes Trabanten und ſeiner ſynodiſchen Bewegung auf 27′ 16″,4 ſteigt, und dem Sinus des doppelten Ueberſchuſſes der mittleren Länge des erſten Trabanten über die des zweyten proportional iſt. Man ſetze die täglichen mittleren tropiſchen Bewegungen des Jupiters und ſeiner Trabanten beziehungsweiſe i, n', n'', u. ſ. w.; ſo iſt die Periode dieſer Gleichung

*) *La Lande* Aſtronomie. T. III. n. 2984. pag. 162.
**) A. a. O. n. 3000. pag. 169.

$= \frac{360}{2(n'-n'')} = 1{,}76273$ Tagen $=$ 1 T. 18 St. 18',334 nur um 10',266 kleiner als die ſynodiſche Umlaufszeit des erſten Trabanten (§. 104.), woraus folgt, daß ſie von einer Verfinſterung bis zu der nächſtfolgenden ſich nur wenig ändert, und die daraus in den Zeiten der Verfinſterungen entſtehende Irregularität eine um vieles längere Periode haben muß, welche auf folgende Art kann gefunden werden. Es iſt die ſynodiſche Umlaufszeit des erſten Trabanten $= \frac{360}{n'-i}$ Tagen; alſo ihr Ueberſchuß über die Periode obiger Gleichung $= \frac{360}{n'-i} - \frac{360}{2(n'-n'')} = \frac{n'-2n''+i}{2(n'-i)(n'-n'')}$ 360 T. Folglich iſt am Ende eines ſynodiſchen Umlaufs des erſten Trabanten der doppelte Ueberſchuß ſeiner Länge über die des zweyten um $2(n'-n'').\frac{n'-2n''+i}{2(n'-i)(n'-n'')}$ 360 oder um $\frac{n'-2n''+i}{n'-i}$ 360 Grade größer als im Anfang deſſelben. Sey x die Anzahl der ſynodiſchen Umläufe des erſten Trabanten, welche erfordert werden, wenn jener doppelte Ueberſchuß $= 360°$ werden ſoll; ſo wird ſeyn müſſen $\frac{n'-2n''+i}{n'-i}$ $360.x = 360$, mithin $x = \frac{n'-i}{n'-2n''+i}$. Alſo kommen die Irregularitäten der Verfinſterungen des erſten Trabanten nach einer Periode von $\frac{n'-i}{n'-2n''+i}$ ſynodiſchen Umläufen des erſten Trabanten, oder wenn man mit einem ſynodiſchen Umlauf, welcher $= \frac{360}{n'-i}$ iſt, multiplicirt, nach einer Periode von $\frac{360}{n'-2n''+i}$ Tagen in derſelben Ordnung wieder, welche mittelſt der §. 104. u. 191. angegebenen Bewegungen $= 437{,}639$ Tagen gefunden wird.

Die Ungleichheit des zweyten Trabanten befolgt ein der Ungleichheit des erſten ähnliches Geſetz, nur mit dem Unterſchied, daß ſie beſtändig das entgegengeſetzte Zeichen von dieſer letzteren hat. Sie beſchleunigt oder verzögert die Verfinſterungen, wenn ſie am gröſten iſt, um 15' 15", und verſchwindet, wenn der erſte und zweyte Trabant zugleich in Oppoſition mit der Sonne ſind. Wenn ſie 90 Grade von einander abſtehen; ſo iſt die Verzögerung der Verfinſte-

rungen des zweyten am gröſten, bey einem Abſtand von 180° verſchwindet ſie wiederum, und von da an beſchleunigen ſich die Verfinſterungen, wie ſie vorher ſich verzögerten. Man ſchloß aus dieſen Beobachtungen, daß die Bewegung des zweyten Trabanten eine in ihrem Maximum auf 1° 4′ 22″,3 ſteigende, und dem Sinus des Ueberſchuſſes der mittleren Länge des erſten Trabanten über die des zweyten proportionale Ungleichheit habe, deren Zeichen dem Zeichen des Sinus, von welchem ſie abhängt, entgegengeſetzt iſt. Die Theorie beſtimmt nicht allein dieſe Ungleichheiten, ſondern zeigt auch, was die Beobachtungen ſelbſt wahrſcheinlich machten, daß ſie das Reſultat zweyer Ungleichheiten iſt, deren eine von der Wirkung des erſten Trabanten abhängt, und dem Sinus des Ueberſchuſſes der Länge des erſten über die des zweyten proportional iſt, die andere aber durch die Wirkung des dritten hervorgebracht wird, und ſich dem Sinus des doppelten Ueberſchuſſes der Länge des zweyten über die des dritten proportional verändert. Dieſe zwey Ungleichheiten fließen aber vermöge der Beziehungen der mittleren Bewegungen und der mittleren Längen der drey erſten Trabanten aufeinander in eine zuſammen. Es iſt nemlich (§. 108.) $l' + 2l'' - 3l'''$ ſehr nahe beſtändig $= 180°$; folglich $l' - l'' = 180° + 2(l'' - l''')$. Die Sinus der Winkel $(l' - l'')$ und $2(l'' - l''')$ ſind alſo dem Zeichen nach einander entgegengeſetzt, aber der Gröſſe nach einander gleich, und zwey Ungleichheiten, von welchen die eine dem Sinus von $l' - l''$ die andere dem Sinus von $2(l'' - l''')$ proportional iſt, verwandeln ſich in eine dem Sinus eines dieſer Winkel proportionale Ungleichheit, welche der Summe oder Differenz jener zwey Ungleichheiten gleich iſt, je nachdem ſie verſchiedene oder einerley Zeichen haben. Demnach iſt die Ungleichheit der Bewegung des zweyten Trabanten auch gleich dem Produkt von 1° 4′ 22″,3 in den Sinus des doppelten Ueberſchuſſes der Länge des zweyten über die Länge des dritten, und ſie hat mit dieſem Sinus einerley Zeichen. Hieraus entſteht, wie man bey dem erſten Trabanten geſehen hat, in den Verfinſterungen des zweyten Trabanten eine Ungleichheit, deren Periode $= \frac{360}{n'' - 2n''' + i}$ Tagen

ist. Es ist aber sehr nahe $n' + 2n''' = 3n''$ (§. 104.), mithin $n' - 2n'' = n'' - 2n'''$; folglich ist diese Periode ebenfalls = 437,639 Tagen.

Auf ähnliche Art fand man eine Ungleichheit der Bewegung des dritten Jupitertrabanten, welche auf $4' 21'',8$ steigt, dem Sinus des Ueberschußes der mittleren Länge des zweyten Trabanten über die des dritten proportional ist, und das entgegengesetzte Zeichen dieses Sinus hat. Sie ist eine Folge der Anziehung, welche der zweyte Trabant auf den dritten ausübt, so daß der zweyte Trabant von dem ersten eine Perturbation leidet, welcher der durch den zweyten auf den dritten hervorgebrachten ähnlich ist, und der zweyte Trabant wiederum durch den dritten eine derjenigen ähnliche Perturbation leidet, welche er in der Bewegung des ersten hervorbringt. Diese zwey Perturbationen des zweyten Trabanten sind es, welche, wie man vorhin gesehen hat, in eine dem Sinus des doppelten Ueberschußes der Länge des zweyten über die Länge des dritten proportionale zusammenfließen. Die Ungleichheit des dritten Trabanten bringt in seinen Verfinsterungen eine Ungleichheit hervor, welche wie bey dem ersten und zweyten eine Periode von 437,639 Tagen hat. Denn die Periode der Ungleichheit des dritten ist $= \frac{360}{n'' - n'''}$, und die synodische Umlaufszeit dieses Trabanten ist $= \frac{360}{n''' - i}$; folglich $\frac{360}{n''' - i} - \frac{360}{n'' - n'''} = \frac{(n'' - 2n''' + i)\,360}{(n''' - i)(n'' - n''')}$. Während eines synodischen Umlaufs des dritten Trabanten wächst also der Ueberschuß der Länge des zweyten über die des dritten um $\frac{n'' - 2n''' + i}{n''' - i}$ 360 Grade, und in $\frac{n''' - i}{n'' - 2n''' + i}$ synodischen Umläufen des dritten um 360 Grade, nach welcher Zwischenzeit die Irregularität der Verfinsterungen in derselben Ordnung wiederkehrt. Aber einer dieser synodischen Umläufe ist $= \frac{360}{n''' - i}$; folglich ist die Periode der Ungleichheiten der Verfinsterungen $= \frac{360}{n'' - 2n''' + i}$ Tagen, oder dieselbe, welche in den Verfinsterungen des zweyten, mithin auch des ersten statt findet.

§. 344. Bradley bemerkte zuerſt dieſe Periode von 437 Tagen in den Ungleichheiten der Verfinſterungen des erſten und zweyten Trabanten. Wargentin, welcher nach den Caſſiniſchen die erſten genaueren Tafeln der Verfinſterungen der Jupitерstrabanten *) lieferte, dehnte dieſe Periode auch auf die Verfinſterungen des dritten Trabanten aus, und ſchrieb dieſe Ungleichheiten den Einwirkungen der drey Jupiterstrabanten aufeinander zu, doch ohne ſie der Analyſe zu unterwerfen, welche damals noch nicht weit genug zu dieſer Unterſuchung vorgerückt war. Bailly und La Grange, welche ſich zuerſt im Jahr 1766 mit der Theorie der Perturbationen der Jupiterstrabanten beſchäftigten, fanden zuerſt dieſe Ungleichheiten, ſo wie ſie ſich auch zuerſt den Beobachtern darboten. La Place hat dieſe Theorie in dem achten Buch ſeiner Mechanik des Himmels ausführlich entwickelt, und gefunden, daß die gegenſeitigen Beziehungen der mittleren Bewegungen und der mittleren Längen der drey erſten Trabanten, auf welche ſich das zuſammenflieſſen der zwey Ungleichheiten des zweyten Trabanten in eine Ungleichheit gründet, nach aller Schärfe wahr ſind. Sonſt müßten ſich dieſe zwey Ungleichheiten nach und nach von einander abſondern, und man müßte andere beträchtliche Ungleichheiten finden, welches gegen die Beobachtungen iſt. Die Vorausſetzung, daß der Zufall die drey erſten Trabanten urſprünglich in die zu dieſen Verhältnißen erforderliche Diſtanzen und Lagen geſetzt habe, war gegen alle Wahrſcheinlichkeit, und es war ſehr wahrſcheinlich, daß ſie ihren Grund in einer beſonderen Urſache haben, welche er in der Wirkung dieſer Trabanten auf einander ſuchte. Die genaue Unterſuchung dieſer Wirkung zeigte ihm, daß ſie dieſe Verhältniße nach aller Schärfe wahr gemacht hat. Die neueren Unterſuchungen, welche de Lambre über die Bewegungen der Jupiterstrabanten durch die Vergleichung einer großen Anzahl von Beobachtungen derſelben angeſtellt hat, haben dieſen durch die Theorie gefundenen Satz beſtätigt, und die ſehr kleinen noch übrig bleibenden Unterſchiede ſind allein den unvermeidlichen Beobachtungsfehlern zuzuſchreiben (§. 104. u.

*) Sie ſtehen in der Sammlung astron. Tafeln. Berlin. 1776.

108.). Also ist genau die mittlere Bewegung des ersten Trabanten sammt der doppelten mittleren Bewegung des dritten gleich der dreyfachen mittleren Bewegung des zweyten, und die mittlere Länge des ersten sammt der doppelten mittleren Länge des dritten weniger die dreyfache mittlere Länge des zweyten = 180°. Es ist nicht nöthig, daß diese Verhältniße ursprünglich nach aller Schärfe Statt gehabt haben, nur müssen sie wenig davon entfernt gewesen seyn, und alsdenn war die gegenseitige Attraction der drey ersten Trabanten hinreichend, um diese Verhältnisse in aller Schärfe hervorzubringen und zu erhalten. Aber der kleine Unterschied zwischen diesen und den ursprünglichen Verhältnissen hat eine allein durch die Beobachtungen zu bestimmende Ungleichheit hervorgebracht, welche sich unter die drey Trabanten vertheilt, und von La Place mit den Namen der Libration bezeichnet wird, vermöge welcher die Verhältnisse der Bewegungen und Längen dieser Trabanten um jene mittleren Verhältnisse hin und her oscilliren, und sich nur um sehr kleine Größen von ihnen bald auf der einen, bald auf der anderen Seite entfernen. Die Untersuchung der Beobachtungen hat gezeigt, daß diese Libration sehr klein und selbst unmerklich seyn muß. Weder Secularungleichheiten der Jupitertrabanten, noch ein Widerstand des Mittels können diese Verhältnisse stören, denn diese Ungleichheiten sind denselben Verhältnissen untergeordnet, in welchen die mittleren Bewegungen der drey ersten Trabanten zu einander stehen *).

§. 345. Die Excentricität der Bahn des dritten Trabanten zeigt sonderbare Anomalien deren Ursache La Place durch die Theorie entdeckt hat. Sie hängen von zwey verschiedenen Mittelpunktsgleichungen ab, deren eine der Bahn dieses Trabanten eigen ist, und sich auf ein Perijovium bezieht, welches eine jährliche Sideralbewegung von 2° 36′ 39″,17 hat, die andere aber von der Wirkung des vierten Trabanten und der Excentricität seiner Bahn abhängt, und sich auf das Perijovium dieses letzteren bezieht, welches eine jährliche side-

*) Méc. cél. T: I. L. II. Ch. VIII. n. 66. pag. 342. und T. IV. L. VIII. Ch. VI. pag. 59. et suiv.

riſche Bewegung von 42′ 58″,73 hat. Dieſe zwey Gleichungen bilden miteinander eine veränderliche Mittelpunktsgleichung, welche ſich auf ein Perijovium bezieht, deſſen Bewegung ungleichförmig iſt. Hieraus entſtehen die §. 226. angeführten Veränderungen der Gleichung des Mittelpunkts. Wargentin ſuchte dieſe Veränderungen durch zwey Mittelpunktsgleichungen darzuſtellen, wurde aber, weil er die eine derſelben nicht auf das Perijovium des vierten Trabanten beziehen konnte, durch die Beobachtungen genöthigt, ſeine Hypotheſe aufzugeben, und kam auf die Hypotheſe einer veränderlichen Gleichung des Mittelpunkts, deren Veränderungen er durch die Beobachtungen beſtimmte, und diß leitete ihn ungefähr auf die §. 226. angezeigten Reſultate.

Die Excentricität der Bahn des vierten Trabanten iſt beträchtlich größer als die der übrigen, ſo daß die gröſte Mittelpunktsgleichung auf 50′ 2″ ſteigt. Sein Perijovium hat eine jährliche directe Sideralbewegung von 42′ 58″,7. Eine andere der Mittelpunktsgleichung ähnliche Gleichung, welche aber nur auf 1′ 11″,5 ſteigt, bezieht ſich auf das Perijovium des dritten Trabanten, ſo daß aus dieſen Gleichungen, wie bey dem dritten Trabanten, eine veränderliche Mittelpunktsgleichung entſteht.

Aus der Wirkung der Trabanten auf einander entſtehen noch einige kleinere Ungleichheiten, worüber man die Mechanik des Himmels nachſehen kann. Diejenige, welche durch die Attraction der Sonne hervorgebracht werden, ſind nicht ſehr beträchtlich, und denjenigen ähnlich, welche die Sonne in der Bewegung des Monds hervorbringt. Namentlich hat der vierte Trabant eine der jährlichen Gleichung des Monds ähnliche von der mittleren Anomalie des Jupiters abhängende Ungleichheit, deren Maximum = 1 53″,33 iſt; eine der Evection ähnliche von 21″,69, und eine, welche mit der Variation einerley Geſetz befolgt, und auf 4″,21 ſteigt. Die letzteren zwey Ungleichheiten ſind bey den übrigen Trabanten unmerklich. Die jährlichen (in einem Jahr des Jupiters wiederkehrenden) Gleichungen des dritten und zweyten Trabanten betragen, wenn ſie am gröſten ſind 47″,76

und 36″,07. Bey dem ersten ist diese Gleichung ebenfalls unmerklich.

Hienach sind, wenn man die mittleren Längen des ersten, zweyten Trabanten u. s. w. mit l', l'' u. s. w. die Längen der Perijovien des dritten und vierten mit p''' und p^{IV}, die mittlere Länge des Jupiters mit J, und seine mittlere Anomalie mit A bezeichnet, die wahren Längen v', v'' u. s. w. folgende:

$$v' = l' + 27' 16'',4 \text{ Sin. } 2(l' - l'')$$
$$v'' = l'' + 1^{\circ}\,4\,22,3 \text{ Sin. } 2(l'' - l''') - 36'',07 \text{ Sin. } A.$$
$$v''' = l''' + 9' 13'',7 \text{ Sin. } (l''' - p''') + 4\ 5,1 \text{ Sin. } (l''' - p^{IV}) - 4\ 21,8 \text{ Sin. } (l''' - l'') - 47,76 \text{ Sin. } A$$
$$v^{IV} = l^{IV} + 50'\ 2'',0 \text{ Sin. } (l^{IV} - p^{IV}) - 1\ 11,5 \text{ Sin. } (l^{IV} - p''') - 1' 53'',33 \text{ Sin. } A.$$

Nach de Lambre ist für die Mitternacht des ersten Januars 1750 $p'' = 180^{\circ}\,20'\,33''$ und $p''' = 309^{\circ}\,26'\,19''$. Die mittleren Längen der Trabanten erhält man nach §. 108.

Aus den Beobachtungen hatte de Lambre folgende tropische mittlere Secularbewegungen der drey ersten Trabanten, und Epochen ihren mittleren Längen für die Mitternacht des ersten Januars 1750 gefunden *).

	mittl. Secularbeweg. in 36525 Tagen.	mittl. Längen am 1. Jan. 1750.
I.	7432435° 28′ 11″,34	15° 1′ 34″,5
II.	3702713 13 53,37	311 51 6,8
III.	1837852 6 48,90	10 16 19,9

Die mittlere Bewegung des ersten sammt der doppelten mittleren Bewegung des dritten weniger die dreyfache mittlere Bewegung des zweyten macht 9″,03, sehr nahe mit La Place's Theorem übereinstimmend. Ferner macht die mittlere Länge des ersten sammt der doppelten mittleren Länge des dritten weniger die dreyfache mittlere Länge des zweyten 180° 0′ 53″,9. Da der Unterschied zwischen dem Resultat der Beobachtungen und dem auf die Epochen sich beziehenden Theorem nicht beträchtlich ist; so hielt es de Lambre für schiklich, die Epochen seiner Tafeln diesem Theorem anzupassen, und auch in den mittleren Bewegungen eine kleine Aenderung zu machen, so daß $n' + 2n''' - 3n'' = 0$ wird. Die mittleren Bewegungen und die Epochen der Länge sind alsdenn folgende:

I.	7432435° 28′ 2″,0	15° 0′ 46″,0
II.	3702713 13 53,3	311 50 25,3
III.	1837852 6 49,0	10 15 15,0

*) Méc. cél. T. IV. pag. 135. u. 136. wo bey der Epoche des zweyten Trabanten 346,5021 statt 346,0521 zu lesen ist.

wo man ſieht, daß die bey den Beobachtungen anzubringende Verbeſſerungen innerhalb der Gränzen der unvermeidlichen Beobachtungsfehler liegen.

Die Maſſen der Jupiterstrabanten und die Abplattung des Jupiters hat La Place mittelſt ſeiner Perturbationsformeln beſtimmt *), wobey er folgende durch die Beobachtungen gegebene Stücke zum Grund legte: erſtlich die große auf 27′ 16″,39 im Bogen ſteigende Ungleichheit des erſten Trabanten, zweytens die große Ungleichheit des zweyten, deren Maximum = 1° 4′ 22″,3 iſt, drittens die jährliche Sideralbewegung des Perijoviums des vierten Trabanten von 42′ 58″,75, viertens den auf das Perijovium des vierten Trabanten ſich beziehenden Theil der Mittelpunktsgleichung des dritten Trabanten, welcher auf 4′ 5″,14 ſteigt, und die Mittelpunktsgleichung 50′ 2″,04 des vierten, endlich fünftens die ſideriſche jährliche retrograde Bewegung der Bahn des zweyten Trabanten auf ſeiner mittleren Bahn 12° 2′ 54″,0. Hieraus fand er folgende Maſſen der Jupiterstrabanten, die des Jupiters zur Einheit angenommen:

I.	0,0000173281
II.	0,0000232355
III.	0,0000426591

Das Verhältniß der kleinen Axe des Jupiters zu dem Durchmeſſer ſeines Aequators fand er = 0,9286992 : 1, welches dem durch die Beobachtungen gefundenen Verhältniß von 13 : 14 (§. 109.) oder von 0,92857 : 1 ſehr nahe kommt **).

Ich bemerke noch, daß die veränderliche Mittelpunktsgleichung des dritten Trabanten aus den zwey Gleichungen von welchen ſie abhängt, mittelſt der Ausdrücke n. 4. 5. 6. u. 7. des 223ſten §. kann gefunden werden, wenn man i und J den Coefficienten der zwey Mittelpunktsgleichungen, und n, N den auf die zwey Perijovien ſich beziehenden Anomalien des dritten Trabanten gleich ſetzt.

§. 346. Die Bahnen der Saturnstrabanten ſind bis jetzt zu wenig genau bekannt, als daß es möglich wäre, die Perturbationen dieſer Nebenplaneten zu berechnen. Aber die Lage ihrer Bahnen bietet eine der Aufmerkſamkeit der Geometer und Aſtronomen würdige Erſcheinung dar. Die Bahnen der ſechs erſten ſcheinen ſehr nahe in der Ebene des Rings zu liegen, indeſſen ſich der ſiebente merklich davon entfernt. Es iſt natürlich, dieſes als eine Wirkung der Anziehung des Saturns anzuſehen, welcher vermöge ſeiner Abplattung

*) Méc. cél. T. IV. L. VIII. pag. 121 et suiv.

**) Die von Pound angeſtellten Meſſungen führt Newton an in Princ. L. III. prop. XIX.

die Bahnen der sechs ersten Trabanten und seine Ringe in der Ebene seines Aequators erhält. Die theoretischen Untersuchungen, welche La Place über diesen Gegenstand angestellt hat*), bestätigen diese Vermuthung, und zeigen, daß die Bahnen der Saturnstrabanten, so wie die Jupitierstrabanten sich auf Ebenen bewegen, welche beständig zwischen dem Aequator und der Bahn des Planeten durch die gemeinschaftliche Durchschnittslinie der letzteren durchgehen, und desto mehr gegen diesen Aequator geneigt sind, je weiter die Trabanten von dem Saturn abstehen. Diese Neigung ist jedoch nur für den äussersten Trabanten merklich, und den Beobachtungen zufolge = 21° 36' 27". Die Bahn des Trabanten ist gegen diese Ebene geneigt um 15° 15' 54", und die jährliche siderische retrograde Bewegung ihrer auf die letztere Ebene bezogenen Knoten beträgt 396",1108. La Place hält aber diese Resultate wegen der Ungewißheit der Beobachtungen nur für eine noch sehr unvollkommene Approximation.

Ueber die Bahnen der Trabanten des Uranus sind wir noch weniger unterrichtet. Nach Herschels Beobachtungen scheinen sich alle in einer auf der Ebene der Bahn des Uranus senkrechten Ebene zu bewegen, woraus La Place auf eine ähnliche Lage der Ebene des Aequators dieses Planeten schließt. Er zeigt**), daß die Abplattung des Uranus verbunden mit der Wirkung seiner Trabanten ihre verschiedene Bahnen sehr nahe in dieser Ebene erhalten kann.

Die Lage der Ebene der Bahn des siebenten Saturnstrabanten kann mittelst der von La Place gefundenen Gesetze der Veränderung seiner Bahn und der aus Bernard's Beobachtungen (§. 227.) sich ergebenden Bestimmungsstücke auf folgende Art berechnet werden.

Die jährliche siderische Bewegung des aufsteigenden Knotens des Rings des Saturns und seines Aequators kann höchstens 10" betragen, und La Place vermuthet, daß sie nicht über eine Sekunde gehen werde***), und die Veränderung des Neigungswinkels der Ebene des Rings gegen die Bahn des Saturns ist eben-

*) Méc. cél. T. IV. L. VIII. Chap. XVI.
**) Méc. cél. T. IV. L. VIII. Chap. XVII.
***) Méc. cél. T. IV. L. VIII. Chap. XVI. pag. 188.

ebenfalls unmerklich. Man kann also die Ebene, auf welcher sich die Bahn des siebenten Saturnstrabanten herumbewegt, als eine siderisch ruhende gegen den Aequator des Saturns um 21° 36′ 27″, und gegen die Ebene seiner Bahn um 8° 23′ 33″ geneigte Ebene betrachten. Die Länge ihres aufsteigenden Knotens in der Bahn des Saturns gerechnet ist für das Jahr 1803 = 170° 51′ 4″ nach Schröter, welche wegen des Zurückweichens der Aequinoktialpunkte jährlich um 50″,1 wächst. Auf dieser fixen Ebene bewegt sich die Bahn des siebenten Trabanten mit einer constanten Neigung von 15° 15′ 54″ herum. Im Jahr 1787 war der Ueberschuß der Länge des aufsteigenden Knotens des Rings über die Länge des aufsteigenden Knotens der Bahn des Trabanten in der fixen Ebene = 34° 0′ 36″, welcher Ueberschuß wegen der retrograden Bewegung des letzteren Knotens jährlich um 306″,1168 wächst. Diese Bewegung ist einer auf 53′ 39″ 8 steigenden dem Sinus jenes doppelten Ueberschußes proportionalen Ungleichheit unterworfen, so daß, wenn t die von 1787 an verfloßene julianische Jahre bedeutet, der Ueberschuß der Länge des aufsteigenden Knotens des Rings über den der Bahn des siebenten Trabanten in der fixen Ebene

$$= 34^\circ 50' 56'' + 306'',1168 . t - 3219'',8 \text{ Sin. } 2(34^\circ 50' 56'' + 306'',1168\, t) \text{ ist.}$$

Die Bahn des Trabanten, die Bahn des Saturns und die fixe Ebene bilden nun auf der Sphäre ein Dreyeck, dessen eine Seite der in der letzteren Ebene liegende so eben angegebene Bogen ist, welcher für jede gegebene Zeit kann berechnet werden. Die constanten dieser Seite anliegenden Winkel sind 15° 15′ 54″ und 80° 23′ 33″, woraus die Neigung der Trabantenbahn gegen die Bahn des Saturns und die dem Winkel 15° 15′ 54″ gegenüberliegende Seite nach §. 223. können berechnet werden. Zieht man diese Seite von der für denselben Zeitpunkt berechneten Länge des aufsteigenden Knotens des Aequators des Saturns in seiner Bahn, welche = 170° 37′ 42″ + 50″,1 t ist, ab; so hat man die Länge des aufsteigenden Knotens der Bahn des siebenten Saturnstrabanten in der Bahn des Jupiters gerechnet. Hienach findet sich

	Länge d. ☊ d. 7. Trab. in der Bahn d. Sat.	Neig. d. Bahn gegen d. B. d. Sat.
1714	151° 14′ 59″	23° 0′ 43″
1787	148 11 42	22 42 0
1801	147 36 41	22 38 2

und wiederum nach §. 223.

	Länge d. ☊ d. 7. Trab. in der Ekliptik	Neigung der Bahn gegen die Ekl.
1714	147° 43′ 47″	25° 0′ 7″
1787	144 57 8	24 45 17
1801	144 25 18	24 42 1

Die im Jahr 1714 von Cassini beobachtete Lage der Bahn

dieſes Trabanten (§. 227.) weicht beträchtlich von der hier berechneten ab. Aber die Beobachtungen ſind nicht genau genug, um die Bewegungen dieſer Bahn mittelſt derſelben beſtimmen zu können.

Fünftes Capitel.

Von der Geſtalt der Erde und der Planeten, von dem Geſetz der Schwere auf ihren Oberflächen, und von der Veränderung der Lage ihrer Umdrehungsaxen.

§. 347. Die Planeten würden, wenn ſie keine Axendrehung hätten, wegen der überall gleichen Schwere ihrer Theilchen eine kugelförmige Geſtalt haben müſſen. Ihre Umdrehungsbewegung entfernt ſie aber ein wenig von der Kugelgeſtalt, und die durch dieſe Bewegung entſtehende Schwungkraft erhöht ſie unter dem Aequator und macht ſie an den Polen abgeplattet. So ſind die Umdrehungsaxen des Mars, Jupiters und Saturns (§. 101. 109 118) kleiner, als ihre auf jener Axe ſenkrechten Durchmeſſer, und wenn die Erde unter dem Aequator nicht ein wenig höher wäre, als unter den Polen, ſo würde das Meer unter den Polen ſinken, gegen den Aequator hin ſich erheben, und daſelbſt alles überſchwemmen *). Die Gradmeſſungen beweiſen, wie man in dem erſten Capitel des zweyten Buchs geſehen hat, eine unter den Polen zuſammengedrükte Geſtalt der Erde, und zeigen, daß ſie einem elliptiſchen Sphäroid nahe kommt, welches durch die Umdrehung einer Ellipſe um ihre kleine Axe beſchrieben wird. Auf einem ſolchen ſich drehenden Sphäroid können weder die Richtungen der Schwere in einem Punkt zuſammenlaufen, noch kann die Kraft der Schwere ſelbſt unter verſchiedenen Parallelkreiſen dieſelbe ſeyn, welches mit den über die Pendellängen angeſtellten Beobachtungen übereinſtimmt (§. 267. u. f.). Huygens erklärte die Verminderung der Schwere unter dem Aequator aus der durch die Axendrehung der Erde entſtehenden Schwungkraft, und ſchloß hieraus, daß die Erde eine unter den Polen zu-

*) Newt. princ. L. III. prop. XVIII.

ſammengedrükte Geſtalt haben müſſe *). Newton gieng von der Vorausſetzung eines gleichförmig dichten elliptiſchen Sphäroids aus, und berechnete hienach das Verhältniß des Durchmeſſers des Aequators zur Erdaxe = 230 : 229 **). Huygens fand nachher dieſes Verhältniß unter der Vorausſetzung daß die urſprüngliche Schwere durchaus conſtant und nach dem Mittelpunkt gerichtet ſey, = 578 : 577 ***). Wenn aber, wie die bisherigen Unterſuchungen gezeigt haben, die Schwere der Erdkörper aus den Attractionen aller materiellen Theilchen der Erde zuſammengeſetzt iſt; ſo hängt das Geſetz der Schwere der Körper an ihrer Oberfläche von der Geſtalt der Erde ab, welche ſelbſt wiederum von dem Geſetz der Schwere abhängt. Dieſe gegenſeitige Abhängigkeit der zwey unbekannten Größen erſchwert ſehr die Unterſuchung der Geſtalt der Erde. Maclaurin hat zuerſt gezeigt, daß eine flüßige Maße, welche eine Umdrehungsbewegung hat, und deren Theilchen ſich im umgekehrten Verhältniß des Quadrats der Diſtanzen anziehen, im Gleichgewicht iſt, wenn ſie die Figur eines elliptiſchen Sphäroids hat †).

§. 348. Der Beweis dieſes Satzes gründet ſich auf die in dem 289ſten §. bewieſenen Sätze, und auf folgende Eigenſchaften der Ellipſe und eines elliptiſchen Sphäroids.

Es ſey *ADBE* (Fig. 134.) eine Ellipſe, deren Mittelpunkt *c* und deren Axen *AB* und *DE* ſeyen. Man ziehe durch irgend einen von den Scheiteln verſchiedenen Punkt *M* dieſer Ellipſe eine Parallele *MR* mit einer ihrer Axen *AB*, welche der Ellipſe noch in einem Punkt *m* begegnen wird (Kegelſchn. II, 8. Zuſ. 1.), und aus eben dieſem Punkt zwey gerade Linien *ML*, *MK* ſo an die Ellipſe, daß ſie mit der *MR* beyderſeits gleiche Winkel machen. Durch *M* und *m* ziehe man die Parallelen *MN*, *mn* mit der Axe *DE*, welche der Axe *AB* in *a* und *b* begegnen, beſchreibe über der geraden Linie *ab* als Axe einer Ellipſe *adbe*, welche der erſteren ähnlich ſey und ähnlich liege, und ziehe an ſie aus dem Punkt *a* die *al*, *ak* mit *ML*, *MK* parallel; ſo

*) Hugenii Opera. T. III. pag. 99.
**) Princ. L. III. prop. XIX.
***) Hugenii Opera reliqua. T. I. De causa gravitatis. Additam.
†) In der Preisſchrift über Ebbe und Fluth, welche dem dritten Band der von le Seur und Jacquier veranſtalteten Ausgabe der Principien pag. 247. u. f. angehängt iſt, und in Treatise of Fluxions by Maclaurin. Chap. XIV.

ist 1.) $\left.\begin{matrix} ka+al \\ 2ak \end{matrix}\right\} = KM \pm ML$, je nachdem die letzteren Linien auf einerley, oder auf verschiedenen Seiten von MN liegen.

Bew. Weil $Mq = qm$ (Kegelschn. II, 8.); so ist $ac = cb$, und die zwey Ellipsen sind concentrisch. Man ziehe den Durchmesser GH, welcher die MK in J halbiere, mit diesem durch den Punkt N die Parallele NF, welche die MK, ak in F und f schneide, durch L die Parallele LQ mit MN, welche der MR in P, der MK in S, und der Axe AB in r begegne, endlich ziehe man NQ. Da $KMR = RML$ (Voraussf.); so ist $LP = PS$, und daher

$\left.\begin{matrix} 2rP \\ 2Ma \\ MN \text{ (Kegelsch. II, 8.)} \end{matrix}\right\} = \left\{\begin{matrix} Lr \\ Ar \end{matrix}\right\} + rS = SQ$. Folglich ist $QN = MS = ML$, und QN mit $\left\{\begin{matrix} MK \\ ak \end{matrix}\right\}$ parallel (I, 34.). Der Durchmesser GH halbiert also die NQ in O (Kegelsch. II, 15. Zus. 3.), mithin auch die mit ihr parallele Chorde ak der Ellipse $adbe$. Es ist aber

$$\begin{aligned} KM &= 2MJ \\ &= 2MF + 2FJ \\ &= 4af + 2fo \text{ (VI, 2. und weil } Ma = aN), \\ \text{und } ML &= NQ \\ &= 2NO \\ &= \quad 2fo; \end{aligned}$$

folglich $\begin{aligned} KM + ML &= 4af + 4fo \\ &= 4ao = 2ak = ka + al. \end{aligned}$

Eben so wird der Beweis für den andern Fall geführt, wo KM und ML auf verschiedenen Seiten von MN liegen.

Aus L, K und k seyen die Perpendickel LP, KR, kp auf MR und ab gefällt; so ist

2.) $RM \pm MP = 2ap$, je nachdem P und R auf einerley, oder auf verschiedenen Seiten von M liegen.

Denn es ist sowohl $KM : RM$ als $ML : MP \Big\} = ak : ap$;

folglich auch $\begin{aligned} KM \pm ML : RM \pm MP &= ak : ap \\ &= 2ak : 2ap \\ &= KM \pm ML : 2ap \text{ (n. 1.).} \end{aligned}$

Also $RM \pm MP = 2ap$ *).

Wenn an einen beliebigen Punkt m einer Ellipse (Fig. 135.) ein Halbmesser cm, und eine Normallinie mn gezogen, und von dem Punkt n, in welchem die letztere einer der Axen ab begegnet, ein Perpendickel nr gefällt wird; so ist

3.) $cm \times mr =$ dem Quadrat der anderen halben Axe $= \overline{cd}^2$.

Bew. Die Tangente mt an dem Punkt m schneide die ver-

*) Andere Beweise dieses Satzes findet man in der Preißschrift Maclaurin's. Sect. III. Lemma. 1. Cor. 4. und in Treat. of Flux. n. 625. pag. 521.

[redacted]

längerte Axe *de* in *t*. Man vollende das Parallelogramm *ctmk*, ziehe *kr*, *pr* und durch *m* die Parallele *mq* mit *ab*. Da so wohl *npm* als *nrm* $= R$; so geht ein über *mn* als Durchmesser beschriebener Kreis durch *p* und *r*, und berührt die *mt* in *m*. Folglich ist $\left.\begin{matrix} cmt \\ mck \end{matrix}\right\}$ (I, 29.) $= mpr$ (III, 32.), und $mck + rpk = mpr + rpk = 2R$. Mithin kann auch um das Viereck *crpk* ein Kreis beschrieben werden (III, 22.), und es ist $crk = cpk$ (III. 21.) $= R$. Die gerade Linie *kr* fällt also auf das Perpendickel *nr*, und wegen der gleichen Winkel *rcp*, *rkp* (III, 21.) verhält sich $cm : mp = km : mr$. Also ist $cm \times mr = km \times mp = tc \times cq = \overline{cd}^2$ (Kegelschn. II, 11. Zus. 7.).

4.) Wenn ein elliptisches Sphäroid (Fig. 136.) mit parallelen Ebenen geschnitten wird; so sind die Durchschnittslinien der krummen Oberfläche mit den schneidenden Ebenen einander ähnliche Ellipsen. Es sey *fg* die Durchschnittslinie der schneidenden Ebene mit einer durch die Axe *de* des Sphäroids auf jene Ebene senkrecht gelegten Ebene *adbe*, und durch einen beliebigen Punkt *m* des Schnitts *fmg* sey eine Ebene *hmi* mit der Ebene des Aequators *ab* des Sphäroids parallel gelegt; so ist die gemeinschaftliche Durchschnittslinie *mr* der Ebenen *fmg* und *hmi* auf der Ebene *adbe* senkrecht (XI, 19.). Und weil der Schnitt *hmi* ein Kreis ist, welcher *hi* zum Durchmesser hat; so ist das Quadrat von $mr = hr \times ri$ (VI, 13). Man ziehe noch den Durchmesser *kl* des durch die Axe gehenden elliptischen Schnitts mit *fg* parallel; so verhält sich vermöge der Eigenschaften der Ellipse $\left.\begin{matrix} hr \times ri \\ \overline{mr}^2 \end{matrix}\right\} : fr \times rg = \overline{ac}^2 : \overline{ck}^2$. Also ist der Schnitt *fmg* eine Ellipse deren Axen sich wie $ac : ck$ verhalten, welches Verhältniß für alle mit *fmg* parallele Schnitte dasselbe bleibt. Namentlich ist der Schnitt durch den Mittelpunkt *c* des Sphäroids, welcher dem Schnitt *fmg* parallel ist, eine Ellipse, deren Axen den Durchmessern *ab* und *kl* gleich sind. Hieraus folgt

5.) Daß, wenn zwey ähnliche concentrische und ähnlich liegende elliptische Sphäroide mit einer Ebene geschnitten werden, die Schnitte ähnliche und concentrische Ellipsen sind. Denn diese Schnitte sind vermöge n. 4. denjenigen ähnlich, welche entstehen, wenn diese Körper mit einer durch ihren gemeinschaftlichen Mittelpunkt gehenden der ersteren schneidenden Ebene parallelen Ebene geschnitten werden, und die letzteren Schnitte sind concentrische ähnliche und ähnlich liegende Ellipsen. In dem besonderen Fall, wo die schneidenden Ebenen mit dem Aequator der Sphäroide parallel sind, gehen die Ellipsen in concentrische Kreise über.

§. 349. Es seyen *afdb*, *ageb* (Fig. 137.) zwey einander

in der geraden Linie *ab* ſich ſchneidende Ebenen, welche ein Stück von einem gleichförmig dichten Körper abſchneiden, deſſen Theilchen einander im umgekehrten Verhältniß des Quadrats der Entfernung anziehen. Es ſeyen ferner *a*, *c* zwey auf der *ab* gegebene Punkte, *cd* ſey beſtändig parallel mit *af*, und die Ebenen *edc*, *gaf* auf der Ebene *afdb* ſenkrecht; folglich einander parallel. Mithin ſind auch *ce* und *ag* einander parallel (XI, 16.), und, wenn dieſe Ebenen mit Beybehaltung ihrer auf *afdb* ſenkrechten Lage ſich um die Punkte *c* und *a* um gleiche Winkel drehen, *ei* parallel mit *al*, *ch* parallel *ak*. Folglich ſind die Winkel an den Spitzen der pyramidenförmigen Körper *cdh* und *efk* beziehungsweiſe einander gleich (XI, 15.). Demnach verhält ſich

1.) Die Gravitation von *c* gegen den $\left\{\begin{smallmatrix}\text{in}\\\text{um}\end{smallmatrix}\right\}$ den Körper beſchriebenen pyramidenförmigen Körper *cdh* zur Gravitation von *a* gegen den $\left\{\begin{smallmatrix}\text{in}\\\text{um}\end{smallmatrix}\right\}$ den Körper beſchriebenen pyramidenförmigen Körper *afk* = *cd* : *af* (§. 289.).

In oder um einen zweyten dem erſten ähnlichen Körper ſey ein pyramidenförmiger Körper *a'f'k'* (Fig. 138.) beſchrieben welcher dem *afk* (Fig. 137.) ähnlich ſey und ähnlich liege; ſo wird ſich die Gravitation *a* gegen *afk* zur Gravitation von *a'* gegen *a'f'k'* verhalten wie *af* : *a'f'* (§. 289), oder, wenn *ab*, *a'b'* ähnlich liegende Linien der zwey Körper ſind, wie *ab* : *a'b'*. Man ziehe *fp*, *f'p'* auf *ab*, *a'b'* ſenkrecht; ſo verhält ſich (§. 289. n. 1.) die Gravitation von *a* gegen *afk* nach der Richtung *ab* zu der Gravitation von *a'* gegen *a'f'k'* nach der Richtung *a'b'* wie *ap* : *a'p'*, oder, wegen der Aehnlichkeit der Figuren *afp*, *a'f'p'*, wie *af* : *a'f'* = *ab* : *a'b'*. Folglich verhält ſich auch die Summe der Gravitationen von *a* gegen alle in oder um den erſten Körper beſchriebenen pyramidenförmigen Körper zu der Summe der Gravitationen von *a'* gegen alle in oder um den zweyten Körper beſchriebenen wie *ab* : *a'b'* (V, 12.). Alſo verhält ſich auch

3.) Die Gravitation von *a* gegen den ganzen erſten Körper zu der Gravitation des ähnlich liegenden Punkts *a'* gegen den ganzen dem erſten ähnlichen Körper = *ab* : *a'b'*.

Innerhalb eines holen Sphäroids (Fig. 139.), welches durch die Umdrehung eines ringförmigen durch zwey concentriſche ähnliche und ähnlich liegende Ellipſen *adbe*, *a'd'b'e'* begränzten Raums um die Axe *de* beſchrieben wird, befinde ſich ein Theilchen *m*, und es ſey durch den Mittelpunkt *c* des Sphäroids und durch *m* eine Ebene gelegt. Da dieſe den holen Körper in zwey gleiche und ähnliche Theile theilt; ſo heben ſich die Attractionen, welche die Theilchen des Sphäroids nach einer auf dieſer Ebene ſenkrechten Richtung auf das Theilchen *m* ausüben, auf beyden Seiten gegen einander auf. Man ziehe in der ſchneiden-

den Ebene durch den Punkt m eine gerade Linie no, welche der äuſſeren Ellipſe in n und o, der inneren in p und q begegne, und halbire ſie in k; ſo iſt, weil die Figuren ähnlich ſind und ähnlich liegen, auch $pk = kq$, und $np = oq$. Man denke ſich entgegengeſetzte pyramidenförmige Körper, deren Spitze in m ſeyen, und deren Seitenlinien daſelbſt gleiche Winkel mit einander einſchlieſſen; ſo verhält ſich die Gravitation gegen das Stük oq wie $np : oq$ (§. 289.). Dieſe Gravitationen ſind alſo ebenfalls einander gleich, und heben ſich gegen einander auf. Eben dieſes findet bey einem holen durch zwey concentriſche Kugeloberflächen begränzten Körper Statt, wie am Ende des 292ſten §. bemerkt worden iſt.

3.) Es ſey $adbe$ (Fig. 139.) ein gleichförmig dichtes Sphäroid, welches durch die Umdrehung der Ellipſe $adbe$ um die Axe de beſchrieben wird. Man ziehe einen Halbmeſſer cf, und nehme auf demſelben einen Punkt g nach Belieben; ſo verhält ſich die Gravitation eines in f befindlichen Theilchens gegen das ganze Sphäroid zu der Gravitation eines in g befindlichen gegen eben dieſes Sphäroid, wie $cf : cg$. Wenn man nemlich von dem Sphäroid ein ihm ähnliches concentriſches und ähnlich liegendes Sphäroid $a'd'b'e'$ hinwegnimmt, welches den Punkt g auf ſeiner Oberfläche hat; ſo heben ſich die Gravitationen von g gegen die in dem übrigen Raum befindlichen Theilchen gegen einander auf, wie ſo eben gezeigt worden iſt. Folglich hat die auſſerhalb der Oberfläche $a'd'b'e'$ befindliche Materie keinen Einfluß auf die Gravitation von g gegen das ganze Sphäroid, und dieſe Gravitation iſt der Gravitation von g gegen das innere Sphäroid $a'd'b'e'$ gleich, welche ſich zu der Gravitation von f gegen das ganze Sphäroid verhält, wie $cg : cf$ (n. 2.).

§. 350. Es ſey M (Fig. 140) ein Punkt auf der Oberfläche eines elliptiſchen Sphäroids, und $AMDBE$ ein Schnitt deſſelben durch die Axe DE. Da die ſchneidende Ebene das Sphäroid in zwey gleiche und ähnliche Theile theilt; ſo fällt die Richtung, nach welcher der Punkt M von dem ganzen Sphäroid angezogen wird, in die Ebene des Schnitts. Man zerlege die Schwere von M gegen das Sphäroid in zwey Kräfte, deren eine in der Richtung Mq auf Axe DE ſenkrecht, die andere in der Richtung Ma mit der Axe DE parallel, oder auf den Aequator AB ſenkrecht wirke; ſo wird die erſtere der Schwere eines in a befindlichen Theilchens gegen den ganzen Körper, die letztere der Schwere eines in q befindlichen Theilchens gegen eben dieſen Körper gleich ſeyn. Man beſchreibe, um dieſes zu beweiſen, in das Sphäroid ein ihm concentriſches ähnliches und ähnlich liegendes Sphäroid $adbe$, welches den Punkt a auf ſeiner Oberfläche habe. Vermöge §. 348. n. 5. ſind die Schnitte der Sphäroide

mit einer durch die gerade Linie MN gelegten Ebene ähnliche und ähnlich liegende concentrische Ellipsen. Sey $ADBE$ (Fig. 134.) einer dieser Schnitte des äusseren, und $adbe$ des inneren Sphäroids mit derselben Ebene. Durch einen beliebigen Punkt p der in der Ebene des Aequators liegenden Axe ab der inneren Ellipse ziehe man die Ordinate lk, sodenn die geraden Linien al, ak, und durch M die ML, LR, MK mit al, ab, ak parallel. Man denke sich diese Sphäroide mit einer andern durch MN gehenden Ebene geschnitten; so entstehen keilförmige zwischen den zwey schneidenden Ebenen liegende Ausschnitte der zwey Sphäroide, dergleichen in dem vorhergehenden §. sind betrachtet worden, und zwar in dem äusseren Sphäroid zwey einander entgegengesetzte mit ihren Schneiden in der geraden Linie MN an einander stossende. In oder um diese Ausschnitte seyen den geraden Linien ML, MK, la, ak anliegende ähnliche pyramidenförmige Körper beschrieben, deren Spitzen in M und a seyen; so werden die Kräfte, mit welchen die Punkte M und a von diesen Körpern angezogen werden, sich verhalten, wie die geraden Linien ML, MK, al, ak (§. 439 n. 1.), und wenn man sie in andere zerfällt, welche mit AB und DE parallel wirken; so werden sich die ersteren verhalten wie MP und MR, ap und ap (§. 289.). Folglich verhält sich die Kraft, mit welcher der Punkt M von den zwey an KM. ML anliegenden pyramidenförmigen Körpern nach der Richtung MR angezogen wird, zu der Kraft, mit welcher der Punkt a von den zwey an al, ak anliegenden nach der Richtung ab angezogen wird, wie $MR \pm MP$ zu $2ap$, je nachdem KM und ML auf einerley, oder verschiedenen Seiten von MN liegen. Weil aber $lp = pk$, also $lap = kap$, $LMR = KMK$; so ist $MR \pm MP = 2ap$ (§. 348. n. 2.). Folglich sind die genannten Kräfte einander gleich. Da nun dieses auch von allen übrigen mit MR und ab beyderseits gleiche Winkel machenden pyramidenförmigen Körpern gilt; so ist die Kraft, mit welcher der Punkt M von der Summe aller in oder um die zwey Ausschnitte des äusseren Sphäroids beschriebenen pyramidenförmigen Körpern nach der Richtung MR angezogen wird, beständig der Kraft gleich, mit welcher der Punkt a von der Summe aller in oder um den correspondirenden Ausschnitt des inneren Sphäroids nach der Richtung ab angezogen wird. Mithin sind auch die Kräfte einander gleich, mit welchen die Punkte M und a nach den parallelen Richtungen MR, ab von den Ausschnitten des äusseren und inneren Sphäroids angezogen werden. Dieß gilt aber auch von allen beyderseits um gleiche Winkel gegen die durch M und die Axe des Sphäroids gelegte Ebene geneigten Ausschnitten; folglich ist die Schwere von M gegen das ganze Sphäroid nach der Richtung Mq (Fig. 140.) der Schwere von a gegen das innere Sphäroid $adbe$, mithin auch (Bew. von n. 3.

§. 349.) der Schwere von a gegen das ganze Sphäroid $ADBE$ gleich. Eben ſo wird gezeigt, daß die Schwere von M gegen das ganze Sphäroid nach der Richtung Ma der Schwere von q gegen ein durch den Punkt gehendes dem erſteren concentriſches ähnliches und ähnlich liegendes Sphäroid, mithin auch (§. 349.) der Schwere q gegen das ganze Sphäroid $ADBE$ gleich ſey.

§. 351. Die Schwere eines innerhalb des Sphäroids (Fig. 140.) auf der geraden Linie MN liegenden Theilchens n gegen das Sphäroid $ADBE$ iſt ſeiner Schwere gegen ein mit dieſem concentriſches ähnliches und ähnlich liegendes Sphäroid gleich, welches cn zum Halbmeſſer hat (Bew. von n. 3. §. 349.). Folglich iſt die Schwere von n gegen das größere Sphäroid nach einer auf DE ſenkrechten Richtung genommen der Schwere von a gegen das innere Sphäroid $adbe$ gleich, wie man in dem vorhergehenden §. geſehen hat. Mithin werden alle gleich weit von der Axe DE abſtehende Theilchen gegen dieſelbe hin mit gleicher Stärke angezogen. Eben ſo kann gezeigt werden, daß alle gleich weit von dem Aequator des Sphäroids abſtehende Theilchen gegen denſelben hin mit gleicher Stärke angezogen werden. Und weil die Schwere in a zur Schwere in A ſich verhält wie $ca : cA$; ſo verhält ſich auch die Schwere von M oder n gegen die Axe hin zu der Schwere von A wie $\left\{\frac{a}{Mq}\right\} : cA$. Eben ſo verhält ſich die Schwere von M nach einer auf dem Aequator ſenkrechten Richtung zu der Schwere in D wie $Ma : cD$.

Man ſetze die Schwere an dem Pol D (Fig. 140.) $= p$, und unter dem Aequator $= a$; ſo verhält ſich, wie ſo eben gezeigt worden iſt,

$$\left.\begin{matrix}\text{die Schwere von } M\\ \text{nach der Richtung } Ma\end{matrix}\right\} : \left\{\begin{matrix}\text{Schw. unt.}\\ \text{dem Pol}\end{matrix}\right\} = Ma : cD,$$

$$\left.\begin{matrix}\text{Schw. unt.}\\ \text{dem Aequat.}\end{matrix}\right\} : \left\{\begin{matrix}\text{Schwere von } M\\ \text{nach der Richt. } Mq\end{matrix}\right\} = cA : Mq,$$

$$\left.\begin{matrix}\text{Schw. unt.}\\ \text{dem Pol}\end{matrix}\right\} : \left\{\begin{matrix}\text{Schw. unt. d.}\\ \text{Aequator}\end{matrix}\right\} = p : a;$$

$$\text{folglich } \left.\begin{matrix}\text{Schw. von } M\\ \text{nach der Richt. } a\end{matrix}\right\} : \left\{\begin{matrix}\text{Schw. von } M\\ \text{nach der Richt. } Mq\end{matrix}\right\} = p.cA.Ma : a.cD.Mq.$$

Nimmt man nun auf der ac die aG gegen den Mittelpunkt c hin ſo, daß

$Ma : aG = p.cA.Ma : a.cD.Mq$; ſo iſt MG die Richtung, nach welcher der Punkt M von dem Sphäroid angezogen wird, und die Stärke dieſer Anziehung verhält ſich zu der Kraft, mit welcher der Punkt M nach der Richtung Ma angezogen wird, wie $MG : Ma$ (§. 252.). Es verhält ſich aber auch $ca : Ma = Mq : Ma$; folglich verhält ſich $ca : aG = p.cA : a.cD$.

Für das Gleichgewicht wird aber erfordert, daß die Rich-

tung MG der Schwere auf der Oberfläche des Sphäroids senkrecht, mithin GM eine Normallinie an dem Punkt M des durch ihn gehenden elliptischen Meridians sey; folglich muß sich verhalten

$ca : aG = AB$: Param. von AB (Kegelschn. II, 11. Zus. 9.)

$= \overline{AB}^2 : \overline{DE}^2$ (Kegelschn. II. Erkl. 9., u. Elem. VI, 20.),

also auch $p.cA : a.cD = \overline{AB}^2 : \overline{DE}^2$

$= \overline{Ac}^2 : \overline{cD}^2$,

oder $p : a = Ac : cD$.

§. 352. Die in dem vorhergehenden §. bewiesenen Sätze werden auch alsdenn noch ihre Anwendung finden, wenn auf alle Theilchen des Sphäroids neben ihren gegenseitigen Attractionen Kräfte wirken, deren Richtungen entweder auf der Axe oder auf dem Aequator senkrecht, oder zugleich solche, welche auf die Axe, und solche, welche auf dem Aequator senkrecht sind, wenn nur diese Kräfte, so wie diejenigen, welche aus den gegenseitigen Attractionen der Theilchen des Sphäroids entstehen, den Abständen der Theilchen, auf welche sie wirken, von der Axe oder von dem Aequator proportional sind. Es seyen die aus der Anziehung des Sphäroids und aus den fremden Kräften entstehende Kräfte, mit welchen die Punkte D und A (Fig. 140.) nach den Richtungen Dc, Ac getrieben werden, m und n. Weil nun die Kraft, mit welcher das Theilchen M nach der Richtung Ma von dem Sphäroid angezogen wird, sich zu der Kraft in D verhält wie $Ma : Dc$ (§. 351.), und vermöge der Voraussetzung jede der fremden auf M mit DE parallel wirkenden Kräfte zu ihrer Wirkung auf ein in D befindliches Theilchen sich ebenfalls wie $Ma : Dc$ verhält; so verhält sich die ganze Kraft, mit welche das Theilchen M nach der Richtung Ma getrieben wird, zu der Kraft m, wie $Ma : Dc$. Eben so verhält sich die ganze Kraft, mit welcher M nach der Richtung Mq getrieben wird, zu der Kraft n wie $Mq : cA$. Wenn also MG die Richtung mittleren aus diesen zwey Kräften zusammengesetzten Kraft ist; so verhält sich $ca : aG = m.cA : n.cD$ (§. 351.)

Es sey $cA : cD = m : n$; so ist fürs erste $\overline{cA}^2 : \overline{cD}^2 = m.cA : n.cD = ca : aG$. Also ist, wie man in dem vorhergehenden §. gesehen hat, die Richtung, nach welcher ein auf der Oberfläche des Sphäroids befindliches Theilchen von dem Sphäroid angezogen wird, auf dieser Oberfläche senkrecht, und die Stärke dieser Anziehung verhält sich zu der Kraft nach der Richtung Ma wie $MG : Ma$. Aber die Kraft in M nach der Richtung Ma verhält sich zu der Kraft in D, wie $Ma : Dc$; folglich verhält sich die Kraft, mit welcher ein in M befindliches Theilchen von

dem Sphäroid nach einer auf der Oberfläche des Sphäroids senkrechten Richtung angezogen wird zu der Kraft m unter dem Pol D, wie die auf den Aequator bezogene Normallinie MG zu der halben Umdrehungsaxe cD. Eben so wird ein innerhalb des Sphäroids auf dem Halbmesser cM befindliches Theilchen m nach einer MG parallelen Richtung mg angezogen mit einer Kraft, welche sich zu der auf M wirkenden verhält, wie $mg : MG$, weil die auf M und m nach der Richtung gerader auf der Axe oder auf dem Aequator senkrechter Linien wirkenden Kräfte sich verhalten, wie die Abstände dieser Theilchen von der Axe oder von dem Aequator.

Um zweytens zu zeigen, daß, wenn das Sphäroid flüßig ist, die Säulen des Fluidums einander an dem Mittelpunkt das Gleichgewicht halten; so seyen GR und gr auf dem Halbmesser cM senkrecht. Da die auf M und m nach den Richtungen MG, mg wirkenden Kräfte sich wie MG zu mg verhalten; so verhalten sich die auf eben diese Theilchen nach der Richtung des Halbmessers Mc wirkenden Kräfte wie $MR : mr$. Und weil $MR : mr = MG : mg = cM : cm$; so wächst die Schwere der in der Säule cM befindlichen Theilchen des Fluidums von dem Mittelpunkt c an ihrer Entfernung von diesem Punkt proportional, woraus folgt, daß der Druck der Säule Mc die Hälfte des Drucks ist, welchen eine ebenso hohe Säule ausüben würde, deren Theilchen durchaus eine der Schwere in M gleiche Schwere hätten, wie hernach gezeigt werden soll. Da nun die auf M nach der Richtung MR wirkende Kraft zu der Kraft nach MG sich verhält wie $MR : MG$, und die letztere zu der Kraft in D wie $MG : cD$; so verhält sich die Kraft MR zu der Kraft in D wie $MR : cD$, und der Druck der Säule Mc zu dem Druck der Säule $Dc = \frac{1}{2} cM \times MR : \frac{1}{2} c\overline{D}^2$. Es ist aber $cM \times MR = c\overline{D}^2$ (§. 348. n. 3.); folglich halten die Säulen Mc, Dc mit einander an dem Mittelpunkt c das Gleichgewicht.

Daß aber der Druck der Säule cM durch $\frac{1}{2} cM . MR$ gemessen werde, kann so gezeigt werden. Es seyen ac, bd (Fig. 141.) zwey auf gleichen Grundflächen stehende gleich hohe Säulen zweyer homogenen Flüßigkeiten, deren Theilchen in der Säule bd durch eine constante der geraden Linie ae proportionale Kraft gegen b hin getrieben werden. Auf die Theilchen der Säule ca aber wirke eine der Entfernung cm proportionale Kraft, welche an dem oberen Ende a dieser Säule der constanten auf die Säule bd wirkenden Kraft ae gleich werde. Sey ae auf ca in a senkrecht, ef parallel mit ca, und die Diagonale ce des Rechtecks $acfe$ schneide die durch m, m mit ae oder cb gezogenen Parallelen mo, $m'a'$ in n und n'. Die ef begegne diesen

Parallelen in p und p'. Da $\left\{\begin{matrix} cm : mn \\ cm' : m'n' \end{matrix}\right\} = ca : ae$; so messen die Linien mn. $m'n'$ die in m, m' wirkende Kraft, und der Druck der Säule mm' würde sich zum Druck der Säule oo' verhalten wie $mn : mp$, wenn auf alle Theilchen der Säule mm' eine der mn proportionale Kraft wirkte, hingegen wie $m'n' : mp$, wenn diese Kraft der $m'n'$ proportional wäre. Folglich ist das Verhältniß des Drucks von mm' zu dem Druck von oo' beständig größer, als das Verhältniß von $mn : mp$ oder des Rechtecks $m'n$ zu dem Rechteck $m'p$, aber kleiner als das Verhältniß des Rechtecks mn' zu dem Rechteck $m'p$, und ebenso verhält es sich mit den übrigen in gleichen Höhen befindlichen Theilen der zwey Säulen. Daher ist das Verhältniß des Drucks der ganzen Säule ca zu dem Druck der ganzen Säule db beständig größer als das Verhältniß der Summe in das Dreyeck ace beschriebenen Rechtecke zu dem Rechteck af, aber kleiner als das Verhältniß der Summe der um das Dreyeck ace beschriebenen Rechtecke zu eben diesem Rechteck af. Mithin ist das Verhältniß des Drucks von ac zu dem Druck von db dem Verhältniß des Dreyecks ace zu dem Rechteck db, oder dem Verhältniß von $\frac{1}{2} ca. ae : \left\{\begin{matrix} ca. ae \\ bd. ae \end{matrix}\right\}$ gleich.

Es verhält sich also auch der Druck der Säule cm zu dem Druck der Säule ca wie das Dreyeck cmn zu dem Dreyeck cae $= \overline{cm}^2 : \overline{ca}^2$, und der Druck der Säule am zu dem Druck der Säule ca wie $\overline{ca}^2 - \overline{cm}^2 : \overline{ca}^2$, oder es ist, wenn man den Druck der Säule $ca = \frac{1}{2} ca. ae$ setzt, der Druck der Säule am $= \frac{\overline{ca}^2 - \overline{cm}^2}{2ac} . ae$.

Drittens sey p (Fig. 140.) ein innerhalb des Sphäroids liegendes Theilchen, Pp eine von der Oberfläche an den Punkt p gehende Säule des Fluidums, und $adbe$ ein mit dem Sphäroid $ADBE$ concentrisches, ihm ähnliches und ähnlich liegendes Sphäroid; so wird der Druck der Säule Pp auf den Punkt p dem Druck der Säule Dd auf den Punkt d gleich seyn. Es liege Pp in der Ebene DBE, und seine Verlängerung schneide die Axe AB in h, die DE in f. Man ziehe PK, pk auf den Aequator AB, PL, pl auf die Axe DE, und ki, lo auf Pf senkrecht; so verhält sich

$$\left.\begin{matrix} \text{die Attract. in } p \\ \text{nach der Richt. } pk \end{matrix}\right\} : \left\{\begin{matrix} \text{Attract. in } D, \\ \text{oder } m \end{matrix}\right\} = pk : cD$$

$$\left.\begin{matrix} \text{Attract. in } p \\ \text{nach der Richt. } pi \end{matrix}\right\} : \left\{\begin{matrix} \text{Attr. in } p \\ \text{nach der Richt. } pk \end{matrix}\right\} = pi : pk,$$

$$\text{also } \left.\begin{matrix} \text{Attr. in } p \\ \text{nach der Richt. } pi \end{matrix}\right\} : m = pi : cD;$$

folglich iſt die Attraction in p nach der Richtung $pi = \frac{m.pi}{cD}$ $= m.\left(\frac{pk}{ph}\right)^2.\frac{pk}{cD}$, weil $ph : pk = pk : pi$. Und weil das Theilchen p nach der Richtung pl mit einer Kraft angezogen wird, welche ſich zur Attraction in B oder zu n verhält, wie $pl : cB$; ſo iſt der nach der Richtung pf wirkende Theil dieſer Kraft $= \frac{n.po}{cB} = n.\left(\frac{pl}{pf}\right)^2.\frac{pf}{cB}$, weil $pf : pl = pl : po$. Folglich iſt die ganze nach der Richtung pf auf p wirkende Kraft $= m.\left(\frac{pk}{ph}\right)^2.\frac{pk}{cD} + n.\left(\frac{pl}{pf}\right)^2.\frac{pf}{cB}$. Wegen der conſtanten Verhältniſſe von $pk : ph$ und von $pl : pf$ iſt der erſte Theil dieſer Kraft der Diſtanz ph, der zweyte der Diſtanz pf proportional, ſo daß jedes Theilchen p' der Säule Pp von zwey Kräften nach der Richtung $p'f$ getrieben wird, wovon die erſte der Diſtanz $p'h$, die zweyte der Diſtanz $p'f$ proportional iſt. Folglich wird, wie vorhin gezeigt wurde, der von der erſten Kraft herrührende Theil des Drucks der Säule Pp gemeſſen durch $\frac{m}{2cD}\left(\frac{pk}{ph}\right)^2(\overline{Ph}^2 - \overline{ph}^2)$, und der von der zweyten Kraft herrührende Theil durch $\frac{n}{2cB}\left(\frac{pl}{pf}\right)^2(\overline{Pf}^2 - \overline{pf}^2)$. Daher iſt der ganze Druck der Säule Pp

$$= \frac{m}{2cD}\left(\frac{pk}{ph}\right)^2(\overline{Ph}^2 - \overline{ph}^2) + \frac{n}{2cB}\left(\frac{pl}{pf}\right)^2(\overline{Pf}^2 - \overline{pf}^2),$$

$$= \frac{m}{2cD}(\overline{PK}^2 - \overline{pk}^2) + \frac{n}{2cB}(\overline{PL}^2 - \overline{pl}^2), \text{ weil } ph : pk = Ph : PK,$$

und $pf : pl = Pf : PL$.

Es verhält ſich aber vermöge Kegelſchn. II, 7. und II, 5. Elem.

$$\overline{PL}^2 : \overline{cD}^2 - \overline{cL}^2 = \overline{cB}^2 : \overline{cD}^2$$

$$\overline{pl}^2 : \overline{cd}^2 - \overline{cl}^2 = \left\{\begin{matrix}\overline{cb}^2 : \overline{cd}^2 \\ \overline{cB}^2 : \overline{cD}^2 \text{ (Conſtr.)}\end{matrix}\right.;$$

folglich $\overline{PL}^2 - \overline{pl}^2 : \overline{cD}^2 - \overline{cL}^2 - \overline{cd}^2 + \overline{cl}^2 = \overline{cB}^2 : \overline{cD}^2$.

Da nun $\left\{\begin{matrix}cA \\ cB\end{matrix}\right\} : cD = m : n$ (Vorausſ.); ſo iſt

$$\frac{n}{2cB}(\overline{PL}^2 - \overline{pl}^2) = \frac{m}{2cD}(\overline{cD}^2 - \overline{cL}^2 - \overline{cd}^2 + \overline{cl}^2).$$

Aber $\frac{m}{2cD}(\overline{PK}^2 - \overline{pk}^2) = \frac{m}{2cD}(\overline{cL}^2 - \overline{cl}^2)$, weil $\left\{\begin{matrix}PK = cL \\ pk = cl\end{matrix}\right\}$; folglich iſt, wenn man dieſe gleichen Größen zu den vorhergehenden addirt, der ganze Druck der Säule $Pp = \frac{m}{2cD}(\overline{cD}^2 - \overline{cd}^2)$

= dem Druck der Säule *Dd*. Auf ähnliche Art kann gezeigt werden, daß andere von der Oberfläche des Sphäroids an das Theilchen *p* gehende Säulen gleich stark darauf drücken, und mit einander das Gleichgewicht halten.

§. 353. Wenn also die Theilchen eines gleichförmig dichten flüßigen elliptischen Sphäroids einander im umgekehrten Verhältniß der Quadrate ihrer Entfernungen anziehen, und noch andere Kräfte auf die Theilchen des Fluidums entweder senkrecht auf die Axe des Sphäroids wirken, welche den Distanzen von der Axe proportional sich verändern, oder senkrecht auf die Ebene des Aequators wirken, welche den Abständen von der Ebene des Aequators proportional sind, oder auch, wenn Kräfte auf die Theilchen des Sphäroids wirken, welche in solche zerlegt werden können, und die ganze an dem Pol *D* (Fig. 140.) wirkende Kraft zu der an dem Umfang des Aequators in *A* oder *B* wirkenden sich verhält, wie der Halbmesser *cA* des Aequators zu der halben Axe *cD* des Sphäroids; so ist das Fluidum im Gleichgewicht. Jede der Oberfläche des Sphäroids concentrische ähnliche und ähnlich liegende Oberfläche *adbc* wird in allen ihren Punkten von dem über ihr befindlichen Theil des Fluidums gleich stark gedrückt, und die Kräfte, mit welchen gleiche Theilchen an diesen Oberflächen gegen das Sphäroid gravitiren, verhalten sich wie die zwischen den Oberflächen und der Ebene des Aequators liegende Stücke *MG*, *mg* der an die Oberflächen gezogenen Normallinien.

Hieraus folgt, daß, wenn ein flüßiges Sphäroid von gleichförmiger Dichtigkeit sich um seine Axe *DE* dreht, und die Attraction *p* an dem Pol *D* sich zu dem Ueberschuß der Attraction *a* unter dem Aequator über die von der Umdrehungsbewegung des Sphäroids herrührende Schwungkraft *v* unter dem Aequator verhält, wie der Halbmesser *cA* des Aequators zu der halben Axe *cD*, das Fluidum im Gleichgewicht ist. Denn in diesem Fall wird die Attraction nach einer auf dem Aequator senkrechten Richtung durch die Schwungkraft, welche in der Ebene der Parallelkreise des Aequators wirkt, nicht geändert, und die Kräfte, mit welchen die Schwungkraft die Theilchen des Fluidums von der Axe des Sphäroids zu entfernen strebt, sind den Halbmessern der Kreise, welche sie beschreiben (§. 273. n. 2.), also ihren Abständen von der Axe proportional. Folglich ist das Fluidum vermöge §. 352. im Gleichgewicht, wenn sich der Halbmesser *cA* des Aequators zu der halben Axe *cD* des Sphäroids verhält wie $p : a - v$. Das elliptische Sphäroid erfüllt also die Bedingungen des Gleichgewichts. Es fragt sich aber, ob nicht durch die Umdrehung einer anderen Figur, als einer Ellipse, ein Körper beschrieben werden könne, bey welchem das Gleichgewicht

möglich iſt. Dieſe Frage haben Le Gendre *) und La Place **) beantwortet, indem ſie zeigten, daß eine gleichförmig dichte flüßige und ſich drehende Maſſe nur alsdenn im Gleichgewicht ſeyn könne, wenn ſie die Figur eines elliptiſchen Sphäroids hat. Letzterer zeigte, daß der Körper eben dieſe Figur annehmen müſſe, wenn ſeine Schichten verſchiedene Dichtigkeiten haben ***). Demnach müßte die Erde, oder ein anderer Planet, wenn ſie anfänglich flüßig und gleichförmig dicht geweſen wäre, vermöge ihrer Umdrehungsbewegung die Geſtalt eines unter den Polen zuſammengedrükten elliptiſchen Sphäroids angenommen haben, wie Newton vorausgeſetzt hat. Und weil die Schweren an der Oberfläche dieſes Sphäroids den zwiſchen dem Aequator und der Oberfläche des Sphäroids liegenden Stücken der Normallinien proportional ſind; ſo wird ſich, wenn man die Excentricität eines elliptiſchen Meridians $= e$ ſetzt, die Schwere unter der Breite l zur Schwere unter der Breite l' verhalten wie $\sqrt{1-e^2 \operatorname{Sin.} l'^2} : \sqrt{1-e^2 \operatorname{Sin.} l^2}$ (§. 137. n. 5.), mithin die Schwere unter der Breite l zur Schwere unter dem Aequator $= 1 : \sqrt{1-e^2 \operatorname{Sin} l^2}$.

Die Schwere unter der Breite l wird alſo ſeyn $= \frac{\text{Schw. unter d. Aequat.}}{\sqrt{1-e^2 \operatorname{Sin.} l^2}}$

$= \text{Schw. unt. d. Aequat.} \left(1 + \frac{1}{2} e^2 \operatorname{Sin.} l^2 + \frac{1.3}{2.4} e^4 \operatorname{Sin.} l^4 + \text{&c.}\right)$

Daher würde, weil e ein ſehr kleiner Bruch iſt, die Schwere von dem Aequator an gegen die Pole hin ſehr nahe dem Quadrat des Sinus der Breite proportional wachſen, wie man durch die Beobachtungen gefunden hat (§. 269. u. 270.).

Ferner verhalten ſich die Würfel der auf einerley Axe eines elliptiſchen Meridians der Erde ſich beziehenden Normallinien deſſelben, wie die denſelben Punkten entſprechenden Krümmungshalbmeſſer der Ellipſe (Kegelſchn. II, 36. Zuſ. 8.), oder wie die Längen der correſpondirenden Meridiangrade; folglich würde die Schwere an verſchiedenen Orten der Erde den Kubikwurzeln aus den Längen der ihnen entſprechenden Meridiangrade proportional ſeyn.

§. 354. Zu der Beſtimmung des Axenverhältniſſes des Sphäroids wird jetzt noch die Größe der Attractionen unter dem Pol und unter dem Aequator erfordert. Es ſey *ADBE* (Fig. 142.) ein gleichförmig dichtes durch die Umdrehung der halben Ellipſe *DAE* um die Axe *DE* erzeugtes Sphäroid, und eine aus dem

*) Mém. de l'Acad. de Paris. 1782.
**) Mém. 1784.
***) Méc. cél. T. II. L. III. Chap. IV. n. 30.

Pol D an die Ellipse gezogene gerade Linie DM schneide einen aus D als Mittelpunkt mit dem Halbmesser Dc beschriebenen Kreis in N. Man ziehe MQ, NR auf Dc senkrecht, und nehme auf der RN die $RK = DQ$. Wenn DKG die krumme Linie ist, welche durch die Endpunkte aller nach diesem Gesetz bestimmten Ordinaten RK durchgeht; so ist die Gravitation gegen das ganze Sphäroid an dem Pol $D = \frac{2\pi \cdot \text{Fläche } DKGc}{Dc}$ (§. 289. n. 5.). Die Gravitation in D gegen eine um DE als Durchmesser beschriebene Kugel ist aber $= \frac{4}{3}\pi \cdot \frac{\overline{Dc}^3}{\overline{Dc}^2}$ (§. 290.); folglich verhält sich die Gravitation des Theilchens D gegen das Sphäroid zu seiner Gravitation gegen diese Kugel wie die Fläche $DKGc$ zu $\frac{2}{3}\overline{Dc}^2$.

Die Gravitation in A unter dem Aequator des Sphäroids ergiebt sich aus der Gravitation unter dem Pol auf folgende Art. Man ziehe durch A die Parallele gh mit der Axe DE und lege durch diese zwey Ebenen, welche auf der Ebene des Aequators senkrecht seyn werden. Es seyen $ADBE$, $Adbe$ die zwey elliptischen hiedurch entstandenen Schnitte des Sphäroids, AM schneide die Ellipse $ADEB$ in m, und einen aus A als Mittelpunkt mit dem Halbmesser $Ai = Dc$ beschriebenen Kreis in n. Man ziehe durch m die mq auf AB, und durch n die rk auf Ah senkrecht, welche der qm in k begegne, und hkB sey die krumme Linie, welche durch die Endpunkte aller nach diesem Gesetz bestimmten Ordinaten rk durchgeht; so wird die Gravitation von A gegen den keilförmigen zwischen den zwey Ebenen $ADBE$ und $Adbe$ liegenden Ausschnitt des Sphäroids gemessen durch $\frac{hkBA}{Ai}$ (§. 289. n. 2.) Man vollende das Parallelogramm $DcGJ$, und verlängere die Ordinate RK, bis sie der GJ in x begegnet. Wenn nun die geraden Linien DM, Am sich so um die Punkte D und A bewegen, daß beständig der Winkel EDM dem Winkel hAm gleich ist; so sind wegen der gleichen Seiten DN, An die Dreyecke DRN und Arn beständig einander gleich, mithin $DR = Ar$, und $\left\{\begin{matrix} cR \\ Gx \end{matrix}\right\} = hr$. Es verhält sich aber (Kegelschn. II, 7.)

$$\overline{qm}^2 : Aq \times qB = \overline{cD}^2 : \overline{cA}^2 = DQ \times QE : \overline{QM}^2$$

und wegen der ähnlichen Dreyecke Aqm, DQM

$$Aq : qm = QM : DQ; \text{ folglich}$$

$$qm : qB = QE : QM,$$

also auch $Aq : qB = QE : DQ$,

und $Aq : QE = AB : DE$.

Nun aber wird vermöge der Construction die dem Punkt c ent-

entſprechende Ordinata cG der krummen Linie DKG der Are DE gleich; folglich iſt QE oder $DE - DQ = cG - DQ = xR - RK$ (weil $RK = DQ$) $= xK$, und

$$\left.\begin{matrix} Aq \\ rk \end{matrix}\right\} : xK = AB : DE.$$

Da nun die den gleichen Abſciſſen hr, Gx entſprechenden Ordinaten rk, xK der zwey krummen Linien hkB, GKD in dem gegebenen Verhältniß von $AB : DE$ ſind; ſo verhält ſich auch die Fläche $AhkB$ zu der Fläche $JGKD$ wie $AB : DE = cA : cD$. Wäre $ADBE$ ein um den Durchmeſſer AB beſchriebener Kreis, oder $Dc = cA$; ſo wäre die Fläche $DKGC = \frac{2}{3}cA^2$ (§. 290. wenn man in Fig. 118. C auf B fallen läßt.), und die Fläche $JGKD = Dc \times cG - DKGC = 2c\overline{A}^2 - \frac{2}{3}cA^2 = \frac{4}{3}c\overline{A}^2$. Folglich verhält ſich vermöge §. 289. n. 2. die Gravitation in A gegen den zwiſchen den Ebenen $ADBE$ und Adb liegenden ſphäroidiſchen Ausſchnitt zu der Gravitation in A gegen den zwiſchen denſelben Ebenen liegenden Ausſchnitt der um AB als Durchmeſſer beſchriebenen Kugel, wie $\frac{hkBA}{Al} : \frac{4}{3}Ac$, das iſt wie

$$\frac{Dc \times cG - DKGc}{Dc} \text{ oder } \frac{Ac}{cD} : \frac{4}{3}Ac, \text{ oder wie } 2\overline{Dc}^2 - DKGc \text{ zu } \frac{4}{3}c\overline{D}^2.$$

Die Gravitation in A gegen das ganze Sphäroid iſt zu der Gravitation in A gegen die um den Durchmeſſer AB beſchriebene Kugel in demſelben Verhältniß. Denn jeder auf dem Aequator ſenkrechte Schritt des Sphäroids iſt eine der Ellipſe $ADBE$ ähnliche Ellipſe (§. 348. n. 4.), und der correſpondirende Schnitt der um den Durchmeſſer des Aequators beſchriebenen Kugel iſt ein Kreis, deſſen Durchmeſſer diejenige Are des elliptiſchen Schnitts iſt, welche der DE ähnlich liegt, und daher iſt das Verhältniß der Gravitation in A gegen den elliptiſchen keilförmigen Körper zu der Gravitation in A gegen den correſpondirenden keilförmigen Ausſchnitt der Kugel beſtändig dem Verhältniß von $2\overline{Dc}^2 - DKGc : \frac{4}{3}c\overline{D}^2$ gleich. Folglich verhält ſich die Gravitation in A gegen das ganze Sphäroid zu der Gravitation in A gegen die um den Durchmeſſer ihres Aequators beſchriebenen Kugel wie $2c\overline{D}^2 - \text{Fläche } DKGc : \frac{4}{3}c\overline{D}^2$. Aber die Gravitation in A gegen dieſe Kugel verhält ſich zu der Gravitation in D gegen eine um die Are DE als Durchmeſſer beſchriebene Kugel wie $Ac : cD$ (§. 290.); folglich verhält ſich die Gravitation in A gegen das Sphäroid zu der Gravitation in D gegen eine um DE als Durchmeſſer beſchriebene Kugel $= Ac(2c\overline{D}^2 - DKGc) : \frac{4}{3}cD^3$. Da nun die Gravitation in D gegen dieſe Kugel ſich zu der Gravitation in D gegen das Sphäroid verhält $= \frac{4}{3}c\overline{D}^2 : \text{Fläche } DKGc$, wie man zu Anfang dieſes §. gefunden hat; ſo verhält

sich die Gravitation unter dem Aequator in A gegen das Sphäroid zur Gravitation gegen daſſelbige unter dem Pol D

$$= Ac\,(2c\overline{D}^2 - DKGc) : 2DKGc \times cD$$

oder $= 2c\overline{D}^2 - DKGc : 2DKGc.\frac{cD}{cA}$.

§. 355. Der Flächenraum $DKGc$ aber kann ſo gefunden werden. Wegen der ähnlichen Dreyecke DQM und DRN verhält ſich

$$\overline{DQ}^2 : \overline{QM}^2 = \overline{DR}^2 : \overline{RN}^2.$$

Aber $\overline{QM}^2 : DQ.QE = \overline{Ac}^2 : c\overline{D}^2$ (Kegelſchn. II, 7);

folglich $DQ : QE = \overline{Ac}^2.\overline{DR}^2 : c\overline{D}^2.\overline{RN}^2$

$$\left.\begin{matrix} DQ \\ RK \end{matrix}\right\} : DE = \overline{Ac}^2.\overline{DR}^2 : \overline{Ac}^2.\overline{DR}^2 + c\overline{D}^2.\overline{RN}^2.$$

Sey der Durchmeſſer AB des Aequators die größere Axe der Ellipſe $ADBE$ und F einer ihrer Brennpunkte. Man ziehe DF; ſo iſt dieſe $= Ac$ (Kegelſchn. II, 1. Zuſ. 8.), und

$$\overline{Ac}^2.\overline{DR}^2 + cD^2.\overline{RN}^2 = \overline{Ac}^2.\overline{DR}^2 + c\overline{D}^2\,(\overline{ND}^2 - \overline{DR}^2)$$
$$= c\overline{D}^4 + c\overline{F}^2.\overline{DR}^2.$$

Alſo iſt $RK : DE = \overline{Ac}^2.\overline{DR}^2 : c\overline{D}^4 + \overline{cF}^2.\overline{DR}^2$.

Man nehme auf der cF die cf ſo, daß $cD : cF = DR : cf$. Alsdenn iſt $cF.DR = cD.cf$,

und 1.) $RK : DE = \overline{Ac}^2.\overline{DR}^2 : \left\{\begin{matrix} c\overline{D}^2\,(c\overline{D}^2 + \overline{cf}^2) \\ c\overline{D}^2.\overline{Df}^2 \end{matrix}\right.$

$= \overline{Ac}^2.\overline{ef}^2 : \overline{cF}^2.\overline{Df}^2$, weil $DR : cD = ef : cF$ (Conſtr.). Eben ſo iſt unter der Vorausſetzung derſelben Conſtruction für jede andere Ordinate $R'K'$ (Fig. 143.) der krummen Linie DKG

2.) $R'K' : DE = \overline{Ac}^2.\overline{cf'}^2 : \overline{cF}^2.\overline{Df'}^2$.

Der Kreis cNH ſchneide die Df, Df', DF in den Punkten s, s, S. Man ziehe an den Punkt s des Kreiſes die Tangente st, welche der Df' in t begegne, ferner die fr', sp auf Df', und die fr auf die Verlängerung von Df ſenkrecht; ſo verhält ſich

$$ff' : f'r = Df : Do$$
$$f'r : st = Dr : Dc;$$

alſo $ff' : st = Dr.Df : \overline{Dc}^2$

$$ff' : ff' - rt = Dr.Df : Dr.Df - \overline{Dc}^2$$
$$= \overline{Df}^2 + Df.fr : \left\{\begin{matrix} \overline{Df}^2 \\ cf^2 \end{matrix}\right. + \begin{matrix} Df.fr - \overline{Dc}^2 \\ + Df.fr. \end{matrix}$$

Daher iſt $ff' : ff' - st < \overline{Df}^2 : cf^2$, und, weil $st > ss'$, um ſo mehr

3.) $ff' : ff' - ss' < \overline{Dj}^2 : \overline{cf}^2$.

Und weil $ff' : fr' = Df' : De$.

$fr' : sp = Df : \begin{cases} Ds \\ De \end{cases}$;

so ist $ff' : sp = Df'.Df : \overline{De}^2$

$= \overline{Df'}^2 - Df'.gr : \overline{De}^2$, wenn man $Dg = Df'$ macht.

Folglich ist $ff' : ff' - sp = \overline{Df'}^2 - Df'.gr : \overline{cf'}^2 - Df'.gr$

$> \overline{Df'}^2 : \overline{cf'}^2$, und weil $sp < ss'$,

4.) um so mehr $ff' : ff' - ss' > \overline{Df'}^2 : \overline{cf'}^2$

Da nun so wohl $DR : cf$ als $DR' : cf'$ $\Big) = De : eF$ (Constr.)

so ist $RR' : ff' = De : eF$.

Aber $ff' : ff' - ss' < \overline{Df}^2 \ \overline{cf}^2$ (n. 3.)

und $RK : DE = \overline{Ae}^2.\overline{cf}^2 : \overline{eF}^2.\overline{Dj}^2$ (n. 1.)

folglich 5.) $RK.RR' : DE\,(ff' - ss') < De.\overline{Ae}^2 : \overline{cF}^3$. Eben so findet sich mittelst n. 2. u. 4.

6.) $R'K'.RR' : DE\,(ff' - ss') > De.\overline{Ae}^2 : \overline{eF}^3$.

Nun ist $DE.ff' = 4.\frac{1}{2}De.ff' = 4.$ Dreyeck Dff', und $DE.ss' = 4.\frac{1}{2}.Ds.ss' = 4.$ Kreisausschnitt Dss'; folglich $DE\,(ff - ss) = 4.$ Fläche $fss'f'$, und $RK.RR'$ ist der Inhalt eines in die Figur $DKGc$ beschriebenen Rechtecks, so wie $R'K'.RR'$ der Inhalt des correspondirenden um die Figur beschriebenen. Also ist das Verhältniß eines jeden in die Figur beschriebenen Rechtecks zu dem Vierfachen des correspondirenden Raums $fss'f'$ beständig kleiner, das Verhältniß eines jeden um die Figur beschriebenen Rechtecks zu dem Vierfachen seines corresp. Raum $fss'f'$ beständig größer, als das gegebene Verhältniß von $De.\overline{Ae}^2 : \overline{cF}^3$, oder von $B : C$ zur Abkürzung. Man setze die Summe aller in die Figur $DKGc$ beschriebenen Rechtecke $= S$, die Summe der darum beschriebenen $= S'$, und den durch die geraden Linien cF, FS und den Kreisbogen Sc begränzten Raum $= A$; so ist auch $S : 4.A < B : C$, und $S' : 4A > B : C$. Da nun durch die Verminderung von RR' der Ueberschuß von S' über S kleiner gemacht werden kann, als jeder gegebene Raum (§. 246.); so verhält sich die Fläche $DKGc$ zu dem Vierfachen der Fläche $SFcS$ wie $De.\overline{Ae}^2 : \overline{cF}^3$. Daher

ist 7.) die Fläche $DKGc = 4.\dfrac{De.\overline{Ae}^2}{\overline{cF}^3} \cdot \frac{1}{2}\,De\,(cF - cS)$

$= 2\dfrac{\overline{De}^2.\overline{Ae}^2}{\overline{cF}^3}\,(cF - cS)$

Setzt man diesen Ausdruck in die am Ende des 354sten §.

gefundenen Proportion; ſo wird das Verhältniß der Gravitation gegen das Sphäroid unter dem Aequator zu der Gravitation an dem Pol

$$= \overline{Ac}^2 . cS : \overline{cD}^2 . cF : 2cD . Ac(cF - cS)$$

$$= \left(\frac{Ac}{cD}\right)^2 \cdot \frac{cS}{cD} : \frac{cF}{cD} : \frac{2Ac}{cD}\left(\frac{cF}{cD} - \frac{cS}{cD}\right).$$

Man ſetze $\frac{cF}{cD} = w$; ſo iſt $\frac{cA}{cD} = \sqrt{1+w^2}$, und $\frac{cS}{cD}$ iſt die Länge eines mit dem Halbmeſſer 1 beſchriebenen Kreisbogens, deſſen Tangente für eben dieſen Halbmeſſer $= w$ iſt. Alſo verhält ſich

8.) $\left(\begin{matrix}\text{Die Gravitat.}\\ \text{unt. d. Aequat.}\end{matrix}\right) : \left(\begin{matrix}\text{Gravit. an}\\ \text{dem Pol}\end{matrix}\right) = (1+w^2)\, Arc.\,\text{Tg.}\, w - w :$
$2(w - Arc.\,\text{Tg.}\, w)\sqrt{1+w^2}$.

Man nehme die Gravitation an der Oberfläche einer mit dem Halbmeſſer 1 beſchriebenen Kugel von der Dichtigkeit 1, das iſt, die Geſchwindigkeit, welche dieſe Kraft in der Zeiteinheit erzeugen würde, zur Einheit des Maaßes der Attractionskräfte an; ſo iſt, wenn man den Inhalt einer mit dem Halbmeſſer Dc beſchriebenen Kugel $= M'$, und ihre Dichtigkeit der Dichtigkeit d des Sphäroids gleich ſetzt, die Gravitation an der Oberfläche dieſer Kugel $= \frac{M'd}{\overline{cD}^2}$ (§. 290.). Der Inhalt M des Sphäroids verhält ſich aber zu dem Inhalt einer um die Umdrehungsaxe DE als Durchmeſſer beſchriebenen Kugel, wie das Quadrat des Halbmeſſers ſeines Aequators zu dem Quadrat ſeiner halben Axe; folglich iſt die Gravitation an dem Pol D der um DE als Durchmeſſer beſchriebenen Kugel $= \frac{Md}{\overline{cA}^2}$. Da ſich nun dieſe Gravitation zu der Gravitation in D gegen das Sphäroid verhält, wie $2c\overline{D}^2 : 3DKGc$ (§. 354.) $= \overline{cF}^3 : 3\overline{Ac}^2 (cF - cS)$ §. 355. n. 7.); ſo iſt

9.) $\left.\begin{matrix}\text{Die Gravitation } p\\ \text{gegen das Sphäroid}\\ \text{an dem Pol } D\end{matrix}\right\} = \frac{3Md(cF - cS)}{\overline{cF}^3},$

$$= \frac{3Md}{\overline{cD}^2} \cdot \frac{w - Arc.\,\text{Tg.}\, w}{w^3},$$

und vermöge der Proportionen n. 8.

10.) $\left.\begin{matrix}\text{Die Gravit. } a \text{ gegen}\\ \text{das Sphäroid unter}\\ \text{dem Aequator}\end{matrix}\right\} = \frac{3Md}{2\overline{D}^2} \cdot \frac{(1+w^2)\, Arc.\,\text{Tg.}\, w - w}{2w^3\sqrt{1+w^2}}.$

Sey die Umdrehungszeit des Sphäroids um ſeine Axe $= t$;

so ist die Schwungkraft k in der Distanz x von der Umdrehungsaxe $= \frac{4w^2}{t^2}$ (§. 273. n. 2.), und unter dem Aequator des Sphäroids $= \frac{4Ac.w^2}{t^2} = v$. Endlich muß, wenn das Fluidum im Gleichgewicht seyn soll, sich verhalten $a - v : p = cD : Ac$; folglich muß seyn

$$Ac.a - Ac.v = cD.p,$$

oder $Ac.cD.a - Ac.cD.v = c\overline{D}^2.p$,

$$c\overline{D}^2.a\sqrt{1+w^2} = c\overline{D}^2.p + \frac{4Ac.w^2}{t^2}\,c\overline{D}^2\sqrt{1+w^2},$$ d. i wenn man statt a und p ihre Werthe aus n. 10. u. 9. setzt,

$$\frac{3Md}{2w^3}\left((1+w^2)\,Arc.\,\mathrm{Tg}.w - w\right) = \frac{3Md}{w^3}\,(w - Arc.\,\mathrm{Tg}.w) + \frac{4Ac.w^2}{t^2}\,c\overline{D}^2\sqrt{1+w^2}$$

$$3(1+w^2)\,Arc.\,\mathrm{Tg}.w - 3w = 6w - 6\,Arc.\,\mathrm{Tg}.w + \frac{8w\,Ac.w^2.c\overline{D}^2\sqrt{1+w^2}}{t^2 Md},$$

woraus man, wenn 11.) $\frac{4Ac.w^2.c\overline{D}^2\sqrt{1+w^2}}{t^2 Md} = q$ gesetzt wird, erhält 2.) $Arc.\,\mathrm{Tg}.w = \frac{9w + 2qw^3}{9 + 3w^2}$.

Setzt man in n. 11. statt des Inhalts M des Sphäroids seinen Werth $\frac{4}{3}\pi.\overline{Ac}^2.cD$; so wird

13.) $q = \frac{3\pi}{t^2.d}$, mithin ist b für ein Sphäroid von einer gegebenen Dichtigkeit umgekehrt dem Quadrat seiner Umdrehungszeit proportional, und daher constant, wenn die Dichtigkeit und die Umdrehungszeit gegeben sind.

Wenn AB (Fig. 140.) die große, DE die kleine Axe einer Ellipse, MG eine Normallinie an dem Punkt M, die Breite $AGM = L$, und die Excentricität $= e$ ist; so ist

$$\overline{GM}^2 = \frac{(\frac{1}{2}\,\mathrm{Param.})^2}{1 - e^2\,\mathrm{Sin.}\overline{L}^2}$$ (§. 137. n. 5.).

Aber $1 - e^2\,\mathrm{Sin.}\overline{L}^2 = 1 - e^2 + e^2\,\mathrm{Cos.}L^2 = \left(\frac{cD}{cA}\right)^2 (1 + w^2\,\mathrm{Cos.}\overline{L}^2)$; folglich ist

$$\overline{GM}^2 = \frac{c\overline{D}^2}{1 + w^2\,\mathrm{Cos.}\overline{L}^2},$$ und es verhält sich

$$\sqrt{1 + w^2\,\mathrm{Cos.}\overline{L}^2} : 1 = cD : GM$$

$= \text{Schwere in D} : \text{Schwere in M}$ (§. 352. n. 1.),

$= \frac{3Md}{eD^2} \cdot \frac{w - Arc.\,Tg.\,w}{w^3} : \text{Schwere in M}$ (n. 9.).

Alſo iſt, wenn man die Schwere in M $= 2g$ = der doppelten Fallhöhe in der erſten Sekunde unter der Breite L ſetzt,

14.) $2g = \frac{Md}{eD^2} \cdot \frac{3(w - Arc.\,Tg.\,w)}{w^3\sqrt{1 + w^2 Cos.L^2}}$.

Hieraus folgt $\frac{eD^2}{Md} = \frac{3(w - Arc.\,Tg.\,w)}{2gw^3\sqrt{1 + w^2\,Cos.\,L^2}}$, und wenn man dieſen Ausdruck in n. 11. ſubſtituirt,

15.) $q = \frac{2Ac.\pi^2}{g.t^2} \cdot \frac{3(w - Arc.\,Tg.\,w)\sqrt{1 + w^2}}{w^3\sqrt{1 + w^2 Cos.L^2}}$.

Wenn der Halbmeſſer Ac des Aequators, die freye Fallhöhe g in der erſten Sekunde unter einer gegebenen Breite L, und die Umdrehungszeit t gegeben ſind; ſo hat man zu der Beſtimmung der zwey unbekannten Größen q und w die zwey Gleichungen n. 12. und 15., mittelſt welcher w, und das Verhältniß der Aren $\sqrt{1 + w^2} : 1$ gefunden werden können.

Sey G die Länge eines unter der Breite L gemeßenen Meridiangrades; ſo iſt

$Ac = \frac{180.G}{\pi}\left(\frac{Ac}{eD}\right)^2 (1 - e^2 Sin\,L^2)^{\frac{3}{2}}$ (§. 137. n. 9.)

$= \frac{180.G}{\pi} \cdot \frac{eD}{eA^2} (1 + w^2\,Cos.\,L^2)^{\frac{3}{2}}$. Man ſetze dieſen Werth von Ac in n. 15.; ſo wird, weil

$\frac{eD}{eA} = \frac{1}{\sqrt{1 + w^2}}$ iſt,

16.) $q = \frac{360.\pi.G}{g.t^2} \cdot \frac{3(w - Arc.\,Tg.\,w)(1 + w^2\,Cos.\,L^2)}{w^3}$, oder auch, wenn die Länge des einfachen Sekundenpendels unter der Breite L mit l bezeichnet wird, vermöge §. 259. n. 2.

17.) $q = \frac{720.G}{\pi.l.t^2} \cdot \frac{3(w - Arc.\,Tg.\,w)(1 + w^2\,Cos.\,L^2)}{w^3}$.

Aus dieſer Gleichung verbunden mit der Gleichung n. 11. erhält man mittelſt der Länge l des einfachen Sekundenpendels und der Größe G eines Meridiangrades, beyde unter der Breite L beobachtet, die Werthe von q und w.

Da $Arc.\,Tg.\,w = w - \frac{1}{3}w^3 + \frac{1}{5}w^5 - \frac{1}{7}w^7 + \&c.$ ſo iſt, wenn

man dieſe Reihe in die Gleichung n. 11. ſetzt, und beyderſeits mit $9+3w^2$ multiplicirt,

$9w+\frac{4}{5}w^5-\frac{24}{35}w^7 = 9w+2qw^3$, alſo wenn man beyderſeits $9w$ abzieht, und mit $2w^3$ dividirt,

$\frac{2}{5}w^2-\frac{12}{35}w^4+$ &c. $= q$, mithin

$w^2 = \frac{5}{2}q+\frac{75}{14}q^2+$ &c.

Es ſey $L = 45°$; ſo iſt $\overline{\text{Cos. } L}^2 = \frac{1}{2}$, und, wenn man in n. 17. obige für *Arc. Tg.* w gegebene Reihe ſetzt, und die gehörigen Reductionen macht,

$q = \frac{720.G}{\pi.l.t^2}(1-\frac{1}{10}w^2+\frac{9}{70}w^4$ &c.), oder weil w^2 nahe $= \frac{5}{2}q$ iſt,

$q = \frac{720.G}{\pi.l.t^2}(1-\frac{1}{4}q+$ &c.)

$= \frac{720.G}{\pi.l.t^2}-\frac{1}{4}\left(\frac{720.G}{\pi.l.t^2}\right)^2+$ &c.

Setzt man die freye Fallhöhe unter dem Aequator $= g'$, die Pendellänge daſelbſt $= l'$, und den Breitengrad $= G'$; ſo iſt vermöge n. 15. u. 17.

18.) $q = \frac{2Ae.\pi^2}{g'.t^2}(1-\frac{3}{5}w^2$ &c.)

$= \frac{720.G'}{\pi.l'.t^2}(1\mp\frac{2}{5}w^2-$ &c.),

und daher q ſehr nahe gleich dem Exponenten des Verhältniſſes der Schwungkraft unter dem Aequator zu der daſelbſt beobachteten Schwere $= g'$.

Vermöge der Beobachtungen iſt für eine Breite von 45°

$G = 56007{,}6$ Toiſ. (§. 143.),

$l = 0{,}5097219$ Toiſ. (§. 269.), und $t = 23$ St. $56'$ $4''{,}1$ (§. 44.). Hieraus findet ſich

$q = 0{,}00344872$; $w^2 = 0{,}00868552$; $\sqrt{1+w^2} = 1{,}00433337$ und das Verhältniß der Erdaxe zu dem Durchmeſſer des Aequators $= 230{,}767 : 231{,}767 = 229 : 229{,}99$ ſehr nahe mit Newton's übereinſtimmend (§. 347.).

Wenn q klein iſt; ſo iſt ſehr nahe $w^2 = \frac{5}{2}q$, und

$\frac{\sqrt{1+w^2}-1}{\sqrt{1+w^2}} = 1-\frac{1}{\sqrt{1+w^2}}$ nahe $= \frac{1}{2}w^2$.

Alſo iſt das Verhältniß des Ueberſchußes des Halbmeſſers des Aequators über die halbe Axe zu dem Halbmeſſer des Aequators nahe $= \frac{1}{2}w^2 : 1$, oder $= \frac{5}{4}q : 1$, d. i. die Abplattung des Sphäroids iſt ſehr nahe $= \frac{5}{4}q = \frac{15.\pi}{4t.^2d}$ (n. 13.). Man bezeichne die Abplattung eines gleichförmig dichten Sphäroids, deſſen

Umdrehungszeit t und Dichtigkeit d iſt, mit α; ſo iſt wenn man eben dieſe auf ein anderes gleichförmig dichtes Sphäroid ſich beziehende Größen mit t', d' und α' bezeichnet,

$\alpha' = \frac{15.\pi}{4t'^2.d'}$, und daher

19. $\alpha : \alpha' = t'^2.d' : t^2.d$.

Hienach wäre die Abplattung des Jupiters $=$
$\frac{1}{230}(\frac{86164''.1}{35750''})^2.0,\frac{1}{231297}$ (§. 44. 109. 304.)
$= \frac{1}{9.16}$ oder $\frac{1}{9\frac{1}{6}}$ *).

Die Beobachtungen geben $\frac{1}{14}$ (§. 109.).

Ebenſo findet man die Abplattung des Saturns unter der Vorausſetzung einer gleichförmigen Dichtigkeit $= \frac{1}{2,57}$. Dieſer Planet hat aber vermöge der Beobachtungen eine von dem elliptiſchen Sphäroid abweichende Geſtalt (§. 118.).

Die Abplattung der Sonne findet ſich mittelſt der Umdrehungszeit 25 T. 10 St. (§. 58.). und ihrer §. 304. angegebenen Dichtigkeit $= \frac{1}{379,39}$, ſo daß die ſcheinbare Größe der halben Axe der Sonne nur um 0″,026 kleiner wäre, als die ſcheinbare Größe des Halbmeſſers ihres Aequators, welches für die Beobachtungen unmerklich iſt.

§. 356. Wenn die Gleichung n. 12. des vorhergehenden §. mehrere mögliche Wurzeln hätte; ſo würden derſelben Umdrehungszeit mehrere Sphäroide entſprechen können, bey welchen das Gleichgewicht möglich wäre. Man ſetze

$y = \frac{9w + 2qw^3}{9 + 3w^2} - Arc.\ \text{Tg.}\ w$; ſo muß, wenn das Gleichgewicht ſtatt finden ſoll, vermöge der Gleichung n. 12. §. 356. $y = 0$ ſeyn. Man denke ſich eine krumme Linie, deren Abſciſſen w, und Ordinaten y ſeyen; ſo wird, weil $y = o$ für $w = o$, die krumme Linie die Axe der Abſciſſen ſchneiden, wenn $w = 0$. Von dieſem Punkt an werden die Ordinaten anfänglich poſitiv ſeyn, und bis zu einer gewißen Gränze wachſen, hierauf abnehmen, und negativ werden, ſo daß die krumme Linie die Axe der Abſciſſen zum zweytenmal ſchneiden wird. Da aber für einen groſſen Werth von w die Ordinate y wieder poſitiv wird; ſo muß die krumme Linie die Axe der Abſciſſen zum drittenmal ſchneiden. Man findet ferner, daß es nur zwey poſitive Abſciſſen giebt, welchen ein gröſter oder kleinſter Werth der Ordinate y entſprechen kann; folglich kann die krumme Linie der Axe der Abſciſſen auſſer ihrem Anfangspunkt in nicht mehr als zwey Punkten auf einerley Seite des Anfangspunkts der Abſciſſen begegnen. Und weil für gleich große poſitive und negative Abſciſſen die Ordinaten y, das Zeichen bey Seite geſetzt, einander gleich ſind; ſo

*) Prine. L. III. prop. XIX.

sind nicht mehr als zwey verschiedene Werthe des Quadrats von w möglich, welches allein in dem Ausdruck des Axenverhältnisses vorkommt. Also giebt es für eine gegebene Umdrehungszeit nicht mehr als zwey Figuren, bey welchen das Gleichgewicht bestehen kann. d'Alembert hat zuerst die Bemerkung gemacht, daß einer gegebenen Umdrehungszeit mehrere Axenverhältnisse entsprechen können *), La Place hat gezeigt, daß nicht mehr als zwey möglich seyen **). Wenn q klein ist; so ist der zweyte Werth von w sehr groß, so daß, wenn man $w = \text{Tang}\,(\frac{1}{2}\pi - x)$ setzt, x ein sehr kleiner Bogen ist. Es ist aber $w = \text{Cotg.}\,x$, $x = Arc.\,\text{Tg.}\frac{1}{w} = \frac{1}{w} - \frac{1}{3w^3} + \frac{1}{5w^5} - \text{\&c.}$ folglich $Arc.\,\text{Tg.}\,w = \frac{1}{2}\pi - x$

$= \frac{1}{2}\pi - \frac{1}{w} + \frac{1}{3w^3} - \frac{1}{5w^5} + \text{\&c.}$ welche Reihe desto schneller convergirt, je größer w ist. Setzt man diesen Ausdruck in die Gleichung n. 12. §. 355.; so erhält man durch die Umkehrung der Reihe

$$w = \frac{3\pi}{4q} - \frac{8}{\pi} + \frac{4q}{\pi}\left(1 - \frac{64}{3\pi^2}\right) + \text{\&c.}$$

$$= 2{,}356195.\frac{1}{q} - 2{,}546479 - 1{,}478885.\,q + \text{\&c.}$$

In Beziehung auf die Erde ist $q = 0{,}00344872$ (§. 355.), welcher Werth von q in den vorhergehenden Ausdruck gesetzt, giebt $w = 680{,}6572$, und $\sqrt{1+w^2} = 680{,}6579$. Demnach könnte, wenn die Erde flüßig und gleichförmig dicht wäre, das Gleichgewicht ihrer Theilchen bey der gegenwärtigen Geschwindigkeit ihrer Axendrehung auch alsdenn bestehen, wenn sich ihre Axe zu dem Durchmesser ihres Aequators verhielte, wie 1 : 680 658.

Je größer der Werth von q wird, desto näher rücken die zwey übrigen Durchschnittspunkte der krummen Linie mit der Axe der Abscissen zusammen, und die krumme Linie berührt die Axe der Abscissen nur noch in einem Punkt, wenn der Werth von q so beschaffen ist, daß für $y = 0$ die Tangente der krummen Linie mit der Axe parallel ist, mithin mit ihr zusammenfällt. Diß findet statt, wenn $q = \frac{6w^2}{(1+w^2)\sqrt{(9+w^2)}}$ ist. Wird q noch größer; so schneidet die krumme Linie die Axe der Abscissen ausser in dem Anfangspunkt derselben nicht mehr; so daß die Werthe von w in der Gleichung n. 12. §. 355. unmöglich werden. Setzt man obigen größten Werth von q in die Gleichung n. 12.; so erhält man die Gleichung

*) Opuscules Mathém. 1768.

**) Mém. de l'Acad. R. de Sc. 1782. und Méc. cél. T. II. L. III. Ch. III. n. 20.

$$Arc.\,Tg.\,w = \frac{7w^5 + 30.w^3 + 27.w}{(1+w^2)(9+w^2)(3+w^2)},$$

welcher der Werth 2,5292 von w Genüge leiſtet. Mittelſt dieſes Werths von w erhält man den correſpondirenden Werth von $q = 0{,}337007$, und $\sqrt{1+w^2}$ findet ſich $= 2{,}7197$. Das Arenverhältniß des Sphäroids iſt alſo in dieſem Fall $= 2{,}7197 : 1$. Seyen t, t' die Umdrehungszeiten zweyer gleichförmig dichten flüßigen Maſſen, d, d' ihre Dichtigkeiten, und q, q' die correſpondirenden Werthe von q; ſo verhält ſich vermöge n. 13. §. 355.

$$q : q' = t^2.d' : t'^2.d.$$

Soll nun q' dem beſtimmten Werth 0,337007 gleich werden; ſo muß ſich verhalten $q : 0{,}337007 = t^2.d' : t'^2.d$, und für einerley Dichtigkeit $q : 0{,}337007 = t^2 : t'^2$. In Beziehung auf die Erde hat man gefunden $q = 0{,}00344872$ (§. 355.); folglich iſt in Beziehung auf eine mit der Erde gleich dichte Maſſe die Umdrehungszeit, welcher der Werth 0,337007 von q entſpricht $=$ (23 St. 56′ 4″,1) $\sqrt{\frac{344872}{337007}} = 2$ St. 25′ 16″,37. Soll einer anderen Maſſe, deren Dichtigkeit $= d'$, derſelbe Werth von q entſprechen; ſo muß $t^2.d' = t'^2.d$, mithin $t : t' = \sqrt{d'} : \sqrt{d}$ ſeyn. Man hat alſo zu der Beſtimmung der Umdrehungszeit t' dieſer Maſſe, bey welcher das Gleichgewicht aufhört möglich zu ſeyn, die Gleichung $t' = (2\text{ St. }25'\,16'',37)\sqrt{\frac{d}{d'}}$.

Hieraus folgt, daß das Gleichgewicht einer homogenen flüßigen Maſſe, deren Dichtigkeit der mittleren Dichtigkeit der Erde gleich iſt, nicht mit einer elliptiſchen Figur beſtehen kann, wenn ihre Umdrehungszeit kleiner als 2 St. 25′ 16″,37 iſt. Iſt dieſe Umdrehungszeit größer; ſo giebt es immer zwey, aber nicht mehrere elliptiſche Figuren, bey welchen das Gleichgewicht beſtehen kann. Iſt die Dichtigkeit des Fluidums von der mittleren Dichtigkeit der Erde verſchieden; ſo findet man die Umdrehungszeit, bey welcher das Gleichgewicht aufhört, mit einem elliptiſchen Sphäroid beſtehen zu können, wenn man 2 St. 25′ 16″,37 mit der Quadratwurzel aus dem Exponenten des Verhältniſſes der Dichtigkeit der Erde zu der Dichtigkeit des Fluidums multiplicirt. In Beziehung auf die Sonne iſt dieſe Umdrehungszeit $=$ 4 St. 48′ 16″, für den Jupiter $=$ 5 St. 2′ 4″, für den Saturn $=$ 7 St. 22′ 12″. Da ſich dieſe Körper langſamer um ihre Axen drehen; ſo iſt das Gleichgewicht möglich.

Uebrigens iſt die Gränze von q nicht diejenige, bey welcher das Fluidum wegen einer zu geſchwinden Axendrehung anfangen würde, ſich zu zerſtreuen. Weil nemlich die Schwere an dem Pol zu der um die Schwungkraft verminderten Gravitation unter dem Aequator, d. i. zur Schwere unter dem Aequator ſich verhält, wie der Halbmeſſer des Aequators zu der halben Axe (§. 353.), welches Verhältniß in dieſem Fall dem von 2,7197 : 1 gleich iſt;

ſo iſt noch immer ein Ueberſchuß der Gravitation unter dem Aequator über die Schwungkraft da, und die unter dem Aequator liegenden Theilchen können ſich nicht zerſtreuen. Aber das Gleichgewicht hört bey einer geſchwinderen Axendrehung auf, und es iſt nicht mehr möglich, der flüßigen Maſſe die Geſtalt eines elliptiſchen Sphäroids zu geben, ſo daß die aus der Attraction des Sphäroids und aus der Schwungkraft zuſammengeſetzte Kraft auf der Oberfläche des Sphäroids ſenkrecht wird. Bey einer geſchwinderen Axendrehung als diejenige iſt, welche das Gleichgewicht noch möglich macht, wird ſich die flüßige Maſſe unter den Polen noch mehr abplatten, und unter dem Aequator ſich erhöhen. Die unter dem Aequator liegende Theilchen werden jetzt mit ihrer vorigen Geſchwindigkeit größere Kreiſe beſchreiben, und dazu eine längere Zeit als vorher gebrauchen. Die Dauer der Umdrehungszeit wird alſo größer werden, und nach vielen Oſcillationen wird die flüßige Maſſe wegen ihrer Zähigkeit ins Gleichgewicht kommen, und diejenige Geſtalt annehmen, bey welcher vermöge der größeren Umlaufszeit die Bedingung des Gleichgewichts eines elliptiſchen Sphäroids erfüllt werden kann *).

§. 357. Die Abplattung der Erde $\frac{1}{230}$, oder genauer $\frac{1}{231,7}$ (§. 355), welche ſich aus der Vorausſetzung einer gleichförmigen Dichtigkeit der Erde ergiebt, ſtimmt aber weder mit den Gradmeßungen, noch mit den beobachteten Pendellängen überein. Vermöge der erſteren ſcheint die Abplattung der Erde nahe $\frac{1}{304}$ zu ſeyn (§. 140.). Aus den letzteren folgt die Abplattung $= \frac{1}{183,07}$, denn es muß ſich, wenn die Erde ein gleichförmig dichtes elliptiſches Sphäroid iſt, der Halbmeſſer des Aequators zu der halben Erdaxe verhalten, wie die Schwere unter dem Pol zu der Schwere unter dem Aequator (§. 353.), oder wie die Länge des einfachen Sekundenpendels unter dem Pol zu der Pendellänge unter dem Aequator (§. 259. u. 4.) $= 0,508341 + 0,0027618 : 0,508341$ (§. 269) $= 185,06 : 184,06$. Und umgekehrt, wenn die Erde gleichförmig dicht wäre; ſo müßte ſich die Pendellänge unter dem Pol zu der Pendellänge unter dem Aequator verhalten, wie $231,7 : 230,7$. Die Vorausſetzung einer gleichförmigen Dichtigkeit der Erde giebt alſo ihre Abplattung zu groß, und die Zunahme der Schwere von dem Aequator an gegen die Pole hin zu klein.

*) Méc. cél. T. III. L. III. Ch. III. n. 21. pag. 59.

Es ist aber leicht einzusehen, daß, wenn die Dichtigkeit der Erde von ihrem Mittelpunkt an gegen ihre Oberfläche beständig abnimmt, die Schwere von dem Aequator an gegen die Pole stärker zunehmen müsse, als in dem Fall einer gleichförmigen Dichtigkeit. Wenn nemlich einem gleichförmig dichten abgeplatteten Sphäroid neue Materie an seinem Mittelpunkt hinzugefügt, oder seine Dichtigkeit in der Nähe des Mittelpunkts vergrößert wird; so wird die Attraction dieser neuen Materie die Schwere an dem Pol um mehr vergrößern, als unter dem Aequator, weil ein an dem Umfang des Aequators liegendes Theilchen in demselben Verhältniß schwächer angezogen wird, als ein an den Polen befindliches, in welchem das Quadrat der halben Axe kleiner ist, als das Quadrat des Halbmessers des Aequators. Die Abplattung des Sphäroids hingegen wird durch die neue hinzugekommene Materie vermindert werden. Man denke sich zwey von dem Mittelpunkt des Sphäroids ausgehende Säulen eines Fluidums, deren eine in der Richtung der Axe, die andere in der Ebene des Aequators liege, und welche mit einander in dem gleichförmig dichten Sphäroid das Gleichgewicht hielten. Von der letzteren sey von dem Mittelpunkt an ein Stück abgeschnitten, welches der an den Pol gehenden Säule gleich sey; so würde, wenn die Attraction der hinzugekommenen Materie sich nur auf die an den Pol gehende Säule und auf das abgeschnittene Stück der an den Aequator gehenden sich erstrekte, das Gleichgewicht der Säulen nicht gestört werden. Nun wirkt aber die neue Materie auch auf den Rest der letzteren; folglich muß sich diese verkürzen, um mit der an den Pol gehenden Säule das Gleichgewicht halten zu können. Zugleich wird wegen dieser Verminderung des Halbmessers des Aequators die Schwungkraft kleiner, und das Sphäroid wird sich mehr einer Kugel nähern, als wenn es gleichförmig dicht gewesen wäre. Umgekehrt verhält es sich, wenn die Dichtigkeit von dem Mittelpunkt an gegen die Oberfläche hin wächst.

Je dichter nun das Sphäroid an seinem Mittelpunkt ist, desto weniger weichen die Richtungen der Gravitation gegen das ruhende Sphäroid von den Richtungen seiner Halbmes-

ſer ab. Man nehme mit Huygens (§. 347.) an, die Gravitation ſey conſtant, und gegen den Mittelpunkt gerichtet; ſo würden zwey gleich lange Säulen eines Fluidums, deren eine von dem Pol, die andere von dem Aequator an Mittelpunkt des Sphäroids ſich erſtreckte, mit einander im Gleichgewicht ſeyn, wenn nicht der Druck der letzteren durch die Schwungkraft vermindert würde. Die von dieſer Kraft herrührende Verminderung iſt den Abſtänden der Theilchen des Fluidums von dem Mittelpunkt proportional (§. 273. n. 2.), und daher iſt die ganze von der Schwungkraft herrührende Verminderung der Schwere der Säule die Hälfte von derjenigen, welche ſie mit ihrer dem Umfang des Aequators entſprechenden Stärke hervorbringen würde (S. Bew. von n. 2. §. 352.); folglich muß, wenn die Schwungkraft unter dem Aequator zu der Gravitation unter dem Aequator gegen das ruhende Sphäroid ſich verhält, wie $f : 1$, die Länge der an den Pol gehenden Säule zu der Länge der in der Ebene des Aequators liegenden ſich verhalten wie $1 - \frac{1}{2}f : 1$, wenn das Gleichgewicht ſtatt finden ſoll. Für die Erde iſt f nahe $= \frac{1}{289}$; folglich iſt das Verhältniß der Länge der Säulen, oder der halben Erdaxe zu dem Halbmeſſer des Aequators $= 1 - \frac{1}{578} : 1 = 577 : 578$, wie Huygens gefunden hat. Man behalte die Richtung der Gravitation gegen den Mittelpunkt bey, laſſe aber ihre Größe nach dem Newtoniſchen Geſetz der Attraction ſich verändern; ſo wird die Abplattung größer werden müſſen, als unter der Vorausſetzung einer conſtanten Schwere. Denn an dem Ende der in der Ebene des Aequators liegenden Säule iſt die Gravitation in dem Verhältniß von $(1 - \frac{1}{578})^2 : 1$, oder von $1 - \frac{1}{289} : 1$ (allgemein von $1 - f : 1$) kleiner, als unter dem Pol, und daher der Druck des Ueberſchußes der an den Aequator gehenden Säule über die an den Pol gehenden kleiner, als wenn die Gravitation conſtant wäre, weswegen die erſtere Säule ſich noch ein wenig verlängern muß, um mit der letzteren das Gleichgewicht halten zu können. Da aber der Unterſchied der Säulen ebenfalls ſehr gering iſt; ſo wird dadurch das Axenverhältniß nicht merklich geändert. Hingegen hat dieſe Verminderung der Gravitation einen merklichen Einfluß auf die

die Verminderung der Schwere unter dem Aequator. Sie beträgt, wie man oben gesehen hat $\frac{1}{289}$ derselben. Hiezu kommt noch die Verminderung durch die Schwungkraft, welche ebenfalls $\frac{1}{289}$ der Schwere ausmacht. Folglich ist die ganze Verminderung der Schwere von den Polen an gegen den Aequator $\frac{1}{289}$ oder $\frac{1}{144,5}$ der Schwere unter den Polen oder $\frac{1}{144,5}$ der Schwere unter dem Aequator. Vermöge der Beobachtungen ist aber die Abplattung der Erde größer, als $\frac{1}{578}$, und die Zunahme der Schwere von dem Aequator bis an die Pole kleiner als $\frac{1}{144}$; also zeigen die Gradmessungen und die Pendellängen mit einander übereinstimmend, daß die Gravitation nicht gegen einen einzigen Punkt der Erde gerichtet, sondern aus den Attractionen aller Theilchen derselben zusammengesetzt ist.

Demnach kann man die Gränzen angeben, zwischen welchen die Abplattung der Erde muß enthalten seyn. Ihre Abplattung muß nemlich größer seyn $\frac{1}{578}$, oder als diejenige, welche sie haben würde, wenn ihre ganze Masse in ihrem Mittelpunkt vereinigt wäre, aber kleiner als $\frac{1}{231,7}$, welche einer gleichförmigen Dichtigkeit entspricht. Im Allgemeinen ist, wenn die Abweichung von der Kugelgestalt gering ist, und die Dichtigkeit von der Oberfläche bis an den Mittelpunkt wächst, die Abplattung kleiner als $\frac{5}{4}$ der Exponenten des Verhältnisses der Schwungkraft unter dem Aequator zu der unter dem Aequator beobachteten Schwere, aber größer als die Hälfte dieses Exponenten. Zwischen der Abplattung und der Zunahme der Schwere von dem Aequator bis an die Pole, findet folgende merkwürdige von Clairaut *) zuerst gefundene Beziehung statt: wenn man die Pendellänge unter dem Pol $= 1$ setzt; so machen die Zunahme der Pendellänge von dem Aequator bis an die Pole und die Abplattung eine constante Summe, nemlich $\frac{5}{2}$ des Exponenten des Verhältnisses der Schwungkraft unter dem Aequator zu der eben daselbst beobachteten Schwere. Man setze die Länge des einfachen Sekundenpendels unter den Polen $= l$, unter dem Aequator $= l'$, die Abplattung $= \alpha$, und das Verhältniß der Schwungkraft unter dem Aequator zu

*) Théorie de la Figure de la Terre, par Clairaut. pag. 149.

der unter dem Aequator beobachteten Schwere $= f' : 1$; so ist nach Clairaut's Theorem $\frac{l-l'}{l} + \alpha = \frac{5}{4}f'$. La Place findet $\frac{l-l'}{l'} + \alpha = \frac{5}{2}f$ *). Genauer ist, wenn man die Pendellänge unter der Breite, deren Quadrat des Sinus $= \frac{1}{3}$ ist, mit l'' bezeichnet, $\frac{l-l''}{l''} + \alpha = \frac{5}{2}f'$. Die Unterschiede dieser Ausdrücke sind aber, wenn α klein ist, nicht beträchtlich.

In Beziehung auf die Erde findet man nach §. 273. n. 2. u. 3. mittelst ihrer Umdrehungszeit (§. 44.) des Halbmessers ihres Aequators (§. 143.), und der freyen Fallhöhe unter dem Aequator, $f = \frac{1}{288,387}$, mithin $\frac{5}{2}f' = \frac{1}{115,355}$. Ferner ist nach der §. 269. gegebenen Formel $\frac{l-l'}{l} = \frac{1}{185,06}$; folglich $\alpha = \frac{1}{115,355} - \frac{1}{185,06} = \frac{1}{306,2}$. Und weil $\frac{l-l'}{l'} = \frac{1}{184,06}$; so wird nach dem von La Place gegebenen Ausdruck $\alpha = \frac{1}{309}$ **). Die Gradmessungen geben $\frac{1}{304}$ (§. 140.), die zwey von der Abplattung der Erde abhängende Ungleichheiten des Monds geben $\frac{1}{305,05}$ und $\frac{1}{304,6}$ (§. 328.), mit welchen Abplattungen die aus den Pendellängen nach Clairaut's Theorem berechnete sehr gut übereinstimmt.

Sey der Halbmesser des Aequators des Jupiters $= 1$, die Zeit seiner Axendrehung $= t'$, der Abstand eines seiner Trabanten von seinem Mittelpunkt $= r$, und die siderische Umlaufszeit dieses Trabanten $= t$; so ist die Gravitation gegen den Jupiter in der Distanz r von seinem Mittelpunkt $= \frac{4r.\pi^2}{t^2}$ (§. 273. n. 2.), und in der Distanz 1, oder an dem Aequator des Jupiters $= \frac{4r^3.\pi^2}{t^2}$. Ferner ist die Schwungkraft unter seinem Aequator $= \frac{4\pi^2}{t'^2}$; folglich ist der Exponent des Verhältnisses dieser Kraft zu der Gravitation an dem Aequator des Jupiters $= \frac{t^2}{r^3.t'^2}$, welcher mittelst der §. 104. angegebenen siderischen Umlaufszeit des vierten Tra-

*) Méc. cél. T. II. Ch. IV. n. 34. pag. 102.

**) La Place findet $\frac{1}{335,78}$ (Méc. cél. T. II. pag. 150.). Der Unterschied kommt grösstentheils von dem in der Note pag. 252. bemerkten Rechnungsfehler her.

banten, ſeines Abſtands von dem Jupiter (§. 110.), und der Umdrehungszeit des Jupiters (§. 109.) = $\frac{1}{10\frac{1}{763}}$ gefunden wird. Daher verhält ſich die Schwungkraft unter dem Aequator des Jupiters zu der Gravitation unter ſeinem Aequator = 1 : 10,705, und zu der um die Schwungkraft verminderten Gravitation, oder zur Schwere unter dem Aequator, wie 1 : 9,765. Mithin fällt die Abplattung des Jupiters zwiſchen $\frac{5}{8} \cdot \frac{1}{9,765}$ und $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{9,765}$, oder zwiſchen $\frac{5}{39}$ und $\frac{1}{19,5}$. Vermöge der Beobachtungen iſt dieſe Abplattung = $\frac{1}{14}$ (§. 109.), womit die von La Place aus den Bewegungen der Jupitersſatrabanten gefundene ſehr nahe übereinſtimmt (§. 345.). Die beobachtete Abplattung fällt alſo zwiſchen die angegebenen Gränzen, und zeigt, daß die Dichtigkeit des Jupiters ebenfalls von ſeinem Mittelpunkt an gegen die Oberfläche abnimmt.

Die Abplattung, welche der Jupiter im Fall einer gleichförmigen Dichtigkeit haben müßte, und welche hier = $\frac{5}{39}$ oder = $\frac{1}{7,8}$ gefunden worden iſt, weicht merklich unter eben dieſer Vorausſetzung in dem 355 §. berechneten ab. Der Unterſchied rührt von den Näherungsformeln her, welcher wegen der großen Abplattung des Jupiters ſehr merklich wird. Man kann dieſe Abplattung unter der Vorausſetzung einer gleichförmigen Dichtigkeit genauer auf folgende Art finden. Wenn in der Gleichung n. 13. §. 355. Die Größen q, t und d ſich auf die Erde beziehen, und die auf den Jupiter ſich beziehende mit q', t' und d' bezeichnet werden; ſo hat man $q = \frac{3\pi}{t^2 d}$; $q' = \frac{3\pi}{t'^2 d'}$, und daher $q' = \left(\frac{t}{t'}\right)^2 \cdot \frac{d}{d'} q$. Mittelſt des §. 355. gefundenen Werths von q, der Umdrehungszeit t' des Jupiters, und des Verhältniſſes ſeiner Dichtigkeit zur Dichtigkeit der Erde (§. 304.), findet man $q' = 0{,}0866141$, und, wenn man dieſen Werth in die Gleichung n. 12. §. 355. ſetzt, $w^2 = 0{,}2663$. Hieraus erhält man $\sqrt{1+w^2} = 1{,}1253$, und das Axenverhältniß des Jupiters = 1 : 1,1253, nahe = 8 : 9, die Abplattung = $\frac{1}{9}$.

§. 358. Der Ring des Saturns beſteht, wie man §. 113. u. f. geſehen hat, aus zwey oder mehreren concentriſchen Ringen von einer in Vergleichung mit ihrer Breite ſehr geringen Dicke, deren Ebene in der erweiterten Ebene des

des Aequators des Saturns liegt. Es iſt nicht wahrſcheinlich, daß dieſe Ringe ſich allein durch den Zuſammenhang ihrer Theilchen erhalten, denn ſonſt würden die dem Planeten zunächſt liegende Theilchen vermöge der ſich ſtets erneuernden Wirkung der Schwere ſich in der Länge der Zeit losgeriſſen haben, und die Ringe würden nach und nach zerſtört worden ſeyn, ſo wie alle Werke der Natur, welche den Einwirkungen fremder Urſachen nicht Kräfte genug entgegengeſetzt haben. Dieſe Ringe erhalten ſich alſo ohne Zwang, und allein nach den Geſetzen des Gleichgewichts. Hiezu wird aber erfordert, daß ſie ſich um eine durch den Mittelpunkt des Saturns gehende auf ihrer Ebene ſenkrechte Axe drehen, ſo daß die durch dieſe Axendrehung entſtehende Schwungkraft mit ihrer Schwere gegen den Planeten das Gleichgewicht hält.

Um die Geſtalt dieſer Ringe zu beſtimmen, bey welcher das Gleichgewicht vermöge der gegenſeitigen Attraction ihrer Theilchen, ihrer Schwere gegen den Saturn, und ihrer Schwungkraft beſtehen kann, nimmt ſie La Place als flüßig, oder mit einer ſehr dünnen Schichte eines Fluidums bedeckt an, und ſucht die Bedingungen des Gleichgewichts dieſes Fluidums. Er findet, daß dieſes Gleichgewicht möglich iſt, wenn jeder Schnitt eines der Ringe mit einer durch ihre Axe gelegten Ebene eine ſehr ſchmale Ellipſe iſt, deren große Axe gegen den Mittelpunkt des Planeten gekehrt iſt, und die Ringe eine in Vergleichung mit ihrem Abſtand von dem Mittelpunkt des Saturns nicht ſehr beträchtliche Breite haben. Jeder der Ringe wird alſo beſchrieben, wenn eine ſehr ſchmale Ellipſe ſich um eine in ihrer Ebene und auſſerhalb der Ellipſe liegende auf der Verlängerung ihrer großen Axe ſenkrechte Axe dreht, wobey der Mittelpunkt der beſchreibenden Ellipſe einen mit dem Mittelpunkt des Saturns concentriſchen Kreis beſchreibt. Das Gleichgewicht iſt auch alsdenn noch möglich, wenn die beſchreibende Ellipſe, während ſie den ganzen Umfang durchlauft ihre Größe und Lage verändert, und ihr Mittelpunkt ſtatt eines Kreiſes eine Linie von doppelter Krümmung beſchreibt, wenn nur dieſe Veränderungen erſt in einer Diſtanz eines in der Ebene der be-

schreibenden Ellipse liegenden Punkts von der Umdrehungsaxe merklich werden, welche beträchtlich größer ist, als der durch diesen Punkt gehende Durchmesser der beschreibenden Ellipse. Ein in allen seinen Theilen vollkommen ähnlicher Ring würde seine Lage nicht beybehalten können, wenn die geringste Kraft, z. B. die Attraction eines Trabanten auf ihn wirkte, und er würde zuletzt auf den Planeten fallen müßen *). Die verschiedenen Ringe, welche den Saturn umgeben, sind folglich irreguläre Körper, welche an den verschiedenen Punkten ihres Umfangs eine ungleiche Breite haben, so daß ihre Schwerpunkte nicht mit den Mittelpunkten ihrer Figur zusammenfallen. Diese Schwerpunkte können als ebenso viele um den Mittelpunkt des Saturns umlaufende Trabanten betrachtet werden, deren Abstände von der Ungleichheit der Theile eines jeden Rings abhängen, und deren Umlaufszeiten denen der Ringe beziehungsweise gleich sind.

Daraus, daß die Schwungkraft mit der Schwere gegen den Saturn das Gleichgewicht halten muß, folgt, daß die Umlaufszeit eines jeden der Ringe einerley ist mit der Umlaufszeit eines Trabanten, dessen Abstand von dem Mittelpunkt des Saturns dem Abstand des Mittelpunkts der beschreibenden Ellipse von dem Saturn gleich ist. Hienach wäre die Umdrehungszeit des innern Rings = 10 St. 33', welche La Place nach der Theorie gefunden hatte, ehe Herschels Entdeckung der Umdrehungszeit des Rings bekannt geworden war, und mit den Beobachtungen nahe übereinstimmt (§. 118.).

Die zur Erhaltung der unveränderlichen Lage der Ringe erforderliche Irregularität ihrer Gestalt wird durch die Beobachtungen angezeigt (§. 118.), und sie dient, wie ebendaselbst bemerkt worden ist, zur Erklärung der von Schröter beobachteten scheinbaren Nicht-Rotation des Rings. La Place hat indessen eine auf eben diese irreguläre Gestalt der Ringe gegründete Erklärung des scheinbaren Wider-

*) Méc. cél. T. II. L. III. Chap. VI. n. 46. pag. 163.

ſpruchs zwiſchen Herſchels und Schröters Beobachtungen bekannt gemacht *).

§. 359. Es ſind noch diejenigen Veränderungen zu betrachten übrig, welche die gegenſeitige Attraction der Himmelskörper in der Lage der Umdrehungsaxen derjenigen Körper hervorbringt, welche eine unter den Polen zuſammengedrückte Geſtalt haben. Die Beobachtungen zeigen eine Veränderung der Lage der Erdaxe, aus welcher die unter dem Namen der Präceßion und Nutation bekannte ſcheinbare Bewegung der Fixſterne, und eine periodiſche Veränderung der Schiefe der Ekliptik entſtehen (§. 150. 160). Wir wollen ſehen, ob die aus den Beobachtungen abgeleitete Geſetze dieſer Veränderungen mit der Theorie der allgemeinen Schwere übereinſtimmen.

Sey $APBP'$ (Fig. 144.) ein Schnitt der Erde mit einer durch ihre Axe PP' und den Mittelpunkt S der Sonne oder des Monds gelegten Ebene. Um die Axe PP' der Erde als Durchmeſſer ſey eine Kugel $aPbP'$ beſchrieben; ſo wird rund um dieſe Kugel herum ein Körper übrig bleiben, welcher beſchrieben wird, wenn die mondförmige Figur $APaP'A$ ſich um die Axe PP' dreht. Man ziehe CS und die JJ' auf CS ſenkrecht; ſo wird die gerade Linie JJ' ſowohl den elliptiſchen Durchſchnitt der Erde als auch den kreisförmigen Durchſchnitt der in ſie beſchriebenen Kugel in zwey gleiche Theile theilen. Die mittlere Richtung der Attraction, welche die Sonne oder der Mond S auf jene Kugel ausüben, geht durch den Mittelpunkt C der Erde, und es kann dadurch keine Drehung der Erdaxe um den Punkt C entſtehen. Aber die mit dem Punkt S auf einerley Seite der geraden Linie JJ' liegenden Theilchen des die Kugel ab umgebenden Körpers werden von S ſtärker angezogen, als die auf der anderen Seite, z. B. in Bb liegende Theilchen, ſo daß der Theil A der Erde gegen die Sonne hin ſchwerer ſeyn wird, als der entferntere Theil B. Was hier von einem Durchſchnitt der Erde gezeigt worden iſt, kann auf die ganze Erde angewendet werden. Die mittlere Richtung al-

*) Connaiss. des tems pour 1811. Monatl. Corresp. May. 1810. pag. 432.

ler Attractionen wird in die durch die Erdaxe und den Mittelpunkt der Sonne oder des Monds gelegten Ebene fallen, weil diese Ebene die Erde in zwey gleiche, ähnliche und in Beziehung auf die Sonne symmetrisch liegende Theile theilt. Wenn also der Mittelpunkt C der Erde unterstützt wäre, und sie keine Axendrehung hätte; so würde sie wie ein zusammengesetztes Pendel in der durch ihre Axe und den Mittelpunkt der Sonne oder des Monds gelegten Ebene hin und her schwingen. Den Mittelpunkt der Erde können wir in so fern als unterstützt betrachten, als dieser Punkt, in welchem man sich die Masse der Erde vereinigt denken kann, um die Sonne sich bewegt, und die durch diese Bewegung entstehende Schwungkraft mit der nach der Sonne gerichteten Centripetalkraft nahe das Gleichgewicht hält, so daß wegen des Ueberschußes einer dieser Kräfte über die andere blos eine Veränderung des Abstands der Erde von der Sonne, nicht aber eine Bewegung der Erdaxe um den Schwerpunkt C der Erde hervorgebracht wird.

Wir wollen zuerst die von der Attraction der Sonne herrührende Veränderung der Lage der Erdaxe betrachten. Es sey OVV' (Fig. 145.) die Ebene der Ekliptik, CS die in ihrer Ebene liegende aus dem Mittelpunkt C der Erde nach dem Mittelpunkt der Sonne gezogene gerade Linie, $AVMB$ die Ebene des Erdäquators, welcher die Ebene der Ekliptik in der geraden Linie VV' schneide. Man lege durch CS die Ebene SCM auf die Ebene des Aequators senkrecht; so mißt der in dieser Ebene mit dem Halbmesser CS oder CM beschriebene Kreisbogen MS die Abweichung der Sonne, der Bogen VS ihre Länge, und der Bogen VM ihre gerade Aufsteigung (§. 29. 36.). Vermöge der Attraction der Sonne würde, wie man so eben gesehen hat, der Punkt M des Erdäquators in der Ebene MS oscilliren, wenn die Erde keine Axendrehung hätte. Man ziehe an den Punkt M des Bogens MS eine Tangente MT, und nehme auf ihr die MT der Geschwindigkeit gleich, welche die Sonne dem Punkt M vermöge jener Oscillationsbewegung, welche sie hervorzubringen strebt, in einer gewißen zur Einheit angenommenen Zeit mittheilen würde. Durch T sey in der

Ebene *SCM* die Parallele *TQ* mit *CS* gezogen, und das Parallelogramm *TQMF* vollendet; ſo würden die zwey Kräfte *MQ* und *MF* dieſelbe Wirkung hervorbringen, welche die Kraft *MT* hervorzubringen ſtrebt, und weil der Winkel *MFT* des bey *M* rechtwinklichten Dreyecks *TMF* dem Winkel *SCM* oder der Abweichung der Sonne gleich iſt; ſo iſt das Verhältniß von *TM* : *MF*, mithin die Kraft *MF* gegeben, wenn man die Geſchwindigkeit *MT* der Oſcillationsbewegung kennt, welche die Sonne in einer gegebenen Zeit erzeugen würde. In der Ebene des in der Figur als ſpitz angenommenen Winkels *VCM* ſey *MN* auf *CM* in *M* ſenkrecht, oder eine Tangente an den Punkt *M* des Aequators gezogen, welche der Verlängerung von *CV* in *N* begegne, und auf welcher nach der Richtung der täglichen Bewegung der Erde die *Mt* der Geſchwindigkeit gleich genommen ſey, welche ein Punkt ihres Aequators vermöge dieſer Bewegung hat. Sey, wie in §. 313. *Mf* die Geſchwindigkeit, welche die Kraft *MF* in dem Zeittheilchen *z* erzeugen würde, alſo *MF* : *Mf* = 1 : *z*. Man vollende das Parallelogramm *Mfkt*, und ziehe durch *N* die Parallele *Nn* mit *MF*, welche verlängerten Diagonale *kM* in *n* begegne. Da ſo wohl *Nn* als *CS* mit der geraden Linie *MF* parallel ſind; ſo ſind *Nn* und *CS* parallel (XI, 9.), und beyde liegen in einer Ebene, nemlich in der Ebene der Ekliptik. In dieſer Ebene ſey auf der *CN* in dem Punkt *N* ein Perpendickel *Nh* errichtet, welches der *Cn* in *h* begegne. Endlich ziehe man in der Ebene der Ekliptik die *SR*, und in der Ebene des Aequators die *MH* auf *CV* ſenkrecht; ſo verhält ſich

$$\left.\begin{matrix} Mf \\ z.FM \end{matrix}\right\} : Mt = Nn : MN,$$

$$HM : CM = MN : CN,$$

$$SR : \left\{\begin{matrix} CS \\ CM \end{matrix}\right\} = Nh : Nn;$$

---

alſo $z.FM.\ HM.\ SR : \overline{CM}^2.\ Mt = Nh : CN$

$= uz : 1$, wenn man, wie in §. 313., die Winkelgeſchwindigkeit, mit welcher die Durchſchnittslinie *VV'* des Aequators und der Ekliptik ſich rükwärts bewegt, mit *u* bezeichnet. Folglich iſt die Winkel-

geschwindigkeit, mit welcher sich im Fall der Figur der Punkt V der Frühlingsnachtgleiche rükwarts bewegt

$$n = \frac{FM}{Mt} \cdot \frac{HM}{CM} \cdot \frac{3R}{CM}.$$

Diese Geschwindigkeit ist veränderlich, und besteht, wie hernach gezeigt werden soll, aus einem constanten und beständig positiven, und aus einem veränderlichen bald positiv, bald negativ werdenden von der Länge der Sonne abhängenden Theil. Der erste bringt eine beständig retrograde gleichförmige Bewegung der Aequinoktialpunkte hervor, und von dem zweyten hängt eine periodische Ungleichheit dieser Bewegung ab.

§. 360. Die Kraft, mit welcher die Sonne S (Fig. 144.) die Theilchen des Erdsphäroids anzieht, kann in dem Mittelpunkt der Sonne vereinigt angenommen werden (§. 290.). Die mittlere Richtung aller dieser Attractionen fällt in die durch die Erdaxe und den Mittelpunkt der Sonne gelegte Ebene. In dieser Ebene seyen Sp auf die Erdaxe und Sq auf die Ebene des Aequators senkrecht gezogen; so sind die Kräfte, mit welchen die Sonne das ganze Sphäroid nach den Richtungen Sp, Sq anzieht, den Kräften gleich, mit welchen S von eben diesem Sphäroid nach den Richtungen Sp, Sq angezogen wird. Man beschreibe in der durch die Erdaxe und den angezogenen Punkt S gelegten Ebene eine Ellipse, welche durch den Punkt S gehe, und mit dem correspondirenden elliptischen Meridian der Erde einerley Brennpunkte habe, und durch die Umdrehung dieser Ellipse um ihre auf die Erdaxe fallende kleine Axe werde ein mit der Erde gleich dichtes Sphäroid erzeugt; so werden sich die Gravitationen von S gegen dieses neue Sphäroid nach den Richtungen Sp und Sq zu den Gravitationen von S gegen das innere oder Erdsphäroid nach eben diesen Richtungen genommen verhalten, wie die Masse des ersten Sphäroids zu der Masse des zweyten. Den Beweis dieses Satzes, welcher auf die §. 350. angezeigte Art geführt werden kann findet man in Treat. of Flux. n. 349.; 350; 351., und in der Méc. cél. T. II. pag. 22. Es verhalte sich der halbe Abstand der Brennpunkte des äusseren Sphäroids zu seiner halben Axe $= x : 1$; so verhält sich die Gravitation an dem Aequator dieses Sphäroids zu der Gravitation an seinen Pol $= (1 + x^2)$ *Arc.* Tg. $x - x$: $2(x - \textit{Arc.}\,\text{Tg.}\,x)\sqrt{1+x^2}$ (§. 355. n. 8.). Man setze die halbe Axe des äusseren Sphäroids $= B$, also den Halbmesser seines Aequators $= B\sqrt{1+x^2}$, die Distanz $CS = r$, und den Winkel ACS,

oder die Abweichung des Punkts $S = d$; ſo iſt $Sq = r \operatorname{Sin.} d$; $Sp = r \operatorname{Cos.} d$, und es verhält ſich die Gravitation von S gegen das äuſſere Sphäroid nach der Richtung Sp zu der Gravitation von S gegen eben dieſes Sphäroid nach der Richtung Sq

$$= ((1+x^2)\,Arc.\,\operatorname{Tg.} x - x)\,\frac{r\operatorname{Cos.} d}{B\sqrt{1+x^2}} : 2(x - Arc.\,\operatorname{Tg.} x)\,\frac{r\operatorname{Sin.} d}{B}\sqrt{1+x^2}$$

(§. 350.).

Aber dieſe Gravitationen verhalten ſich zu den correſpondirenden Gravitationen gegen das innere Sphäroid, wie die Maſſe des äuſſeren zu der Maſſe des inneren; folglich verhält ſich auch die Gravitation von S gegen das innere Sphäroid nach der Richtung Sp zur Gravitation von S gegen dieſes Sphäroid nach der Richtung $Sq = ((1+x^2)\,Arc.\operatorname{Tg.} x - x)\,r\operatorname{Cos.} d : 2(x - Arc.\operatorname{Tg.} x)\,r(1+x^2)\operatorname{Sin.} d$. Man nehme auf den geraden Linien Sq und Sp die Sq' und Sp' dieſen Kräften proportional, vollende das Parallelogramm $Sp'sq'$, und ziehe ſeine Diagonale Ss, deren Verlängerung die auf CS ſenkrechte gerade Linie JJ' in K ſchneide; ſo iſt SK die Richtung, nach welcher der Punkt S von dem ganzen Erdſphäroid angezogen wird, und es verhält ſich

$Sp' : p's = 1 : \operatorname{Tg.} pSs$. Folglich iſt

$$\operatorname{Tg.} pSs = \frac{p's}{Sp'} = \frac{2(x - Arc.\,\operatorname{Tg.} x)(1+x^2)}{(1+x^2)\,Arc.\,\operatorname{Tg.} x - x}\operatorname{Tg.} d,$$

und wenn man den von x abhängenden Factor in eine Reihe entwickelt,

$$\operatorname{Tg.} pSs = \frac{1+6\left(\frac{1}{3\cdot 5}x^2 - \frac{1}{5\cdot 7}\cdot x^4 + .\right)}{1-5\left(\frac{1}{3\cdot 5}x^2 - \frac{1}{5\cdot 7}x^4 + ..\right)}\operatorname{Tg.} d$$

$$= (1+\tfrac{3}{5}x^2 + \&c.)\operatorname{Tg.} d,$$

wo man wegen der Kleinheit von x die höheren Potenzen von x vernachläßigen kann. Demnach iſt der Winkel pSs gröſſer als der Winkel d, oder gröſſer als $\left\{\begin{matrix} qCS \\ pSC \end{matrix}\right\}$, ſo daß die Richtung der mittleren Kraft Ss die JJ' unterhalb C in K ſchneidet. Es folgt aber allgemein aus der Gleichung $\operatorname{Tg.} a = (1+m)\operatorname{Tg.} b$, $\operatorname{Sin.}(a-b) = m \operatorname{Sin.} b \operatorname{Cos.} a$, und, wenn m ein kleiner Bruch iſt, ſehr nahe $a - b = m \operatorname{Sin.} b \operatorname{Cos.} a$, oder $= m \operatorname{Sin.} b \operatorname{Cos.} b$; folglich iſt ſehr nahe, der Winkel $CSK = \frac{3}{5}x^2 \operatorname{Sin.} d \operatorname{Cos.} d$.

Es ſchneide SK die groſſe Axe AB in G; ſo verhält ſich

$$\left\{\begin{matrix} CS \\ r \end{matrix}\right\} : CG = \operatorname{Sin.} CGS : \operatorname{Sin.} CSG,$$

$$\text{nahe} = \operatorname{Sin.} qCS : CSG,$$

$$= \operatorname{Sin.} d : \tfrac{3}{5}x^2 \operatorname{Sin.} d \operatorname{Cos.} d$$

Alſo iſt $CG = \frac{3}{5}.r.x^2 \operatorname{Cos.} d$.

Man ſetze die halbe Axe $= b$, und das Verhältniß des halben Abſtands der Brennpunkte eines Erdmeridians zu der hal-

ben Erdaxe $= w : 1$; so ist der halbe Abstand dieser Brennpunkte $= b.w$, und, weil die Meridiane des durch S gehenden und des Erdsphäroids vermöge der Voraussetzung einerley Brennpunkte haben, $x = \frac{w.b}{B}$. Aber w ist in Vergleichung mit b, und um so mehr in Vergleichung mit B sehr klein; folglich ist sehr nahe $B = CS = r$, $x = \frac{w.b}{r}$, und

$$CG = \tfrac{3}{5} . \frac{w^2.b^2}{r} \text{ Cos.} d.$$

Man kann also die Erde als ein um C in der Ebene pCS schwingendes zusammengesetztes Pendel betrachten, dessen Schwerpunkt in G fällt, und auf welches eine gegen den Punkt S gerichtete Schwere wirkt. Wegen der großen Entfernung dieses Punkts können die Richtungen dieser Schwere als parallel angenommen werden, und wegen der geringen Abweichung der Erde von der Kugelgestalt ist ihr Moment der Trägheit um eine durch C gehende auf die Ebene des Schwungs senkrechte Axe nahe $= \frac{2}{5} M.b^2$ (§. 265.) *); folglich ist der Abstand des Mittelpunkts des Schwungs von der Umdrehungsaxe $= \frac{2}{5} . \frac{b^2}{CG}$ (§. 264. n. 3.)

$= \frac{2}{3} . \frac{r}{w^2 . \text{Cos.} d}$, und vermöge der Eigenschaft dieses Punkts würde, wenn die ganze Masse der Erde in ihm vereinigt wäre, und auf ihn nach einer mit CS parallelen Richtung eine Kraft k wirkte, welche der Anziehungskraft der Sonne in der Distanz CS gleich ist, die Oscillationsbewegung der Erde dieselbe seyn, welche durch die Wirkung der Sonne auf das Erdsphäroid würde hervorgebracht werden, wenn es keine Axendrehung hätte. Man denke sich die Erdmasse in dem Punkt A an dem Umfang ihres Aequators oder in der Distanz $b\sqrt{1+w^2}$ von ihrem Mittelpunkt vereinigt; so müßte auf diesen Punkt nach einer mit CS parallelen Richtung eine Kraft wirken, welche in dem Verhältniß von $b\sqrt{1+w^2}$ zu $\frac{2}{3} \frac{r}{w^2 . \text{Cos.} d}$ kleiner wäre als k, wenn die Oscillationsbewegung dieselbe bleiben sollte. Folglich wird die Fig. 145. durch MF ausgedrückte Kraft seyn $= \frac{3k}{2} . \frac{b}{r} w^2 \text{ Cos.} d \sqrt{1+w^2}$.

Es ist aber, wenn man einen Sterntag $= t'$, das siderische Jahr $= T$, und den mittleren Abstand der Sonne von der Erde $= a$ setzt, die Anziehungskraft der Sonne in der Distanz $a = \frac{4a\pi^2}{T^2}$, und in der Distanz $r = \frac{4a^3.\pi^2}{r^2.T^2}$, und die Geschwindigkeit Mt (Fig. 145.) eines Punkts des Erdäquators $= \frac{2b\pi\sqrt{1+w^2}}{t'}$;

*) Genau ist dieses Moment der Trägheit $= \frac{2}{5} M.b^2.(1 + \frac{1}{2} w^2)$.

[redacted]

folglich ist

$$\frac{MF}{Mt} = \frac{3\pi . t'}{T^2} w^2 \text{Cos.} d \times \left(\frac{a}{r}\right)^3, \text{ nahe} = \frac{3\pi t'}{T^2} w^2 \text{Cos.} d.$$

Endlich verhält sich in dem bey M rechtwinklichten sphärischen Dreyeck VSM

$$\text{Sin.} V : \text{Sin.} MS = 1 : \text{Sin.} VS,$$
$$\text{Cotg.} V : \text{Cotg.} MS = \text{Sin.} VM : 1;$$

folglich $\text{Cos.} V : \text{Cos.} MS = \text{Sin.} VM : \text{Sin.} VS,$

$$= \text{Sin.} VM : \overline{\text{Sin.} VS}^2,$$

oder $\text{Cos.} V : \text{Cos.} d = \frac{HM}{CM} \cdot \frac{SR}{CM} : \overline{\text{Sin.} VS}^2.$

Also ist vermöge der in dem 259sten §. für die Winkelgeschwindigkeit u des Aequinoktialpunkts gefundenen Gleichung

$$1.)\ u = \frac{3\pi t'}{T^2} w^2 \text{Cos.} V \overline{\text{Sin.} VS}^2.$$

Sey u' die Geschwindigkeit, mit welcher sich die Schiefe V der Ekliptik verändert; so kann auf ähnliche Art, wie in dem 315ten §. gezeigt worden, daß

$u : u' = 1 : \text{Sin.} V \text{Cotg.} VM.$ Im Fall der Figur nimmt aber die Schiefe der Ekliptik ab;

folglich ist 2.) $u' = -u \text{Sin.} V \text{Cotg.} VM,$

$$= -u \text{Tg.} V \text{Cotg.} VS, \text{ weil Cotg.} VM \text{Cos.} V = \text{Cotg.} VS,$$

$$= -\frac{3\pi t'}{T^2} w^2 \text{Sin.} V \text{Sin.} VS \text{Cos.} VS, \text{ (n. 1.)},$$

$$= -\frac{3\pi t'}{2T^2} w^2 \text{Sin.} V \text{Sin.} 2VS.$$

Die Attraction der Sonne bringt also blos periodische Veränderungen in der Schiefe der Ekliptik hervor. Man setze ihre mittlere Schiefe $= E$, die Länge der Sonne $VS = l$, ihre tägliche tropische mittlere Bewegung $= m$, und ihre mittlere Länge für eine gewiße Epoche $= a$; so erhält man aus n. 1., wenn man statt der wahren Länge die mittlere setzt,

$$u = \frac{3\pi t'}{T^2} w^2 \text{Cos.} E \overline{\text{Sin.} l}^2,$$

$$= \frac{3}{2} \frac{\pi t'}{T^2} w^2 \text{Cos.} E (1 - \text{Cos.} 2l),$$

$$= \frac{3}{2} \frac{\pi t'}{T^2} w^2 \text{Cos.} E - \frac{3}{2} \frac{\pi t'}{T^2} w^2 \text{Cos.} E \text{Cos.} (2a + 2mt).$$

Daher ist nach §. 239. n. 1. wenn man E als constant betrachtet, die von der Attraction der Sonne herrührende retrograde Bewegung der Aequinoktialpunkte in t Tagen

$$= \frac{3}{2} \frac{\pi t' . t}{T^2} w^2 . \text{Cos.} E - \frac{3\pi t'}{4mT^2} . w^2 . \text{Cos.} E \text{Sin.} (2a + 2mt).$$

Aus n. 2. erhält man auf ähnliche Art nach §. 239. n. 2. die von der Attraction der Sonne herrührende periodische Veränderung der Schiefe der Ekliptik

$$= + \frac{3mt'}{4mT^2} \cdot w^2 \text{ Sin. } E \text{ Cos. } (2\alpha + 2mt).$$

§. 361. Eine ähnliche Bewegung der Erdaxe wird durch die Wirkung des Monds auf das Erdsphäroid hervorgebracht. Die gerade Linie CL Fig. 145. sey nach dem Mittelpunkt des Monds gerichtet, und durch sie sey eine Ebene LCM auf die Ebene des Erdäquators senkrecht gelegt; so mißt der aus C als Mittelpunkt mit dem Halbmesser CM beschriebene Kreisbogen ML die hier nördlich angenommene Abweichung d' des Monds, und der Bogen MS die Abweichung d eines Punkts, welcher mit dem Mond eine gleiche gerade Aufsteigung VM hat. Man setze den Abstand des Monds von der Erde $= r'$, und die Kraft, mit welcher er einen in der Distanz r' von ihm befindlichen Körper anzieht $= k'$; so ist nach dem vorhergehenden §. die aus der Attraction des Monds auf das Erdsphäroid entstehende mit CL parallel wirkende Kraft, vermöge welcher die Erde, wenn sie keine Axendrehung hätte, in der Ebene MCL als ein zusammengesetztes Pendel schwingen würde, $= \frac{3k'}{2} \cdot \frac{b}{r'^3} w^2 \text{ Cos. } d' \sqrt{1 + w^2}$. Man nehme auf der durch den Punkt M mit CL parallel gezogenen MK die MF' dieser Kraft proportional, ziehe durch F die parallele FT mit CM, und durch M die Parallele MF mit CS, welche der ersteren in F begegne; so zerfällt die Kraft MF' in zwey andere MF und FF', von welchen die letztere mit CM parallel wirkende keinen Einfluß auf die Bewegung der Erdaxe hat. Die erstere MF verhält sich zu $MF' =$ Sin. MFF' : Sin. $MF'F =$ Sin. MCL : Sin. $MCS =$ Sin. d' : Sin. d; folglich ist $MF = \frac{MF' \text{ Sin. } d'}{\text{Sin. } d} = \frac{3k'}{2} \cdot \frac{b}{r'^3} w^2 \frac{\text{Sin. } d'}{\text{Sin. } d} \text{ Cos. } d' \sqrt{1 + w^2}$. Nun ist aber, wenn man die Erdmasse $= 1$, die Sonnenmasse $= M$ und die Masse des Monds $= \mu$ setzt, vermöge des Newtonischen Gravitationsgesetzes

$$k : k' = r^2 . M : r'^2 . \mu,$$

und $M + 1 : 1 + \mu = a^3 . T'^2 : a'^3 . T^2$ (§. 301. n. 3.)

folglich $(M + 1)k : (1 + \mu)k' = \frac{a^3 . M . T'^2}{r^2} : \frac{a'^3 \mu . T^2}{r'^2}$, oder, weil die Erdmasse in Vergleichung mit der Masse der Sonne sehr klein ist,

$$\frac{k}{r} : \frac{k'}{r'} = T'^2 \left(\frac{a}{r}\right)^3 : \frac{\mu . T^2}{1 + \mu} \cdot \left(\frac{a'}{r'}\right)^3.$$

Da man bey dieser Untersuchung die aus den Veränderungen der Abstände der Sonne und des Monds von der Erde ent-

ſtehende Veränderungen ihrer Attractionkräfte vernachläßigen kann; ſo iſt nahe

$$1.)\ \frac{k}{r} : \frac{k'}{r'} = 1 : \left(\frac{T}{T'}\right)^2 \cdot \frac{\mu}{1+\mu}$$
$$= 1 : \lambda, \text{ zur Abkürzung.}$$

Alſo iſt $\frac{MF}{M\mu} = \frac{3\lambda . \varpi . t'}{T^2} \omega^2 . \frac{\text{Sin. } d'}{\text{Sin. } d} \text{ Cos. } d'$, und weil $\frac{HM}{CM} =$ Sin. VM, $\frac{SR}{CM} =$ Sin. VS; ſo iſt, wenn man die Winkelgeſchwindigkeit, mit welcher der Aequinoktialpunkt V wegen der Einwirkung des Monds gegen ν hin rückt, oder ſich rükwärts bewegt, $= U$ ſetzt,

$$2.)\ U = \frac{3\lambda . \varpi . t'}{T^2} \omega^2 \frac{\text{Sin. } d'}{\text{Sin. } d} \text{ Cos. } d' \text{ Sin. } VM \text{ Sin. } VS \text{ (§. 359.)}.$$
$$= \frac{3\lambda . \varpi . t'}{T^2} \omega^2 \frac{\text{Sin. } d'}{\text{Sin. } V} \cdot \frac{\text{Cos. } d'}{\text{Cos. } d} \text{ Cos. } V \text{ Sin. } VS,$$

weil in dem bey M rechtwinklichten ſphäriſchen Dreyeck VSM die Cotg. $V =$ Sin. VM Cotg. MS iſt.

Es ſey ABC (Fig. 146.) die Ebene des Aequators, CDE die Ebene der Ekliptik, C der Mittelpunkt der Erde, L der Mittelpunkt des Monds. Man fälle aus L das Perpendickel LM auf die Ebene des Aequators, ziehe MV auf die Aequinoktiallinie CG ſenkrecht, und lege durch LM und MV eine Ebene, welche auf CG ſenkrecht ſeyn, und die Ebene GE der Ekliptik in der geraden Linie VS ſchneiden wird. Endlich fälle man aus L das Perpendickel LL' auf die Verlängerung von VS, und ziehe CL, CL', CS, und CM; ſo iſt die Länge l' des Monds $= VCL'$, ſeine Breite $b' = LCL'$, ſeine gerade Aufſteigung $= VCM$, ſeine Abweichung $d' = MCL$, $MCS = d$, und VCS der Winkel, welcher in der 145ſten Figur durch den Bogen VS gemeßen wird. Da nun

$$CS : CV = 1 : \text{Cos. } VCS,$$
$$CV : CL' = \text{Cos. } l' : 1,$$
$$CL' : CL = \text{Cos. } b' : 1;$$

ſo iſt $\left.\begin{matrix} CS & : & CL \\ \text{Cos. } d' & : & \text{Cos. } d \end{matrix}\right\} = \text{Cos. } b' \text{ Cos. } l' : \text{Cos. } VCS.$

Daher $\frac{\text{Cos. } d'}{\text{Cos. } d} \text{ Sin. } VCS = \text{Cos. } b' \text{ Cos. } l' \text{ Tg. } VCS,$

$$= \frac{VS}{CV} . \text{Cotg. } b' \text{ Cos. } l',$$
$$= \frac{VS}{CL'} . \text{Cos. } b',$$
$$= \frac{VL' - L'S}{CL'} . \text{Cos. } b',$$

$$= \frac{CL' \text{ Sin. } l' - CL' \text{ Tg. } b' \text{ Tg. } V}{CL'} \cdot \text{Cos. } b'$$

$$= (\text{Sin. } l' - \text{Tg. } b' \text{ Tg. } V) \text{ Cos. } b'.$$

Man ziehe noch durch L' die Parallele lm mit LM, und durch L die Parallele Ll mit Vm; so ist

$$\left.\begin{matrix}\text{Sin. } MCL \\ \text{Sin. } d'\end{matrix}\right\} = \frac{LM}{CL} = \frac{mL + L'l}{CL},$$

$$= \frac{CL.\text{Cos. } b' \text{ Sin. } l' \text{ Sin. } V + CL \text{ Sin. } b' \text{ Cos. } V}{CL};$$

$$\text{also } \frac{\text{Sin. } d'}{\text{Sin. } V} = \text{Cos. } b' (\text{Sin. } l' + \text{Tg. } b' \text{ Cotg. } V).$$

Setzt man diese Ausdrücke in die Gleichung n. 2.; so erhält man

$$U' = \frac{3\lambda.\pi.t'}{T^2} w^2.\overline{\text{Cos. } b'^2} (\text{Sin. } l' + \text{Tg. } b' \text{ Cotg. } V)(\text{Sin. } l' - \text{Tg. } b' \text{ Tg. } V) \text{Cos. } V,$$

$$= \frac{3\lambda.\pi.t'}{T^2} w^2.\text{Cos. } \overline{b'^2} (\overline{\text{Sin. } l'^2} + 2\text{Tg. } b' \text{ Sin. } l' \text{ Cotg. } 2V - \overline{\text{Tg. } b'^2}) \text{Cos. } V,$$

weil Cotg. V − Tg. V = 2 Cotg. 2 V.

Sey die Länge des aufsteigenden Mondsknotens $= n$, und die Neigung der Mondsbahn gegen die Ekliptik $= i$; so sind

$$\text{Tg. } b' = \text{Tg. } i \text{ Sin. } (l' - n) \text{ (§. 175. n. 1.)},$$
$$= h \text{ Sin. } (l' - n), \text{ wenn man Tg. } i = h \text{ setzt};$$

$$\overline{\text{Sec. } b'^2} = 1 + h^2 \text{ Sin. } \overline{(l' - n)^2}$$

$$\overline{\text{Cos. } b'^2} = 1 - h^2 \text{ Sin. } \overline{(l' - n)^2} + \&c.$$
$$= 1 - \tfrac{1}{2} h^2 + \tfrac{1}{2} h^2 \text{ Cos. } 2(l' - n) + \&c.$$

Man setze diese Werthe in den vorhin gefundenen Ausdruck von U; so erhält man nach gehöriger Reduction, wenn man V der mittleren Schiefe E der Ekliptik gleich setzt,

$$3.) \; U = \tfrac{3}{2}\lambda . \frac{\pi . t' . w^2}{T^2} \Big((1 + \tfrac{3}{2} h^2) \text{ Cos. } E + (1 - \tfrac{1}{2} h^2) h \frac{\text{Cos. } 2E}{\text{Sin. } E} \text{ Cos. } n$$

$$- (1 - \tfrac{1}{2} h^2) \text{ Cos. } E \text{ Cos. } 2l' + \&c. \Big)$$

Die hier vernachläßigten Glieder sind, wie man leicht durch weitere Ausführung der Rechnung findet, so klein, daß ihr Einfluß auf die Bewegung der Aequinoktialpunkte für die Beobachtungen unmerklich ist.

Die Geschwindigkeit U', mit welcher sich wegen der Wirkung des Monds die Schiefe V der Ekliptik verändert, ist, wie man in dem 360sten §. n. 2. gesehen hat, $= -U \text{ Tang. } V \text{ Cotg. } VS$.

Also ist, wenn man statt U seinen Werth aus n. 2. setzt,

$$U' = -\frac{3\lambda . \pi . t' . w^2}{T^2} \cdot \frac{\text{Sin. } d'}{\text{Sin. } V} \cdot \frac{\text{Cos. } d'}{\text{Cos. } d} \cdot \text{Sin. } V. \text{Cos. } VS.$$

Es ist aber, wie oben gezeigt worden ist, $\frac{\text{Cos. } d^2}{\text{Cos. } d} \text{ Cos. } VS =$ Cos. b' Cos. l', und $\frac{\text{Sin. } d'}{\text{Sin. } V} =$ Cos. b' (Sin. $l' +$ Tg. b' Cotg. V) = Cos. b' (Sin. $l' + k$ Sin. $(l' - n)$ Cotg. V); folglich ist

$$U' = -\frac{3\lambda . \varpi . t' . w^2}{T^2} \overline{\text{Cos. } b'}^2 (\text{Sin. } l' + k \text{Sin.}(l' - n) \text{Cotg. } V) \text{Cos. } l' . \text{Sin. } V,$$

$$= -\frac{3\lambda . \varpi . t' . w^2}{2T^2} \overline{\text{Cos. } b'}^2 (\text{Sin. } 2l' + k \text{ Cotg. } V \text{ Sin. } (2l' - n) - k \text{ Cotg. } V \text{ Sin. } n) \text{ Sin. } V,$$

woraus man wie vorhin erhält

4.) $U' = -\frac{3}{2}\lambda . \frac{\varpi . t' . w^2}{T^2} ((1 - \frac{1}{2}k^2) \text{Sin. } E . \text{Sin. } 2l' - (1 - \frac{1}{2}k^2) \text{Cos. } E . \text{Sin. } n + \text{&c.})$

Es seyen a', a'' die mittleren Längen des Monds und seines aufsteigenden Knotens für eine gewiße Epoche, und m', m'' ihre tägliche tropische Bewegungen; so ist für t Tage nach dieser Epoche die mittlere Länge des Monds $= a' + m't$, und die mittlere Länge seines aufsteigenden Knotens $= a'' - m''t$. Da man nun in den Ausdrücken der sehr kleinen periodischen Veränderungen, welche der Mond in der Lage der Erdare hervorbringt, statt der wahren Längen des Monds und seines Knotens die mittleren, oder $a' + m't$, $a' - m''t$ statt l' und n setzen kann; so erhält man aus n. 3. u. 4. nach §. 239. n. 1. u. f. die von der Attraction des Monds herrührende retrograde Bewegung der Aequinoktialpunkte in t Tagen,

$$= \frac{3}{2}\lambda . \frac{\varpi . t' . t}{T^2} w^2 . (1 - \frac{3}{2}k^2) \text{ Cos. } E$$

$$- \frac{3}{2}\lambda . \frac{\varpi . t'}{T^2} w^2 . \left(\frac{(1 - \frac{1}{2}k^2) k}{m''} \frac{\text{Cos. } 2E}{\text{Sin. } E} \text{ Sin. } n + \frac{1 - \frac{1}{2}k^2}{2m'} \text{Cos. } E \text{ Sin. } 2l' \right),$$

und die Veränderung der Schiefe der Ekliptik

$$= +\frac{3}{2}\lambda . \frac{\varpi . t'}{T^2} w^2 \left(\frac{(1 - \frac{1}{2}k^2)}{2m} \text{Sin. } E \text{ Cos. } 2l' + \frac{(1 - \frac{1}{2}k^2) k}{m''} \text{ Cos. } E \text{ Cos. } n \right).$$

§. 362. Das mittlere Zurückweichen der Aequinoktialpunkte beträgt also in t Tagen

$\frac{3}{2} \frac{\varpi . t' . t}{T^2} . w^2$ Cos. E wegen der Wirkung der Sonne (§. 360.), und

$\frac{3}{2}\lambda . \frac{\varpi . t' . t}{T^2} w^2 (1 - \frac{3}{2}k^2)$ Cos. E wegen der Wirkung des Monds (§. 361.).

Will man mehrerer Genauigkeit halber die Quadrate der Excentricitäten e und e' der Bahnen der Erde und des Monds beybehalten; so darf man nur auf die Ausdrücke von $\frac{MF}{Mf}$ zurückge-

hen, in welchen man die Größen $\left(\frac{a}{r}\right)^3$ und $\left(\frac{a'}{r'}\right)^3 = 1$ gesetzt hat. Es ist aber (Note zu §. 323. pag. 576.) $\left(\frac{a}{r}\right)^3 = 1 + \frac{3}{2}e^2 + .$, und ebenso $\left(\frac{a'}{r'}\right)^3 = 1 + \frac{3}{2}e'^2 +$ &c.; folglich muß man, um diese Größen noch in Rechnung zu bringen, die vorhergehenden Ausdrücke der mittleren Bewegung der Aequinoktialpunkte beziehungsweise mit $1 + \frac{3}{2}e^2$ und $1 + \frac{3}{2}e'^2$ multipliciren. Setzt man noch $t = 365\frac{1}{4}$; so ist das jährliche Zurückweichen der Aequinoktialpunkte wegen der vereinigten Wirkungen der Sonne und des Monds

$$= \frac{3}{2} \cdot \frac{\pi . t' . 365{,}25}{T^2} w^2 . \text{Cos. } E . (1 + \frac{3}{2}e^2 + (1 - \frac{3}{2}h^2)(1 + \frac{3}{2}e'^2)\lambda),$$

die Beobachtungen geben

$t' = 0{,}9972697$ T.; $T = 365{,}25638$ T.; $E = 23° 28'$;
$h = 0{,}0900596$; $e = 0{,}01679435$; $e' = 0{,}0550268$;

also ist $\frac{3\pi . t'}{2T^2} = 0{,}0000352256$ in Theilen des Halbm.

$= 7{,}2658$ Sekunden,

und die mittlere jährliche Bewegung der Aequinoktialpunkte
$= 2435'',37 . w^2 . (1 + 0{,}991953 . \lambda)$.

Setzt man nun nach §. 307. die Masse des Monds $= \frac{1}{69{,}75}$; so wird $\lambda = \frac{1}{76{,}75}\left(\frac{T}{T'}\right)^2$ (§. 361. n. 1.), $= 2{,}526127$. Und weil unter der Voraussetzung einer gleichförmigen Dichtigkeit der Erde ihre Abplattung $= \frac{1}{231{,}7}$ (§. 355.), mithin $w^2 = \frac{462{,}4}{(230{,}7)^2}$ seyn müßte; so wäre unter eben dieser Voraussetzung die jährliche Bewegung der Aequinoktialpunkte $= 74'',178$, welche $24''$ mehr ausmacht, als nach den Beobachtungen (§. 37.). Auch diese Erscheinung zeigt also, daß die Erde nicht gleichförmig dicht ist. Wäre das Gesetz gegeben, nach welchem ihre Dichtigkeit von der Oberfläche an gegen den Mittelpunkt hin zunimmt; so könnte man die mittlere Richtung SK (Fig. 144.) der Kräfte, mit welchen der Körper S die Theilchen der Erde anzieht, die Lage des Punkt G, und das Moment der Trägheit der Erde berechnen. Zu der Bestimmung von G würden die über die Pendellängen angestellten Beobachtungen hinreichend seyn, das Moment der Trägheit hingegen bleibt unbestimmt, wenn das Gesetz nicht gegeben ist, nach welchem sich die Dichtigkeit der Erde von ihrer Oberfläche an bis zu ihrem Mittelpunkt verändert. Uebrigens wird die Lage der Erdaxe sich nach demselben Gesetz verändern, welches bey einer gleichförmigen Dichtigkeit statt finden würde, und man kann in obiger Gleichung w^2 so bestimmen, daß die berechnete Bewegung der Aequinoktialpunkte mit der be-

obachteten übereinſtimmt. Aber das ſo beſtimmte Verhältniß von $w : 1$ wird nicht dem Verhältniß der Excentricität eines Erdmeridians zu der halben Erdaxe gleich ſeyn, ſondern ſich auf ein gleichförmig dichtes elliptiſches Sphäroid beziehen, welches an die Stelle der Erde geſetzt dieſelben Veränderungen in der Lage ſeiner Umdrehungsaxe zeigen würde, welche man in Bewegungen der Erdaxe beobachtet. Will man w und λ mittelſt der beobachteten Veränderungen der Lage der Erdaxe beſtimmen; ſo muß man zwiſchen w und λ noch eine Gleichung haben, wozu man die gröſte der periodiſchen Veränderungen, nemlich die von dem Coſinus der Länge des aufſteigenden Mondsknotens abhängende, oder die ſogenannte Nutation der Schiefe der Ekliptik (§. 160.), gebrauchen kann. Dieſe iſt, wenn man die gegebene Zahl $\frac{3\pi \cdot \varepsilon'}{4 \cdot 2 T^2}$ mit c bezeichnet, und zugleich das Quadrat der Excentricität der Mondsbahn, wie im Anfang dieſes §. gezeigt worden iſt, mit in Rechnung nimmt, vermöge des am Ende des 361ſten §. gegebenen Ausdrucks

$$= \frac{c \cdot \lambda \cdot w^2 \cdot (1 - \frac{1}{2} k^2 + \frac{3}{2} e'^2) k \cdot \text{Cos. } E}{m''} \text{ Cos. } n.$$

Es iſt aber $m'' = 190'',639$, und in Theilen des Halbmeſſers $= 0{,}0009242438$; folglich iſt die Nutation der Schiefe der Ekliptik $= 649'',7493 \lambda . w^2 . \text{Cos. } n$, und ihr groſter Werth $= 649'',7493 \lambda . w^2$. Nach den Beobachtungen iſt ſie aber $= 9'',63$ (§. 160. nemlich die halbe große Axe der Nutationsellipſe); folglich muß ſeyn $649'',7493 \lambda . w^2 = 9'',63$, woraus man erhält

1.) $\lambda . w^2 = 0{,}0148211$.

Die jährliche mittlere Bewegung der Aequinoktialpunkte in der Ekliptik beträgt nach den Beobachtungen $50'',1$ (§. 37.). Weil aber die Ebene der Erdbahn ſelbſt ihren Neigungswinkel gegen eine unbewegliche Ebene wegen der Einwirkung der Planeten verändert (§. 331.); ſo entſteht hieraus eine jährliche directe Bewegung der Aequinoktialpunkte von $0'',155$, und daher iſt die aus den Attractionen des Monds und der Sonne entſtehende Bewegung der Aequinoktialpunkte um $0'',155$ gröſſer als die beobachtete, mithin $= 50'',255$ (S. den folgenden §.). Man wird alſo die Gleichung haben

$$2435'',37 . w^2 (1 + 0{,}991953 . \lambda) = 50'',255,$$

oder 2.) $w^2 + 0{,}991953 \lambda . w^2 = 0{,}02063547$.

Setzt man in dieſe Gleichung den Werth von $\lambda . w^2$ aus n. 1.; ſo erhält man

$w^2 = 0{,}00593363$, und mittelſt der Gleichung n. 1.

$\lambda = 2{,}4978$, woraus man nach §. 361. n. 1. die Maſſe des Monds $= \frac{1}{76.55}$ findet, nahe mit §. 307. übereinſtimmend. Aus dem Werth von w^2 ergiebt ſich die Abplattung eines gleichförmig dichten elliptiſchen Sphäroids, welches in Beziehung auf

die beobachtete Bewegungen der Erdare an die Stelle der Erde gesetzt werden könnte $= \frac{1}{338,8}$.

La Place setzt im Mittel aus mehreren Erscheinungen die Masse des Monds $= \frac{1}{68,5}$ der Masse der Erde *). Hienach wäre $\lambda = 2,57156$, und vermöge der Gleichung n. 2. der Werth von $w^2 = 0,00581139$, mithin nach n. 1. die halbe große Axe der Nutationsellipse $= 9'',71$, sehr nahe mit den Beobachtungen übereinstimmend.

Wird die oben gefundene Masse des Monds $\frac{1}{70,55}$ beybehalten; so ist die von der Attraction des Monds herrührende Veränderung der Schiefe der Ekliptik $= 9'',63$. Cos. n. Vermöge der am Ende des 361sten §. gefundenen Ausdrücke ist die von der Länge des aufsteigenden Mondsknotens abhängende Ungleichheit der Bewegung des Aequinoktialpunkt in der Ekliptik oder die Nutation in der Länge, wenn man auch hier das Quadrat von e' mit in Rechnung nimmt,

$$= -\frac{\varepsilon.\lambda.w^2.(1-\frac{1}{2}h^2+\frac{3}{2}e'^2)h}{m''}.\frac{\text{Cos. }2E}{\text{Sin. }E}.\text{ Sin. }n,$$

$$= -9'',63.\frac{\text{Cos. }2E}{\text{Sin. }E\,\text{Cos. }E}\text{ Sin. }n = -19'',26\text{ Cotg. }2E.\text{ Sin. }n.$$

Das Gesetz dieser Bewegung der Erdare stimmt mit Bradley's Beobachtungen (§. 160.) überein. Denn vermöge der so eben gefundenen Nutation in der Länge hat die Bewegung des Aequinoktialpunkts die Ungleichheit $-9'',63\,\frac{\text{Cos. }2E}{\text{Sin. }E\,\text{Cos. }E}\,\text{Sin. }n$. Der senkrechte Abstand des Erdpols von dem durch seinen mittleren Ort gelegten Breitenkreis beträgt also $9,63.\frac{\text{Cos. }E}{\text{Sin. }E\,\text{Cos. }E}\,\text{Sin. }n$ Sekunden des durch diesen Pol gehenden Parallelkreises der Ekliptik, oder, weil der Halbmesser dieses Parallelkreises in dem Verhältniß des Sin. E : Sin. tot. kleiner ist als der Halbmesser eines gröſten Kreises, $9,63\,\frac{\text{Cos. }2E}{\text{Cos. }E}\,\text{Sin. }n$ Sekunden eines gröſten Kreises der Sphäre. Die gröſte östliche und westliche Elongation des Pols des Aequators von seinem mittleren Ort findet statt, wenn $n = 90°$ oder $= 270°$ ist, wo sie $9,63\,\frac{\text{Cos. }2E}{\text{Cos. }E}$ Sekunden ausmacht. Wegen der Nutation in der Richtung der Breite, welche 9,63 Cos. n Sek. beträgt, und für $n = 0$ und $180°$ auf 9,63 Sekunden steigt, ändert sich der Abstand des Pols des Aequators von dem Pol der Ekliptik dem Cosinus der Länge des aufsteigenden Mondsknotens proportional. Die östliche und westliche Elongation ändert sich dem Sinus eben dieses Winkels proportional, und daher würde, wenn das Maximum der letzteren eben-

*) Méc. cél. T. III. L. VI. Ch. XVI. pag. 160.

ebenfalls auf 9″,63 ſtiege, der Pol des Aequators um ſeinen mittleren Ort einen Kreis von dem ſcheinbaren Halbmeſſer 9,63 Sek. beſchreiben. Dieſe Elongationen ſind aber in dem gegebenen Verhältniß von Cos. $2E$: Cos. E kleiner, als ſie bey dieſer Kreisbewegung ſeyn würden; folglich beſchreibt der Pol um ſeinen mittleren Ort eine kleine Ellipſe an der Himmelskugel, deren halbe große unter einem Winkel von 9,63 erſcheinende Axe in der Ebene des durch den Pol des Aequators gehenden Breitenkreiſes liegt, und ſich zu der halben kleinen Axe wie Cos E : Cos. $2E$ verhält, woraus ſich die §. 160. angegebene Conſtruktion ergiebt.

Berechnet man mittelſt der oben gefundenen Werthe von c, λ, und w noch die übrigen Glieder der §. 360. und 361. für die Bewegungen der Erdaxe gefundenen Ausdrücke; ſo erhält man die periodiſchen Ungleichheiten der Bewegung der Aequinoktialpunkte

$= -18'',00 \sin. n - 1'',150 \sin. 2l - 0'',215 \sin. 2l'$,

und dieſe Gleichungen müßen zu den von dem mittleren Aequinoktialpunkt an gerechneten Längen mit ihren Zeichen hinzugefügt werden, um die von dem wahren Aequinoktialpunkt an gerechnete Längen zu erhalten.

Die periodiſchen Ungleichheiten der Veränderung der Schiefe der Ekliptik ſind

$+ 9'',63 \cos. n + 0'',499 \cos. 2l + 0'',093 \cos. 2l'$,

welche Gleichungen zu der mittleren Schiefe müßen addirt werden, um die wahre Schiefe der Ekliptik zu erhalten *).

Die von der mittleren Länge n des aufſteigenden Mondsknotens abhängende Ungleichheiten der Bewegung der Erdaxe ſind diejenigen, welche die Aſtronomen mit dem Namen der Nutation bezeichnen. Die Theorie zeigt uns noch einige kleinere Ungleichheiten, welche von der Länge der Sonne und des Monds abhängen, und durch ſie mit einer viel größeren Genauigkeit beſtimmt ſind, als man ſie durch die Beobachtungen würde haben beſtimmen können. Die größere Vollkommenheit der neueren Aſtronomie erfordert, daß man die von der Länge der Sonne abhängende Nutation der Erdaxe in Rechnung nehme.

§. 363. Wir haben bisher die Ebene der Erdbahn, auf welche die Veränderung der Lage der Erdaxe bezogen wurde, als eine unbewegliche Ebene betrachtet. Dieſe verändert aber wegen der Attraction der Planeten ihre Lage (§. 331.); folglich muß, wenn man die Lage der Erdaxe auf eine unbewegliche Ebene be-

*) Die von La Place in der Méc. cél. T. II. pag. 350 gegebenen Ausdrücke gründen ſich auf die Vorausſetzung $\lambda = 3$, weswegen die von der Sonnenlänge abhängende Ungleichheiten kleiner ſind. Die daſelbſt angegebenen Coefficienten der Sinus und Coſinus der doppelten Mondslängen müßen noch, wie man aus den allgemeinen Formeln ſieht, mit λ multiplicirt werden.

zieht, aus der Wirkung der Sonne auf das Erdsphäroid eine Nutation der Erdaxe entstehen, welche der durch den Mond hervorgebrachten ähnlich ist, dessen Bahn ihre Lage gegen die Ekliptik ändert. Eine ähnliche Nutation muß aus der Wirkung des Monds entstehen, weil die mittlere Neigung seiner Bahn gegen die Erdaxe constant ist. Nur werden diese von der Veränderung der Lage der Erdbahn abhängende Oscillationen der Erdaxe sehr viel längere Perioden haben, als die bisher betrachtete Nutation. Die Veränderung der Lage der Erdbahn bringt, indem sie sich mit den Wirkungen des Monds und der Sonne auf das Erdsphäroid verbindet, eine von derjenigen sehr verschiedene Veränderung der Schiefe der Ekliptik hervor, welche wegen jener Bewegung der Erdbahn allein statt finden würde. Wäre die Erde genau sphärisch; so würden die Sonne und der Mond weder eine Bewegung der Aequinoktialpunkte, noch eine Veränderung der Schiefe der Ekliptik hervorbringen, und die Secularveränderung der Schiefe der Ekliptik würde der durch die Wirkung der Planeten hervorgebrachten Secularveränderung des Neigungswinkels der Erdbahn gegen eine unbewegliche Ebene gleich seyn. La Place findet *), daß die ganze Veränderung der Schiefe der Ekliptik durch die Wirkung der Sonne und des Monds auf das Erdsphäroid ungefähr auf den vierten Theil desjenigen Werths reducirt wird, welcher wegen der Wirkung der Planeten allein statt haben würde. Aber dieser Unterschied wird erst nach zwey oder drey Jahrhunderten merklich.

Sey die Anzahl der von 1750 an verfloßenen julianischen Jahre $= t$, die Bewegung der Aequinoktialpunkte in einer unbeweglichen Ebene, mit welcher im Jahr 1750 die Ebene der Erdbahn zusammenfiel, $= \Psi$, der Neigungswinkel des Erdäquators gegen diese Ebene $= V$, sodenn die Bewegung der Aequinoktialpunkte in der Erdbahn oder in der wahren Ekliptik $= \Psi'$, und der Winkel des Aequators mit der Ebene der Erdbahn $= V'$; so ist, wenn man die mittlere Schiefe der Ekliptik für das Jahr 1750 $= 23° 28' 18''$ setzt, und nur auf die Secularveränderungen Rücksicht nimmt, nach Méc. cél. T. III. pag. 158.

$$\Psi = 50'',41203.t + 10077'',01 + 13788'',21 \text{ Sin.}(85° 33' 57'',5 + 50'',41203.t) - 23823'',98 \text{ Cos. } 32'',11575.t - 5693'',46 \text{ Sin. } 13'',94645.t;$$

$$V = 23° 28' 18'' - 1191'',22 - 5892'',78 \text{ Cos.}(85° 33' 57'',5 + 50'',41203.t) - 9222'',21 \text{ Sin. } 32'',11575.t + 1646'',79 \text{ Cos. } 13'',94645.t;$$

$$\Psi' = 50'',41203.t - 4627'',46 \text{ Sin. } 13'',94645.t + 20154'',03 \text{ Sin. } 16'',057877.t^2;$$

$$V' = 23° 28' 18'' - 3347'',05 \text{ Sin. } 32'',11575.t - 2382'',44 \text{ Sin. } 6'',973225.t^2.$$

*) Méc. cél. T. II. pag. 320.

Dieſe Ausdrücke ſind auf Zeiträume von tauſend bis zwölfhundert Jahren vor oder nach der Epoche 1750 anwendbar, indem man im erſten Fall t negativ ſetzt. Hienach beträgt das Zurückweichen der Aequinoktialpunkte in dem Zeitraum von 1750 bis 1850

in der unbeweglichen Ebene 1° 23′ 46″,66;
in der Ebene der Erdbahn 1 23 31,13;

der Unterſchied iſt alſo = 15,53, von welchem man in dem vorhergehenden §. Gebrauch gemacht hat.

	V	V'
Ferner findet man für 1750	23° 28′ 18″,00	23° 28′ 18″,00
für 1850	23 28 18,09	23 27 25,86,

woraus ſich die Secularabnahme der Schiefe der Ekliptik in dem gegenwärtigen Jahrhundert = 52″,14 ergiebt. Im Jahr 1800 müßte alſo die Schiefe der Ekliptik geweſen ſeyn = 23° 27′ 52″,93. Nach den Beobachtungen war ſie = 23° 27′ 57″ (§. 331.), und daher ſcheint, wenn anders die für 1750 angenommene Schiefe richtig iſt, die Secularabnahme 52″,14 zu groß zu ſeyn (§. 331.).

Noch kann man obigen Ausdrücken, wenn ſie nur auf Zeiträume von zwey oder drey Jahrhunderten ſich erſtrecken ſollen, durch Auflöſung der trigonometriſchen Funktionen in Reihen eine zum Rechnen bequemere Form geben. Man erhält, wenn man diejenige Glieder wegläßt, welche die dritte und höhere Potenzen von t enthalten,

$\Psi = 50'',28760.t - 0'',0001217943.t^2$;
$V = 23° 28' 18'' + 0'',0000984241.t^2$;
$\Psi' = 50'',09915.t + 0'',0001221484.t^2$;
$V' = 23° 28' 18'' - 0'',52114.t + 0'',0000002722945.t^2$.

Der letztere Ausdruck ſtimmt in dem Coefficienten von t mit dem §. 331. aus der Méc. cél. angeführten überein. Die Coefficienten von t^2 weichen merklich von einander ab.

Die Unterſchiede zwiſchen Ψ und Ψ', V und V' dienen zur Beurtheilung der Veränderung der Lage der Erdbahn gegen die angenommene unbewegliche Ebene. Man ſieht, daß die wirkliche Secularveränderung der Lage der Erdare ſelbſt in einem Jahrhundert ſehr gering, und die Abnahme der Schiefe der Ekliptik ſehr nahe der durch die Attraction der Planeten bewirkten Veränderung des Neigungswinkels der Erdbahn gegen eine unbewegliche Ebene (§. 331.) gleich iſt. Erſt nach mehreren Jahrhunderten wird die wirkliche Secularbewegung der Erdare merklich, welche durch die Wirkung der Planeten verbunden mit der Wirkung der Sonne und des Monds auf das Erdſphäroid hervorgebracht wird.

§. 364. Dieſelben Kräfte, welche die Lage der Umdrehungsaxe der Erde verändern, müßen auch beſtändige Oſ-

cillationen des Fluidums hervorbringen, welches den größeren Theil ihrer Oberfläche bedeckt. Es sey $ADBE$ (Fig. 147.) ein Durchschnitt der Erde mit einer durch ihren Mittelpunkt C und den Mittelpunkt S der Sonne gelegten Ebene. Man ziehe EDS und den Durchmesser AB auf DE senkrecht; so werden alle mit der Sonne auf einerley Seite von AB liegende Theilchen stärker von ihr angezogen, als der Mittelpunkt C der Erde, hingegen wird dieser stärker angezogen als die in der anderen von der Sonne abgekehrten Hälfte AEB liegende Theilchen. Zugleich zerfällt die in der Richtung der geraden Linie MS wirkende Kraft MG, mit welcher das Theilchen M angezogen wird, in zwey andere MN und MR, von welchen die eine in der mit SE parallelen Richtung OMN, die andere in der auf SE senkrechten Richtung MP wirkt. Folglich muß das Meer in D und E sich erheben, bey A und B aber sinken, wenn das Gleichgewicht wieder hergestellt werden soll.

Man ziehe CM, und setze die Masse der Sonne $= S$; so ist $MG = \frac{S}{\overline{SM}^2}$ und die Kraft CQ, mit welcher die Sonne den Mittelpunkt C der Erde anzieht $= \frac{S}{\overline{CS}^2}$. Da nun

$$\left.\begin{matrix} GM \\ \text{oder nahe } MN \end{matrix}\right\} : CQ = \overline{CS}^2 : \overline{SM}^2;$$

so ist $MN - CQ : CQ = \overline{CS}^2 - \overline{SM}^2 : \overline{SM}^2$,

$$\text{nahe} = 2\,CP.\,CS : \overline{SM}^2,$$

$$\text{nahe} = 2\,CP : CS, \text{ weil } CP \text{ in Vergleichung mit } CS \text{ sehr klein ist.}$$

Also ist 1.) $MN - CQ = \frac{2.CQ.CP}{CS} = \frac{2\,S.OM}{\overline{CS}^3}$.

Und weil $GM : MR = SM : PM$,

$$CQ : GM = \overline{SM}^2 : \overline{CS}^2;$$

so ist $CQ : MR = \overline{SM}^3 : \overline{CS}^2.PM$,

$$\text{nahe} = CS : PM.$$

Folglich ist 2.) $MR = \frac{CQ.PM}{CS} = \frac{S.PM}{\overline{CS}^3}$.

Was hier von einem an der Oberfläche liegenden Theilchen bewiesen worden ist, kann auch ebenso von allen innerhalb des Körpers und in irgend einem anderen durch SE ge-

legten Durchſchnitt befindlichen Theilchen gezeigt werden. Wenn alſo die Erde mit einer durch ihren Mittelpunkt *C* auf *CS* ſenkrechten Ebene *AB* geſchnitten wird; ſo wird die Schwere ihrer Theilchen auf beyden Seiten dieſer Ebene nach einer auf ihr ſenkrechten Richtung durch die Attraction der Sonne ihren Abſtänden *MO* von der Ebene *AB* proportional vermindert (n. 1.), und nach einer auf *DE* ſenkrechten Richtung *MP* den Abſtänden *MP* proportional vergrößert (n. 2.). Folglich kann, wenn die Erde als flüßig angenommen wird, das Gleichgewicht des Fluidums nur alsdenn beſtehen, wenn ſie die Geſtalt eines elliptiſchen Sphäroids hat, welches durch die Umdrehung einer Ellipſe um ihre große Axe beſchrieben wird (§. 353.), und die Axe dieſes Sphäroids gegen die Sonne gerichtet iſt. Bey der Umdrehung der Erde um ihre Axe werden die Pole dieſes Sphäroids nach und nach anderen Punkten der Oberfläche der Erde entſprechen, und namentlich zur Zeit der Tag- und Nachtgleichen den Umfang des Erdäquators durchlaufen. Aehnliche Bewegungen werden durch die Attraction des Monds hervorgebracht werden, woraus diejenige Erſcheinungen entſtehen, welche unter dem Namen der Ebbe und Fluth bekannt ſind. Zur Zeit der Syzygien iſt die Erhöhung des Meers eine Wirkung der Summe der anziehenden Kräfte der Sonne und des Monds, zur Zeit der Quadraturen aber ihrer Differenz, weil in dem letzteren Fall die Axe des Sphäroids, welches der Mond hervorzubringen ſtrebt, mit der Axe desjenigen Sphäroids einen rechten Winkel macht, welches durch die Attraction der Sonne allein würde hervorgebracht werden. Man beobachtet, daß die Ebbe und Fluth auch in den Quadraturen ſich nach dem Lauf des Monds richtet. Folglich übertrifft die Kraft, mit welcher der Mond die Theilchen der Erde anzieht, die Kraft mit welcher eben dieſe Theilchen von der Sonne angezogen werden, welches mit den Erſcheinungen der Nutation übereinſtimmt. Während eines täglichen Umlaufs des Monds entſteht zweymal Fluth und zweymal Ebbe. Weil aber das Waſſer einige Zeit gebraucht, um nach denjenigen Gegenden hin zu ſtrömen, wo es durch die Attractionen des Monds und der

Sonne erhöht wird; ſo tritt die Fluth erſt nach dem Durchgang des Monds durch den Meridian ein. Dieſe Verſpätigung ändert ſich mit den Abſtänden des Monds von der Sonne, indem dieſe die Wirkung des Monds bald vergröſſert, bald vermindert. Die Gröſſe der Fluth ändert ſich mit der anziehenden Kraft, alſo mit den Entfernungen des Monds und der Sonne von der Erde, und an einem gegebenen Ort der Erde zugleich mit den Declinationen dieſer Himmelskörper, oder mit ihren Mittagshöhen.

§. 365. Das Axenverhältniß des ablangen elliptiſchen Sphäroids, bey welchem unter der hier gemachten Vorausſetzung das Gleichgewicht beſtehen könnte, kann ſo gefunden werden. Es ſey wie man in dem 354ſten §. vorausgeſetzt hat, DE (Fig. 148.) die Umdrehungsaxe des Sphäroids, aber es ſey jetzt DE gröſſer als der Durchmeſſer AB des Aequators. Man ſetze $\frac{D\bar{C}^2 - A\bar{C}^2}{D\bar{C}^2} = x^2$; ſo iſt $\frac{A\bar{C}^2 - D\bar{C}^2}{D\bar{C}^2} = -x^2$, oder, wenn man die §. 355. gebrauchten Benennungen beybehält, $w^2 = -x^2$. Alſo muß man in den Ausdrücken n. 9. und 10. des 355ſten §. ſtatt w ſetzen $x\sqrt{-1}$. Es iſt aber

$$Arc.\,Tg.\,x\sqrt{-1} = (x + \tfrac{1}{3}x^3 + \tfrac{1}{5}x^5 + \tfrac{1}{7}x^7 + \&c.)\sqrt{-1},$$

$$= \frac{\sqrt{-1}}{2}\,Lg.\,\frac{1+x}{1-x};$$

folglich iſt, wenn man die Erdmaſſe $Md = 1$ ſetzt,

die Gravitation am Pol D des ablangen Sphäroids $= \frac{3(\frac{1}{2}Lg.\frac{1+x}{1-x} - x)}{x^3.\,C\bar{D}^2}$,

und die Gravit. in A unter dem Aequat. $= \frac{3(x - \frac{1}{2}(1-x^2)Lg.\frac{1+x}{1-x})}{2\,C\bar{D}^2.x^3\sqrt{1-x^2}}$ *).

Man ſetze den Abſtand der Sonne von der Erde $= R$; ſo iſt die durch die Sonne bewirkte Verminderung der Schwere unter den Polen D und E des Sphäroids $= \frac{2S.DC}{R^3}$ (§. 364. n. 1.), und die Vergröſſerung unter dem Aequator $= \frac{S.AC}{R^3}$ (§. 364. n. 2). Folglich muß ſich nach §. 353. im Fall des Gleichgewichts verhalten

*) Dieſelben Ausdrücke ergeben ſich aus Maclaurin Treat. of Flux. n. 647. pag. 537.

$$\frac{3\left(\frac{1}{2}\text{Lg.}\frac{1+x}{1-x}-x\right)}{x^3.\overline{CD}^2}-\frac{2S.CD}{R^3}:\frac{3\left(x-\frac{1}{2}(1-x^2)\text{Lg.}\frac{1+x}{1-x}\right)}{2.\overline{CD}^2.x^3\sqrt{1-x^2}}+\frac{S.AC}{R^3}$$

$$=\begin{cases}AC\\ \sqrt{1-x^2}\end{cases}:\begin{matrix}CD\\ 1\end{matrix}\text{, woraus man erhält}$$

$$\frac{9-3x^2}{2}.\text{Lg.}\frac{1+x}{1-x}-9x=2S.\left(\frac{CD}{R}\right)^3\left(\frac{AC}{CD}\sqrt{1-x^2}\right)x^3,$$

$$=2S\left(\frac{CD}{R}\right)^3(3-x^2)x^3.$$

Sey 1.) $q=S.\left(\frac{CD}{R}\right)^3(3-x^2)$; so wird

2.) $\frac{1}{2}\text{Lg.}\frac{1+x}{1-x}=\frac{9x+2qx^3}{9-3x^2}$,

oder $x+\frac{1}{3}x^3+\frac{1}{5}x5+\frac{1}{7}x^7+..=\frac{9x+2qx^3}{9-3x^2}$,

mithin $\frac{2}{3}x^2+\frac{12}{35}x^4+\text{\&c.}=q$.

Also ist 3.) x^2 nahe $=\frac{3}{2}q$.

Da nun $CD:CA=1:\sqrt{1-x^2}$

$=1:1-\frac{1}{2}x^2-\text{\&c.}$

so ist $CD-CA:CD+CA=\frac{1}{2}x^2:2-\frac{1}{2}x^2$, oder, wenn man den mittleren Erdhalbmesser $\frac{CD+CA}{2}=r$ setzt,

4.) $CD-CA=\frac{1}{2}rx^2=\frac{3}{4}r.q$ (n. 3.).

Man setze den mittleren Abstand der Sonne von der Erde $=a$, und ihre mittlere Horizontalparallaxe $=p$; so ist

$\frac{CD}{a}=\text{Sin.}p'$, $\frac{CD}{R}=\frac{a}{R}\text{Sin.}p'$, und

5.) $q=S.\overline{\text{Sin.}p'^3}.(3-x^2)\frac{a^3}{R^3}$ (n. 1.),

nahe $=3S.\overline{\text{Sin.}p'^3}.\frac{a^3}{R^3}$;

folglich 6.) $CD-CA=\frac{15}{4}r.S.\overline{\text{Sin.}p'^3}.\left(\frac{a}{R}\right)$.

Unter der Voraussetzung der Sonnenparallaxe $p'=8''{,}8$ ist $S=331144$, und r kann man der halben Summe des Halbmessers des Aequators und der halben Erdaxe $=3266327$ Toiſ. (§. 143.) $=72.3266327$ par. Zollen setzen; folglich wird für den mittleren Abstand der Sonne von der Erde $CD-CA=22{,}67843$ Zollen $=1$ Fuß $10\frac{3}{4}$ Zoll *).

*) Newton, welcher zuerſt die Ebbe und Fluth nach der Theorie der allgemeinen Schwere berechnet hat, fand 1 Fuß $11\frac{1}{30}$ Zoll. Princ. L. III, prop. XXXVI.

Man ſchneide das Sphäroid mit einer durch ſeine Are DE auf die Ebene des Erdäquators ſenkrecht gelegten Ebene $ADBE$, und es ſey NO die Durchſchnittslinie dieſer zwey Ebenen; ſo wird, weil die Verlängerung von DE durch den Mittelpunkt der Sonne geht, der Winkel OCD die Abweichung der Sonne meſſen, und an einem unter dem Aequator liegenden Punkt O der Unterſchied der Höhen des Meeres bey der Fluth und Ebbe $= CO - CA$ ſeyn. Denn der Schnitt des Waſſerſphäroids mit einer durch NO auf die Ebene $ADBE$ ſenkrecht gelegten Ebene iſt eine Ellipſe, deren große Are $= NO$, und deren kleine Are dem Durchmeſſer AB des Aequators des Waſſerſphäroids gleich iſt. Man findet aber aus dem §. 138. zwiſchen n. 3. und 4. vorkommenden Ausdrücken, wenn man d ſtatt l' ſetzt, und die Quadrate und höhere Potenzen des in gegenwärtigem Fall ſehr kleinen Bruchs $\frac{a-b}{a}$ vernachläßigt, $CO = CD - (CD - CA)\,\mathrm{Sin.}\,d^2$.

Folglich iſt 7.) $CO - CA = (CD - CA)\,\mathrm{Cos.}\,d^2$,

$$= \tfrac{15}{4}\, r.S\,\mathrm{Sin.}\,p'^3 \left(\tfrac{a}{R}\right)^3 \mathrm{Cos.}\,d^2.$$

Es liege nun ein Ort o (Fig. 148.) auſſerhalb des Erdäquators, und es werde das Waſſerſphäroid mit einer dem Erdäquator NO parallel gelegten Ebene no geſchnitten; ſo iſt der Schnitt eine Ellipſe, deren große Are no ſich zu ihrer kleinen Are wie $NO : AB$ verhält (§ 348. n. 4.). Alſo verhält ſich auch, wenn man om dem Ueberſchuß der halben großen Are über die halbe kleine Are dieſer Ellipſe gleich macht, $CO - CA : om = NO : on$, oder wegen der geringen Abweichung des Sphäroids von der Kugelgeſtalt ſehr nahe wie der Sinus totus zu dem Coſinus der Breite des Orts o. Man ziehe den Halbmeſſer Co, und mr auf Co ſenkrecht; ſo iſt, weil Co nahe mit der Richtung der Schwere zuſammenfällt, or der Ueberſchuß der Fluthhöhe über die Ebbe. Man ſetze die Breite von $o = L$; ſo iſt nahe $or = mo\,\mathrm{Cos.}\,L = (CO - CA)\,\mathrm{Cos.}\,L^2$. Alſo iſt unter der Breite L die von der Wirkung der Sonne herrührende Fluthhöhe über die Ebbe

8.) $= \tfrac{15}{4}\, r.S.\,\mathrm{Sin.}\,p'^3\,\mathrm{Cos.}\,L^2 \left(\tfrac{a}{R}\right)^3 \mathrm{Cos.}\,d^2$.

Vermöge n. 1. und 4. iſt die Fluthhöhe direct der Maſſe des Himmelskörpers, welcher die Bewegungen des Meeres hervorbringt, und umgekehrt dem Würfel ſeiner Entfernung von der Erde proportional. Wenn man alſo die Erdmaſſe wie bisher $= 1$, die Maſſe des Monds $= \mu$, ſeinen Abſtand von der Erde $= R'$, und diejenige Größe, welche in Beziehung auf die Sonne mit g bezeichnet wurde, in Beziehung auf den Mond $= g'$ ſetzt; ſo wird man haben $g' = \mu \left(\frac{CD}{R'}\right)^3 (3 - x^2)$, nahe $= 3\mu \left(\frac{CD}{R'}\right)^3$.

Es iſt aber, wenn man den mittleren Abſtand des Monds von der Erde $= a'$, ſeine ſideriſche Umlaufszeit $= T'$, und die ſideriſche Umlaufszeit der Erde $= T$ ſetzt,

$$\frac{S+1}{a^3} : \frac{1+\mu}{a'^3} = T'^2 : T^2 \text{ (§. 301. n. 3.)};$$

folglich iſt $\frac{\mu}{a'^3} = \frac{\mu}{1+\mu}\left(\frac{T}{T'}\right)^2 \frac{S+1}{a^3}$,

ſehr nahe $= \frac{\mu}{1+\mu}\left(\frac{T}{T'}\right)^2 \cdot \frac{S}{a^3} = \frac{178{,}72 \cdot \mu}{1+\mu} \cdot \frac{S}{a^3}$,

$= \lambda \cdot \frac{S}{a^3}$, zur Abkürzung,

und $\mu \cdot \left(\frac{CD}{R'}\right)^3 = \lambda . S . \left(\frac{CD}{a}\right)^3 \cdot \left(\frac{a'}{R'}\right)^3$.

Man ſetze noch die Abweichung des Monds $= d'$; ſo iſt vermöge n. 8. unter der Breite L die von der Wirkung des Monds herrührende Fluthhöhe über die Ebbe

9.) $= \frac{15}{4} r . S . \overline{\text{Sin.}p'^3} \lambda . \left(\frac{a'}{R'}\right)^3 \overline{\text{Cos.}d'^2}$.

Wenn der Mond mit der Sonne in Conjunktion oder Oppoſition iſt; ſo iſt die Fluthhöhe die Summe der Höhen, welche durch die Wirkungen der Sonne und des Monds einzeln genommen würden hervorgebracht worden ſeyn. Folglich iſt nach n. 8. und 9. um die Zeit der Syzygien die aus den vereinigten Wirkungen des Monds und der Sonne entſtehende Fluthhöhe über die Ebbe

10.) $= \frac{15}{4} r . S . \overline{\text{Sin.}p'^3} . \overline{\text{Cos.}L^2}\left(\left(\frac{a}{R}\right)^3 \overline{\text{Cos.}d^2} + \lambda . \left(\frac{a'}{R'}\right)^3 \overline{\text{Cos.}d'^2}\right)$.

§. 366. Die Unregelmäßigkeit der Tiefe des Meeres, die Art, nach welcher es über die Erde verbreitet iſt, die Lage und der Abhang der Ufer, ihre Verhältniße gegen die benachbarten Küſten, die Strömungen, der Widerſtand, welchen die Gewäſſer leiden, alle dieſe Urſachen, welche man nicht der Berechnung unterwerfen kann, modificiren die Oſcillationen dieſer großen flüſſigen Maſſe. Man kann daher nur die allgemeinen Erſcheinungen, welche aus den Anziehungen des Monds und der Sonne entſtehen müßen, zergliedern, und aus den Beobachtungen die Data ableiten, welche zu der Ergänzung der Theorie der Ebbe und Fluth in einem jeden Hafen erforderlich ſind, und von der Größe des Meeres, von ſeiner Tiefe, und von den Localumſtänden des Hafens abhängen.

Den Werth von λ kann man zwar, wie in dem 362ſten §. gezeigt worden iſt, unabhängig von den Erſcheinungen der Ebbe und Fluth beſtimmen. Weil aber auch dieſe Größe durch

Localumstände geändert werden kann; so ist es nöthig, sie durch die Beobachtungen der Ebbe und Fluth zu bestimmen. Nach vielen in dem Hafen von Brest angestellten Beobachtungen ist daselbst die Höhe der Fluth über die Ebbe um die Zeit der Syzygien im Mittel genommen = 18,126 Fuß, um die Zeit der Quadraturen aber = 8,586 F. Also verhält sich nahe die Summe der Wirkungen des Monds und der Sonne zu ihrer Differenz, oder $\lambda+1:\lambda-1 = 18{,}126:8{,}586$, und $\lambda:1 = 26{,}712:9{,}54 = 2{,}8:1$. La Place fand durch eine genauere Berechnung dieser Beobachtungen $\lambda = 2{,}9677$ *), und setzte in runder Zahl $\lambda = 3$. Es ist aber nach dem vorhergehenden §. $\lambda = \frac{\mu}{1+\mu}\left(\frac{T}{T'}\right)^2 = 178{,}72.\frac{\mu}{1+\mu}$; folglich ist für $\lambda = 3$ der Werth von $\mu = \frac{1}{58{,}57}$. Die Mondsgleichung der Sonnentafeln hat gegeben $\frac{1}{69{,}75}$ (§. 308.), die Nutation $\frac{1}{70{,}55}$ (§. 362. pag. 671.), und vermöge der beobachteten Horizontalparallaxe des Monds muß die Masse des Monds ebenfalls nahe $= \frac{1}{70}$ seyn (§. 310.). Also ist wirklich in dem Hafen von Brest das Verhältniß der Wirkung des Monds zu der Wirkung der Sonne auf das Meer größer, als es vermöge der Masse des Monds seyn sollte.

Man setze nun nach Anleitung der Gleichung n. 10. des vorhergehenden §. die Fluthhöhe über die Ebbe um die Zeit der Syzygien $= h'\left(\left(\frac{a}{R}\right)^3 \overline{\text{Cos.}\,d}^2 + \lambda.\left(\frac{a'}{R'}\right)^3 \overline{\text{Cos.}\,d'}^2\right)$; wo h' eine durch Beobachtungen zu bestimmende Größe ist. Zur Zeit der Tag- und Nachtgleichen sind Cos. d und Cos. d', so wie $\frac{a}{R}$, nahe $= 1$, und wegen der Variation ist in den Syzygien der Abstand des Monds von der Erde im Mittel genommen um $\frac{1}{120}$ kleiner, als sein mittlerer Abstand a' **); mithin der mittlere Werth von $\left(\frac{a'}{R'}\right)^3$ in den Syzygien nahe $= \frac{41}{40}$. Wird nun die mittlere aus einer großen Anzahl von Beobachtungen geschloßene Fluthhöhe über die Ebbe um die Zeit der Syzygien und Aequinoctien mit $2h$ bezeichnet; so wird man die Gleichung haben

$$2h = h'\left(1+\tfrac{41}{40}\lambda\right),$$

aus welcher man erhält $h' = \frac{40}{40+41\lambda}\,2h$,

$$= \frac{40}{163}\,.\,2h, \text{ für } \lambda = 3.$$

Setzt man diesen Werth von h' in den vorhergehenden allgemeinen Ausdruck, und $\lambda = 3$; so erhält man für die Syzygien

*) Méc. cél. T. II. pag. 269.
**) Méc. cél. T. II. pag. 250.

die Fluthhöhe über die Ebbe $= \frac{40}{163} \cdot 2h \left(\left(\frac{a}{R}\right)^3 \overline{\text{Cos. } d}^2 + 3 \left(\frac{a'}{R'}\right)^3 \overline{\text{Cos. } d'^2} \right)$ *).

Um die Zeit der Quadraturen iſt nahe

die Fluthhöhe über die Ebbe $= \frac{40}{163} \cdot 2h \left(3 \left(\frac{a'}{R}\right)^3 \overline{\text{Cos. } d'^2} - \left(\frac{a}{R}\right)^3 \overline{\text{Cos. } d^2} \right)$.

In dem Hafen von Breſt z. B. iſt $2h = 19{,}27$ Fuß. Hieraus findet ſich $h' = 4{,}73$, und daher die Fluthhöhe über die Ebbe $= 4{,}73 \left(\left(\frac{a}{R}\right)^3 \overline{\text{Cos. } d}^2 + 3 \left(\frac{a'}{R'}\right)^3 \overline{\text{Cos. } d'^2} \right)$ Fuß.

Der Quotient $\frac{a'}{R'}$ kann mittelſt der Tafel der Mondsparallaxe gefunden werden.

Man ſetze die Horizontalparallaxe des Monds in ſeiner mittleren Entfernung a' von der Erde $= P'$, in der Diſtanz R' aber $= P$; ſo verhält ſich $a' : R' = \text{Sin. } P : \text{Sin. } P'$ (§. 49. n. 1.), nahe $= P : P'$. Nach **Bürg** iſt das conſtante Glied des Ausdrucks der Mondsparallaxe $= 57' 1''$ (§. 327. pag. 589), und dieſes iſt, weil die Mondsparallaxe durch die mittlere Anomalie ausgedrückt iſt, die Parallaxe in der mittleren Diſtanz; folglich iſt $\left(\frac{a'}{R'}\right)^3 = \left(\frac{P}{57' 1''}\right)^3$.

Es ergiebt ſich aus obigen Ausdrücken, daß unter übrigens gleichen Umſtänden in den Syzygien die Fluthhöhen um die Zeit der Nachtgleichen am gröſten, um die Zeit der Sonnenwenden aber am kleinſten ſeyn müßen. Umgekehrt muß es ſich um die Zeit der Quadraturen verhalten, weil alsdenn der Mond ſeine gröſte Abweichung hat, wenn die Abweichung der Sonne $= 0$ iſt, und ſeine Abweichung verſchwindet, wenn die der Sonne am gröſten iſt. Diß ſtimmt mit den zu Breſt angeſtellten Beobachtungen überein. Es war nemlich

die gröſte Fluthhöhe über die Ebbe in 24 Syzygien der Nachtgleichen } im Mittel $=$ 19,27 Fuß,
und in 24 Syzygien der Sonnenwenden — $=$ 16,98,
die kleinſte Fluthhöhe über die Ebbe in 24 Quadraturen der Nachtgleichen } im Mittel $=$ 7,49,
und in 24 Quadraturen der Sonnenwenden $=$ 9,68 **).

Die tägliche Verſpätung der Fluthen war &c.

in den Syzygien der Nachtgleichen	$=$	0	36′ 43″
— — —— — Sonnenwenden	$=$	0	41 11
in den Quadraturen der Nachtgleichen	$=$	1	22 47
— — —— — Sonnenwenden	$=$	1	7 10.

Weil die durch den Mond hervorgebrachte Fluth die von der Sonne herrührende übertrifft; ſo muß die aus den Wirkungen

*) Méc. cél. T. II. pag. 289.
**) Mechanik des Himmels, übers. von Burckhardt. II. Theil, pag. 330.

dieſer zwey Himmelskörper zuſammengeſetzte Fluth ſich hauptſächlich nach der Fluth des Mondes richten, und in einer gegebenen Zeit müßen ſich eben ſo viele Fluthen ereignen, als es obere oder untere Durchgänge des Monds durch den Meridian giebt, welches mit den Beobachtungen übereinſtimmt. Aber der Zeitpunkt der zuſammengeſetzten Fluth muß nach einem von den Mondsphaſen und von dem Verhältniß der Wirkung des Monds zu der Wirkung der Sonne abhängenden Geſetz um den Zeitpunkt der Mondsfluth hin und her ſchwanken. Der erſtere dieſer Zeitpunkte eilt dem zweyten von der gröſten bis zur kleinſten Fluth vor, und folgt ihm nach von der kleinſten bis zur gröſten, ſo daß, weil der mittlere Zeitpunkt der zuſammengeſetzten Fluth mit der Mondsfluth zuſammenfällt, die mittlere tägliche Verſpätigung der Fluthen 50′ 28″,3 beträgt (§. 62.). La Place *) fand durch die Theorie unter der Vorausſetzung $\lambda = 3$ die tägliche Verſpätigung der Fluthen in den Syzygien der Nachtgleichen $= 35' 32''$, und in den Syzygien der Sonnenwenden $= 41' 11''$ nahe mit den Beobachtungen übereinſtimmend. Der Unterſchied zwiſchen der Theorie und den Beobachtungen verſchwindet, wenn man $\lambda = 3{,}155$ ſetzt. Für die Quadraturen der Nachtgleichen fand La Place die tägliche Verſpätigung $=$ 1 St. 32′ 31″, und für die Quadraturen der Sonnenwenden 1 St. 5′ 12″ **). Die Unterſchiede zwiſchen der Theorie und den Beobachtungen liegen innerhalb der Gränzen der Fehler der Beobachtungen und der zu der Berechnung gebrauchten Elemente.

Das Maximum und Minimum der Fluth fällt nicht auf den Tag der Syzygie und der Quadratur, ſondern einen oder zwey Tage ſpäter, wenn die Zwiſchenzeit zwiſchen der Mondsfluth und dem Durchgang des Monds durch den Meridian ſammt der zwiſchen den Durchgängen des Monds und der Sonne durch den Meridian verfloßenen Zeit der zwiſchen der Sonnenfluth und dem Durchgang der Sonne durch den Meridian verfloßenen Zeit gleich iſt. La Place fand aus den zu Breſt angeſtellten Beobachtungen, daß daſelbſt die gröſte Fluth 1 T. 12 St. 10′ 26″ nach der Syzygie eintritt ***). Es ergiebt ſich hieraus, daß in dieſem Hafen die Sonnenfluth 4 St. 24′ 21″ nach dem Durchgang der Sonne, und die Mondsfluth 3 St. 8′ 39″ nach dem Durchgang des Monds durch den Meridian eintritt.

Vermöge der Beobachtungen ſchwankt das Meer um einen gewißen mittleren Zuſtand hin und her, von welchem es ſich nicht über eine gewiße Gränze entfernt, was La Place die Stabilität des Gleichgewichts des Meeres nennt. Er fand daß dieſe Stabilität nothwendig ſtatt finden müße, wenn die Dichtigkeit des

*) Méc. cél. T. II. L. IV. Chap. III. n. 35. pag. 276. 277.
**) A. a. O. n. 39. pag. 284. 285.
***) A. a. O. n. 24. pag. 248.

Meeres kleiner iſt als die mittlere Dichtigkeit der Erde *). Die Theorie der Geſtalt der Erde verbunden mit den Gradmeßungen und den Beobachtungen über die Pendellängen, die Bewegungen der Erdaxe, und die von Cavendish angeſtellten Verſuche zeigen, daß die mittlere Dichtigkeit der Erde die des Waſſers übertrifft; folglich ſtimmt auch in dieſem Punkt die Theorie mit den Beobachtungen überein.

Ein nicht weniger merkwürdiges Reſultat der Theorie iſt der von La Place gefundene Satz, daß, was auch das Geſetz der Tiefe des Meeres, und die Geſtalt des Sphäroids, welches es bedeckt, ſeyn mögen, die Phänomene der Präceßion und Nutation dieſelben ſind, als wenn das Meer mit dieſem Sphäroid eine feſte Maſſe bildete **).

§. 367. Was in Beziehung auf das Meer bemerkt worden iſt, läßt ſich auch auf das elaſtiſche Fluidum anwenden, welches die Erde umgiebt, und ihre Atmoſphäre bildet (§. 14.). Nähme die Dichtigkeit der Atmoſphäre von der Oberfläche der Erde an genau dem Druck proportional ab; ſo würde ſie ſich ohne Ende ausdehnen, und ſich zuletzt zerſtreuen. Es muß alſo die Elaſticität der atmoſphäriſchen Luft in einem größeren Verhältniß abnehmen, als der Druck, und eine Verdünnung ſtatt finden, bey welcher dieſes Fluidum ohne Elaſticität iſt, und in dieſem Zuſtand muß es ſich an der Oberfläche der Atmoſphäre befinden.

Alle Schichten der Atmoſphäre müßen wegen ihres Reibens an einander und an der Oberfläche der Erde nach und nach einerley Rotationsbewegung mit den Körpern angenommen haben, welche ſie umgeben. Wegen dieſer Umdrehungsbewegung muß alſo die Atmoſphäre eine unter den Polen zuſammengedrückte und unter dem Aequator erhabene Figur haben, unter welchem ſie ſich nicht weiter, als bis dahin erſtrecken kann, wo die Schwungkraft genau der Schwere gleich iſt. Für dieſe Gränze kann das Verhältniß der Axe des Sphäroids zu dem Durchmeſſer ſeines Aequators nicht kleiner ſeyn als das Verhältniß von 2 : 3 ***).

In dieſer Atmoſphäre muß durch die Attractionen der Sonne und des Monds eine der Ebbe und Fluth des Mee-

*) A. a. O. Chap. II. n. 14. pag. 209.
**) A. a. O. L. V. Chap. I. n. 11. 12. pag. 239. et ſuiv.
***) A. a. O. L. III. Chap. VII. n. 47. pag. 169.

res ähnliche Oscillation hervorgebracht werden. Aber so wohl die Winde, als die Veränderungen des Barometerstandes, welche hieraus entstehen, sind sehr gering. Wenn die Sonne und der Mond in ihren mittleren Abständen von der Erde und in dem Aequator sich befinden; so ist in den Syzygien der gröste Raum, welchen ein Lufttheilchen vermöge der vereinigten Wirkungen dieser Gestirne in einer Sekunde durchlauft, kleiner als 3 Zolle, und für denselben Stand der Sonne und des Monds beträgt die von ihren Wirkungen herrührende Veränderung der Barometerhöhe von der kleinsten Höhe bis zur grösten unter dem Aequator 0,2795 Linien *). Wegen der großen Beweglichkeit der Atmosphäre kann übrigens eine sehr kleine Ursache die Quelle sehr beträchtlicher Veränderungen werden.

Die Attraction der Sonne und des Monds bringt weder in dem Meer, noch in der Atmosphäre eine beständige Bewegung von Morgen gegen Abend hervor. Die beständigen Ostwinde (vents alisés, trade-winds), welche man zwischen den Wendekreisen beobachtet, müßen also eine andere Ursache haben, wahrscheinlich folgende **). Wenn die, mehrerer Einfachheit halber in der Ebene des Aequators angenommene Sonne durch ihre Wärme die unter dem Aequator befindliche Luftsäulen ausdehnt, und sie über ihre wahre Gleichgewichtsfläche erhebt; so müßen sie in dem oberen Theil der Atmosphäre vermöge ihres Gewichts gegen die Pole hin abfließen, und zu gleicher Zeit muß in dem unteren Theil von den gegen die Pole hin liegenden Erdstrichen eine kühlere Luft herbeyströmen, welche die unter dem Aequator verdünnte Luft ersetzt. Es entstehen also zwey einander entgegengesetzte Luftströme, der eine in dem unteren Theil der Atmosphäre, der andere in dem oberen. Nun ist die wahre von der Umdrehungsbewegung der Erde herrührende Geschwindigkeit der Luft desto kleiner, je näher sie bey den Polen ist; folglich muß sie, wenn sie gegen den Aequator vorrückt, sich langsamer umdrehen, als die correspon-

*) Méc. cél. T. II. L. IV. Ch. IV. n. 44. pag. 296. 297.
**) Expos. du Monde pag. 277. De Lüc Ideen über die Meteorol. II. Th. §. 840.

direnden Theile der Erde, und die auf ihrer Oberfläche befindlichen Körper müßen auf sie mit dem Ueberschuß ihrer Geschwindigkeit stoßen, mithin durch die Zurückwirkung der Luft einen Widerstand leiden, welcher nach einer der Umdrehungsbewegung der Erde entgegengesetzten Richtung wirkt. Folglich scheint einem Beobachter, der sich in Ruhe glaubt, ein Wind nach einer Richtung zu wehen, welche der Richtung der Umdrehungsbewegung der Erde entgegengesetzt ist, das ist, von Morgen gegen Abend.

§. 368. Bald nach dem Untergang und kurz vor dem Anfang der Sonne beobachtet man zuweilen, besonders im Frühjahr und Herbst, ein weißes der Milchstraße ähnliches aber helleres von der Sonne aus im Thierkreise fortgehendes an seinem oberen Ende spitzig zulaufendes Licht, welches man das Zodiakallicht nennt. Die Spitze desselben steht 90 bis 100 Grade von dem Mittelpunkt der Sonne ab, woraus folgt, daß es sich über die Erdbahn hinaus erstrecken muß. Nach Cassini's Beobachtungen fällt seine größte Ausdehnung in die Richtung des Sonnenäquators, und man hielt es daher für wahrscheinlich, daß dieses Licht die Sonnenatmosphäre sey, welche durch die Axendrehung der Sonne eine sehr abgeplattete Gestalt angenommen habe. Vermöge des vorhergehenden §. kann sich aber die Sonnenatmosphäre nicht weiter als bis auf diejenige Distanz von ihr erstrecken, in welcher ein Planet sich von der Sonne befinden müßte, dessen Umlaufszeit der Umdrehungszeit der Sonne um ihre Axe, d. i. $25\frac{1}{2}$ Tagen (§. 58.), gleich wäre. Folglich reicht die Sonnenatmosphäre bey weitem nicht bis an die Bahn des Merkurs. Ferner kann das Verhältniß der kleinen Axe dieser Atmosphäre zu der großen nicht kleiner seyn als das Verhältniß von 2 : 3, und das Zodiakallicht erscheint unter der Gestalt einer sehr abgeplatteten Linse; folglich kann auch aus diesem Grund das Fluidum, welches uns das Thierkreislicht zurückwirft, nicht die Sonnenatmosphäre seyn, und weil es die Sonne umgiebt; so muß es um dieselbe nach denselben Gesetzen umlaufen, nach welchen die Planeten ihre Umläufe um die Sonne ma-

chen, woher es kommen mag, daß dieses Fluidum den Bewegungen der Planeten keinen bemerkbaren Widerstand entgegensetzt. Eben so wenig scheinen die neueren über die Polar- und Aequatorial-Durchmesser der Sonne angestellten Untersuchungen der Hypothese günstig zu seyn, daß die Sonne ein dunkler von einer Lichtatmosphäre umgebener Körper sey. Denn vermöge der Axendrehung der Sonne müßte dieses Fluidum die Gestalt eines unter den Polen zusammengedrückten Sphäroids annehmen, mithin der Polardurchmesser kleiner seyn als der Aequatorialdurchmesser. Hr. von Lindenau fand aber aus mehr als 2000 Maskelyne'schen Beobachtungen für die mittlere Distanz der Sonne von der Erde den ersteren = 32′ 5″,82, den letzteren = 32′ 1″,10 *). Sind diese Resultate richtig; so kann die Oberfläche der Sonne mit keinem Fluidum bedeckt seyn, weil das Gleichgewicht bey dieser Figur nicht bestehen könnte. Mit dieser unter den Polen ablangen Gestalt der Sonne hängt eine periodische Veränderung ihres in der Richtung des Aequators der Himmelskugel genommenen Durchmessers genau zusammen, so daß der Unterschied der horizontalen und vertikalen Sonnendurchmesser nicht aus der Verschiedenheit der Beobachtungsmethoden allein scheint erklärt werden zu können. Jener Durchmesser muß nemlich unter übrigens gleichen Umständen desto größer seyn, je größer der Winkel ist, welchen der Sonnenäquator mit dem Aequator der Himmelskugel macht.

Aus der ganzen Reihe der Maskelyne'schen Beobachtungen schien auch eine jährliche successive Verminderung des Sonnenhalbmessers zu folgen. Hr. von Lindenau erhielt den mittleren Aequatorialhalbmesser der Sonne in ihrer mittleren Distanz von der Erde aus den Beobachtungen **)

von 1765 — 76 = 961″,66
1776 — 87 = 960″,22
1787 — 98 = 959,77.

Allein die früheren Bradley'schen Beobachtungen gaben 961″,86, und die Piazzi'schen 961″,21 nahe mit Maskelyne's ersten Beobachtungsjahren übereinstimmend, und daher

*) Monatl. Corr. Jun. 1810. pag. 481.
**) A. a. O. pag. 476.

daher scheint jene Verminderung des Sonnenhalbmessers in einer durch das Alter verminderten Reizbarkeit des Auges für den Eindruck des Lichts zu suchen zu seyn *). Folgende Tafel zeigt die periodischen Veränderungen des in der Richtung des Aequators der Himmelskugel genommenen und auf die mittlere Distanz reducirten Halbmessers der Sonne, welche sich aus Maskelyne's Beobachtungen von 1787 bis 1798 ergeben haben:

Januar	15′ 59″,70	Julius	15′ 59″,52
Februar	59,99	August	59,98
März	60,41	September	60,19
April	59,80	October	60,10
May	59,81	November	60,07
Junius	59,00	December	58,75

§. 369. Der Punkt, in welchem die Schwungkraft der Schwere gleich ist, liegt desto näher bey dem Körper, je geschwinder seine Axendrehung ist. Wenn man also annimmt, daß die Atmosphäre des Körpers sich bis an diese Gränze erstrecke, und sich an seiner Oberfläche aus irgend einer Ursache nach und nach verdichte; so werden die an der Gränze der Atmosphäre in der Ebene des Aequators liegende Theilchen dem Körper sich nicht nähern können, sie werden sich von dem übrigen Theil der Atmosphäre trennen, und nach den Gesetzen der Centralbewegung um den Körper umlaufen. Diejenigen Theilchen, welche sich dem Mittelpunkt des Körpers genähert haben, werden, weil ihre wahre Geschwindigkeit größer war, als die Geschwindigkeit der näher bey dem Mittelpunkt liegenden, eine geschwindere Umdrehungsbewegung als der Körper selbst haben, und daher mit dem Ueberschuß ihrer Winkelgeschwindigkeit über die des Körpers vermöge des Widerstands und der Friktion auf den Körper wirken. Seine Umdrehungsbewegung wird also immer mehr und mehr sich beschleunigen, und die äusserste Gränze der Atmosphäre wird sich beständig dem Mittelpunkt des Körper nähern. Die Atmosphäre wird also nach und nach in der Ebene ihres Aequators Zonen von Flüßigkeiten absetzen, welche fortfahren werden, nach den Gesetzen

*) A. a. O. pag. 478.

der Centralbewegung um den Körper umzulaufen, weil ihre Schwungkraft ihrer Schwere gleich ist. Da aber diese Gleichheit in Beziehung auf die von dem Aequator entfernte Theilchen nicht statt findet; so werden diese nicht aufhören, einen Theil der Atmosphäre des Körpers auszumachen. La Place hält es für wahrscheinlich, daß die Ringe des Saturns ähnliche von seiner Atmosphäre abgesetzte Zonen seyen *).

Allgemeine Betrachtungen über das Weltsystem **).

§. 370. Alle Planeten bewegen sich um die Sonne nach einerley Richtung, nemlich von Abend gegen Morgen, in wenig gegen einander geneigten Ebenen, zwischen welchen die Ebene des Sonnenäquators das Mittel hält. Die Nebenplaneten laufen um ihre Hauptplaneten nahe in derselben Ebene und nach derselben Richtung, nur die Trabanten des Uranus, welcher sich an der Gränze des Sonnensystems, so weit wir es kennen, befindet, machen eine Ausnahme hievon. Ferner drehen sich die Sonne und die Planeten, deren Umdrehungsbewegung man beobachtet hat, nach einerley Richtung, nemlich ebenfalls von Abend gegen Morgen, und ungefähr in der Ebene des Sonnenäquators um ihre Axen. Endlich sind die Bahnen der Planeten und der Nebenplaneten nahe kreisförmig. Die Ursache, welche die Bewegungen der Planeten hervorgebracht oder ihnen ihre Richtungen gegeben hat, muß also alle diese Körper umfaßt haben, und wegen ihrer erstaunlichen Entfernungen von einander, ein Fluidum von einer unermeßlichen Ausdehnung gewesen seyn. Dieses Fluidum muß die Sonne nach Art einer Atmosphäre umgeben haben, um denselben nach einerley Richtung eine beynahe kreisförmige Bewegung um die Sonne haben mittheilen zu können. Die Betrachtung der Bewegungen der Planeten leitet also auf die Vermuthung, daß sich die Sonnenatmosphäre vermöge einer ausserordentlichen Hitze ursprünglich über alle Planetenbahnen hinaus erstreckt, und sich nach und nach in ihre gegenwärtige Gränzen zusammengezogen habe. Eine ähnliche Ursache mag den lebhaften Glanz des zu Anfang des

*) Expos. du Syst. du Monde. pag. 257.

**) A. a. O. pag. 391. et suiv. Cosmologische Briefe über die Einrichtung des Weltbaues von J. H. Lambert.

Novembers 1572 in der Cassiopea erschienenen Fixsterns hervorgebracht haben, welcher in den ersten Tagen seiner Erscheinung den Sirius und Jupiter an Glanz übertraf, und bey Tage gesehen werden konnte, von dem December 1572 an nach und nach abnahm, und im März 1574 wieder verschwand. Tycho beobachtete seine gerade Aufsteigung = 0° 26', seine Abweichung 61° 47'.

Die große Excentricität der Cometenbahnen führt auf dasselbe Resultat, und zeigt augenscheinlich, daß viele weniger excentrische Bahnen verschwunden seyn müßen, welches um die Sonne eine weit über die Perihelien der beobachtbaren Cometen sich erstreckende Atmosphäre voraussetzt, deren Widerstand die Bewegung dererjenigen, welche durch diese Atmosphäre während der Dauer ihrer großen Ausdehnung gegangen sind, vernichtet, und sie mit der Sonne vereinigt hat. Man sieht also, daß es jetzt nur noch solche Cometen geben kann, welche ausserhalb dieser Atmosphäre sich befanden, und daß ihre Bahnen sehr excentrisch seyn müßen, weil wir nur diejenige beobachten können, welche in ihrem Perihelium nahe genug zu der Sonne kommen. Zu gleicher Zeit sieht man, daß ihre Neigungen dieselbige Mannigfaltigkeit zeigen müßen, als wenn der Zufall diese Körper hingeworfen hätte, weil die Sonnenatmosphäre keinen Einfluß auf ihre Bewegungen haben konnte. Es lassen sich also die lange Dauer der Umlaufszeiten der Cometen, die große Excentricität ihrer Bahnen, und die Mannigfaltigkeit ihrer Neigungen sehr natürlich mittelst dieser Atmosphäre erklären.

Aber nun fragt es sich, wie sie die Rotations- und Umlaufsbewegungen der Planeten und ihrer Trabanten bestimmt habe. Wären diese Körper innerhalb der Sonnenatmosphäre befindlich gewesen; so hätten sie wegen des Widerstands, welchen sie in dieser Atmosphäre erlitten haben würden, auf die Sonne fallen müßen. Man kann also vermuthen, daß die Planeten sich an den successiven Gränzen der Sonnenatmosphäre durch die Verdichtung der Zonen gebildet haben, welche sie nach und nach in der Ebene ihres Aequators auf die vorhin gezeigte Art abgesetzt hat. Diese Zonen von Dämpfen haben durch ihre Erkältung flüßige oder feste Rin-

res ähnliche Oscillation hervorgebracht werden. Aber so wohl die Winde, als die Veränderungen des Barometerstandes, welche hieraus entstehen, sind sehr gering. Wenn die Sonne und der Mond in ihren mittleren Abständen von der Erde und in dem Aequator sich befinden; so ist in den Syzygien der gröste Raum, welchen ein Lufttheilchen vermöge der vereinigten Wirkungen dieser Gestirne in einer Sekunde durchlauft, kleiner als 3 Zolle, und für denselben Stand der Sonne und des Monds beträgt die von ihren Wirkungen herrührende Veränderung der Barometerhöhe von der kleinsten Höhe bis zur grösten unter dem Aequator 0,2795 Linien *). Wegen der großen Beweglichkeit der Atmosphäre kann übrigens eine sehr kleine Ursache die Quelle sehr beträchtlicher Veränderungen werden.

Die Attraction der Sonne und des Monds bringt weder in dem Meer, noch in der Atmosphäre eine beständige Bewegung von Morgen gegen Abend hervor. Die beständigen Ostwinde (vents alisés, trade-winds), welche man zwischen den Wendekreisen beobachtet, müßen also eine andere Ursache haben, wahrscheinlich folgende **). Wenn die, mehrerer Einfachheit halber in der Ebene des Aequators angenommene Sonne durch ihre Wärme die unter dem Aequator befindliche Luftsäulen ausdehnt, und sie über ihre wahre Gleichgewichtsfläche erhebt; so müßen sie in dem oberen Theil der Atmosphäre vermöge ihres Gewichts gegen die Pole hin abfließen, und zu gleicher Zeit muß in dem unteren Theil von den gegen die Pole hin liegenden Erdstrichen eine kühlere Luft herbeyströmen, welche die unter dem Aequator verdünnte Luft ersetzt. Es entstehen also zwey einander entgegengesetzte Luftströme, der eine in dem unteren Theil der Atmosphäre, der andere in dem oberen. Nun ist die wahre von der Umdrehungsbewegung der Erde herrührende Geschwindigkeit der Luft desto kleiner, je näher sie bey den Polen ist; folglich muß sie, wenn sie gegen den Aequator vorrückt, sich langsamer umdrehen, als die correspon-

*) Méc. cél. T. II. L. IV. Ch. IV. n. 44. pag. 296. 297.
**) Expos. du Monde pag. 277. De Lüc Ideen über die Meteorol. II. Th. §. 840.

direnden Theile der Erde, und die auf ihrer Oberfläche befindlichen Körper müßen auf sie mit dem Ueberschuß ihrer Geschwindigkeit stoßen, mithin durch die Zurückwirkung der Luft einen Widerstand leiden, welcher nach einer der Umdrehungsbewegung der Erde entgegengesetzten Richtung wirkt. Folglich scheint einem Beobachter, der sich in Ruhe glaubt, ein Wind nach einer Richtung zu wehen, welche der Richtung der Umdrehungsbewegung der Erde entgegengesetzt ist, das ist, von Morgen gegen Abend.

§. 368. Bald nach dem Untergang und kurz vor dem Anfang der Sonne beobachtet man zuweilen, besonders im Frühjahr und Herbst, ein weißes der Milchstraße ähnliches aber helleres von der Sonne aus im Thierkreise fortgehendes an seinem oberen Ende spitzig zulaufendes Licht, welches man das Zodiakallicht nennt. Die Spitze desselben steht 90 bis 100 Grade von dem Mittelpunkt der Sonne ab, woraus folgt, daß es sich über die Erdbahn hinaus erstrecken muß. Nach Cassini's Beobachtungen fällt seine größte Ausdehnung in die Richtung des Sonnenäquators, und man hielt es daher für wahrscheinlich, daß dieses Licht die Sonnenatmosphäre sey, welche durch die Axendrehung der Sonne eine sehr abgeplattete Gestalt angenommen habe. Vermöge des vorhergehenden §. kann sich aber die Sonnenatmosphäre nicht weiter als bis auf diejenige Distanz von ihr erstrecken, in welcher ein Planet sich von der Sonne befinden müßte, dessen Umlaufszeit der Umdrehungszeit der Sonne um ihre Axe, d. i. 25 $\frac{1}{2}$ Tagen (§. 58.), gleich wäre. Folglich reicht die Sonnenatmosphäre bey weitem nicht bis an die Bahn des Merkurs. Ferner kann das Verhältniß der kleinen Axe dieser Atmosphäre zu der großen nicht kleiner seyn als das Verhältniß von 2 : 3, und das Zodiakallicht erscheint unter der Gestalt einer sehr abgeplatteten Linse; folglich kann auch aus diesem Grund das Fluidum, welches uns das Thierkreislicht zurückwirft, nicht die Sonnenatmosphäre seyn, und weil es die Sonne umgiebt; so muß es um dieselbe nach denselben Gesetzen umlaufen, nach welchen die Planeten ihre Umläufe um die Sonne ma-

chen, woher es kommen mag, daß dieses Fluidum den Bewegungen der Planeten keinen bemerkbaren Widerstand entgegensetzt. Eben so wenig scheinen die neueren über die Polar- und Aequatorial-Durchmesser der Sonne angestellten Untersuchungen der Hypothese günstig zu seyn, daß die Sonne ein dunkler von einer Lichtatmosphäre umgebener Körper sey. Denn vermöge der Axendrehung der Sonne müßte dieses Fluidum die Gestalt eines unter den Polen zusammengedrückten Sphäroids annehmen, mithin der Polardurchmesser kleiner seyn als der Aequatorialdurchmesser. Hr. von Lindenau fand aber aus mehr als 2000 Maskelyne'schen Beobachtungen für die mittlere Distanz der Sonne von der Erde den ersteren = 32′ 5″,82, den letzteren = 32′ 1″,10 *). Sind diese Resultate richtig; so kann die Oberfläche der Sonne mit keinem Fluidum bedeckt seyn, weil das Gleichgewicht bey dieser Figur nicht bestehen könnte. Mit dieser unter den Polen ablangen Gestalt der Sonne hängt eine periodische Veränderung ihres in der Richtung des Aequators der Himmelskugel genommenen Durchmessers genau zusammen, so daß der Unterschied der horizontalen und vertikalen Sonnendurchmesser nicht aus der Verschiedenheit der Beobachtungsmethoden allein scheint erklärt werden zu können. Jener Durchmesser muß nemlich unter übrigens gleichen Umständen desto grösser seyn, je größer der Winkel ist, welchen der Sonnenäquator mit dem Aequator der Himmelskugel macht.

Aus der ganzen Reihe der Maskelyne'schen Beobachtungen schien auch eine jährliche successive Verminderung des Sonnenhalbmessers zu folgen. Hr. von Lindenau erhielt den mittleren Aequatorialhalbmesser der Sonne in ihrer mittleren Distanz von der Erde aus den Beobachtungen **)

von 1765 — 76 = 961″,66
1776 — 87 = 960″,22
1787 — 98 = 959,77.

Allein die früheren Bradley'schen Beobachtungen gaben 961″,86, und die Piazzi'schen 961″,21 nahe mit Maskelyne's ersten Beobachtungsjahren übereinstimmend, und daher

*) Monatl. Corr. Jun. 1810. pag. 481.
**) A. a. O. pag. 476.

daher ſcheint jene Verminderung des Sonnenhalbmeſſers in einer durch das Alter verminderten Reizbarkeit des Auges für den Eindruck des Lichts zu ſuchen zu ſeyn *). Folgende Tafel zeigt die periodiſchen Veränderungen des in der Richtung des Aequators der Himmelskugel genommenen und auf die mittlere Diſtanz reducirten Halbmeſſers der Sonne, welche ſich aus Maskelyne's Beobachtungen von 1787 bis 1798 ergeben haben:

Januar	15′ 59″,70	Julius	15′ 59″.52
Februar	59,99	Auguſt	59.98
März	60,41	September	60.19
April	59,80	October	60,10
May	59,81	November	60,07
Junius	59,00	December	58,75

§. 369. Der Punkt, in welchem die Schwungkraft der Schwere gleich iſt, liegt deſto näher bey dem Körper, je geſchwinder ſeine Axendrehung iſt. Wenn man alſo annimmt, daß die Atmoſphäre des Körpers ſich bis an dieſe Gränze erſtrecke, und ſich an ſeiner Oberfläche aus irgend einer Urſache nach und nach verdichte; ſo werden die an der Gränze der Atmoſphäre in der Ebene des Aequators liegende Theilchen dem Körper ſich nicht nähern können, ſie werden ſich von dem übrigen Theil der Atmoſphäre trennen, und nach den Geſetzen der Centralbewegung um den Körper umlaufen. Diejenigen Theilchen, welche ſich dem Mittelpunkt des Körpers genähert haben, werden, weil ihre wahre Geſchwindigkeit größer war, als die Geſchwindigkeit der näher bey dem Mittelpunkt liegenden, eine geſchwindere Umdrehungsbewegung als der Körper ſelbſt haben, und daher mit dem Ueberſchuß ihrer Winkelgeſchwindigkeit über die des Körpers vermöge des Widerſtands und der Friktion auf den Körper wirken. Seine Umdrehungsbewegung wird alſo immer mehr und mehr ſich beſchleunigen, und die äuſſerſte Gränze der Atmoſphäre wird ſich beſtändig dem Mittelpunkt des Körper nähern. Die Atmoſphäre wird alſo nach und nach in der Ebene ihres Aequators Zonen von Flüßigkeiten abſetzen, welche fortfahren werden, nach den Geſetzen

*) S. a. O. pag. 478.

der Centralbewegung um den Körper umzulaufen, weil ihre Schwungkraft ihrer Schwere gleich ist. Da aber diese Gleichheit in Beziehung auf die von dem Aequator entfernte Theilchen nicht statt findet; so werden diese nicht aufhören, einen Theil der Atmosphäre des Körpers auszumachen. La Place hält es für wahrscheinlich, daß die Ringe des Saturns ähnliche von seiner Atmosphäre abgesetzte Zonen seyen *).

Allgemeine Betrachtungen über das Weltsystem **).

§. 370. Alle Planeten bewegen sich um die Sonne nach einerley Richtung, nemlich von Abend gegen Morgen, in wenig gegen einander geneigten Ebenen, zwischen welchen die Ebene des Sonnenäquators das Mittel hält. Die Nebenplaneten laufen um ihre Hauptplaneten nahe in derselben Ebene und nach derselben Richtung, nur die Trabanten des Uranus, welcher sich an der Gränze des Sonnensystems, so weit wir es kennen, befindet, machen eine Ausnahme hievon. Ferner drehen sich die Sonne und die Planeten, deren Umdrehungsbewegung man beobachtet hat, nach einerley Richtung, nemlich ebenfalls von Abend gegen Morgen, und ungefähr in der Ebene des Sonnenäquators um ihre Axen. Endlich sind die Bahnen der Planeten und der Nebenplaneten nahe kreisförmig. Die Ursache, welche die Bewegungen der Planeten hervorgebracht oder ihnen ihre Richtungen gegeben hat, muß also alle diese Körper umfaßt haben, und wegen ihrer erstaunlichen Entfernungen von einander, ein Fluidum von einer unermeßlichen Ausdehnung gewesen seyn. Dieses Fluidum muß die Sonne nach Art einer Atmosphäre umgeben haben, um denselben nach einerley Richtung eine beynahe kreisförmige Bewegung um die Sonne haben mittheilen zu können. Die Betrachtung der Bewegungen der Planeten leitet also auf die Vermuthung, daß sich die Sonnenatmosphäre vermöge einer ausserordentlichen Hitze ursprünglich über alle Planetenbahnen hinaus erstreckt, und sich nach und nach in ihre gegenwärtige Gränzen zusammengezogen habe. Eine ähnliche Ursache mag den lebhaften Glanz des zu Anfang des

*) Expos. du Syst. du Monde. pag. 257.

**) A. a. O. pag. 391. et suiv. Cosmologische Briefe über die Einrichtung des Weltbaues von J. H. Lambert.

Novembers 1572 in der Caſſiopea erſchienenen Fixſterns hervorgebracht haben, welcher in den erſten Tagen ſeiner Erſcheinung den Sirius und Jupiter an Glanz übertraf, und bey Tage geſehen werden konnte, von dem December 1572 an nach und nach abnahm, und im März 1574 wieder verſchwand. Tycho beobachtete ſeine gerade Aufſteigung = 0° 26', ſeine Abweichung 61° 47'.

Die große Excentricität der Cometenbahnen führt auf daſſelbe Reſultat, und zeigt augenſcheinlich, daß viele weniger excentriſche Bahnen verſchwunden ſeyn müßen, welches um die Sonne eine weit über die Perihelien der beobachtbaren Cometen ſich erſtreckende Atmoſphäre vorausſetzt, deren Widerſtand die Bewegung derjenigen, welche durch dieſe Atmoſphäre während der Dauer ihrer großen Ausdehnung gegangen ſind, vernichtet, und ſie mit der Sonne vereinigt hat. Man ſieht alſo, daß es jetzt nur noch ſolche Cometen geben kann, welche auſſerhalb dieſer Atmoſphäre ſich befanden, und daß ihre Bahnen ſehr excentriſch ſeyn müßen, weil wir nur diejenige beobachten können, welche in ihrem Perihelium nahe genug zu der Sonne kommen. Zu gleicher Zeit ſieht man, daß ihre Neigungen dieſelbige Mannigfaltigkeit zeigen müßen, als wenn der Zufall dieſe Körper hingeworfen hätte, weil die Sonnenatmoſphäre keinen Einfluß auf ihre Bewegungen haben konnte. Es laſſen ſich alſo die lange Dauer der Umlaufszeiten der Cometen, die große Excentricität ihrer Bahnen, und die Mannigfaltigkeit ihrer Neigungen ſehr natürlich mittelſt dieſer Atmoſphäre erklären.

Aber nun fragt es ſich, wie ſie die Rotations- und Umlaufsbewegungen der Planeten und ihrer Trabanten beſtimmt habe. Wären dieſe Körper innerhalb der Sonnenatmoſphäre befindlich geweſen; ſo hätten ſie wegen des Widerſtands, welchen ſie in dieſer Atmoſphäre erlitten haben würden, auf die Sonne fallen müßen. Man kann alſo vermuthen, daß die Planeten ſich an den ſucceſſiven Gränzen der Sonnenatmoſphäre durch die Verdichtung der Zonen gebildet haben, welche ſie nach und nach in der Ebene ihres Aequators auf die vorhin gezeigte Art abgeſetzt hat. Dieſe Zonen von Dämpfen haben durch ihre Erkältung flüßige oder feſte Rin-

ge um den Centralkörper bilden können. Aber dieser ausserordentliche Fall scheint in dem Sonnensystem nur in Beziehung auf den Saturn statt zu haben. Im allgemeinen haben sie sich zu mehreren Kugeln vereinigt, und, wenn eine derselben die übrigen stark genug anzog; so hat ihre Vereinigung einen beträchtlichen Planeten gebildet. Und weil die wahren Geschwindigkeiten der Theilchen des Rings von Dämpfen mit ihren Abständen von der Sonne wachsen; so haben die aus ihrer Vereinigung gebildeten Kugeln sich in der Richtung ihrer Umlaufsbewegungen um ihre Axen drehen müßen. Die vorhin angeführten Phänomene fließen also ganz natürlich aus dieser Hypothese: die Ringe des Saturns, und die Entdeckung der vier kleinen zwischen Mars und Jupiter in nahe gleichen Distanzen um die Sonne laufenden Planeten, geben ihr einen neuen Grad von Wahrscheinlichkeit. Endlich, wenn sich in den von der Sonnenatmosphäre nach und nach abgesetzten Zonen Theilchen befanden, welche zu flüchtig waren, um sich unter sich, oder mit den Himmelskörpern zu vereinigen; so müßen sie uns, indem sie ihre Umlaufsbewegung um die Sonne fortsetzen, alle Erscheinungen des Zodiakallichts darbieten, ohne den Planeten einen merklichen Widerstand entgegenzusetzen.

§. 371. Was es nun auch mit dieser Hypothese über den Ursprung unseres Sonnensystems, in welche La Place selbst, da sie kein Resultat der Beobachtung oder des Calculs ist, einiges Mißtrauen setzt, vor eine Beschaffenheit haben mag; so ist wenigstens so viel gewiß, daß seine Elemente so angeordnet sind, daß es, wenn es durch keine fremde Ursachen gestört wird, die gröste Stabilität haben muß. Schon allein deswegen, daß die Haupt- und Neben-Planeten in beynahe kreisförmigen und wenig gegen einander geneigten Bahnen sich nach einerley Richtung bewegen, schwankt dieses System nur um einen gewißen mittleren Zustand hin und her, von welchem es sich niemals um mehr, als um sehr kleine Größen entfernt. Die mittleren Rotations- und Umlaufs-Bewegungen dieser verschiedenen Körper sind gleichförmig, und ihre mittleren Abstände von den Mittelpunkten

der auf ſie wirkenden Hauptkräfte ſind conſtant. Alle Secularungleichheiten ſind periodiſch. Die gröſten ſind diejenigen, welche die mittleren Bewegungen des Monds in Beziehung auf ſeine Knoten, ſein Perigäum, und auf die Sonne betreffen. Sie ſteigen auf mehrere ganze Umläufe, und kommen erſt nach ſehr vielen Jahrhunderten wieder. In dieſer großen Zwiſchenzeit würden ohne die Attraction des Erdſphäroids nach und nach alle Theile der Mondsoberfläche gegen die Erde gekehrt werden. Aber dieſe Attraction, welche die Rotation des Monds an ſeinen großen Ungleichheiten Theil nehmen macht, richtet beſtändig dieſelbe Halbkugel dieſes Trabanten gegen uns, und macht die andere Halbkugel auf immer unſichtbar. Ebenſo hat die gegenſeitige Anziehung der drey erſten Trabanten des Jupiters urſprünglich jenes ſchöne Verhältniß zwiſchen ihren mittleren Bewegungen hervorgebracht, und erhält es auf immer (§. 344.). Vermöge der Anziehungen der Himmelskörper iſt die Dauer des Jahrs beſtändig ſehr nahe dieſelbe, die in enge Gränzen eingeſchloſſene Veränderung der Neigung der Ekliptik gegen den Aequator kann nur geringe Verſchiedenheiten in der Länge der Tage um die Zeit der Solſtitien, und in der Temperatur der Jahrszeiten herbeyführen, niemals wird ſie einen beſtändigen Frühling auf der ganzen Erde hervorbringen. Die Natur ſcheint an dem Himmel alles zur Sicherheit der Dauer des Planetenſyſtems angeordnet zu haben. Schon ſind einige dieſer Phänomene auf die erſten Naturgeſetze zurückgeführt. So iſt z. B. die Unveränderlichkeit der Pole der Erde auf ihrer Oberfläche, und die Stabilität des Gleichgewichts der Meere, welche beyde für die Erhaltung der organiſirten Körper gleich nöthig ſind, nichts anderes, als ein einfaches Reſultat der Rotationsbewegung, und der allgemeinen Schwere. Vermöge ihrer Umdrehung hat ſich die Erde abgeplattet, und ihre Umdrehungsaxe iſt eine der Hauptaxen geworden, um welche die Rotationsbewegung unveränderlich iſt. Vermöge der Schwere haben ſich die dichteſten Schichten der Erde ihrem Mittelpunkt genähert, und ihre mittlere Dichtigkeit übertrifft die der Gewäſſer, welche ſie bedecken, welches hinreichend iſt,

um die Stabilität des Gleichgewichts der Meere zu sichern, und dem Toben ihrer Wellen Einhalt zu thun. Endlich, sagt La Place, wenn die Muthmaßungen, welche ich über den Ursprung des Planetensystems aufgestellt habe, gegründet sind; so ist auch die Stabilität dieses Systems eine Folge der allgemeinen Gesetze der Bewegung. Diese, und einige andere auf ähnliche Art erklärte Phänomene berechtigen uns, zu glauben, daß alle von diesen Gesetzen nach mehr oder weniger versteckten Beziehungen abhängen, über welche es übrigens klüger ist, das Geständniß der Unwissenheit abzulegen, als eingebildete Ursachen an ihre Stelle zu setzen.

§. 372. Wir wollen nun unsere Blicke über das Sonnensystem hinaus werfen. Unzählige Sonnen, welche die Mittelpunkte ebenso vieler Planetensysteme seyn können, sind in dem unermeßlichen Raum und in einer solchen Distanz von der Erde verbreitet, daß aus ihrem Mittelpunkt gesehen der ganze Durchmesser der Erdbahn unmerklich ist. Mehrere Sterne leiden sehr merkwürdige Veränderungen ihrer Farbe und Helligkeit; es giebt andere, welche plözlich erschienen, und, nachdem sie einige Zeit mit einem sehr lebhaften Lichte geglänzt haben, verschwunden sind. Welche ungeheuere Veränderungen mußten auf der Oberfläche dieser großen Körper vorgehen, um in der Distanz, welche uns von ihnen trennt, merklich zu seyn? Um wie viel müßen sie diejenige übertreffen, welche wir auf der Oberfläche der Sonne beobachten? Alle diese unsichtbar gewordenen Körper befinden sich an der Stelle, wo sie beobachtet wurden, weil sie dieselbe während der Zeit ihrer Sichtbarkeit nicht verändert haben. Es giebt also in dem Himmelsraum dunkele, ebenso große, und vielleicht ebenso viele Körper, als die Fixsterne. Ein Verzeichniß dieser nur auf kurze Zeit erscheinenden Sterne; ihre im Augenblick ihres größten Glanzes beobachtete Lage; die Bestimmung aller veränderlichen Sterne und der periodischen Veränderungen ihres Lichts; endlich die eigenen Bewegungen dieser großen Körper, welche, indem sie ihrer gegenseitigen Attraction, und wahrscheinlich ursprünglichen Impulsionen gehorchen, unermeßliche Bahnen beschreiben; diß wer-

den in Beziehung auf die Fixſterne die Hauptgegenſtände der künftigen Aſtronomie ſeyn.

Die Fixſterne ſind, wie ſchon der erſte Anblick zeigt, ſehr ungleichförmig an der Oberfläche der ſcheinbaren Himmelskugel vertheilt. Mehrere bilden kleine Sterngruppen, in welchen man mit dem bloßen Auge viele kleine Sterne unterſcheiden kann. Andere zeigen ſich dem bloßen Auge als Nebelflecke, welche durch ſtarke Teleſkope in eine unzählbare Menge kleiner Sterne ſich auflöſen, wiederum andere erſcheinen ſelbſt durch dieſe nur mit einem weißlichten Schimmer. Herſchel hat mehrere Tauſende ſolcher Nebelflecke durch ſeine Teleſkope beobachtet, welche ſehr wahrſcheinlich aus einer großen Menge ſcheinbar nahe bey einander ſtehender Fixſterne beſtehen, aber wegen ihrer großen Entfernung von uns und wegen der Irradiation des Lichts nicht mehr von einander unterſchieden werden können. Unſere Sonne und die hellſten Fixſterne machen wahrſcheinlich eine ſolche Sterngruppe aus, welche von unſerem Standpunkt aus geſehen den Himmel zu umgeben ſcheint, und die Milchſtraße bildet. Die große Anzahl von Sternen, welche man in dieſer Gegend des Himmels in einem kleinen Raum durch Teleſkope beobachtet *), zeigt uns die unermeßliche Diſtanz dieſer Sterne, welche den Abſtand des Sirius tauſendmal übertreffen muß, ſo daß ſehr wahrſcheinlich die Lichtſtralen der meiſten dieſer Sterne eine große Anzahl von Jahrhunderten gebraucht haben, um zu uns zu gelangen. Denken wir uns unſeren Standpunkt jenſeits der Milchſtraße; ſo würde von dort aus geſehen unſer Fixſternhimmel zuletzt in einen Nebelfleck von einem kleinen ſcheinbaren Durchmeſſer ſich verlieren. Es iſt alſo ſehr wahrſcheinlich, daß die meiſten Nebelflecke nicht anders als in einer ſehr großen Ferne geſehene Sternhaufen ſind, welche in kleineren Diſtanzen betrachtet das Anſehen der Milchſtraße haben würden. Die Entfernungen der Sterne von einander, welche eine jede ſolche Sterngruppe

*) Herſchel's Teleſkope löſen den Lichtſchimmer der Milchſtraße in lauter kleine Sterne auf. Nach ſeiner Behauptung iſt die Anzahl der Sterne, welche er in der Gegend der Keule des Orions in einem 15 Grade langen und 2 Grade breiten Streifen beobachtete, nicht geringer als 50000.

bilden, sind wenigstens tausendmal größer als der Abstand der Sonne von der Erde, man kann also nach der unzähligen Menge von Sternen, welche man in der Milchstraße beobachtet, über die erstaunliche Ausdehnung dieser Sterngruppen urtheilen. Bedenkt man noch die geringe scheinbare Größe und die große Anzahl der Nebelflecke, welche ohne alle Vergleichung weiter von einander entfernt sind, als die Sterne, welche sie bilden; so wird die Einbildungskraft, durch die Unermeßlichkeit des Weltalls in Erstaunen gesetzt, Mühe haben, sich die Gränzen desselben zu denken.

Aus diesen auf die teleskopischen Beobachtungen gegründeten Betrachtungen ergiebt sich, daß die Nebelflecke, welche scharf genug begränzt erscheinen, um ihre Mittelpunkte mit Genauigkeit beobachten zu können, in Beziehung auf uns diejenige himmlische Gegenstände sind, welche man noch am meisten als unbeweglich betrachten kann, und auf welche es schiklich ist, die Lage aller übrigen Gestirne zu beziehen. Es ergiebt sich ferner daraus, daß die Bewegungen unseres Sonnensystems sehr verwickelt sind. Der Mond beschreibt eine beynahe kreisförmige Bahn um die Erde, aber aus der Sonne gesehen beschreibt er eine Reihe von Epicykloiden, deren Mittelpunkte auf dem Umfang der Erdbahn liegen. Ebenso beschreibt die Erde eine Reihe von Epicykloiden, deren Mittelpunkte auf der Bahn liegen, welche die Sonne um den Schwerpunkt unseres Nebelflecks beschreibt. Endlich beschreibt die Sonne selbst eine Reihe von Epicykloiden, deren Mittelpunkte auf der krummen Linie liegen, welche der Schwerpunkt unseres Nebelflecks um den des Weltalls beschreibt. Die Astronomie ist schon dadurch weit vorgerückt, daß sie uns die Bewegung der Erde, und die Epicykloiden kennen lehrte, welche der Mond und die übrigen Nebenplaneten auf den Bahnen ihrer Hauptplaneten beschreiben. Es ist noch die Bahn der Sonne und die Bahn des Schwerpunkts ihres Nebelflecks zu bestimmen übrig. Aber wenn Jahrhunderte erfordert wurden, um die Bewegungen des Planetensystems kennen zu lernen; welche ungeheure Dauer wird die Bestimmung der Bewegung der Sonne und der Fixsterne erfordern? Die Beobachtungen fangen an, diese Bewegungen anzuzeigen.

Man verſuchte ſie durch das Fortrücken der Sonne allein zu erklären, und mehrere Beobachtungen laſſen ſich genau genug darſtellen, wenn man eine Bewegung des Sonnenſyſtems gegen das Sternbild des Herkules hin vorausſetzt. Andere Beobachtungen aber ſcheinen zu beweiſen, daß dieſe ſcheinbaren Bewegungen der Fixſterne eine Verbindung ihrer wirklichen Bewegungen mit der Bewegung der Sonne ſeyen. Der Durchmeſſer der Erde iſt eine hinreichend große Grundlinie, um die Entfernung des Monds von der Erde zu beſtimmen. Die jährliche Bewegung der Erde um die Sonne bringt den Beobachter an die zwey Endpunkte einer über 23000 mal größeren Grundlinie, mittelſt welcher es möglich war, die Bahnen der Planeten zu beſtimmen. Aber auch dieſe in Vergleichung mit der Größe der Erde ſehr große Diſtanz verſchwindet ſchon beynahe gegen die Entfernung der nächſten Fixſterne von uns, und nur das Fortrücken unſeres ganzen Sonnenſyſtems wird über die Bahn der Sonne, die Entfernung der Fixſterne, und über ihre wahren Bewegungen in den künftigen Jahrhunderten einigen Aufſchluß geben können.

Zuſatz zu §. 30.

Maskelyne ſetzte für das Jahr 1800 die gerade Aufſteigung des Athair (α Aquilæ) = 295° 15′ 15″,3, ihre jährliche Zunahme mit Inbegriff der eigenen Bewegung = 43″,77. Im Jahr 1802 zeigte er eine Verbeſſerung von + 3″,8 an, welche auch zu der geraden Aufſteigung aller übrigen für das Jahr 1800 von ihm beſtimmten Fixſterne zu addiren iſt *). Die franzöſiſchen Aſtronomen fanden aus den Greenwicher Beobachtungen dieſe Verbeſſerung = + 5″,5 **). Piazzi fand für das Jahr 1805 die gerade Aufſteigung des Procyon = 112° 16′ 17″,70, des Athair = 295° 9′ 0″,00, die erſte aus 188, die letztere aus 200 in der Nähe der Frühlings- und Herbſt-Aequinoctien während 1803, 1804 und 1805 gemachten Beobachtungen ***). Demnach iſt für das Jahr 1805

die gerade Aufſteig. des Procyon = 112° 16′ 14″,7 nach Maskelyne
= 112 16 16,4 nach d. franz. Aſtr.
= 112 16 17,7 nach Piazzi,

*) Monatl. Corr. Jan. 1802. pag. 61.
**) Monat. Corr. Jul. 1803. pag. 96, 97.
***) M. C. Aug. 1807. pag. 183.

und die gerade Aufſteig. d. Athair = 295° 18′ 57″,95 nach Maskelyne
= 295 18 59,65 nach d. franz. Aſt.
= 295 19 0,00 nach Piazzi.

Folgende Tafel iſt ein Auszug aus dem neueſten Piazzi'ſchen Fixſternverzeichniß (Libro Sesto de R. Osservatorio di Palermo.). Die gerade Aufſteigung iſt in Zeit angegeben. Werden die angegebenen Differenzen zu Piazzi's Angaben mit ihren Zeichen hinzugefügt; ſo erhält man die gerade Aufſteigung und Abweichung nach dem neueſten Maskelyne'ſchen Verzeichniß von 36 Sternen.

Namen d. Sterne.	Mittlere AR. 1805.	Jährl. Praec.	Eigne Bewegung.	Diff. mit Maskelyne.
γ Pegasi . .	0U 3′ 12,″42	3,″074	— 0,″002	— 0,″09
α Arietis . .	1 56 12, 36	3, 339	+ 0, 013	— 0, 05
α Ceti . . .	2 52 5, 87	3, 122	— 0, 005	— 0, 11
Aldebaran .	4 24 44, 49	3, 423	+ 0, 003	+ 0, 09
Capella . .	5 2 18, 11	4, 401	+ 0, 008	+ 0, 10
Rigel . . .	5 5 10, 20	2, 877	. . .	+ 0, 04
β Tauri . .	5 13 58, 35	3, 779	— 0, 001	+ 0, 04
α Orionis . .	5 44 37, 04	3, 242	. . .	— 0, 05
Sirius . . .	6 36 33, 17	2, 679	— 0, 036	+ 0, 27
Castor {Praeced. / Sequens.}	7 22 7, 73 / 7 22 8, 12	3, 861	— 0, 011	— 0, 05
Procyon . .	7 29 5, 18	3, 193	— 0, 047	— 0, 15
Pollux . . .	7 33 21, 76	3, 736	— 0, 047	— 0, 02
Alphard . .	9 18 0, 05	2, 950	— 0, 010	+ 0, 09
Regulus . .	9 57 58, 27	3, 225	— 0, 018	+ 0, 17
Denebola . .	11 39 6, 14	3, 103	— 0, 036	— 0, 07
β Virginis .	11 40 32, 15	3, 075	+ 0, 052	0, 00
Spica Virginis	13 14 56, 15	3, 146	. . .	— 0, 01
Arcturus . .	14 6 46, 11	2, 811	— 0, 078	— 0, 01
α2 Librae . .	14 40 6, 73	3, 303	— 0, 006	— 0, 04
Gemma . .	15 26 25, 83	2, 527	+ 0, 003	+ 0, 26
α Serpentis .	15 34 40, 18	2, 936	+ 0, 002	+ 0, 04
Antares . .	16 17 28, 45	3, 657	+ 0, 003	— 0, 05
α Herculis .	17 5 45, 46	2, 730	. . .	+ 0, 14
α Ophiuchi .	17 25 53, 13	2, 771	+ 0, 007	+ 0, 01
Wega . . .	18 30 20, 02	2, 011	+ 0, 017	+ 0, 03
γ Aquilae . .	19 36 59, 23	2, 851	— 0, 004	— 0, 16
α Aquilae. .	19 41 16, 00	2, 891	+ 0, 034	— 0, 09
β Aquilae. .	19 45 43, 92	2, 945	— 0, 001	— 0, 01
α Capricorni.	20 6 49, 74	3, 335	+ 0, 001	— 0, 04
2α Capricorni	20 7 13, 53	3, 334	+ 0, 004	— 0, 03
Deneb . . .	20 34 47, 04	2, 040	+ 0, 004	— 0, 01
α Aquarii. .	21 55 45, 81	3, 085	— 0, 008	— 0, 14
Fomahand. .	22 46 50, 84	3, 318	+ 0, 022	0, 00
α Pegasi . .	22 55 3, 25	2, 975	+ 0, 001	— 0, 10
α Andromedae	23 58 19, 80	3, 064	+ 0, 008	+ 0, 02

Namen der Sterne.	Mittlere Dec. 1805.				Jährliche Praec.	Eigne Bewegung.	Diff. mit Maskelyne.
γ Pegasi . .	14°	5′	56,″6	B	+ 20,″06	— 0,″09	+ 8‴,1
α Arietis . .	22	32	3,	7	+ 17, 54	— 0, 20	+ 3, 5
α Ceti . .	3	19	1,	7	+ 14, 67	— 0, 15	+ 5, 9
Aldebaran .	6	6	21,	3	+ 8, 10	— 0, 20	+ 2, 1
Capella . .	45	47	0,	6	+ 5, 00	— 0, 43	+ 0, 7
Rigel . .	8	26	12,	6 A	— 4, 75	+ 0, 04	— 7, 4
β Tauri . .	28	25	44,	4 B	+ 4, 00	— 0, 20	+ 4, 3
α Orionis .	7	21	31,	9	+ 1, 35	. . .	+ 4, 8
Sirius . .	16	27	27,	9 A	+ 3, 19	+ 1, 10	— 10, 6
Castor . .	32	18	9,	6 B	— 7, 04	— 0, 10	+ 1, 2
Procyon . .	5	42	55,	8	— 7, 60	— 0, 98	+ 6, 1
Pollux . .	28	29	6,	6	— 7, 95	— 0, 11	+ 3, 9
Alphard . .	7	49	11,	2 A	+ 15, 26	+ 0, 05	— 6, 6
Regulus . .	12	54	55,	4 B	— 17, 28	. . .	+ 3, 5
Denebola .	15	39	44,	4	— 19, 98	— 0, 08	+ 0, 7
β Virginis .	2	51	48,	9	— 19, 99	— 0, 25	+ 3, 8
Spica Virginis	10	8	19,	3 A	+ 19, 00	+ 0, 03	— 8, 3
Arcturus .	20	12	13,	2 B	— 17, 07	— 1, 96	+ 6, 0
α2 Librae .	15	13	22,	0 A	+ 15, 36	+ 0, 14	— 10, 4
Gemma . .	27	22	44,	8 B	— 12, 46	— 0, 12	+ 2, 3
α Serpentis .	7	2	54,	1	— 11, 89	— 0, 01	+ 6, 2
Antares . .	25	59	10,	0 A	+ 8, 68	+ 0, 07	— 13, 5
α Herculis .	14	37	24,	0 B	— 4, 70	+ 0, 05	+ 7, 0
α Ophiuchi .	12	42	46,	9	— 2, 98	— 0, 22	+ 4, 0
Wega. . .	38	36	35,	0	+ 2, 65	+ 0, 25	— 1, 6
γ Aquilae .	10	8	52,	9	+ 8, 24	+ 0, 02	+ 5, 4
α Aquilae .	8	21	50,	3	+ 8, 53	+ 0, 38	+ 3, 2
β Aquilae .	5	55	47,	2	+ 8, 93	— 0, 53	+ 5, 5
α Capricorni	13	5	59,	6 A	— 10, 55	. . .	— 9, 1
2 α Capricorni	13	8	18,	0	— 10, 58	— 0, 12	— 8, 8
Deneb . .	44	35	21,	8 B	+ 12, 54	— 0, 10	— 0, 6
α Aquarii .	1	15	40,	4 A	— 17, 19	+ 0, 05	— 7, 4
Fomahand .	30	39	7,	8	— 19, 05	+ 0, 27	— 12, 4
α Pegasi . .	14	9	33,	0 B	+ 19, 26	— 0, 08	+ 7, 0
α Andromedae	28	0	47,	6	+ 20, 06	— 0, 06	+ 6, 6

Zusatz zu §. 191.

Nach den neuen Venustafeln des Hr. von Lindenau *) ist

	T.	St.		
die siderische Umlaufszeit der Venus	= 224	16	49′	7″,987
— tropische — — —	= 224	16	41	25,847

*) Tabulæ Veneris novæ et correctæ ex theoria gravitatis clar. de Laplace et ex observ. recentiss. in specula astr. Seebergensi habitis erutæ, auctore *Bernhardo de Lindenau*. Gothæ. 1810.

tägliche trop. Bewegung	=		1°	36′	7″,8074
jährliche trop. Bew. in 365 T.	=	7$^{s.}$	14	47	29,688
trop. Bew. in 100 jul. Jahren	=	6	19	12	44,05
halbe große Axe	=	0,7233316			
Excentric. 1801.	=	0,0068074			
Neigung der Bahn 1801.	=	3°	23′	28″,4	
jährliche trop. Bew. des Apheliums	=		+ 46″,98		nach den Beobachtungen.
jährliche trop. Bew. des aufst. Knotens	=		+ 30,66		
jährliche Veränderung der Excentr.	=	- 0,00000 1088			
— — — — Neigung	=		+ 0″,0724		

Endlich ist für die Mitternacht des pariser Meridians zwischen dem 31. Dec. 1800 und dem 1. Jan. 1801

die mittlere Länge der Venus	=	0$^{s.}$	10°	44′	21″,6
— — — des Aphel.	=	10	8	43	53
— — — des Knot.	=	2	14	54	13.

Nach Piazzi *) ist das tropische Jahr = 365 T. 5 St. 48′ 50″,0, nur um 0″,86 Sek. kleiner als nach den Sonnentafeln des Hr. von Zach, und um 1″,6 kleiner als nach Delambre.

die mittlere Länge der Sonne am 31. Dec. 1804 im mittl. Mittag zu Palermo	=	9$^{s.}$	9°	39′	43″,0
	=	9	9	39	41,0 v. Zach
	=	9	9	39	40,0 Delambre
Länge des Apog. 1805.	=	3	9	34	31,5
		—	—	—	14,0 v. Zach
		—	—	—	13,0 Delambre
jährl. Bew. des Apog.	=			1	2,2
				1	1,91 v. Zach. und Delambre.
Excentr. 1805.	=	0,01678622			
		0,0167900 von Zach			
		0,0167926 Delambre			
Durchmesser der Sonne in der mittl. Dist.	=	32′	2″,47		
		32	2,75 v. Zach u. Delambre.		

Zusatz zu §. 310. und 366.

Wenn man den mittleren Abstand des Monds von der Erde = a' setzt, und die übrigen in dem angeführten §. gebrauchten Benennungen beybehält; so ist (Méc. cél. T. III. pag. 248.)

$$\left(\frac{r'}{a'}\right)^3 = \frac{m}{m+m'} \cdot \frac{r'}{l'} \cdot \frac{(2,0006168)^2}{0,9973020 \cdot t^2},$$ und daher für die Abplattung $\frac{1}{305}$

*) Monatl. Corresp. Aug. 1807. pag. 184.

$\left(\frac{r}{a'}\right)^3$ oder $\overline{\text{Sin.}p}^3 = \frac{4r}{s^2.t'} \cdot 1{,}005523. \frac{m}{m+m'}$, ſehr nahe mit dem §. 310. S. 549. gegebenen Ausdruck übereinſtimmend. Setzt man $r = 3271691$ (§. 143.), $l = 0{,}5092616$ (§. 269.), alſo $l' = 0{,}5104367$, und $p = 57'\,1''$; ſo erhält man $\frac{m}{m'} = \frac{1}{70{,}5}$. Und umgekehrt, wenn man nach §. 307. die Maſſe des Monds $= \frac{1}{69{,}75}$ ſetzt; ſo findet man $p = 57'\,0''{,}83$, nur $0''{,}17$ weniger, als der conſtante Theil der Bürgiſchen Mondsparallaxe ausmacht, welcher bey der von Bürg gewählten Form der Mondstafeln die Horizontalparallaxe des Monds unter dem Aequator in ſeiner mittleren Diſtanz von der Erde iſt.

Zuſatz zu §. 362. und 363.

Piazzi ſetzt die mittlere Schiefe der Ekliptik für den Anfang des Jahrs 1800 $= 23°\,27'\,56''$, und ihre jährliche Abnahme nach den Beobachtungen der neueren Aſtronomen $= 0''{,}443$. Ferner fand er aus den Beobachtungen das jährliche Zurückweichen der Aequinoktialpunkte $= 50''{,}21056$, die durch die Einwirkung der Planeten bewirkte directe Bewegung der Aequinoktialpunkte (§. 363.) $= 0''{,}1774$, ſo daß hienach die ganze durch die Sonne und den Mond bewirkte jährliche Bewegung der Aequinoktialpunkte $= 50''{,}388$ wird. Die Nutation in der Länge ſetzt er $= 19 \text{ Sin. } \Omega$ *). Hieraus folgt nach S. 672 die Nutation der Schiefe der Ekliptik $= 10''{,}15$. Maskelyne fand dieſe durch die Vergleichung aller von Bradley über die Nutation angeſtellten Beobachtungen $= 9''{,}55$ **).

Zuſatz zu §. 368.

Delambre fand aus Maskelyne'ſchen Beobachtungen von 1800, 1805 und 1807 weder eine periodiſche, noch progreſſive Aenderung des Sonnenhalbmeſſers, aber die Differenz der Horizontal- und Vertikalhalbmeſſer beynahe mit Hr. von Lindenau übereinſtimmend ***). Er erhielt folgende Reſultate.

*) Monatl. Corresp. Aug. 1807. pag. 185.

**) Mécan. cél. T. III. pag. 159.

***) Monatl. Corresp. Aug. 1810. pag. 193. u. f.

Register.

Die Zahlen beziehen sich auf die Seiten.

A.

Abenddämmerung, 76.
Abendpunkt, 3.
Abendstern, 131.
Abendweite, 11. 14.
Abirrung, Aberration, 235. f. wie sie bey den Planeten in Rechnung gebracht wird, 355.
Abplattung, der Erde, 197. 590. 647. 655.
—— des Jupiters, 163. 623. Gränzen derselben 656.
—— des Mars, 152.
—— des Saturns, 173.
—— der Sonne, 688.
Abweichung, der Sonne, 44. eines Sterns, 54. Veränderung d. Abw. der Sterne, 58.
Aequator, 5. der Erde, 67.
Aequatorshöhe, 45.
Aequinoctialpunkte, 44. Bestimmung ihrer Lage, 45. f. ihre Bewegung, 55. f. 670.
Almucantharat, 9.
Amplitudo, ortiva, occidua, 11. ihre Berechnung, 14.
Anomalie, mittlere, wahre, 251. 283. excentrische, 283.
Anziehung, 502.
Aphelium, 247.
Apogäum, 60.
Apsiden, 60.
Apsidenlinie, 60. Bestimmung ihrer Lage, 248.
—— des Monds, 100. ihre Bewegung, 101. 560. 569.
Argument der Breite, 100.
Ascensionaldifferenz, Constr. 12. Berechnung, 14.
Astrognosie, 19.
Astronomie, sphärische, 17. theorische, 186. physis., Newtonische, 501.
Atmosphäre, 22. Höhe, 80. Oscillat. derselben, 685. Gränze ihrer Abplattung, 685.
Atmosphäre der Sonne, 687.
Attraction, 502.
Atwoodische Maschine, 437.
Aufgang der Sterne, Bestimmung durch Constr. 11. d. Berechn. 14. 40.
Aufsteigung, gerade, der Sonne, 44. eines Sterns, 54. Veränd. 58.
Auges, 60.
Axendrehung, der Erde, 219. 243. der Venus, 139. d. Mars, 152. d. Monds, 121. des Jupiters, 163. des Saturns, 172. der Sonne, 85.
Azimuth, 8. 10. 13. 14.

B.

Barometer, Veränderung seiner Höhe durch die Ebbe und Fluth der Atmosphäre, 686.
Berge, des Monds, 124. f. der Venus, 139.
Bewegung, Gesetze der, 376. f. gleichförmige, 377. beschleunigte und verzögerte, 378. gleichförmig beschleunigte und verzögerte, 381. ihre Zusammensetzung und Zerlegung, 391. krummlinigte, 392. f. auf vorgeschriebenen Wegen, 422. f. freye, S. Centralbewegung. tägliche, 3. ist gleichförmig, 41. 42. eine Folge der Axendrehung der Erde, 219. mittlere der Planeten, ist unveränderlich, 593.
Brachystochrona, 434.
Brechung der Lichtstralen, 21. in der Luft, 23.
Breite, eines Sterns, 53. Berechnung, 54. der Sonne, 605. geocentrische, 305. f. geographische, 67. heliocentrische, 298. Breitenkreis 53.

C.

Centralbewegung, 457. Gesetz der Centripetalkraft in der Ellipse, 465 f. 474. in einer gegebenen krummen Linie, 477. Bestimmung er krummen Linie, wenn die Centripetalkraft umgekehrt dem Quadrat der Entfernung proportional ist, 485. f. Umlaufszeit in der Ellipse, 489. Zeit, in welcher ein Secter beschrieben wird, 490.
Centripetalkraft, 458.
Centrifugalkraft, S. Schwungkraft.
Ceres, 178.
Clairauts Theorem, 655.
Cometen, 179. f. ihre Bahnen, 320. f. Bestimmung der parab. Bahn d. Constr.

Conſtr. 325, f. durch Berechnung, 333. f. Wiederkehr derſelben, Halleyſcher Comet, 356. bringen keine merkliche Perturbationen hervor, 599, 609. werden durch die Planeten geſtört, 608. ihre Phaſen, 357. Größe des Cometen von 1807, 357. f. Kleinheit ihrer Maſſen, 608. 609. Wirkungen ihres Stoßes, 610.
Commutationswinkel, 306.
Conjunction, 92. untere u. obere, 129.
Conſtellation, 19.
Copernicaniſches Syſtem, 182.
Correſpondirende Höhen, 7.
Cycloide, 431.

D.

Dämmerung, 76. f. bürgerliche, 77. Dauer derſelben, 77. kürzeſte 78. f.
Declination, S. Abweichung.
Dichtigkeit, der Himmelskörper, 534. f. der Sonne, 537. der Erde, 539. der Planeten, 537. 538. mittlere, 535.
Diſtanz, abgekürzte, 298. ſcheinbare, der Sterne, 19. f. Berechnung der wahren aus der ſcheinbaren, 41. f.
Durchmeſſer, S. Halbmeſſer.

E.

Ebbe und Fluth, 675. f. Formeln zur Berechnung der Fluthhöhen, 682. 683.
Ebene, unbewegliche, 597.
Ecliptique fixe, 598.
Ekliptik, ihre Eintheilung, 56. Schiefe, 47. Beſtimmung derſelben, 50. f. Veränderungen, 57. f. 594. Secularveränderungen, 674.
Elemente der Planetenbahnen, 295. 299. f. Veränderung derſelben, 594.
Ellipſe, Figur der Planetenbahnen, 271. bewegliche, 564. f.
Elongationswinkel, 306.
Entfernung, ſcheinbare der Sterne, 19. f. S. Diſtanz. des Monds von der Erde, 95. nach Ariſtarch, 110. der Sonne von der Erde, 73. nach Hipparch, 120.
Epoche, 295.
Erde, ihre kugelförmige Geſtalt, 14. f. 119. f. ihre Axendrehung, 219, 243. Pole, 66. genauere Beſtimmung ihrer Geſtalt und Größe, 187. f. Snellius Methode, 194, 193. Abplattung, 197, 205, 210, 590, 647, 655. Abweichungen des Erdſphäroids, 210. f. Dichtigkeit, 539. un gleichförmige Dichtigkeit derſelben, 651. f. Theorie ihrer Geſtalt, 626. f. ellipt. Sphäroid. 638. f. Axenverhältniß bey gleichf. Dichtigkeit, 647. bey ungleichf. 655. Gränzen der Erdaxplattung, 654.
Erdaxe, 67. Theorie ihrer Bewegung, 659. f.
Erdbahn, Beſtimmung ihrer Figur, 257, 258, 271.
Erdferne, Erdnähe, 60. des Monds, 100.
Erdſchatten, auf dem Mond, wahrer Schatten, 113. f.
Erdſtriche, 74.
Evection, 101, 581.

F.

Fall, freyer, der Erdkörper, 417. f. Fallhöhe aus der Länge des Sekundenpendels, 455. Fall mit Rückſicht auf die Axendrehung der Erde, 245. auf der geneigten Ebene, 418. auf vorgeſchriebenen Wegen, 425. f. durch den Fall erlangte Geſchwindigkeit, 426, 477. Alle Körper fallen im Vacuo gleich geſchwind, 456.
Feuchtigkeit der Luft, ihr Einfluß auf die Stralenbr. 39.
Figur der Himmelskörper, 626. Theorie derſelben, 627. f. einer gegebenen Umdrehungszeit entſprechen zwey Figuren, 648. Gränzen der ellipt. Figur, 650. Clairaut's Theorem, 655.
Finſterniße, der Sonne, 104, 111. des Monds, 105, 113. der Jupiterstrabanten, 155. Periode der Finſterniße, 118. f.
Fixſterne, 18. eigene Bewegung derſelben, 694. f. 698. ihre Entfernung, 240, 241.
Flecken, der Sonne, 84. des Monds, 121. f. der Venus, 139. des Mars, 152. Jupiters, 165. des Saturns, 173.
Fluth, 675. f. Fluthhöhen, ihre Berechnung, 682, 683.
Frühlingspunkt, 44.
Fußpunkt, 2.

G.

Gasarten in der Atmoſphäre, 39.
Gegenſchein, 91.
Geocentriſcher Ort der Planeten, Berechnung deſſelben, 305.
Geſchwindigkeit, 377.
Geſetze der Bewegung der Planeten,

246. f. erſtes kepl. Geſetz, 271, 461. zweytes, 272. drittes, 274. Vergl. 522. Modification des dritten, 525. des freyen Falls 417.
Geſetz, Mariottiſches, 22. der Trägheit, 300.
Geſichtskreis, 1.
Geſtalt, S. Figur.
Gleichung des Mittelpunkts, 251. ihre Berechnung in der Ellipſe, 280. f. gröſte Gleichung des Mittelpunkts, im Kreis, 254, 259. in der Ellipſe, 289. f. wie ſie durch Beobachtungen gefunden wird, 252. Jährliche des Monds, 102. nach der Theorie, 571. f.
Gleichung der Zeit, 62.
Gleichungen des Monds, 359. nach Mayer und Bürg, 586. f.
Grade eines Erdmeridians, 196.
Gradmeſſungen, 191, 193. f.
Gravitation, 502. gegen gleichförmig dichte Körper von gegebener Figur, 505. f. gegen eine Kugel, 508.
Größe, ſcheinbare, 72.

H.

Halbmeſſer, ſcheinbarer und wahrer der Sonne und Planeten, 217. des Monds, 95.
Halbſchatten, 116.
Herbſtpunkt, 44.
Himmelsgewölb, 1. eingedrückte Geſtalt deſſelben, 80. f. Berechnung, 82.
Höhe der Sterne, gröſte und kleinſte, 3, 4. corresp. Höhen, 7. Berechnung der Höhen, 12.
Horizont, 1.
Hygrometer, ob es bey der Stralenbrechung zu Rath gezogen werden müße, 39.

J.

Jahr, 63. tropiſches, ſideriſches, ebend.
Jahrszeiten, 43.
Jährliche Gleichung, 102.
Irrſterne, 18.
Isochrona, 432.
Juno, 178.
Jupiter, 152. ſcheind. Bew. 153. Beſtimmung ſeiner Entfernung von der Sonne, 158. ſcheinbare Beſchleunigung ſeiner mittleren Bewegung 592. Urſache derſelben, 601. Streifen des Jupiters, 163. Axendrehung, 163. Abplattung, 163, 623, 648, 656. Maſſe, 532, 534. Dichtigkeit, 537.
Jupitersſtrabanten, 154. ihre Umlaufszeiten, 156. Abſtände, 164. Axendrehung, 165. Durchmeſſer, 166. Maſſen, 623. Verfinſterungen, 155. Dauer der Verfinſt. 165. Entdeckung der ſucceſiven Fortpflanzung des Lichts, 160. Verhältniße der mittleren Bewegungen der drey erſten Jupitersſtrabanten, 157. der mittleren Längen, 161, 619. La Place's Theorem, ebendaſ. Libration, 620. Beſtimmung ihrer jovicentriſchen Längen, 157, 160. Bewegung nach dem dritten kepl. Geſetz, 371. Lage und Neigung ihrer Bahnen, 360. f. Geſetz ihrer Veränderung, 612. Geocentriſche Geſtalt der Bahnen, 366. Ungleichheiten ihrer Bewegungen, 368. f. 615. Hauptungleichheiten ihrer Verfinſterungen, Periode von 437 Tagen, ebendaſ.

K.

Keplériſche Regeln oder Geſetze, 271, 272, 274.
Knoten, des Monds, 96. Bewegung derſelben, 97. nach der Theorie, 552. f. der Planeten, 264.
Knotenlinie, 96.
Koluren, 48.
Kometen, S. Cometen.
Kraft, 399. unveränderliche und veränderliche, 400. wodurch ſie gemeßen wird, 400. Zuſammenſetzung und Zerlegung der Kräfte, 414. f. aus dem Geſetz der Kraft das Geſetz der Geſchwindigkeit finden, 401. f. 405.
Kräfte, welche nur auf das Aeußere wirken, 434.
Kreisbewegung, 461. f.

L.

Länge der Sterne, 53. f. heliocentriſche, 297. geocentriſche, 305. geographiſche, 67, 68. des Monds in ſeiner Bahn, 99.
Libration, des Monds, 121. der Jupitersſtrabanten, 620.
Licht, Brechung des Lichts, 21. aſtronomiſche Stralenbrechung, S. Stralenbrechung. Succeſive Fortpflanzung des Lichts, 160.
Lichtgeſtalt, S. Phaſen.

Lichtgleichung, große und kleine, 370.
Loth, Bleyloth, 1.
Luft 22. ihre Ausdehnung durch die Wärme, 22. Gewicht, 22. Strahlenbrechende Kraft, 23.

M.

Mars, scheinb. Bewegung, 139. Darstellung derselben, 140. f. 147. seine Phasen, 147. Flecken, Axendrehung, 152. Abplattung, 152. Parallaxe, 151. dient zur Bestimmung der Sonnenparallaxe, 151.
Masse der Himmelskörper, 528, 534. wie sie gefunden wird, 528. f. der Planeten, 533. f. des Monds, 545, 672. der Jupitersstrab. 623.
Mechanik des Himmels, 501.
Meer, S. Ebbe und Fluth.
Merkur, 126. gröste Digressionen, 126. Darstellung seiner scheinb. Bewegung, 127. 132. relative Bewegung, 134. Durchgänge vor der Sonne, 131. Phasen, 128.
Mètre, 211.
Meile, geographische. 211, 213.
Meridian, Mittagskreis, 2. Bestimmung seiner Lage, 5, 6, 7. erster Meridian, 68.
Milchstraße, 695.
Mittagslinie, 2. wie sie kann gezogen werden, 7.
Mittagspunkt, Südpunkt, 3.
Mittagsunterschied, 68.
Mittelpunkt der Kräfte, 458. gemeinschaftlicher der Planetenbahnen, 491. des Schwungs, 442.
Mitternachtspunkt, Nordpunkt, 3.
Moment der Trägheit, 443.
Monat, synodischer, 91. periodischer, 91. ihre Vergleichung, 92.
Mond der Erde, seine scheinbare Bahn, 93. f. Neigung derselben, 97. Veränderung, 97. tägliche Bewegung, 92. mittlere tägliche Umlaufszeit, 93. Veränderung derselben, 94. Ungleichheiten seiner Bewegung, 100. f. 359. f. mittlere Horizontalparallaxe des Monds, 95, 548. f. mittlerer Halbmesser des Monds, 95. scheinbare Vergrößerung am Horizont, 83. f. wirkliche Zunahme seiner scheinbaren Größe mit der Höhe, 72. Abstand des Monds von der Erde, 95. nach Aristarch, 110.
Mondsberge, 124. f.
Mondsfinsternisse, 105. f. 113. Gränzen ihrer Möglichkeit, 114, 115. Periodeu, 118. f.
Mondsflecken, 121. f.
Mondjahr 92.
Mondsphasen, ihre Bestimmung, 106. f.
Mondstafeln, Mayer's, Bürg's, 585. f.
Mondstheorie, 545. f. Bewegung der Knoten, 552. f. Veränderung der Neigung, 558. f. Bewegung der Apsidenlinie, 560. f. jährliche Gleichung, 571. f. Seculargleichung, 575. f. Evection, 581. Variation, 582.
Morgen-Dämmerung, 76.
Morgenpunkt, Ostpunkt, 3.
Morgen- und Abendstern, 131.
Morgen- und Abendweite, 11.

N.

Nachtgleichen, Punkte der Nachtgleichen. 44. Zeit der Nachtgleichen, 50 Vorrücken, 63. Vergl. Aequinoktialpunkte.
Nadir. Fußpunkt, 2.
Nebelflecke, Nebelsterne, 695.
Nebenplaneten, Gesetze ihrer Bewegungen, 493. ihre Axendrehung, 121. 165, 171.
Neigung der Mondsbahn, 97. Veränderung, 558. f.
Neigungen der Planetenbahnen, 301. Veränderung derselben, 301, 594.
Neumond, 91.
Nordpunkt, 3.
Nutation, 231. f. Theorie, 672. die Erscheinungen derselben sind dieselben, als wenn das Meer mit der Erde eine feste Masse bildete, 685.

O.

Opposition, 91.
Optische Ungleichheit, 256, 259.
Ostpunkt, 3.
Ostwinde, zwischen den Wendekreisen, 686.
Ovallinie, Keplers, 270.

P.

Pallas, 178.
Parabel, Bahn der Cometen, 320. f. in welchem Fall sie beschrieben wird, 489.
Parallaxe, 21. Bestimmung durch Beobachtung, 70. Horizontalparallaxe, 71. der Sonne, 72, 73, 132, 151. nach der Mondstheorie, 590. des

Monds, 94. f. nach der Theorie der allgemeinen Schwere, 548. f. 700. f. Verbesserung wegen der Gestalt der Erde, 213. Parallare der Fixsterne, die tägliche ist unmerklich, 40. jährliche, 229, 240. f.
Parallelkreise, des Aequators, 5.
Pendel, einfaches, 427. Gesetze der Schwingungen, 429. f. in der Cykloide, 431. im Kreis, 433. Aufhängungspunkt, Mittelpunkt des Schwungs, 442. Bestimmung der Länge des einfachen aus der Länge des zusammengesetzten, 437. f. Zunahme der Pendellängen vom Aequator gegen die Pole, 243. Pendellängen unter verschiedenen Breiten, 450. Gesetz ihrer Veränderungen, 451. nach der Theorie, 639.
Perigäum, 60.
Perihelium, 247.
Perturbationen, 541, 545, 607.
Phasen, des Monds, 90, 106. f. der Erde, 110. der Merkurs, 128. der Venus, 130. des Mars, 147. des Jupiters sind unmerklich, 163. der Cometen, 357.
Planeten, 18, 126. untere und obere, 145. neue, teleskopische, 178. Bestimmung ihres heliocentrischen Orts aus dem geocentrischen, 261. Berechnung des heliocentrischen Orts, 296. f. des geocentrischen, 305. f. Zeichen der Planeten, 179.
Planetenbahn, Bestimmung derselben in der Kreishypothese, 316. Bestimmung d. elliptischen Bahn, 275, 309 f.
Polarkreise, 75.
Polarstern, Veränderung seines Abstands vom Pol, 59.
Pole, Nord- und Südpol der Himmelskugel, 3. der Erde, 110.
Polhöhe, 3. ihre Bestimmung, 4, 52.
Präcession, 55. f. 670.
Problem der drey Körper, 504. keplerisches, 282.
Prostaphæresis, 251.
Ptolemäisches System, 181.

Q.

Quadrant ein. Erdmeridians, 208, 210.
Quadraturen, 90, 91.

R.

Radius Vector, 251.
Rechtläufig, 135.
Rectascension, S. Aufsteigung.
Reduction auf die Ekliptik, 100.
Refraction, S. Stralenbrechung.
Richtung der Bewegung, 377. der Kraft, 401.
Ring, des Saturns. S. Saturn.
Rotation. S. Axendrehung.
Rückläufig, 135.

S.

Saturn, 166. scheinbare Verlängerung seiner mittleren Bewegung, 592. Ursache derselben, 601. Axendrehung, 172. Irreguläre Gestalt des Saturns, 173. Scheinbarer Durchmesser, 166.
Saturnsring, 167. Veränderungen, 168. f. dient zur Bestimmung der Entfernung des Saturns, 169. f. Axendrehung desselben, 172. f. Abmessungen, 173. Irreguläre Gestalt, 174. Geocentrische Gestalt und Lage des Rings, 373. f. Theorie, 656.
Saturnstrabanten, 170. siderische Umlaufszeiten, 172. Axendrehung des siebenten, 171. Abstände und Längen, ebendas. bewegen sich nach dem dritten keplerischen Gesetz, 374. Lage ihrer Bahnen, 372. f. Veränderungen, 623. Geocentrische Gestalt der Bahnen, 373.
Schalttag, 63.
Scheitelpunkt, 3.
Schiefe der Ekliptik, S. Ekliptik.
Schwanken der Erdaxe. S. Nutation.
Schwanken des Monds. S. Libration.
Schwere der Erdkörper, 417. f. Gesetz ihrer Veränderung, 638, 639.
Schwere erstreckt sich auf den Mond, 494, 547.
Schwere, allgemeine, 457. f. Gesetz, 497. Geschichte der Entdeckung der allgemeinen Schwere, 499.
Schwerpunkt, Bewegung desselben, 513. f. Aehnlichkeit der Bahnen um den Schwerpunkt, 519.
Schwingungspunkt. S. Mittelpunkt des Schwungs.
Schwungbewegung. S. Pendel.
Schwungkraft, 465.
Secularaleichung, des Monds, 102. f. ihre Ursache, 575.
Secularungleichheiten, 592.
Secundenpendel, Länge des einfachen, 453.
Solstitialpunkte, 44.



Register.

Sonne, scheinbare Bewegung, 43. f. Ungleichförmigkeit derselben, 60. Arendrehung der Sonne, 85. kugelförmige Gestalt, ebendas. scheinbarer und wahrer Durchmesser der Sonne, 217, 688, 700, 702. Abplattung der Sonne, 648, 688, 701. f. Scheinbare Größe der Sonne am Horizont, 83. f.
Sonnenäquator, 85. Bestimmung seiner Lage, 85. f.
Sonnenfinsternisse, 104. f. 111. totale, partiale, ringförmige, 111, 112. Gränzen ihrer Möglichkeit, 112. Perioden, 118. f.
Sonnenferne, 247. f.
Sonnenflecken, 84.
Sonnenjahr. S. Jahr.
Sonnennähe, 247.
Sonnensystem, Fortrücken desselben, 696, 697.
Sonnentag, mittlerer und wahrer, 61, 62, 65.
Sonnenwenden, Solstitialpunkte, 44.
Sonnenzeit, mittlere und wahre, 61, bis 65.
Stabilität des Planetensystems, 596, 604. des Gleichgewichts des Meeres, 684.
Sterne, ihr Verschwinden, 16, 17. sind durch Fernröhre bey Tag sichtbar, 17. Vergl. Fixsterne.
Sternbild, 19.
Sternhaufen, 695.
Sterntag, 61.
Sternzeit, 64. Vergleichung derselben mit mittlerer Sonnenzeit, 65.
Stillstandspunkte, des Merkurs und der Venus, 136. f. der oberen Planeten, 148. f.
Störungen, der elliptischen Beweg. 541. f. des Monds durch die Sonne, 545. f. der Planeten, 607.
Stralenbrechung, 19, 21, 24. Erscheinungen, welche sie hervorbringt, 25. Theorie der Stralenbrechung, 26. f. Simpson's und Bradley's Regeln zu ihrer Berechnung, 28. Bestimmung der Stralenbrechung durch Beobachtungen, 31. f. 52. Tafel der Stralenbrechung nach La Place, 37. Veränderungen der Stralenbr 38, 39.
Stundenwinkel, 9. seine Berechnung, 12, 13.
Südpunkt, 3.
Synodischer Monat, 91, 103.
Syzygien, 91.

T.

Tag, astronomischer, 61. seine Ungleichheit, 61. bürgerlicher, 64. Unveränderlichkeit des mittleren astr. Tags, 579.
Tagbogen, 11. scheinbarer, 40.
Tavtochrona, 432.
Teleskopische Planeten, 178.
Thierkreis, 126. Zeichen desselben, 56. Sternbilder, 57.
Thierkreislicht. S. Zodiakallicht.
Tolse von Peru, 211.
Trabanten, des Jupiters, 154. des Saturns, 170. des Uranus, 177. Vergl. Jupitertrabanten, Saturntrabanten.
Trägheit, 400. Moment der Trägheit, 443.
Tropicus, 57.
Tropisches Jahr, 62.
Tychonisches System, 183.

U.

Umdrehung. S. Arendrehung.
Umlaufszeit, tropische der Sonne, 62. anomalistische Umlaufszeit, 249.
Umlaufszeiten, des Monds. S. Mond. der Planeten, 300.
Untergang der Gestirne, 10, 14, 40.
Ungleichheit, physische und optische, 259, periodische und Secularungleichheiten, 592.
Uranus, 175. frühere Beobachtungen desselben, 176, 607. Uranustrabanten, 177, 624.

V.

Variation des Monds, 102, 582.
Venus, 130. Flecken, Arendrehung, 139. Berge, 139. gröster Glanz, 131. Durchgang vor der Sonne, 131. dient zur Bestimmung der Sonnenparallaxe, 132. Darstellung ihrer scheinbaren Bewegungen, 130, 132. Construction ihrer relativen Bahn, 134. Venustafeln, 699.
Vesta, 178.
Viertel, 90.
Vollmond, 90.
Vorrücken der Nachtgleichen, 63. ist eine Folge der Bewegung der Erdaxe, 226, 670.

W.

Weiten in Oſt und Weſt. S. Morgen- und Abendweite.
Weltare, 3.
Weltſyſtem, Weltordnung, Ptolemäiſches, 181. Copernikaniſches, 182. Tychoniſches, 183.
Wendekreiſe, 57.
Weſtpunkt, 3.
Widerſtand des Mittels, 575.
Winde, zwiſchen den Wendekreiſen, (vents alisés), 686.
Wurfbewegung, 470.

Z.

Zeichen des Thierkreiſes, 56. unterſcheiden ſich von den Sternbildern des Thierkreiſes, 56. 57 aufſteigende und niederſteigende Zeichen, 57.
Zeichen der Planeten, 179.
Zeit, mittlere, wahre, 62.
Zeitgleichung, 62.
Zenith, 2.
Zerlegung der Bewegung, 391. f. der Kräfte, 414. f.
Zolle, bey Finſterniſſen, 113, 117.
Zodiakus, 126.
Zodiakallicht, 687. wahrſcheinliche Urſache deſſelben, 692.
Zonen, 74.
Zurückweichen der Aequinoktialpunkte, 56, 226, 670.
Zuſammenkunft, 91.
Zuſammenſetzung, der Bewegung, 391. f. der Kräfte, 414. f.

Druckfehler und Verbeſſerungen.

Seite	Lin.	
9	22	leſe man: PF und PG der Polardiſtanz des Sterns gleich nimmt, und die Punkte F und G.
11	5 v. u.	ſtatt $\left.\begin{matrix}pF\\pG\end{matrix}\right\}$ l. $\left.\begin{matrix}pF'\\pG'\end{matrix}\right\}$
12	15	ſt. Rw l. $: RW$.
13	1	ſt. $2\left(\frac{\text{Sin. }\frac{1}{2}t}{\text{Sin. tot.}}\right)$ l. $2\left(\frac{\text{Sin. }\frac{1}{2}t}{\text{Sin. tot.}}\right)^2$.
17	1 v. u.	ſt. betrift, l. übertrift.
19	13 v. u.	ſt. weil, l. welche.
24	6	ſt. des, l. das.
—	1 v. u.	l. Parallare.
25	12	ſt. den l. der.
26	17	ſt. Ende l. Erde.
—	2 v. u.	ſt. Sin. b Sin. b' l. Sin. b' Sin. b''.
27	1	ſt. cb l. $: cb$.
—	7	ſt. verlänge l. verlängere.
—	11 v. u.	ſt. $\left\{\begin{matrix}\text{Sin. } s'\\\text{Sin. } (b'-r')\end{matrix}\right\}$ l. Sin. $b' : \left\{\begin{matrix}\text{Sin. } s'\\\text{Sin. } (b'-r')\end{matrix}\right\}$
29	13	ſt. Zeitdiſtanz l. Zenithdiſtanz.
30	15	l. Coefficient.
32	14	ſt. 8° 9′ l. 7° 48′.
—	8 v. u.	l. der doppelte Unterſchied.
—	7 v. u.	l. Polhöhen.
—	4 v. u.	ſt. 8′ l. 8″.
—	2 v. u.	l. $s'-s$
33	21	ſt. 41. l. 21.
—	25	ſt. s l. S.
—	26	ſt. s' l. S'.
37	8	ſt. 48° l. 8°.
39	7 v. u.	ſt. Refraktion l. Temperatur.
—	1 v. u.	ſt. überſtim- l. übereinſtim-



Seite	Lin.	
46	26	ſt. Sin. Ab' : Sin. Ab l. Sin. Ab' – Sin. Ab.
47	4	ſt. Ab l. Ab''.
60	5	v. ſt. ſt. ab l. zu.
—	4	v. u. ſt. zugenommen l. abgenommen
80	10	ſt. ef l. cf.
—	18	ſt. cbd l. sbd.
82	6	v. u. ſt. $\frac{1}{2}$ Tg. a. l. $\frac{1}{2}\overline{\text{Tg.}a}^2$.
84	15	ſt. §. 59. l. §. 58.
85	3	v. u. ſt. $acbd$ l. $aebd$
88	13	ſt. in A l. A.
89	3	v. u. l. $\begin{Bmatrix} 7^\circ\ 15'\ 11'',7 \\ 7\ \ 15\ \ 11,5 \end{Bmatrix}$
90	7	v.. u. ſt. erſcheint l. erſcheint er.
93	4	v. u. ſt. 4. l. 5.
94	17	ſt. wenn man l. und.
95	20	ſt. paralare l. parallare.
101	24	ſt. ſeiner l. von ſeiner.
107	6	v. u. ſt. Etliptit l. Etliptik.
110	13	ſt. Nachſeite l. Nachtſeite.
114	9	ſt. es l. as
119	21	ſt. Meridian l. Meridiane.
125	5	ſt. Nachſeite l. Nachtſeite.
—	11	iſt die 28. Figur zu citiren.
132	19	l. vor der Sonne.
133	14	ſt. nehmen l. nehme.
—	24	ſt. $e'm'b'$ l. $a'm'b'$.
134	4. und 5	ſt. Bewegungen l. Bewegung.
137	18	ſt. $(R^2 - r)$ l. $(R - r^2)$.
147	21	ſt. 200 l. 2000.
149	16	ſt. $(r^2 - V^2)$ l. $(v^2 - V^2)$.
154	14	ſt. parallen l. parallelen.
158	13	v. u. ſt. Punkt l. Winkel.
163	10	l. veränderlich.
177	4	l. Flamſteed.
183	15	ſt. Unordnung l. Anordnung.
187	8	v. u. ſt. kommt l. kennt.
197	1	v. u. ſt. b l. b^2.
213	12	v. u. ſt. 17'8,87 l. 859,435.
222	10	v. u. ſt. V l. Z.
—	8	v. u. l. PSV.
223	12	v. u. ſt. ihre l. ihre Are.
227	7	v. u. ſt. dem l. den.
228	2	v. u. ſt. Bewegungen l. Benennungen.
229	11	v. u. l. mehr als
235	4	v. u. ſt. ; l. ,
243	1	ſt. 19,36 l. 19,26.
—	7	v. u. ſt. verſchiedene l. verſchiedenen.
—	—	— ſt. Länge l. Längen.
244	2	ſt. Umfangse l. Umfangs.
249	11	v. u. ſt. beziehende l. ſich beziehende.
250	7	ſt. Apſidenlie l. Apſidenlinie.
254	6	v. u. ſt. iſt l. iſt.
257	5	v u. ſt. Ts l. $t's$.
264	18	ſt. $Sr'p'$ l. $r'Sp'$.
265	21	ſt. Tg. $(\frac{1}{2}(L-l)-n)$ l. Tg. $(\frac{1}{2}(L+l)-n)$

in.
30 st. $L-l$ l. $L+l$, zweymal.
8 v. u. in der Note st. apello l. appello.
12 st. $\sqrt{1+e^2}$ l. $\sqrt{1-e^2}$.
3 st. Gränze l. Genüge.
3 st. Cos. u l. Cos. v.
— 12 st. als l. also.
312 u. 313 kommt der Buchstabe b unter zweyerley Bedeutung vor.
8. u. I. II. bezeichnet er die Breite PTR, in den übr
drücken aber den Winkel RST.
10 l. der Sonne $=1$, des Planeten $=a$, die Masse der Erde
Planeten $=$
18 l. Insigniores.

st. $\overline{C\ldots\tfrac{1}{2}u}^2$ l. $\overline{\text{Cos.}\tfrac{1}{2}v}^2$
u. st. PM l. $\overline{PM}^2$.
. l. Länge des Periheliums $=270$ u. s. w.
24 st. Beschleunigung l. Beschreibung.
st. sey l. seyn.
st. in Mm l. Mm.
6 v. u. st. Verhältniß l. Verhältniß.
25 l. verhält sich
430 11 st. $1:4\pi^2$ l. $\pi^2:4$.
— 12 st. $1:\pi^2$ l. $\pi^2:1$.
— 13 st. $\pi^2:1$ l. $1:\pi^2$.
— 16 st. $\pi^2:1$ l. $1:\pi^2$.
— 8 v. u. st sie l. sich.
436 4 v. u. st. PQ l. $P-Q$.
477 19 st. welcher l. welche
480 9 v. u. st. ch l. e^2h.
489 2 st. $MQ.MS$ l. $MQ=MS$.
506 16 st. mr l. nr.
533 23 st. Sin. 8″, l. Sin. 8″,8.
551 1 st. MP l. Mp.
552 1 v. u. ist die 131. Fig. zu citiren.
553 12 v. u. st. Perperdickel l. Perpendickel.
560 6 v. u. st. $cpcq$ l. cp,cq.
561 4 l. Centripetalkraft $x=\frac{\overline{ad}^2}{ca}$ (§. 273. n. 1.), und in ei
dem Halbmesser cm mit der Geschwindigkeit mo besch
Kreis die –
566 13 st. eine l. einer
576 24 st. $\left(\frac{a}{E}\right)^3$ l. $\left(\frac{a}{R}\right)^3$.
587 30 st. XV. l. XXV.
589 2 st. 57″ l. 57′.
608 7 st. Peturbationen l. Perturbationen.
623 21 st. III. l. IV. und zwischen II. und IV. setze man III. 0,0000
644 2 v. u. st. $2\overline{D}^2$. l. $c\overline{D}^2$.
656 24 st. Die l. die
672 14 l. Aequinoktialpunkts.


31
b
s
a
m
c
e
q
n
f
t




35
e
m
r
I
c
V
S
E
4 mit 4
e
p
d
B
l
m
c
f
g
h
C
45
P
k
V
S'
Z'
m
p
m'
C
p'


P
d
p
a
D
b
p
c
E
51
Q
q
L
T
C
K
M
V


N'
58
S
q
p
m
q
r
N




64
70
74
82


90
96
95
103
109




114
A
L
C
V
r
R
P
S
Q
119
E
e
C
F
H
Q
L
121
g
f
d
A
p
C
3
b
B
126
n'
b
r
n
p
a
133
a'
a
m
r
q
p
A


136
139
I
P
C
G
K
A
I'


146
L
G

QB 43 .B7
Astronomie /
Stanford University Libraries
3 6105 041 613 568

QB
43
B7

Stanford University Libraries
Stanford, California

Return this book on or before date due.